



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Post-ACL Reconstruction Rehabilitation

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #24

Klinische Details

Arzt: Dr. PSP

Datum: 2026-03-28

Beschreibung: A 28-year-old male athlete, 4 weeks post-op for ACL reconstruction using a hamstring graft. Currently experiencing mild swelling and limited range of motion (ROM) in the right knee.

Physische Messungen

Größe: 182 cm

Gewicht: 78 kg

Blutgruppe: O+

Anamnese

Raucher: Nein

Chronische Krankheiten: Nein

Aktivitätsniveau: Aktiv

Zusätzliche Patienteninformationen

Verletzungsgeschichte: Complete ACL tear occurred during a football match on January 15, 2026, due to a sudden pivoting motion. Surgery was performed on March 1, 2026.

Medikationen: Ibuprofen 400mg as needed for pain, Vitamin D3 supplements, and Omega-3 fish oil.

Funktionsfähigkeit: Partial weight-bearing with one crutch. Knee flexion is currently at 95 degrees. Struggles with stairs and long-distance walking.

Persönliche Ziele: Full return to competitive football within 9 months, restoration of full quad strength, and achieving 135-degree knee flexion.

Intelligente klinische Analyse

Klinische Erklärung:

Der Patient ist ein 28-jähriger männlicher Athlet, der sich vier Wochen nach einer vorderen Kreuzbandrekonstruktion mit einem Hamstring-Transplantat befindet. Der aktuelle Zustand zeigt eine leichte Schwellung und eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit im rechten Knie. Die postoperative Phase erfordert eine sorgfältige Rehabilitation, um die Funktionalität des Knies wiederherzustellen und die Rückkehr zum Wettkampfsport zu ermöglichen. Die Ziele des Patienten umfassen die vollständige Rückkehr zum Fußball innerhalb von neun Monaten sowie die Wiederherstellung der vollen Quadrizepskraft und eine Kniebeugung von 135 Grad.

Sofortige physiotherapeutische Empfehlungen:

Die physiotherapeutischen Maßnahmen sollten sich auf die Verbesserung der Beweglichkeit und die Stärkung der Muskulatur konzentrieren. Passive und aktive Mobilisationstechniken sollten angewendet werden, um die Flexion des Knies zu fördern. Kräftigungsübungen für die Oberschenkelmuskulatur sind ebenfalls wichtig, jedoch sollte die Intensität schrittweise gesteigert werden, um Überlastungen zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Es ist wichtig, übermäßige Belastungen des Knies zu vermeiden, insbesondere bei Aktivitäten, die plötzliche Richtungswechsel erfordern. Der Patient sollte darauf achten, keine Schmerzen während der Übungen zu verursachen und die Schwellung im Auge zu behalten. Treppensteigen und längere Gehstrecken sollten mit Vorsicht angegangen werden.

Geschätzter Erholungsverlauf:

Die vollständige Genesung und Rückkehr zum Wettkampfsport wird innerhalb von neun Monaten nach der Operation erwartet, wobei die ersten drei Monate der Rehabilitation besonders kritisch sind.

Risikobewertung:

Potenzielle Risiken umfassen eine verzögerte Heilung, anhaltende Schwellungen und Schmerzen sowie das Risiko von Komplikationen wie einer Thrombose oder einer erneuten Verletzung des Kreuzbands.

Warnzeichen:

Notfallzeichen, die sofortige medizinische Aufmerksamkeit erfordern, sind starke Schmerzen, plötzliche Schwellungen, Fieber, Rötung oder Überwärmung des Knies sowie das Gefühl von Instabilität im Gelenk.

Testgruppe: Range of Motion (ROM) Assessment

Test: Knee Flexion (Right)


HIGHEST
115.0

LOWEST
95.0

AVERAGE
106.0

OVERALL PROGRESS

Increased by 21.1% ↑ Since first test (2026-04-01)



Datum	Ergebnis
2026-04-01	95
2026-04-05	100
2026-04-10	110
2026-04-20	110
2026-04-26	115

