



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Post-ACL Reconstruction Rehabilitation

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #24

Klinische Details

Arzt: Dr. PSP

Datum: 2026-03-28

Beschreibung: A 28-year-old male athlete, 4 weeks post-op for ACL reconstruction using a hamstring graft. Currently experiencing mild swelling and limited range of motion (ROM) in the right knee.

Physische Messungen

Größe: 182 cm

Gewicht: 78 kg

Blutgruppe: OPositive

Anamnese

Raucher: Nein

Chronische Krankheiten: Nein

Aktivitätsniveau: Active

Zusätzliche Patienteninformationen

Verletzungsgeschichte: Complete ACL tear occurred during a football match on January 15, 2026, due to a sudden pivoting motion. Surgery was performed on March 1, 2026.

Medikationen: Ibuprofen 400mg as needed for pain, Vitamin D3 supplements, and Omega-3 fish oil.

Funktionsfähigkeit: Partial weight-bearing with one crutch. Knee flexion is currently at 95 degrees. Struggles with stairs and long-distance walking.

Persönliche Ziele: Full return to competitive football within 9 months, restoration of full quad strength, and achieving 135-degree knee flexion.

Intelligente klinische Analyse

Clinical Explanation:

Der Patient ist ein 28-jähriger männlicher Athlet, der sich vier Wochen nach einer vorderen Kreuzbandrekonstruktion mit einem Hamstring-Transplantat befindet. Aktuell zeigt er eine leichte Schwellung und eine eingeschränkte Beweglichkeit im rechten Knie. Die postoperative Phase erfordert eine sorgfältige Rehabilitation, um die Funktionalität des Knies wiederherzustellen und die Rückkehr zum Wettkampfsport zu ermöglichen. Die Zielsetzung des Patienten umfasst die vollständige Rückkehr zum Fußball innerhalb von neun Monaten sowie die Wiederherstellung der vollen Quadrizepskraft und einer Kniebeugung von 135 Grad.

Immediate Physiotherapy Recommendations:

Die physiotherapeutischen Maßnahmen sollten sich auf die Verbesserung der Beweglichkeit und die Stärkung der Muskulatur konzentrieren. Passive und aktive Bewegungsübungen sollten in das Programm integriert werden, um die Flexion des Knies zu fördern. Zudem sind gezielte Kräftigungsübungen für die Oberschenkelmuskulatur wichtig, um die Stabilität des Knies zu unterstützen.

Precautions:

Es sollte darauf geachtet werden, dass der Patient keine übermäßigen Belastungen auf das operierte Knie ausübt. Aktivitäten, die plötzliche Drehbewegungen oder hohe Belastungen erfordern, sollten vermieden werden. Eine angemessene Schmerzbewältigung ist ebenfalls wichtig, um eine Überlastung zu verhindern.

Estimated Recovery Timeline:

Die geschätzte Erholungszeit für die vollständige Rückkehr zum Wettkampfsport beträgt etwa neun Monate, wobei die Fortschritte in der Beweglichkeit und Kraft kontinuierlich überwacht werden müssen.

Risk Assessment:

Potenzielle Risiken umfassen eine verzögerte Heilung, anhaltende Schwellungen und die Möglichkeit von Komplikationen wie einer Thrombose oder einer Infektion. Eine sorgfältige Überwachung der Symptome ist erforderlich.

Red Flags:

Notfallzeichen, die sofortige medizinische Aufmerksamkeit erfordern, sind starke Schmerzen, anhaltende Schwellungen, Fieber, Rötung oder Wärme im Bereich des Knies sowie eine plötzliche Verschlechterung der Beweglichkeit oder Funktion des Knies.

Testgruppe: Range of Motion (ROM) Assessment

Test: Knee Flexion (Right)


HIGHEST
115.0

LOWEST
95.0

AVERAGE
106.0

OVERALL PROGRESS

Increased by 21.1% ↑ Since first test (2026-04-01)



Datum	Ergebnis
2026-04-01	95
2026-04-05	100
2026-04-10	110
2026-04-20	110
2026-04-26	115

