



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Post-ACL Reconstruction Rehabilitation

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #24

Klinische Details

Arzt: Dr. PSP

Datum: 2026-03-28

Beschreibung: A 28-year-old male athlete, 4 weeks post-op for ACL reconstruction using a hamstring graft. Currently experiencing mild swelling and limited range of motion (ROM) in the right knee.

Physische Messungen

Größe: 182 cm

Gewicht: 78 kg

Blutgruppe: OPositive

Anamnese

Raucher: Nein

Chronische Krankheiten: Nein

Aktivitätsniveau: Active

Zusätzliche Patienteninformationen

Verletzungsgeschichte: Complete ACL tear occurred during a football match on January 15, 2026, due to a sudden pivoting motion. Surgery was performed on March 1, 2026.

Medikationen: Ibuprofen 400mg as needed for pain, Vitamin D3 supplements, and Omega-3 fish oil.

Funktionsfähigkeit: Partial weight-bearing with one crutch. Knee flexion is currently at 95 degrees. Struggles with stairs and long-distance walking.

Persönliche Ziele: Full return to competitive football within 9 months, restoration of full quad strength, and achieving 135-degree knee flexion.

Intelligente klinische Analyse

Clinical Explanation:

Der Patient ist ein 28-jähriger männlicher Athlet, der sich vier Wochen nach einer vorderen Kreuzbandrekonstruktion mit einem Hamstring-Transplantat befindet. Aktuell zeigt er eine leichte Schwellung und eine eingeschränkte Beweglichkeit im rechten Knie. Die Rehabilitation zielt darauf ab, die Funktionalität des Knies wiederherzustellen und die Rückkehr zum Wettkampfsport innerhalb von neun Monaten zu ermöglichen. Die Fortschritte in der Flexion des Knies sind ermutigend, jedoch ist eine sorgfältige Überwachung und Anpassung der Therapie erforderlich.

Immediate Physiotherapy Recommendations:

Die physiotherapeutischen Maßnahmen sollten sich auf die Verbesserung der Beweglichkeit und die Stärkung der Muskulatur konzentrieren. Passive und aktive Mobilisationstechniken sollten angewendet werden, um die Flexion des Knies weiter zu fördern. Zusätzlich sind gezielte Kräftigungsübungen für die Oberschenkelmuskulatur wichtig, um die Stabilität des Knies zu unterstützen.

Precautions:

Es sollte darauf geachtet werden, Überlastungen zu vermeiden, insbesondere bei Aktivitäten, die plötzliche Richtungswechsel erfordern. Der Patient sollte darauf hingewiesen werden, keine intensiven Sportarten oder Aktivitäten mit hohem Risiko für das Knie auszuführen, bis die Beweglichkeit und Kraft ausreichend verbessert sind.

Estimated Recovery Timeline:

Die vollständige Genesung und Rückkehr zum Wettkampf wird innerhalb von neun Monaten angestrebt. Eine kontinuierliche Überwachung der Fortschritte ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Patient auf dem richtigen Weg ist.

Risk Assessment:

Potenzielle Risiken umfassen eine verzögerte Heilung, anhaltende Schwellungen und das Risiko einer erneuten Verletzung des Kreuzbandes. Eine sorgfältige Beurteilung der Fortschritte ist notwendig, um diese Risiken zu minimieren.

Red Flags:

Notfallzeichen, die sofortige ärztliche Hilfe erfordern, sind starke Schmerzen, anhaltende Schwellungen, Instabilität des Knies, Fieber oder Anzeichen einer Infektion.

Testgruppe: Range of Motion (ROM) Assessment

Test: Knee Flexion (Right)


HIGHEST
115.0

LOWEST
95.0

AVERAGE
106.0

OVERALL PROGRESS

Increased by 21.1% ↑ Since first test (2026-04-01)



Datum	Ergebnis
2026-04-01	95
2026-04-05	100
2026-04-10	110
2026-04-20	110
2026-04-26	115

