



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Post-ACL Reconstruction Rehabilitation

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #24

Klinische Details

Arzt: Dr. PSP

Datum: 2026-03-28

Beschreibung: A 28-year-old male athlete, 4 weeks post-op for ACL reconstruction using a hamstring graft. Currently experiencing mild swelling and limited range of motion (ROM) in the right knee.

Physische Messungen

Größe: 182 cm

Gewicht: 78 kg

Blutgruppe: O+

Anamnese

Raucher: Nein

Chronische Krankheiten: Nein

Aktivitätsniveau: Aktiv

Zusätzliche Patienteninformationen

Verletzungsgeschichte: Complete ACL tear occurred during a football match on January 15, 2026, due to a sudden pivoting motion. Surgery was performed on March 1, 2026.

Medikationen: Ibuprofen 400mg as needed for pain, Vitamin D3 supplements, and Omega-3 fish oil.

Funktionsfähigkeit: Partial weight-bearing with one crutch. Knee flexion is currently at 95 degrees. Struggles with stairs and long-distance walking.

Persönliche Ziele: Full return to competitive football within 9 months, restoration of full quad strength, and achieving 135-degree knee flexion.

Intelligente klinische Analyse

Klinische Erklärung:

Der Patient ist ein 28-jähriger männlicher Athlet, der sich vier Wochen nach einer vorderen Kreuzbandrekonstruktion mit einem Hamstring-Transplantat befindet. Aktuell zeigt er eine leichte Schwellung und eine eingeschränkte Beweglichkeit im rechten Knie. Die postoperative Phase erfordert eine sorgfältige Rehabilitation, um die Funktionalität des Knies wiederherzustellen und die Rückkehr zum Wettkampfsport zu ermöglichen. Die Zielsetzung des Patienten umfasst die vollständige Rückkehr zum Fußball innerhalb von neun Monaten sowie die Wiederherstellung der vollen Quadrizepskraft und einer Kniebeugung von 135 Grad.

Sofortige physiotherapeutische Empfehlungen:

Die physiotherapeutischen Maßnahmen sollten sich auf die Verbesserung der Beweglichkeit und die Stärkung der Muskulatur konzentrieren. Passive und aktive Bewegungsübungen sollten schrittweise eingeführt werden, um die Flexion des Knies zu fördern. Der Einsatz von Kälte- und Wärmetherapie kann zur Schmerzlinderung und Schwellungsreduktion beitragen. Zudem sollte das Gehen mit einer Krücke fortgesetzt werden, um das Gewicht kontrolliert zu belasten.

Vorsichtsmaßnahmen:

Es sollte darauf geachtet werden, plötzliche Bewegungen oder Überlastungen des Knies zu vermeiden. Aktivitäten, die eine hohe Belastung auf das Knie ausüben, wie Laufen oder Springen, sollten bis zur vollständigen Genesung vermieden werden. Auch das Treppensteigen sollte mit Vorsicht angegangen werden.

Geschätzter Erholungsverlauf:

Die vollständige Genesung und Rückkehr zu sportlichen Aktivitäten wird innerhalb von neun Monaten angestrebt, wobei eine kontinuierliche Verbesserung der Beweglichkeit und Kraft in den ersten sechs Monaten erwartet wird.

Risikobewertung:

Potenzielle Risiken umfassen eine verzögerte Heilung, die Entwicklung von Narbengewebe und die Möglichkeit einer erneuten Verletzung des Kreuzbands. Eine sorgfältige Überwachung der Fortschritte ist entscheidend, um diese Risiken zu minimieren.

Warnzeichen:

Notfallzeichen, die sofortige medizinische Aufmerksamkeit erfordern, sind starke Schmerzen, anhaltende Schwellungen, Fieber, Rötung oder Überwärmung des Knies sowie eine plötzliche Verschlechterung der Beweglichkeit oder Stabilität des Gelenks.

Testgruppe: Range of Motion (ROM) Assessment

Test: Knee Flexion (Right)

HÖCHSTER WERT
115.0


NIEDRIGSTER WERT
95.0

DURCHSCHNITT
106.0

GESAMTFORTSCHRITT

Gestiegen um 21.1% ↑

Seit dem ersten Test (2026-04-01)



Datum	Ergebnis
2026-04-01	95
2026-04-05	100
2026-04-10	110
2026-04-20	110
2026-04-26	115

