



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Post-ACL Reconstruction Rehabilitation

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #24

Klinische Details

Arzt: Dr. PSP

Datum: 2026-03-28

Beschreibung: A 28-year-old male athlete, 4 weeks post-op for ACL reconstruction using a hamstring graft. Currently experiencing mild swelling and limited range of motion (ROM) in the right knee.

Physische Messungen

Größe: 182 cm

Gewicht: 78 kg

Blutgruppe: OPositive

Anamnese

Raucher: Nein

Chronische Krankheiten: Nein

Aktivitätsniveau: Active

Zusätzliche Patienteninformationen

Verletzungsgeschichte: Complete ACL tear occurred during a football match on January 15, 2026, due to a sudden pivoting motion. Surgery was performed on March 1, 2026.

Medikationen: Ibuprofen 400mg as needed for pain, Vitamin D3 supplements, and Omega-3 fish oil.

Funktionsfähigkeit: Partial weight-bearing with one crutch. Knee flexion is currently at 95 degrees. Struggles with stairs and long-distance walking.

Persönliche Ziele: Full return to competitive football within 9 months, restoration of full quad strength, and achieving 135-degree knee flexion.

Intelligente klinische Analyse

Clinical Explanation:

Der Patient ist ein 28-jähriger männlicher Athlet, der sich vier Wochen nach einer vorderen Kreuzbandrekonstruktion mit einem Hamstring-Transplantat befindet. Aktuell zeigt er eine leichte Schwellung und eine eingeschränkte Beweglichkeit im rechten Knie. Die Rehabilitation konzentriert sich auf die Wiederherstellung der Beweglichkeit, die Stärkung der Muskulatur und die Rückkehr zu sportlichen Aktivitäten, insbesondere im Fußball.

Immediate Physiotherapy Recommendations:

Die physiotherapeutischen Maßnahmen sollten sich auf passive und aktive Mobilisation des Knies konzentrieren, um die Flexion zu verbessern. Stärkung der Oberschenkelmuskulatur sollte schrittweise eingeführt werden, wobei der Fokus auf exzentrischen Übungen liegt. Zusätzlich sollten Gleichgewichts- und Koordinationsübungen in das Programm integriert werden.

Precautions:

Der Patient sollte Aktivitäten vermeiden, die eine hohe Belastung des Knies verursachen, insbesondere plötzliche Richtungswechsel und Sprünge. Es ist wichtig, auf Schmerzen während der Übungen zu achten und diese zu vermeiden.

Estimated Recovery Timeline:

Die vollständige Genesung und Rückkehr zum Wettkampfsport wird innerhalb von 9 Monaten angestrebt, wobei eine schrittweise Steigerung der Aktivität und Belastung erfolgen sollte.

Risk Assessment:

Potenzielle Risiken umfassen die Möglichkeit einer erneuten Verletzung des Kreuzbandes, insbesondere bei vorzeitiger Rückkehr zu intensiven sportlichen Aktivitäten. Eine unzureichende Rehabilitation könnte zu langfristigen funktionellen Einschränkungen führen.

Red Flags:

Notfallzeichen, auf die geachtet werden sollte, sind starke Schmerzen, anhaltende Schwellungen, Instabilität des Knies, Fieber oder Anzeichen einer Infektion sowie eine signifikante Verschlechterung der Beweglichkeit.

Testgruppe: Range of Motion (ROM) Assessment

Test: Knee Flexion (Right)


HIGHEST
115.0

LOWEST
95.0

AVERAGE
106.0

OVERALL PROGRESS

Increased by 21.1% ↑ Since first test (2026-04-01)



Datum	Ergebnis
2026-04-01	95
2026-04-05	100
2026-04-10	110
2026-04-20	110
2026-04-26	115

