



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Post-ACL Reconstruction Rehabilitation

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #24

Klinische Details

Arzt: Dr. PSP

Datum: 2026-03-28

Beschreibung: A 28-year-old male athlete, 4 weeks post-op for ACL reconstruction using a hamstring graft. Currently experiencing mild swelling and limited range of motion (ROM) in the right knee.

Physische Messungen

Größe: 182 cm

Gewicht: 78 kg

Blutgruppe: OPositive

Anamnese

Raucher: Nein

Chronische Krankheiten: Nein

Aktivitätsniveau: Active

Zusätzliche Patienteninformationen

Verletzungsgeschichte: Complete ACL tear occurred during a football match on January 15, 2026, due to a sudden pivoting motion. Surgery was performed on March 1, 2026.

Medikationen: Ibuprofen 400mg as needed for pain, Vitamin D3 supplements, and Omega-3 fish oil.

Funktionsfähigkeit: Partial weight-bearing with one crutch. Knee flexion is currently at 95 degrees. Struggles with stairs and long-distance walking.

Persönliche Ziele: Full return to competitive football within 9 months, restoration of full quad strength, and achieving 135-degree knee flexion.

Intelligente klinische Analyse

Clinical Explanation:

Der Patient ist ein 28-jähriger männlicher Athlet, der vier Wochen nach einer vorderen Kreuzbandrekonstruktion mit einem Hamstring-Transplantat ist. Aktuell zeigt er eine leichte Schwellung und eine eingeschränkte Beweglichkeit im rechten Knie. Die postoperative Phase erfordert eine sorgfältige Rehabilitation, um die Funktionalität des Knies wiederherzustellen und die Rückkehr zum Wettkampfsport zu ermöglichen. Die Ziele des Patienten umfassen eine vollständige Rückkehr zum Fußball innerhalb von neun Monaten sowie die Wiederherstellung der vollen Quadrizepskraft und einer Kniebeugung von 135 Grad.

Immediate Physiotherapy Recommendations:

Die physiotherapeutischen Maßnahmen sollten sich auf die Verbesserung der Beweglichkeit und die Stärkung der Muskulatur konzentrieren. Passive und aktive Bewegungsübungen sind wichtig, um die Flexion zu fördern. Zudem sollte ein gezieltes Krafttraining des Quadrizeps und der Oberschenkelmuskulatur in das Programm integriert werden, um die Stabilität des Knies zu unterstützen.

Precautions:

Es sollte darauf geachtet werden, dass der Patient keine übermäßigen Belastungen auf das operierte Knie ausübt. Aktivitäten, die plötzliche Drehbewegungen oder hohe Belastungen erfordern, sollten vermieden werden. Zudem ist eine Überwachung der Schwellung und Schmerzen wichtig, um eine Überlastung zu verhindern.

Estimated Recovery Timeline:

Die geschätzte Erholungszeit für die vollständige Rückkehr zum Wettkampfsport beträgt etwa neun Monate, wobei eine kontinuierliche Verbesserung der Beweglichkeit und Kraft in den ersten sechs Monaten erwartet wird.

Risk Assessment:

Potenzielle Risiken umfassen eine verzögerte Heilung, anhaltende Schwellungen und Schmerzen sowie das Risiko einer erneuten Verletzung des Kreuzbands. Eine sorgfältige Überwachung der Fortschritte ist entscheidend.

Red Flags:

Notfallzeichen, die sofortige medizinische Aufmerksamkeit erfordern, sind starke Schmerzen, plötzliche Schwellungen, Fieber, Anzeichen einer Infektion oder eine signifikante Verschlechterung der Beweglichkeit.

Testgruppe: Range of Motion (ROM) Assessment

Test: Knee Flexion (Right)


HIGHEST
115.0

LOWEST
95.0

AVERAGE
106.0

OVERALL PROGRESS

Increased by 21.1% ↑ Since first test (2026-04-01)



Datum	Ergebnis
2026-04-01	95
2026-04-05	100
2026-04-10	110
2026-04-20	110
2026-04-26	115

