



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Post-ACL Reconstruction Rehabilitation

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #24

Klinische Details

Arzt: Dr. PSP

Datum: 2026-03-28

Beschreibung: A 28-year-old male athlete, 4 weeks post-op for ACL reconstruction using a hamstring graft. Currently experiencing mild swelling and limited range of motion (ROM) in the right knee.

Physische Messungen

Größe: 182 cm

Gewicht: 78 kg

Blutgruppe: OPositive

Anamnese

Raucher: Nein

Chronische Krankheiten: Nein

Aktivitätsniveau: Active

Zusätzliche Patienteninformationen

Verletzungsgeschichte: Complete ACL tear occurred during a football match on January 15, 2026, due to a sudden pivoting motion. Surgery was performed on March 1, 2026.

Medikationen: Ibuprofen 400mg as needed for pain, Vitamin D3 supplements, and Omega-3 fish oil.

Funktionsfähigkeit: Partial weight-bearing with one crutch. Knee flexion is currently at 95 degrees. Struggles with stairs and long-distance walking.

Persönliche Ziele: Full return to competitive football within 9 months, restoration of full quad strength, and achieving 135-degree knee flexion.

Intelligente klinische Analyse

Klinische Erklärung:

Der Patient ist ein 28-jähriger männlicher Athlet, der sich vier Wochen nach einer vorderen Kreuzbandrekonstruktion mit einem Hamstring-Transplantat befindet. Aktuell zeigt er eine leichte Schwellung und eine eingeschränkte Beweglichkeit im rechten Knie. Die postoperative Phase erfordert eine sorgfältige Überwachung der Rehabilitation, um die Funktionalität des Knies wiederherzustellen und die Rückkehr zum Wettkampfsport zu ermöglichen.

Sofortige physiotherapeutische Empfehlungen:

Die physiotherapeutische Behandlung sollte sich auf die Verbesserung der Kniebeugung, die Stärkung der Oberschenkelmuskulatur und die Förderung der Mobilität konzentrieren. Passive und aktive Bewegungsübungen sollten schrittweise eingeführt werden, um die Flexibilität zu erhöhen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Der Patient sollte Aktivitäten vermeiden, die zu einer Überlastung des Knies führen könnten, wie z.B. plötzliche Richtungswechsel, Sprünge oder intensives Laufen. Es ist wichtig, auf Schmerzen zu achten und die Belastung entsprechend anzupassen.

Geschätzter Erholungsverlauf:

Die vollständige Rückkehr zum Wettkampfsport wird innerhalb von neun Monaten angestrebt, wobei eine schrittweise Steigerung der Aktivitäten und eine kontinuierliche physiotherapeutische Betreuung erforderlich sind.

Risikobewertung:

Potenzielle Risiken umfassen eine verzögerte Heilung, erneute Verletzungen des Kreuzbands oder eine unzureichende Wiederherstellung der Muskulatur, was zu Instabilität im Knie führen könnte.

Warnzeichen:

Notfallzeichen, die sofortige ärztliche Hilfe erfordern, sind starke Schmerzen, anhaltende Schwellungen, Fieber, Rötung oder eine plötzliche Verschlechterung der Beweglichkeit im Knie.

Testgruppe: Range of Motion (ROM) Assessment

Test: Knee Flexion (Right)


HIGHEST
115.0

LOWEST
95.0

AVERAGE
106.0

OVERALL PROGRESS

Increased by 21.1% ↑ Since first test (2026-04-01)



Datum	Ergebnis
2026-04-01	95
2026-04-05	100
2026-04-10	110
2026-04-20	110
2026-04-26	115

