



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Post-ACL Reconstruction Rehabilitation

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #24

Klinische Details

Arzt: Dr. PSP

Datum: 2026-03-28

Beschreibung: A 28-year-old male athlete, 4 weeks post-op for ACL reconstruction using a hamstring graft. Currently experiencing mild swelling and limited range of motion (ROM) in the right knee.

Physische Messungen

Größe: 182 cm

Gewicht: 78 kg

Blutgruppe: OPositive

Anamnese

Raucher: Nein

Chronische Krankheiten: Nein

Aktivitätsniveau: Active

Zusätzliche Patienteninformationen

Verletzungsgeschichte: Complete ACL tear occurred during a football match on January 15, 2026, due to a sudden pivoting motion. Surgery was performed on March 1, 2026.

Medikationen: Ibuprofen 400mg as needed for pain, Vitamin D3 supplements, and Omega-3 fish oil.

Funktionsfähigkeit: Partial weight-bearing with one crutch. Knee flexion is currently at 95 degrees. Struggles with stairs and long-distance walking.

Persönliche Ziele: Full return to competitive football within 9 months, restoration of full quad strength, and achieving 135-degree knee flexion.

Intelligente klinische Analyse

Clinical Explanation:

Der Patient ist ein 28-jähriger männlicher Athlet, der sich vor vier Wochen einer vorderen Kreuzbandrekonstruktion mit einem Hamstring-Transplantat unterzogen hat. Aktuell zeigt er eine leichte Schwellung und eine eingeschränkte Beweglichkeit im rechten Knie. Die postoperative Phase erfordert eine sorgfältige Überwachung und ein strukturiertes Rehabilitationsprogramm, um die Funktionalität des Knies wiederherzustellen und die Rückkehr zum Wettkampfsport zu ermöglichen.

Immediate Physiotherapy Recommendations:

Die physiotherapeutische Behandlung sollte sich auf die Verbesserung der Beweglichkeit und die Stärkung der Muskulatur konzentrieren. Passive und aktive Mobilisationstechniken sollten eingesetzt werden, um die Flexion des Knies zu fördern. Zudem sind gezielte Kräftigungsübungen für die Oberschenkelmuskulatur wichtig, um die Stabilität des Knies zu unterstützen.

Precautions:

Es sollte darauf geachtet werden, dass der Patient keine übermäßigen Belastungen auf das operierte Knie ausübt. Aktivitäten, die plötzliche Richtungswechsel oder hohe Belastungen erfordern, sollten vermieden werden. Auch das Treppensteigen sollte mit Vorsicht angegangen werden, um das Risiko einer Überlastung zu minimieren.

Estimated Recovery Timeline:

Die vollständige Genesung und Rückkehr zum Wettkampfsport wird innerhalb von neun Monaten angestrebt. Eine schrittweise Steigerung der Aktivitäten sollte in den kommenden Wochen erfolgen, wobei regelmäßige Kontrollen der Beweglichkeit und Stabilität des Knies notwendig sind.

Risk Assessment:

Das Risiko einer erneuten Verletzung oder Komplikationen wie einer Thrombose sollte berücksichtigt werden. Eine sorgfältige Überwachung der Schwellung und der Schmerzsymptomatik ist entscheidend.

Red Flags:

Notfallzeichen, die sofortige ärztliche Hilfe erfordern, sind starke Schmerzen, plötzliche Schwellungen, Fieber, Rötung oder Überwärmung des Knies sowie eine signifikante Einschränkung der Beweglichkeit.

Testgruppe: Range of Motion (ROM) Assessment

Test: Knee Flexion (Right)


HIGHEST
115.0

LOWEST
95.0

AVERAGE
106.0

OVERALL PROGRESS

Increased by 21.1% ↑ Since first test (2026-04-01)



Datum	Ergebnis
2026-04-01	95
2026-04-05	100
2026-04-10	110
2026-04-20	110
2026-04-26	115

