



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Chronic Lumbar Disc Herniation with Sciatica

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #22

Klinische Details

Arzt: Dr. PSP

Datum: 2026-04-28

Beschreibung: Patient presents with persistent radiating pain from the lower back down to the right calf. Diagnosed with L4-L5 disc protrusion. Pain is aggravated by prolonged sitting and forward bending.

Physische Messungen

Größe: 178 cm

Gewicht: 85 kg

Blutgruppe: APositive

Anamnese

Raucher: Nein

Chronische Krankheiten: Nein

Aktivitätsniveau: Moderate

Intelligente klinische Analyse

Clinical Explanation:

Der Patient präsentiert sich mit persistierenden ausstrahlenden Schmerzen vom unteren Rücken bis zur rechten Wade, diagnostiziert mit einer L4-L5 Bandscheibenprotrusion. Die Schmerzen werden durch längeres Sitzen und Vorbeugen verstärkt. Die Rehabilitation sollte sich auf die Schmerzlinderung, Verbesserung der Beweglichkeit und Stärkung der Rumpfmuskulatur konzentrieren, um die Belastung der Wirbelsäule zu minimieren und die Funktionalität zu verbessern.

Immediate Physiotherapy Recommendations:

Es wird empfohlen, mit gezielten physiotherapeutischen Übungen zu beginnen, die die Flexibilität und Stärke der Rumpfmuskulatur fördern. Dehnungsübungen für die hintere Oberschenkelmuskulatur und die Wadenmuskulatur sollten in das Programm integriert werden. Zudem sind Techniken zur Schmerzlinderung, wie manuelle Therapie und Elektrotherapie, sinnvoll.

Precautions:

Der Patient sollte Aktivitäten vermeiden, die die Schmerzen verschlimmern, insbesondere längeres Sitzen und Vorbeugen. Es ist wichtig, auf die Körperhaltung zu achten und ergonomische Hilfsmittel zu verwenden. Übermäßige Belastungen und plötzliche Bewegungen sollten vermieden werden.

Estimated Recovery Timeline:

Die geschätzte Erholungszeit beträgt etwa 6 bis 12 Wochen, abhängig von der individuellen Reaktion auf die Therapie und der Einhaltung der empfohlenen Maßnahmen.

Risk Assessment:

Potenzielle Risiken umfassen eine Verschlechterung der Symptome bei unsachgemäßer Ausführung der Übungen oder bei Überlastung. Eine unzureichende Rehabilitation kann zu chronischen Schmerzen und funktionellen Einschränkungen führen.

Red Flags:

Notfallzeichen sind: plötzliche, starke Schmerzen, Verlust der Blasen- oder Darmkontrolle, Schwäche in den Beinen, Taubheitsgefühl oder Kribbeln in den Beinen, sowie Fieber oder unerklärlicher Gewichtsverlust.

Testgruppe: Range of Motion (ROM) Assessment

Test: Knee Flexion (Right)

HIGHEST
115.0


LOWEST
95.0

AVERAGE
106.0

OVERALL PROGRESS

Increased by 21.1% ↑

Since first test (2026-04-14)



Datum	Ergebnis
2026-04-14	95
2026-04-18	100
2026-04-22	110
2026-04-26	110
2026-04-28	115

