



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Post-ACL Reconstruction Rehabilitation

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #24

Klinische Details

Arzt: Dr. PSP

Datum: 2026-03-28

Beschreibung: A 28-year-old male athlete, 4 weeks post-op for ACL reconstruction using a hamstring graft. Currently experiencing mild swelling and limited range of motion (ROM) in the right knee.

Physische Messungen

Größe: 182 cm

Gewicht: 78 kg

Blutgruppe: OPositive

Anamnese

Raucher: Nein

Chronische Krankheiten: Nein

Aktivitätsniveau: Active

Zusätzliche Patienteninformationen

Verletzungsgeschichte: Complete ACL tear occurred during a football match on January 15, 2026, due to a sudden pivoting motion. Surgery was performed on March 1, 2026.

Medikationen: Ibuprofen 400mg as needed for pain, Vitamin D3 supplements, and Omega-3 fish oil.

Funktionsfähigkeit: Partial weight-bearing with one crutch. Knee flexion is currently at 95 degrees. Struggles with stairs and long-distance walking.

Persönliche Ziele: Full return to competitive football within 9 months, restoration of full quad strength, and achieving 135-degree knee flexion.

Intelligente klinische Analyse

Clinical Explanation:

Der Patient ist ein 28-jähriger männlicher Athlet, der sich vier Wochen nach einer vorderen Kreuzbandrekonstruktion mit einem Hamstring-Transplantat befindet. Aktuell zeigt er eine leichte Schwellung und eine eingeschränkte Beweglichkeit im rechten Knie. Die postoperative Phase erfordert eine sorgfältige Überwachung und eine schrittweise Rehabilitation, um die volle Funktionalität und Stärke des Knies wiederherzustellen.

Immediate Physiotherapy Recommendations:

Die physiotherapeutischen Maßnahmen sollten sich auf die Verbesserung der Beweglichkeit und die Stärkung der Muskulatur konzentrieren. Passive und aktive Mobilisationstechniken sollten angewendet werden, um die Flexion des Knies zu fördern. Kräftigungsübungen für die Oberschenkelmuskulatur sind ebenfalls wichtig, wobei der Fokus auf der Quadrizepsmuskulatur liegen sollte.

Precautions:

Es ist wichtig, übermäßige Belastungen des Knies zu vermeiden, insbesondere bei Aktivitäten, die plötzliche Richtungswechsel erfordern. Der Patient sollte auch darauf achten, keine Schmerzen während der Übungen zu verursachen und die Schwellung im Auge zu behalten.

Estimated Recovery Timeline:

Die vollständige Rückkehr zum Wettkampfsport wird innerhalb von neun Monaten angestrebt, wobei eine schrittweise Steigerung der Aktivitäten und der Belastung erforderlich ist.

Risk Assessment:

Mögliche Risiken umfassen eine verzögerte Heilung, anhaltende Schwellung und Schmerzen, die auf eine unzureichende Rehabilitation oder Überlastung hinweisen könnten. Eine sorgfältige Überwachung der Fortschritte ist entscheidend.

Red Flags:

Notfallzeichen, die sofortige ärztliche Hilfe erfordern, sind anhaltende oder zunehmende Schmerzen, signifikante Schwellung, Instabilität des Knies oder Anzeichen einer Infektion (z. B. Fieber, Rötung, Überwärmung).

Testgruppe: Range of Motion (ROM) Assessment

Test: Knee Flexion (Right)


HIGHEST
115.0

LOWEST
95.0

AVERAGE
106.0

OVERALL PROGRESS

Increased by 21.1% ↑ Since first test (2026-04-01)



Datum	Ergebnis
2026-04-01	95
2026-04-05	100
2026-04-10	110
2026-04-20	110
2026-04-26	115

