6 Changements de repère

Jusqu'à présent, nous avons travaillé dans des repères dont les axes étaient alignés avec ceux des coniques considérées. Mais que se passe-t-il lorsque le repère n'est pas orienté comme on le souhaite par rapport à la conique ?

Dans ce cas, il suffit d'effectuer un changement de repère, un changement de variables, en combinant éventuellement une translation et une rotation.

6.1 Translation

Pour translater un repère et recentrer le repère au point $(x_c, y_c) \neq (0, 0)$, on introduit de nouvelles variables définies par :
$X = x - x_c$ et $Y = y - y_c$.

Les axes du nouveau repère sont 2 à 2 parallèles à ceux du premier repère.

6.1.1 Ellipse

Equation cartésienne d'une ellipse de centre (x_c, y_c) (sans rotation).

Soit $a, c \in \mathbb{R}^+$ tels que $a > c$.
Dans un repère orthonormé, considérons une ellipse centrée en (x_c, y_c) dont les foyers sont $F_1(x_c - c, y_c)$ et $F_2(x_c + c, y_c)$ et dont le grand axe mesure $2a$.
Alors son équation cartésienne s'écrit

$$\mathcal{E} \equiv \frac{(x - x_c)^2}{a^2} + \frac{(y - y_c)^2}{b^2} = 1 \tag{6.1}$$

Avec $b^2 = a^2 - c^2$, $(0 < b < a)$.

6.1.2 Hyperbole

Equation cartésienne d'une hyperbole de centre (x_c, y_c) (sans rotation).

Soit $a, c \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$ tels que $c > a$.
Dans un repère orthonormé, considérons une hyperbole centrée en (x_c, y_c) dont les foyers sont $F_1(x_c - c, y_c)$ et $F_2(x_c + c, y_c)$, et dont la différence des distances à chaque foyer est constante et égale à $2a$.
Alors son équation cartésienne s'écrit

$$\mathcal{H} \equiv \frac{(x - x_c)^2}{a^2} - \frac{(y - y_c)^2}{b^2} = 1 \tag{6.2}$$

Avec $b^2 = c^2 - a^2$, $(0 < b < c)$.

Equations cartésiennes réduites de la parabole ou équations cartésiennes rapportées à son axe.

Soit $p \in \mathbb{R}^+ \setminus \{0\}$.

Dans un repère orthonormé, considérons une parabole de sommet $S(x_S, y_S)$, de foyer $F(x_S + \frac{p}{2}, y_S)$ et de directrice $d_F \equiv x = x_S - \frac{p}{2}$. Alors son équation cartésienne s'écrit :

$$\mathcal{P} \equiv (y - y_S)^2 = 2p(x - x_c) \tag{6.3}$$