HARiS -2016年愛滋病預防項目指標調查-男跨女跨性別人士

背景

男跨女跨性別人士一向是容易被忽略及難以接觸的社群。然而,不同研究顯示,此社群的愛滋病病毒 感染率可以相當高。為進一步了解本港情況,我們於 2014 年的「愛滋病預防項目指標調查」(HARiS) 中首次將男跨女跨性別人士納入為高危社群之一。

本調查目的是要建立一個以社區為基礎的行為調查,以收集高危社群的愛滋病相關風險行為和測試行為的統一指標數據,隨時間追蹤及評估本港愛滋病健康推廣和監測計劃的覆蓋率和成效。

第四次的 HARiS (2016) 再次委託香港中文大學何鴻桑防治傳染病研究中心進行。

方法

此次調查一共有三間非政府機構參與。受訪者分別通過自願愛滋病病毒測試服務(兩間)、外展及網上活動(各一間)在 2016 年 4 月至 6 月期間招募。任何曾經和另一名男性進行過口交或肛交,而又界定自己為女性的男性都符合參加資格。受訪者會被邀請填寫一份問卷。

結果

1. 受訪者基本人口統計資料

三間非政府機構一共訪問了 87 名男跨女跨性別人士 (非政府機構中心: 23 名;外展: 29 名;網上: 35 名)。 受訪者當中 60.9%為華人、27.6%為菲律賓人、5.7%為泰國人。大約一半(51.7%)年齡介乎 20 至 29 歲。 超過一半(56.3%)在調查期之前的六個月內在香港居住超過三個月。

2. 性行為及安全套的使用

在調查期之前的六個月內,分別有 41.4%、31%及 36.8%的受訪者表示曾經和有感情關係的伴侶、固定性伴侶及非固定性伴侶進行性交,而最近一次性交的安全套使用率分別為 55.6%、63.7%及 84.4%。大約三分一的受訪者(35.6%)在過去六個月內曾經和性工作者性交,而最近一次性交的安全套使用率為 96.8%。

3. 愛滋病病毒測試

87名受訪者當中,有57人(65.5%)曾接受愛滋病病毒測試及有56人(98.2%)知道他們的測試結果;有50人(57.5%) 的測試是在調查期之前的一年內進行,50人(57.5%)知道自己最近的測試結果。非政府機構是最多受訪者接受測試的地方,佔曾經測試者的56.1%,其次是私營醫療服務(22.8%),和公營醫療服務 (14%)。

4. 藥物及酒精使用

受訪者當中,有32.2% 和10.3% 曾在過去六個月內在性行爲以前或進行期間使用酒精和藥物。當中芳香劑(Poppers) (66.7%)及冰(44.4%)爲最常見。

分析

- 1. 除性工作者外,男跨女跨性別人士與各類性伴侶,包括固定、非固定性伴侶及有感情關係性伴侶進行性行為時的安全套使用率均下跌。與有感情關係性伴侶進行性行為時的安全套使用率由去年的82.1%下跌至今年的55.6%。在此社群中提倡與所有類型伴侶持續使用安全套的信息仍要繼續加強。
- 2. 曾接受愛滋病病毒測試的比率由 2015 年的 78.8%下跌至 2016 年的 65.5%。比率未如理想,因此 定期接受愛滋病病毒測試的意識需在此社群中進一步推廣。
- 3. 是次調查發現相當比例的跨性別人士(37.9%)為非華裔。他們會較少到愛滋病服務中心接受服務。 因此在這社群中推廣預防愛滋病及測試服務時,應以外展服務(儘可能以朋輩參與模式)為主。

HARiS -2016愛滋病預防項目指標調查-男跨女跨性別人士資料頁

由衞生署衞生防護中心

特別預防計劃出版

電話: 3143 7225 傳真: 2780 9580

網址:<u>http://www.aids.gov.hk</u>電郵:<u>aids@dh.gov.hk</u>

二零一七年五月