Medikament	Indikation	Aufziehanleitung	Dosierung
Acetysalicylsäure (Aspirin®)	Akutes Koronarsyndrom (ACS)	500mg Trockensubstanz mit 5ml Auqa aufziehen) =100mg/ml	250mg i.v
Adrenalin (Suprarenin®)	Reanimation Erwachsener	10mg Adrenalin (10ml) + 90ml NaCl mischen, dann 10ml aufziehen = 0,1mg/ml (1:10)	1 mg i.v (10ml)
	Reanimation Kind < 10kg	1mg (1ml) + 100ml NaCl mischen, dann 10ml aufziehen = 0,01mg/ml (1:100)	0,01mg/kgKG
	Anaphylaxie	0,6mg (0,6ml) pur aufziehen	>60kg: 0,6mg i.m, 30-60kg: 0,1mg/10kgKG i.m <30kgKG: 0,01/kgKG
	Bradykardie	Überbrückung: 1mg (1ml) + 100ml NaCl, dann 10ml aufziehen = 0,01mg/ml (1:100)	0,01mg langsam i.v (1ml)
		5mg (5ml) + 45 NaCL auf Perfuserspritze aufziehen = 0,1mg/ml (1:10)	Start mit1,2ml/Std, Anpassbar bis 7,2ml/Std
	Extrapulmonale Atemwegsobstruktion	5 mg (5ml) pur auf Vernebler	5mg Vernebeln
Amiodaron (Cordarex®)	Reanimation Erwachsener	2x Ampullen 150mg/3ml pur aufziehen = 300mg/6ml Wiederholung: 1x Ampulle mit 150mg/3ml pur aufziehen	300mg nach der 3. Defibrillation, 150mg nach der 5. Defibrillation
	Reanimation Kind	1x Ampulle mit 150mg/3ml pur aufziehen, Wiederholung: 1x Ampulle mit 150mg/3ml pur aufziehen	5mg/kgKG i.v/i.o
Atropin (Atropinsulfat®)	Bradykardie	1x Ampulle 0,5mg/1ml pur aufziehen	0,5mg i.v., Wiederholung: alle 3-5 Min. bis max 3mg

Medikament	Indikation	Aufziehanleitung	Dosierung
Butylscopolamin (Buscopan®)	Gallenkolik	1x Ampulle 20mg/2ml pur aufziehen	20mg langsam i.v
Clemastinfumarat (Tavegil®)	Allergische Reaktion Erwachsene	1x Ampulle 2mg/2ml pur aufziehen	2mg langsam i.v
	Allergische Reaktion Kind >1 Jahr	1x Ampulle 2mg/2ml mit 18ml NaCl aufziehen =0,1mg/ml (1:10)	0,03/kgKg i.v
Dimenhydrinat (Vomex A®)	bei Übelkeit mit vitaler Bedrohung	1x Ampulle 62mg/10ml pur aufziehen	langsam i.v oder in VEL >14Jahren: 62 mg, 6-14 Jahre: 1,25mg/kgKG
Esketamin (Ketanest S®)	traumatische Schmerzen	1x Ampulle 50mg/2ml + 8ml NaCl aufziehen = 5mg/ml, Nasal 1x Ampulle 50mg/2ml pur mit MAD	0,25mg/kgKG i.v oder nasal, Wiederholung: 0,125mg/kgKG
Glucose	Hypoglykämie	2x 1x Ampulle 4g/10ml + 10ml NaCl aufziehen = 0,2g/ml,	>12 Jahre 8g i.v,<12 Jahre 0,2g/kgKG
Glyceroltrinitrat (Nitrolingual®)	ACS, Linksherzinsuffizienz	1 Hub = 0,4mg sublingual, max. 3 Hübe nach je 3 Minuten	
Ipratropiumbromid (Atrovent®)	Akute obstruktive Atemwegserkrankung (COPD, Asthma bronchiale)	2 Ampullen à 0,25mg in Vernebler bei Kindern: 1 Ampulle 2ml + 3ml NaCl in Vernebler	0,5 mg vernebeln, <12 Jahre 0,25mg vernebeln, nach 30 Minuten Wiederholbar
Levetiracetam (Keppra®)	Status Epileptikus	4 Fässchen (je 500mg/5ml) mit 100ml NaCl mischen, als Kurzinfusion vorbereiten	30mg/kgKG aber max. 2000mg über 10 Minuten i.v

Medikament	Indikation	Aufziehanleitung	Dosierung
Midazolam (Dormicum®)	Status epilepticus	1 Ampulle 15mg/3ml pur 1ml aufziehen mit MAD	nasal oder i.v >50kg: 5mg, <50kgKG 1mg/10kgKG, 1x Wiederholbar nach 2 Min.
	CO-Medikation bei Analgesie mit Esketamin (optional)	1 Ampulle 15mg/3ml mit 12 ml NaCL aufziehen = 1mg/ml	i.v oder nasal: >50kg: 1mg, <50kgKG 0,2mg/10kgKG,
Nalbuphin (Nubain®)	Abdomineller Schmerz, Rückenschmerzen nicht traumatisch	1 Ampulle 20mg/2ml mit 8ml NaCl aufziehen = 2mg/ml	i.v 0,2mg/kgKG max 20mg, Wiederholbar nach 6 Min. 0,1mg/kgKG
Paracetamol (Perfalgan®)	abdomineller Schmerz,	Fertiglösung 1000mg in 100ml Kurzinfusion über 15 Min. pur	i.v über 15 Min. >50kgKG: 1000mg, 10-50 kg: 15mg/kg
Prednisolon (Solu-Decortin®/Rectodelt®)	Akute obstruktive Atemwegserkrankung, Extrapulmonale Atemwegsobstruktion, allergische Reaktion / Anaphylaxie	250mg Trockensubstanz mit 5ml Aqua aufziehen	250mg i.v über 5 Min.
Rectodelt	Akute obstruktive Atemwegserkrankung Kind, Extrapulmonale Atemwegsobstruktion	1 Zäpfchen 100mg rektal einführen / lassen	
Salbutamol	Akute obstruktive Atemwegserkrankung	2 Ampullen in Vernebler (5ml) bei Kindern: 1 Ampulle in Vernbler (2,5ml)	Vernebeln >12 Jahren 2,5mg, <12 Jahren 1,25mg , nach 15 Minuten Wiederholbar
Urapidil (Ebrantil®)	Hypertensiver Notfall	1 Ampulle 50mg/10ml pur aufziehen (5mg/ml)	i.v 5mg über 1 Minute, Wiederholbar bis max 25mg