M16 Midazolam

Wirkstoff: Midazolam

Gruppe: Sedativa (Wirkstoffgruppe: Benzodiazepin)

Handelsname: Midazolam® oder Dormicum® 15 mg/3 ml

Indikation:
- **Akuter, andauernder Krampfanfall (Status epilepticus)**
- **Postreanimation (Beatmung wird nicht toleriert)**
- **Co-Medikation bei Analgesie mit Esketamin (optional)**

Wirkung:
- Dämpft das zentrale Nervensystem (Tranquilizer)
- Sedativ, hypnotisch, antikonvulsiv, anxiolytisch, amnestisch, muskelentspannend

Unerwünschte Arzneimittelwirkungen:
- Atemdepression bis Apnoe (Atemwegsverlegung durch die Zunge, zentrale Atemantriebsstörung im Atemzentrum/Hirnstamm)
- Bewusstseinstrübung bis Bewusstlosigkeit
- Hypotonie
- Anterograde Amnesie
- Paradoxe Reaktion möglich, vor allem bei älteren Patienten und bei psychoaktiver Begleitmedikation

Kontraindikationen:
- **Allergie gegenüber dem Wirkstoff/der Substanzklasse**
- **Bewusstseinsstörungen bzw. Einfluss psychoaktiver Substanzen wie Alkohol, Drogen, Psychopharmaka (GCS <12)**
- **Myasthenia gravis**

Vorbereitung:
- nasale Gabe: pur in 1ml Spritze + MAD
- intravenöse Gabe: 3ml Midazolam (15mg) + 12ml NaCl 0,9%

Dosierung:
- **Status epilepticus i.v. / nasal: bis 50 kgKG: 1 mg/10 kgKG; > 50 kgKG: 5 mg**
- **Co-Medikament bei Analgesie mit Esketamin: 10 – 50 kgKG: 0,2 mg/10 kgKG langsam, > 50 kgKG: 1 mg langsam**

Wiederholungsgabe:
- i.v. nach 2 Min.
- nasal nach 2 Min.

Antidot:
- Flumazenil (Anexate®) 0,5 mg in 5ml Benzodiazepin-Antagonist