

Medikament	Indikation	Aufziehanleitung / Dosierung
Acetylsalicylsäure (Aspirin®)	Akutes Koronarsyndrom (ACS)	250mg i.V. Auflösen der Trockensubstanz mit der beigefügten 5 ml-Ampulle, 1 ml Lösung enthalten dann 100 mg ASS
Adrenalin (Suprarenin®)	Reanimation Anaphylaxie Bradykardie Schwellung der oberen Atemwege	Reanimation: 10ml + 90ml NaCl mischen, dann 10ml in 10er Spritze aufziehen Anaphylaxie: <30kg: 0,01mg/kgKG, 30-60kg: 0,1mg/10kgKG, >60kg: 0,6mg, 1ml Spritze mit i.m Kanüle Bradykardie: 1ml+9ml NaCl in 10ml Spritze, dann 5ml + 45ml NaCl mit Perfusor Krupp Syndrom: 5 mg unverdünnt mit 5-10L O ₂ verabreichen
Amiodaron (Cordarex®)	Reanimation	2 Ampullen 6ml pur, Wiederholungsgabe 1 Ampulle 3ml pur
Atropin (Atropinsulfat®)	Bradykardie	in 2er Spritze pur
Butylscopolamin (Buscopan®)	abdominelle Koliken	in 2er Spritze pur
Clemastinfumarat (Tavegil®)	Anaphylaxie	in 2er Spritze pur
Dimenhydrinat (Vomex A®)	bei Übelkeit und Aspirationsgefahr	in 10er Spritze pur
Esketamin (Ketanest S®)	traumatische Schmerzen	i.v: 1 Ampulle 2ml + 8ml NaCl auf 10er Spritze, Nasal: pur mit MAD
Glucose	Hypoglykämie	10ml + 10ml NaCl auf 20er Spritze
Glyceroltrinitrat (Nitrolingual®)	ACS, Linksherzinsuffizienz	1 Hub

Medikament	Indikation	Dosierung
Ipratropiumbromid (Atrovent®)	Akut obstruktive Atemwegserkrankung (COPD, Asthma bronchiale)	2 Ampullen in Verneblermaske bei Kindern: 1 Ampulle 2ml + 3ml NaCl in Verneblermaske
Levetiracetam (Keppra®)	Status Epileptikus	4 Fässchen in 100ml NaCl
Midazolam	Status Epileptikus, traumatischer Schmerz	in 1 ml Spritze pur + MAD 3ml in 20er Spritze + 12 ml NaCl
Nalbuphin (Nubain®)	Abdomineller Schmerz, Rückenschmerzen nicht traumatisch	1 Ampulle 2ml+ 8ml NaCl
Paracetamol (Perfalgan®)	abdomineller Schmerz,	pur 1000mg in 100ml über 15min
Prednisolon (Solu-Decortin®/Rectodelt®)	Akut obstruktive Atemwegserkrankung, Extrapulmonale Atemwegsobstruktion, Allergische Reaktion / Anaphylaxie	5ml in 5er Spritze mit Aqua aufziehen
Rectodelt	Akut obstruktive Atemwegserkrankung Kind, Extrapulmonale Atemwegsobstruktion	Zäpfchen
Salbutamol	Akut obstruktive Atemwegserkrankung	2 Ampullen in Verneblermaske mit 5-10L O ₂ vernebeln bei Kindern : 1 Ampulle in Verneblermaske in 2er Spritze pur
Thiamin (Vitamin B1®)	Hypoglykämie mit C2, Kachexie	1 Ampulle 10ml auf 10er Spritze pur
Urapidil (Ebrantil®)	Hypertensiver Notfall, RR > 180syst. &/>110 diast.	je nach Bedarf
NaCl 0,9%	Flüssigkeitssubstitution & Trägerlösung	je nach Bedarf
Sterofundin	bei i.v Zugang	je nach Bedarf