



STARTER PDF • RELACJE MIĘDZY KOTAMI

# Czy to jeszcze zabawa?

## 7 cichych oznak konfliktu między kotami i pierwszy plan działania

Jak rozpoznać presję społeczną, uporządkować zasoby i zdecydować, kiedy wystarczy korekta środowiska, a kiedy potrzebna jest konsultacja.



Krzysztof Regulski

MATERIAŁ EDUKACYJNY



# Dla kogo jest ten materiał



Dla opiekuna, który nie widzi jawnych bójek, ale zauważa unikanie, blokowanie przejść, życie „na obrzeżach” domu, pośpiech przy kuwecie albo zmianę relacji po zmianie w domu, wizycie w lecznicy czy pojawieniu się nowego kota.

## Co znajdziesz w środku



### Szybki filtr problemu

Czy to jeszcze zabawa, czy już presja społeczna wpływająca na zasoby i poczucie bezpieczeństwa.



### 7 cichych oznak napięcia

Sygnały, które najczęściej pojawiają się wcześniej niż jawna bójka.



### Tabela różnicująca

Jak odróżnić kota wywierającego presję od kota zagrożonego.



### Plan na 14 dni

Konkretna kolejność zmian, bez robienia dziesięciu rzeczy naraz.



### Reintrodukcja i czerwone flagi

Kiedy wrócić do relacji od nowa, a kiedy nie czekać z konsultacją.



### Dziennik i checklista

Krótkie notatki, które naprawdę pomagają ocenić postęp i przygotować się do konsultacji.

“

*Jeśli jedna interakcja regularnie kończy się ustąpieniem, wycofaniem albo zmianą trasy dojścia do kuwety, miski lub człowieka, nie mówimy już wyłącznie o zabawie. Mówimy o relacji, w której pojawia się element presji społecznej.*

# 7 cichych oznak konfliktu między kotami



## 1. Blokowanie przejścia

Jeden kot zajmuje próg, wejście lub schody i sama jego obecność wystarczy, by drugi zawrócił.

## 2. Patrzenie i zamrożenie

Długi kontakt wzrokowy poprzedza ustępowanie, napięcie albo ucieczkę.

## 3. Ciche oddawanie zasobów

Kot regularnie rezygnuje z miski, kuwety, legowiska lub parapetu, gdy pojawia się drugi.

## 4. Życie na obrzeżach domu

Kot spędza coraz więcej czasu w jednym pokoju albo na wysokości, z dala od ruchu domowników.

## 5. Pośpiech przy kuwecie lub jedzeniu

Kot je szybko, korzysta z kuwety w pośpiechu i stale nasłuchuje, czy drugi nie zbliża się do zasobu.

## 6. Zmiana snu, zabawy i pielęgnacji

Kot śpi płycej, szybciej kończy zabawę, mniej się myje albo nadmiernie się wylizuje.

## 7. Objawy somatyczne

Napięcie może współwystępować ze znakowaniem moczem, idiopatycznym zapaleniem pęcherza, biegunką lub zaparciami.

## Na co patrzeć najpierw

Najczęściej pierwszy sygnał nie dotyczy samej interakcji, lecz zmiany codziennej rutyny. Brak hałaśliwych incydentów nie musi oznaczać, że relacja jest dobra.

## Kot wywierający presję i kot zagrożony

### Konflikt jawny i konflikt cichy

Konflikt jawny częściej widać: syczenie, gonitwy, przepychanki i ataki. Konflikt cichy jest trudniejszy, bo składa się z ustępowania bez dźwięku, blokowania dostępu, życia na obrzeżach domu i ciągłej czujności.

| Obserwacja            | Kot wywierający presję                     | Kot zagrożony                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Przy zasobach         | zajmuje najlepsze miejsca i nie ustępuje   | czeka, korzysta później albo rezygnuje           |
| W korytarzu           | zatrzymuje się frontalnie, patrzy, blokuje | zawraca, kuli się, szuka obejścia                |
| Kontakt z człowiekiem | wchodzi pierwszy, kontroluje dystans       | przychodzi dopiero, gdy drugi kot znika          |
| Codzienna aktywność   | pozostaje aktywny i pewny                  | żyje ciszej, bardziej skrycie i fragmentarycznie |

## Pułapka interpretacyjna

Opiekunowie często skupiają się na kocie wycofanym i próbują go „ośmielić”, zamiast najpierw odciążyć środowisko i ograniczyć społeczną presję.

# Skąd bierze się konflikt w domu wielokotowym

Najczęstszym tłem konfliktu jest konkurencja o zasoby: jedzenie, wodę, kuwety, miejsca odpoczynku, punkty obserwacyjne, kryjówki i uwagę człowieka. Nie chodzi wyłącznie o liczbę zasobów, lecz także o ich rozmieszczenie.

Dwie miski stojące obok siebie nadal mogą wymuszać bliski kontakt, którego jeden z kotów nie toleruje.

## Najczęstsze wyzwalacze

- zbyt mało rozproszonych zasobów w domu
- ślepe zaułki i przejścia bez możliwości odwrotu
- przymuszane zbliżenia i wspólne karmienie „na siłę”
- powrót kota z lecznicy z obcym zapachem
- przewlekły ból lub choroba jednego z kotów
- widok obcych kotów za oknem i wzrost pobudzenia terytorialnego

### Reguła praktyczna

Im bardziej zasób jest ważny biologicznie lub społecznie, tym mniej powinien wymuszać bliski kontakt. Dotyczy to zwłaszcza kuwety, jedzenia, wody i bezpiecznych miejsc odpoczynku.

## Zasoby, przestrzeń i trasy ucieczki

| Obszar     | Najczęstszy błąd                      | Rozwiązanie praktyczne                                              |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kuwety     | wszystkie ustawione obok siebie       | rozmieść kuwety w różnych pokojach i unikaj ślepych zaułków         |
| Jedzenie   | miski w jednej linii                  | karm w odległości, z osłoną wizualną lub w osobnych pomieszczeniach |
| Wysokość   | jedna półka dla wszystkich            | stwórz kilka tras pionowych i kilka punktów zejścia                 |
| Odpoczynek | jedno główne legowisko w centrum domu | dodaj rozproszone, spokojne miejsca i kryjówki                      |
| Przejścia  | wąskie korytarze bez alternatywy      | zapewnij obejścia i otwartą możliwość odwrotu                       |

# Kiedy napięcie zaczyna odbijać się na zdrowiu

Przewlekłe napięcie nie jest wyłącznie problemem relacyjnym. U wrażliwych kotów może odbijać się na zdrowiu pęcherza, przewodu pokarmowego, jakości snu i ogólnym dobrostanie.

Jeżeli konflikt między kotami zbiega się z pojawieniem objawów somatycznych, nie należy czekać wyłącznie na poprawę po zmianach środowiskowych.

## Czerwone flagi medyczne

- parcie na mocz, wokalizacja w kuwecie, krew w moczu lub bardzo częste mikcje
- spadek apetytu albo nagłe ograniczenie picia
- gwałtowne chudnięcie, senność, niechęć do skakania
- uporczywe wylizywanie brzucha lub boków
- biegunka, zaparcie lub regularne wymioty w okresach napięcia

## Pierwszy krok

Najpierw obniż presję i uporządkuj środowisko. Równolegle zaplanuj diagnostykę, jeśli pojawiają się objawy z pęcherza, przewodu pokarmowego, bólu lub wyraźny spadek dobrostanu.

## Plan naprawczy na 14 dni

| Etap      | Co robisz                                                                                                    | Na co patrzeć                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dni 1-2   | zbierasz obserwacje i zapisujesz, gdzie pojawiają się blokowanie, pośpiech przy kuwecie i „gorące” przejścia | czy jeden kot ustępuje od zasobu lub zmienia trasę                 |
| Dni 3-4   | rozdzielasz zasoby: kuwety, wodę, miski, punkty karmienia i miejsca odpoczynku                               | czy maleje presja przy kuwecie, misce i wejściach                  |
| Dni 5-6   | ułatwiasz drogi ucieczki: usuwasz ślepe zaułki, dodajesz obejścia, trasy pionowe i osłony wizualne           | czy kot zagrożony częściej wychodzi z części wspólnej              |
| Dni 7-9   | obniżasz pobudzenie: przewidywalny rytm dnia, krótkie zabawy, mniej wymuszonych zbliżeń                      | czy spada czujność i liczba zatorów w przejściach                  |
| Dni 10-12 | pracujesz na skojarzeniach: kontrolowana obecność drugiego kota + odległe nagrody                            | czy oba koty potrafią zjeść lub odpocząć bez wzrostu napięcia      |
| Dni 13-14 | oceniasz postęp i decydujesz, czy wystarczy korekta środowiska, czy trzeba wejść w reintrodukcję             | czy nadal utrzymuje się wyparcie, znakowanie albo objawy zdrowotne |



## Nie oceniaj efektu po jednym dniu

Jeśli już po kilku dniach maleje pośpiech przy kuwecie, spada liczba „zatorów” w przejściach, a kot zagrożony częściej pojawia się w części wspólnej, to dobry sygnał. Nadal jednak warto utrzymać zmiany przez kilka tygodni.

# Kiedy potrzebna jest ponowna introdukcja

1.

### Stabilizacja

Oddziel koty, zapewnij pełen zestaw zasobów po obu stronach i pozwól napięciu opaść.

2.

### Wymiana bodźców

Wymieniaj koce, miejsca odpoczynku i karm od obu stron drzwi, aby obecność drugiego kota znów zaczęła przewidywać coś dobrego.

3.

### Kontakt przez barierę

Krótkie, spokojne sesje przy siatce, bramce lub uchylonych drzwiach, bez wpatrywania i przymuszania.

4.

### Kontakty kontrolowane

Dopiero gdy oba koty jedzą, bawią się i odpoczywają w obecności drugiego bez napięcia, można przejść dalej.

## Czego nie robić

Nie doprowadzaj do bezpośrednich spotkań „żeby się dogadały”, nie stawiaj misek bardzo blisko bariery zbyt wcześnie i nie nagradzaj tylko jednego kota w sposób, który może zwiększyć napięcie.

# Kiedy zgłosić się po pomoc

## Nie czekaj z konsultacją

- gdy pojawiła się bójka lub kontakt kończy się pogonią i przyparciem do ściany
- gdy któryś kot przestał korzystać z części mieszkania
- gdy napięcie zbiega się z objawami medycznymi
- gdy zmiany środowiskowe po 2-4 tygodniach nie dają wyraźnej poprawy
- gdy w domu są więcej niż dwa koty i trudno wskazać, kto z kim pozostaje w konflikcie

# Dziennik obserwacji i checklista

Największą wartość diagnostyczną mają krótkie, regularne notatki. Zamiast ogólnego wrażenia „chyba się nie lubią”, lepiej zapisać konkret: kto ustąpił, przy jakim zasobie, o której godzinie i w jakich okolicznościach.

| Data | Sytuacja | Który kot ustąpił | Co było w pobliżu | Jak zakończył się incydent |
|------|----------|-------------------|-------------------|----------------------------|
|      |          |                   |                   |                            |
|      |          |                   |                   |                            |
|      |          |                   |                   |                            |
|      |          |                   |                   |                            |

## Krótką checklista środowiskowa

- ✓ Czy każdy kot ma więcej niż jedną bezpieczną trasę przemieszczania się?
- ✓ Czy kuwety są w różnych lokalizacjach, a nie w jednym skupisku?
- ✓ Czy miski nie wymuszają stania twarzą w twarz?
- ✓ Czy istnieją wysokie miejsca odpoczynku i spokojne kryjówki?
- ✓ Czy da się zamknąć widok na obce koty za oknem, jeśli to właśnie tam zaczyna się pobudzenie?

## Kiedy ten materiał zwykle wystarcza

- napięcie jest wczesne, nie ma bójek ani wyraźnego wypierania kota z części mieszkania
- widzisz poprawę po 7-14 dniach po uporządkowaniu zasobów, przejść i rytmu dnia
- obraz problemu jest czytelny i nie pojawiają się równoległe objawy kuwetowe lub medyczne

Jeśli nadal nie wiesz, czy obserwujesz jeszcze zabawę, czy już presję społeczną, przejdź do PDF-u „Koty: zabawa czy napięcie?”. Jeśli w tle pojawiają się kuweta, sen albo objawy zdrowotne, lepsza będzie konsultacja albo właściwy PDF z sąsiedniej ścieżki.

# Co dalej, jeśli to nie wystarczy

Ten przewodnik ma pomóc uporządkować pierwszy krok. Jeśli temat wraca, miesza kilka wątków albo potrzebujesz kogoś, kto zobaczy Twoją konkretną sytuację - rozmowa zwykle skraca drogę.

## Co dalej?

### Gdy problem dotyczy głównie kuwety

Sięgnij po PDF o lęku kuwetowym albo głębsze kompendium o problemie poza kuwetą.

### Gdy chcesz głębiej odróżniać zabawę od konfliktu

Następny krok to „Koty: zabawa czy napięcie?” - materiał bardziej diagnostyczny i szerszy.

### Gdy napięcie nasiliło się po zmianach w domu

Kolejny PDF to „Kot chowa się po zmianach”.

### Gdy nie wiesz, który problem jest główny

Umów 15 min konsultacji - szybciej ustalisz, czy iść w ścieżkę kuwetową, konfliktową czy medyczną.

#### KWADRANS · 69 ZŁ

#### Kwadrans z behawiorystą

15 minut rozmowy audio. Najprostszy start przy jednym pytaniu, niepewności albo pierwszym uporządkowaniu tematu.

[regulskibehawiorysta.pl/book?service=szybka-konsultacja-15-min](https://regulskibehawiorysta.pl/book?service=szybka-konsultacja-15-min)

#### DWA KWADRANSE · 169 ZŁ

#### Dwa kwadranse

30 minut online, kiedy 15 minut to za mało, temat ma kilka wątków albo chcesz spokojniej przejść przez sytuację.

[regulskibehawiorysta.pl/book?service=konsultacja-30-min](https://regulskibehawiorysta.pl/book?service=konsultacja-30-min)

#### PEŁNA KONSULTACJA · 470 ZŁ

#### Pełna konsultacja behawioralna

60 minut rozmowy, diagnoza, plan poprawy i 7 dni konsultacji tekstowych przez WhatsApp. Dla spraw złożonych, przewlekłych albo wielowątkowych.

[regulskibehawiorysta.pl/book?service=konsultacja-behawioralna-online](https://regulskibehawiorysta.pl/book?service=konsultacja-behawioralna-online)

#### KONTAKT

[kontakt@regulskibehawiorysta.pl](mailto:kontakt@regulskibehawiorysta.pl)

#### STRONA

[regulskibehawiorysta.pl](https://regulskibehawiorysta.pl)

#### INSTAGRAM

[@regulskibehawiorysta](https://www.instagram.com/regulskibehawiorysta)