

PÓŁKA BEZPŁATNA · PIERWSZY BEZPIECZNY KROK

# Transporter bez paniki

Spokojne przygotowanie kota do podróży i weterynarza

Jeśli transporter pojawia się wyłącznie przed wizytą w lecznicy, szybko staje się zapowiedzią chwytania, zamknięcia i obcych bodźców. Można to zmienić — zaczynając wtedy, gdy nie trzeba jeszcze nigdzie jechać.



## Regulski Behawiorysta

Ekspertka treść, prosty język i spokojny pierwszy krok.

## Zakres

Krótki materiał do użycia od razu.

## Ważne

Przy czerwonych flagach zdrowotnych kontakt z lekarzem weterynarii.





# 01 · Najpierw sprawdź sam transporter

Dobry transporter jest stabilny, dobrze wentylowany, bezpiecznie się zamyka i pozwala na łatwe czyszczenie. Bardzo praktyczny jest model ze zdejmowaną górą: w lecznicy kot może czasem pozostać w dolnej części zamiast być wyciągany przez małe drzwiczki.

Sprawdź, czy:

- zamek nie otworzy się po nacisku kota;
- dno nie ugina się przy podnoszeniu;
- kot może swobodnie się położyć i obrócić;
- góra lub drzwiczki nie trzaskają;
- wewnątrz mieści się cienie, znajome posłanie;
- transporter można stabilnie zabezpieczyć w samochodzie.

Miękka torba może się zapadać i utrudniać bezpieczne wyjęcie przestraszonego kota. Plecak z przezroczystą kopułą wygląda efektownie, ale może ograniczać możliwość schowania się i wystawiać kota na wiele bodźców. Wybór dopasuj do konkretnego kota, trasy i sposobu badania w lecznicy.

Nie podnoś transportera wyłącznie za uchwyt, jeśli powoduje kołysanie. Podeprzyj go od spodu i trzymaj możliwie poziomo.

---

## 02 · Etap pierwszy: transporter przestaje zapowiadać pościg

Postaw otwarty transporter w spokojnym miejscu, w którym kot już bywa. Zdejmij drzwiczki albo zabezpiecz je tak, żeby nie poruszyły się nagle. Włóż znajomy kocyk. Nie wkładaj kota do środka.

Przez pierwsze dni celem jest zwykła obecność przedmiotu. Kot może go ignorować, obwąchiwać, ocierać się albo wejść do środka. Każda z tych reakcji jest w porządku. Nie przesuwaj transportera w stronę kota i nie zamykaj wejścia, gdy tylko pojawi się w środku.

Możesz położyć kilka smakołyków najpierw obok wejścia, później na progu, a dopiero potem głębiej. Jeśli kot nie bierze jedzenia, cofnij trudność. Głód nie powinien być sposobem na zmuszenie go do wejścia.

Transporter może zostać jednym z miejsc odpoczynku. Dzięki temu przestaje pojawiać się z szafy wyłącznie w dniu, w którym opiekun zaczyna chodzić za kotem po mieszkaniu.

Pierwszym sukcesem nie jest zamknięcie drzwiczek. Jest nim dobrowolne podejście kota bez przerwania poczucia bezpieczeństwa.



## 03 · Etap drugi: wejście i krótkie zamknięcie



Kiedy kot swobodnie wchodzi, wprowadź delikatny ruch drzwiczek. Najpierw dotknij ich i od razu przestań. W kolejnych krótkich próbach przymknij je na sekundę, otwórz i pozwól kotu wyjść. Nie zwiększaj czasu, jeśli kot przestaje jeść, napina ciało, odwraca się gwałtownie albo próbuje natychmiast uciec.

Następnie przećwicz:

1. zamknięcie na kilka spokojnych sekund;
2. położenie dłoni pod transporterem;
3. minimalne uniesienie i odstawienie;
4. kilka kroków po pokoju;
5. postawienie transportera w innym miejscu i natychmiastowe otwarcie.

Każdy etap powtarzaj osobno. Nie łącz pierwszego zamknięcia z pierwszym podniesieniem i pierwszą jazdą samochodem. Krótka próba zakończona spokojnie jest bardziej użyteczna niż długa próba, podczas której kot walczy o wyjście.

Jeśli termin wizyty jest bliski, a kot nadal silnie reaguje, zadzwoń do lecznicy. Próba szybkiego „przepracowania” paniki dzień wcześniej może pogorszyć skojarzenie.

---

## 04 · Etap trzeci: samochód bez podróży

Zacznij od wejścia z zamkniętym transporterem do nieruchomego samochodu. Zabezpiecz go tak, żeby nie jeździł po siedzeniu. Pozostań chwilę bez uruchamiania silnika, wróć do domu i otwórz transporter w spokojnym miejscu.

Kolejne kroki to krótka chwila przy włączonym silniku, potem bardzo krótki przejazd i powrót. Nie dokładaj czasu, jeśli kot intensywnie dyszy, ślini się, wymiotuje, rzuca się na ścianki albo długo nie wraca do normalnego zachowania.

W podróży:

- transporter pozostaje zamknięty;
- jest stabilny i zabezpieczony pasem zgodnie z konstrukcją;
- cienka osłona może zmniejszyć liczbę bodźców, ale nie blokuje wentylacji;
- temperatura w aucie jest bezpieczna przez całą trasę;
- kot nie zostaje sam w zaparkowanym samochodzie;
- nie podajesz leków ani środków uspokajających bez ustalenia z lekarzem.

Luźny kot w samochodzie może schować się pod pedałami lub uciec po otwarciu drzwi. Nawet jeśli wokalizuje, nie otwieraj transportera w niezabezpieczonym miejscu.





## 05 · Wizyta zaczyna się przed poczekalnią

Przy umawianiu powiedz, że kot silnie reaguje na transporter lub podróż. Zapytaj o cichszą porę, możliwość oczekiwania poza zatłoczoną poczekalnią i sposób wejścia do gabinetu. Jeśli kot ma trudną historię wizyt, lekarz może zaproponować indywidualne przygotowanie — nie improwizuj samodzielnie.

W lecznicy ustaw transporter wyżej niż podłoga, stabilnie i z dala od psów. Nie otwieraj go w poczekalni. Znajomy koc może ograniczyć bodźce wzrokowe i zapachowe. W gabinecie zdejmowana góra pozwala czasem ocenić kota w dolnej części transportera.

Po powrocie postaw transporter w spokojnym pomieszczeniu, otwórz i pozwól kotu wyjść w swoim tempie. W domu wielokotowym zapach lecznicy może wywołać napięcie. Nie ustawiaj kotów od razu naprzeciwko siebie; obserwuj reakcje i daj powracającemu kotu czas w osobnej, znanej przestrzeni, jeśli tego potrzebuje.

Spokojniejsza wizyta nie zależy wyłącznie od treningu kota. Zależy też od transportu, poczekalni, sposobu obsługi i wcześniejszej rozmowy z lecznicą.

## 06 · Plan krótkich prób

- ☐ Transporter jest stabilny, bezpieczny i stoi otwarty w domu.
- ☐ Kot może wejść oraz wyjść bez zamykania i nacisku.
- ☐ Ruch drzwiczek został wprowadzony osobno.
- ☐ Podnoszenie ćwiczymy od podparcia dna i na bardzo krótko.
- ☐ Samochód zaczynamy od postoju, nie od długiej trasy.
- ☐ Przy silnej reakcji rozmawiamy z lecznicą przed wizytą.

### Co dalej?

Jeśli największy problem pojawia się dopiero przy dotyku, badaniu, czesaniu, zakraplaniu oczu lub obcinaniu pazurów, przejdź do poradnika „**Kot: dotyk i pielęgnacja**”. Nagłą zmianę tolerancji dotyku lub transportu najpierw skonsultuj z lekarzem weterynarii.

Regulski Behawiorysta · transporter ma stać się częścią środowiska, nie sygnałem rozpoczynającym pościg.

