

Les masses des particules

Leurs énergies au repos se mesurent en multiples de l'**eV**.

$$1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Leurs masses se mesurent en **eV/c²**

$$1 \text{ eV/c}^2 = 1,783 \times 10^{-36} \text{ Kg}$$

$$m_{electron} = 511 \text{ keV/c}^2$$

$$m_{proton} = 938 \text{ MeV/c}^2$$

$$m_{neutron} = 940 \text{ MeV/c}^2$$

c = 1 dans les équations

Le quadrivecteur impulsion-énergie

$$p = \begin{pmatrix} \vec{p} \\ E/c \end{pmatrix}$$

$$p^2 = \vec{p}^2 - \frac{E^2}{c^2} = -m^2 c^2$$

L'énergie et l'impulsion sont les composantes d'un **même** vecteur

- ➡ L'énergie est définie de manière **absolue**.
- ➡ L'énergie au repos peut apparaître quand on modifie la structure **interne** des systèmes.

$$E^2 = \vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4$$

$$H(\vec{p}) = \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4}$$

Les particules de masse nulle

Approximation ultra-relativiste pour des particules massives

$$E = \sqrt{\vec{p}^2 c^2 + m^2 c^4} = cp \times \left(1 + \frac{m^2 c^2}{p^2} \right)^{1/2} \approx \boxed{cp + \frac{m^2 c^3}{2p}}$$

Dans la limite d'une masse nulle : $E = cp$ et $v = c$

Des particules sans masse se déplacent à la vitesse de la lumière dans tous les repères galiléens

Trajectoires des photons : génératrices du cône de lumière

Les systèmes de particules

Paradigme des systèmes loin des instants d'interaction

Les lois de conservation et d'invariance permettent d'établir des bilans → **cinématique relativiste**

$$\mathbf{p}_{\text{tot}} = \sum_i \mathbf{p}_i$$

Référentiel dans lequel $\vec{p}_{\text{tot}} = \vec{0}$: **référentiel du centre de masse**




Ce système n'est pas celui où : $\sum_i m_i \vec{v}_i = \frac{d}{dt} \left(\sum_i m_i O\vec{M}_i \right) = 0$

Défaut de masse et énergie

Fission nucléaire



La fission libère une énergie due au défaut de masse entre l'uranium et les produits de la réaction.



Fusion nucléaire

Paradoxe → durée de vie du soleil ?



Emission solaire dans tout l'espace :

$$4,4 \times 10^9 \text{ Kg.s}^{-1}$$

Durée de vie du soleil

$$M_{\text{soleil}} = 2 \times 10^{30} \text{ Kg}$$

Perte de masse dans la réaction :

$$\begin{aligned} \Delta m &\approx 4m_p - M_\alpha = 4 \times 1,67262 \times 10^{-24} - 6,6466 \times 10^{-24} \\ &= 0,04582 \times 10^{-24} \text{ g} \approx \boxed{\frac{4m_p}{150}} \end{aligned}$$

Donc la durée de vie estimée est :

$$T = \frac{M_{\text{soleil}}}{150 \times 4,4 \times 10^9} \text{ s} = \boxed{96 \times 10^9 \text{ ans}}$$

Des ondes relativistes

Electromagnétisme et relativité

“If a unit electric point charge is in motion in an electromagnetic field, the force acting upon it is equal to the electric force which is present at the locality of the charge, and which we ascertain by transformation of the field to a system of coordinates at rest relatively to the electrical charge.”

A. Einstein (1905),

De l'électrodynamique des corps en mouvement

Electromagnétisme et relativité

$$\vec{F} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B} \right) \quad \text{La force dépendait du repère...}$$

Dans le repère tangent : $\frac{d\vec{p}}{d\tau} = \gamma \frac{d\vec{p}}{dt} = q\gamma \left(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B} \right)$

$$\mathbf{u} = (\gamma\vec{v}, \gamma c) \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{d\vec{p}}{d\tau} = \gamma \frac{d\vec{p}}{dt} = q \left(-\frac{u_4}{c} \vec{E} + \vec{u} \wedge \vec{B} \right) \\ \frac{dp_4}{d\tau} = \gamma \frac{d(q\vec{E} \cdot \vec{v})}{cdt} = \frac{q}{c} (\vec{E} \cdot \vec{u}) \end{array} \right.$$

$$\frac{d\mathbf{p}}{d\tau} = q \mathbf{F} \mathbf{u}$$

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} 0 & E_x/c & E_y/c & E_z/c \\ E_x/c & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z/c & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}$$

La covariance des équations de Maxwell

$$\left\{ \begin{array}{l} \operatorname{div} \vec{B} = 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{array} \right.$$

$$E'_x = E_x$$

$$B'_x = B_x$$

$$E'_y = \gamma(E_y - c\beta B_z)$$

$$B'_y = \gamma\left(B_y + \frac{\beta}{c} E_z\right)$$

$$E'_z = \gamma(E_z + c\beta B_y)$$

$$B'_z = \gamma\left(B_z - \frac{\beta}{c} E_y\right)$$

Quadri-potentiel $\mathbf{A} = \left(\vec{A}, \frac{V}{c} \right)$


Quadri-courant $\mathbf{j} = \left(\vec{j}, \rho c \right)$

$$d\mathbf{F} = \frac{\mathbf{j}}{\varepsilon_0}$$

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$$

$$F = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix}$$

Tenseur électromagnétique



Peter Higgs
(1929 -)

$$L = \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \dots$$

L'onde plane monochromatique

$$G = A \cos \left(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi \right)$$

Les crêtes et les creux sont indépendants de l'observateur

$\Phi = \vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t + \varphi$ est un invariant relativiste

On définit donc un nouveau quadrivecteur

$$\mathbf{k} = \left(\vec{k}, \frac{\omega}{c} \right)$$

Quadrivecteur d'onde

Transformation de Lorentz


$$\begin{pmatrix} k'_x \\ \frac{\omega'}{c} \end{pmatrix} = \gamma \begin{pmatrix} 1 & -\beta \\ -\beta & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_x \\ \frac{\omega}{c} \end{pmatrix}$$

$$\omega' = \gamma \left(\omega - \vec{k} \cdot \vec{v} \right)$$

L'effet Doppler relativiste


On considère une source d'une onde électromagnétique s'éloignant de l'observateur.

$$\omega' = \gamma \left(\omega - \vec{k} \cdot \vec{v} \right) = \gamma \omega \left(1 - \frac{v}{c} \right)$$



$$\frac{\lambda_r}{\lambda_e} = \frac{\omega'}{\omega} = \gamma (1 - \beta) = \left(\frac{1 - \beta}{1 + \beta} \right)^{\frac{1}{2}}$$

Décalage vers le rouge pour les objets qui s'éloignent



L'effet Cerenkov



La gravitation : vers la relativité générale

Equivalence entre **masse inertielle** et **masse pesante**

Le mouvement est **indépendant** de la masse

⇒ propriété de l'espace-temps

Paradoxe des jumeaux

⇒ modification du temps avec l'accélération

Trajectoire dans l'espace-temps : **géodésique**, même en présence d'un champ gravitationnel.

Principe d'équivalence : accélération \leftrightarrow pesanteur

Licence d'usage dans un contexte public, sans modification

La licence confère à l'utilisateur un droit d'usage sur le document consulté ou téléchargé, totalement ou en partie, dans les conditions définies ci-après et à l'exclusion expresse de toute utilisation commerciale.

Le droit d'usage défini par la licence autorise un usage à destination de tout public qui comprend :

- Le droit de reproduire tout ou partie du document sur support informatique ou papier,
- Le droit de diffuser tout ou partie du document au public sur support papier ou informatique, y compris par la mise à la disposition du public sur un réseau numérique.

Aucune modification du document dans son contenu, sa forme ou sa présentation n'est autorisée.

Les mentions relatives à la source du document et/ou à son auteur doivent être conservées dans leur intégralité.

Le droit d'usage défini par la licence est personnel, non exclusif et non transmissible. Tout autre usage que ceux prévus par la licence est soumis à autorisation préalable et expresse de l'auteur.

