

2004 TST #1

Tristan Shin

1 May 2019

Suppose a_1, a_2, \dots, a_n and b_1, b_2, \dots, b_n are real numbers such that

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 - 1)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2 - 1) > (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n - 1)^2.$$

Prove that $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 > 1$ and $b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2 > 1$.

Let $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ and $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$. Then

$$\begin{aligned} \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{a}\|^2 &= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 + \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 \|\mathbf{a}\|^2 - \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 \\ &= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 + (\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 - \|\mathbf{b}\|^2) \|\mathbf{a}\|^2 \\ &= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 + \langle \mathbf{a} - 2\mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle \cdot \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle \\ &= \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 + \langle \mathbf{a} - \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle^2 - \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle^2 \\ &\geq \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2 \\ &= (\|\mathbf{a}\|^2 - 1)(\|\mathbf{b}\|^2 - 1) - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2 + \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 - 1 \\ &> (\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle - 1)^2 - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2 + \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 - 1 \\ &= \|\mathbf{a}\|^2 - 2\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \|\mathbf{b}\|^2 \\ &= \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 \end{aligned}$$

so $\|\mathbf{a}\| > 1$. Similarly $\|\mathbf{b}\| > 1$. Thus $a_1^2 + \dots + a_n^2 > 1$ and $b_1^2 + \dots + b_n^2 > 1$. ■