## Distribution bioclimatique potentielle de Abies bornmuelleriana en France (Avec les variables bioclimatiques 1,4,5,6,12,13,14,15) Référence Aire d'indigénat 1951-1980 1981-2010 60°N-42.5°N 42.0°N-50°N-41.5°N-41.0°N-40.5°N-Latitude N°04 40.0°N 39.5°N-30°N 39.0°N-29°E 30°E 31°E 32°E 33°E 34°E 35°E Longitude 20°N↓— 10°E 30°E 40°E 50<sup>°</sup>E 20°E Longitude Scénario SSP1-2.6 **Toutes périodes** 2041-2070 2071-2100 2011-2040 Présence totale • 1 • 2 • 3 Scénario SSP3-7.0 **Toutes périodes** 2071-2100 2011-2040 2041-2070 Présence totale • 1 • 2 • 3 Scénario SSP5-8.5 **Toutes périodes** 2071-2100 2011-2040 2041-2070 Présence totale • 1 • 2 • 3 **Tous Scénarios** 2011-2040 2041-2070 **Total** 2071-2100

Présence totale • 1 • 2 • 3

Présence totale • 1 • 2 • 3

Présence totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Présence totale • 1 • 2 • 3