

本草备要讲解

光明中医函授大学

电子版制作时间：2025-02-19

本草备要讲解

编者

导言

编者的话

本草备要序

增补本草备要原序

本草备要凡例

药性总义

[原文]

〔讲解〕

一、药性：

二、配伍：

三、禁忌：

四、炮制：

五、用量：

各论

第一章解表药

第一节辛温解表药

麻黄

桂枝

紫苏

荆芥

防风

羌活

白芷

藁本

细辛

辛夷
苍耳子
香薷
生姜
葱白
胡荽
赤桤柳
鸡苏

第二节辛凉解表药

薄荷
牛蒡子
桑叶
甘菊花
蝉蜕
淡豆豉
蔓荆子
葛根
柴胡
升麻
浮萍
木贼

小结

第二章 泻下药

第一节攻下药

大黄
朴硝 芒硝 元明粉
芦荟

第二节润下药

大麻仁

郁李仁

海松子

蜂蜜

蓖麻子

第三节峻下逐水药

甘遂

大戟

芫花

薤花

巴豆

牵牛子

商陆

续随子

泽漆

小结

第三章清热药

第一节清热泻火药

石膏

知母

槐子

芦根

天花粉

竹叶

夏枯草

决明子

穀精草

密蒙花

青箱子

夜明砂

熊胆

西瓜

第二节 清热燥湿药

黄芩

黄连

黄柏

龙胆草

苦参

白鲜皮

秦皮

第三节 清热凉血药

犀角

生地黄

干地黄

玄参

牡丹皮

紫草

童便

人中黄

人中白

芸苔

第四节 清热解毒药

金银花

连翘

蒲公英

紫花地丁

大青叶

青黛

败酱草

土茯苓

马勃

山豆根

射干

白头翁

马齿苋

白蔹

漏芦

山慈姑

绿豆

菱

橄榄

梨

甘蔗

茶

芭蕉根

枳椇子

第五节清虚热药

青蒿

白薇

地骨皮

胡黄连

小结

第四章芳香化湿药

藿香

苍术

厚朴

砂仁

白豆蔻

草豆蔻

附：草果

小结

第五章利水渗湿药

茯苓

附：茯神

猪苓

泽泻

薏苡仁

车前草 车前子

滑石

木通

通草

篇蓄

石苇

瞿麦

海金沙

萆薢

茵陈

地肤子

冬葵子

冬瓜

附：冬瓜皮

赤小豆

灯草

淡竹叶

鲤鱼

小结

第六章祛风湿药

独活

威灵仙

防己

秦艽

木瓜

五加皮

桑寄生

白花蛇

乌梢蛇

蛇蜕

虎骨

豨莶草

海桐皮

原蚕沙

松节

络石藤

桑枝

石南叶

天仙藤

小结

第七章 温里药

附子 附：乌头 天雄

草乌头

肉桂 桂心

干姜 附：黑姜

吴茱萸

高良姜

附：红豆蔻

川椒

附：椒目

丁香

附：母丁香

茴香

胡椒

附：荜澄茄

荜茇

小结

第八章开窍药

麝香

牛黄

冰片

苏合香

石菖蒲

安息香

小结

第九章安神药

第一节重镇安神药

朱砂

磁石

龙骨

龙齿

牡蛎

紫石英

金

铁

珍珠

琥珀

第二节养心安神药

酸枣仁

柏子仁

远志

合欢皮

小结

第十章平肝息风药

羚羊角

石决明

贝子

代赭石

钩藤钩

天麻

蚯蚓

僵蚕

全蝎

蜈蚣

小结

第十一章理气药

陈皮

青皮

枳实、枳壳

香附

木香

乌药

佛手

香橼

沉香

檀香

紫檀

川楝子

荔枝核

薤白

大腹皮

甘松香

山柰

刀豆

柿干

梅花

小结

第十二章活血祛瘀药

芎藭

延胡索
郁金
姜黄
蓬莪术
荆三棱
丹参
益母草
泽兰
桃仁
红花
鸡血藤
乳香
没药
穿山甲
王不留行
皂角刺
苏木
刘寄奴
自然铜
牛膝
五灵脂
降真香
凌霄花
枫脂香
马鞭草

干漆

小结

活血祛瘀药功用归纳简表

第十三章止血药

大小蓟

侧柏叶

槐实

地榆

白茅根

苎麻根

藕

仙鹤草

白芨

棕榈

血余炭

三七

茜草

蒲黄

艾叶

卷柏

伏龙肝

百草霜

花乳石

小结

止血药功用归纳简表

第十四章消食药

山楂

麦芽

穀芽

神曲

鸡内金

莱菔(莱菔子)

小结

消食药功用归纳简表

第十五章驱虫药

使君子

槟榔

雷丸

鹤虱

芜荑

榧实

贯众

大蒜

小结

第十六章化痰止咳平喘药

第一节温化寒痰药

半夏

天南星

白附子

白芥子

旋覆花

白前

皂角 肥皂荚

第二节清化热痰药

前胡

桔梗

贝母

瓜蒌

竹茹

竹沥

荆沥

天竺黄

礞石

浮海石

海蛤壳

瓦楞子

海藻

昆布

胖大海

葶苈

芥菀

胡桐泪

第三节止咳平喘药

杏仁

紫菀

款冬花

百部

桑白皮

葶苈子

马兜铃

枇杷叶

小结

第十七章补益药

第一节补气药

人参 人参芦

党参

西洋参

太子参

黄芪

白术

山药

白扁豆

甘草

大枣

第二节补阳药

鹿茸

巴戟天

肉苁蓉

锁阳

淫羊藿

仙茅

菟丝子

蒺藜子

破故纸

益智仁

杜仲

续断

狗脊

骨碎补

胡芦巴
冬虫夏草
蛤蚧
胡桃
紫河车
海狗肾
韭菜 韭子
阳起石
海马
羊肉

第三节补血药

熟地黄
何首乌
当归
白芍药 赤芍药
阿胶
黄明胶
龙眼肉

第四节补阴药

沙参
麦门冬
天门冬
石斛
菱蕤
黄精
百合
枸杞子 枸杞叶
旱莲草
女贞子

桑椹
楮实
落花生
龟版
鳖甲
胡麻
乌骨鸡
黑大豆

小结

补益药功用归纳简表

第十八章收敛药

山茱萸
五味子
五倍子
小麦
乌梅
肉豆蔻
诃子
赤石脂
禹余粮
石榴皮
海螵蛸
芡实
莲子
莲蕊鬚
荷叶

金樱子

覆盆子

桑螵蛸

椿樗白皮

白果

罂粟壳

刺猬皮

没石子

小结

第十九章涌吐药

瓜蒂

常山

胆矾

藜芦

小结

第二十章外用药及其他

雄黄

石硫黄

砒石

水银

轻粉

铅

密陀僧

硼砂

炉甘石

明矾

皂矾

斑蝥

蟾蜍

木鳖子

附：马钱子

血竭

樟脑

大风子

蛇床子

木槿皮

丝瓜

孩儿茶

阿魏

露蜂房

小结

补充药物归纳表

本书引用方剂索引

电子版录入与校对

更多信息

编者

光明中医函授大学 主编

席与民 主编

席与民 朱肇和 吴大真 编

白永波审阅

导言

中医教育学，是一门古老而崭新的科学。中医教育的历史，若从师徒授受和医籍编纂算起，已有两千余年。近代史上的中医教育，首推一八八五年浙江陈虬创立的利济医学堂。新中国诞生不久，创办了北京、上海、广州和成都四所中医学院，从而揭开了当代中医教育的序幕，至现在，全国已发展到二十三所。但是，如果把我国中医教育的实践经验加以分析、研究、总结和提炼，升华，揭示它的规律，使之成为一门专门的学科——中医教育学的话，那么，它还处在再创阶段。这就是说，中医教育及其规律存在的历史是悠久的，但论述中医教育及其规律的学科却是崭新的。因此，中医教育工作需要进行探索和研究。

在探索和创建适合我国国情的中医教育的时候，我们必须植根于我们民族文化的肥沃土壤之中，充分重视中医典籍在培育和造就历代医家中的伟大作用。事实上，在长期的历史发展中，逐渐形成了具有中华民族特色的中医药理论体系，它既有丰富临床经验，又有高深的理论基础。历代医学家就是把这些道理传授给他们的弟子，其中部分人经过刻苦自学和临床实践，成为医术高超的医学家，这是我国历代医学家成才之路，亦是中医教育史上培养人才的宝贵经验。这就是我们民族中医教育事业的光辉历史。

在新的历史时期，作为中医教育工作来说，既要给学生打好传统医学的基本功，又要使他们掌握一些新兴的科学知识，使继承与发展得到统一。根据这种认识，我们十分认真地研究和设计了光明中医函授大学的教学计划、教材内容、教学方法与教学手段。归结起来即是：注重打好中医基本功，注意提高中医基本理论水平和培养临床诊治技能，着力培养辨证论治的思维方法，竭诚发挥中医在防病治病中的特长。并在这个基础上，扩大学员知识面。我们把这些要求与思想，全面体现在本校的教材建设中。其目的是使中医人才的知识结构更加合理，以便能担负起继承和发扬祖国医药学防病治病的光荣任务。

在回顾中华医学教育历史，展望现代医学教育的发展趋势以及总结三十多年正反两方面经验的基础上，我们认为，要培养出适合四化需要的合格中医人才，对中医教育的课程设计和教材内容，就要进行必要的改革，建立起为新形势所需要的中医教材。我们正在朝这一方向努力。在认真研究高等中医院校教材和广泛征询中医专家、学者和医务人员意见的基础上，新编了这套较为完整的中医教材，定名为《高等中医函授教材》（包括了二十八门课程）教材的编写人员，由本校选聘知名教授、学者和学有专长者担任，编写时，我们力求各门教材要有鲜明的针对性，在内容上富有实用性，在文字表达上深入浅出、简明易懂，以利便于自学或函授，此外，我们还将根据需要，选编一些辅导材料，以帮助学员（读者）理解教材内容，更好地学取中医知识。

由于教材编写时间仓促，又竭力于继承与创新，不足之处在所难免，敬希学员和广大读者惠赐宝贵意见，以便在再版时修订。

光明中医函授大学教育研究室

一九八五年十月四日

加入光明：



光明中医网址：www.gmzyjx.com，www.gmzyjc.com

编者的话

本书以清·汪昂《本草备要》为蓝本，予以讲解注释而成。除为函授学员学习应用外，也可供广大中医、中药人员及中医爱好者阅读。

本书主要对原著进行讲解。讲解中既解释原文主要内容，又有所阐发。力求突出重点，通俗易懂，理论联系实际，便于自学。

本书分总义和各论两部分。总义部分概括地阐明了中药的性能、配伍、炮制、用法等基本理论。原书引录的经典内容较多，且有一定重复，我们只选摘了部分内容，结合中药理论加以阐述。各论部分，分作二十章，不依原书按草、木、虫、兽等分类的方法，而以功效归类的方法，按章、节予以改编。每章、节之首均列概说，简要介绍本类药物的共性问题。每章之末均有小结，将所载药物联系对比，明确其异同，以兹鉴别运用；还附有功用归纳简表，便于学习记忆；并列有复习思考题，便于复习思考。书末附列补充药物归纳表，系全国中医学院统编教材《中药学》所载而《备要》未收的药物，以资互为参照。书后附有方剂和药名索引，顺序按首字简体笔画排列，便于读者查阅。

通过本课程的学习，要求学习能联系中医理论和辨证论治的原则，系统地掌握中药的基本理论、基本概念、基本内容。具体要求则按教材各章内容统一划分为三级：第一级“掌握”为重点内容；第二级“熟悉”为次重点内容；第三级“了解”为非重点内容。学员在自学过程中宜按此三级要求，运用唯物论和辩证法的观点，充分发挥独立思考能力，尽可能地理论联系实际，做到分别主次，循序渐进。在此基础上，结合复习思考题进行自我练习和测试，以巩固已经掌握的学习内容，提高自学效果。本课程计划安排自学150学时，面授40学时，详见各章学习进度安排项内。在这里特别强调一点：学习中药学的基本理论，必须紧密地联系中医学的基本理论；掌握中药学的临床药理和药性，必须紧密地联系中医的临床实践。也就是说，要注重中医理法方药的内在联系。因此，《本草备要讲解》课，既可以作为基础课对待，又可以作为专业课对待；既可以作为学员或中医师打基本功的必

修课，又可以作为中医师案头的参考书。从这个意义上说，学习本课程不要抓紧一阵子、放松一辈子，切勿产生一劳永逸的思想。

本书从原著中选取400余味临床常用中药，每药按原文、讲解、临证应用、用量用法等各项阐述。先解释难字、难词，并提示药物作用特点，再根据原文主要内容叙述性味、归经、功效、应用，但不是逐字逐句解释。临证应用，则侧重于“实用”二字，选取对临床有指导意义和实用价值的内容，并引出行之有效的常用方剂。用量用法，介绍临床常用剂量及使用注意项、禁忌等。

少数在临床上极少应用的药物，未收入本书。药物来源及产地部分，只对古今异议或原著详言者，酌加解释，习知习见者，则未予赘述。对同一动、植物的不同药用部分或某些作用相近，但又不甚常用的药物，列入附药介绍。原书在每味药物之末，均记载“相反”、“相恶”、“相畏”等内容，近世多不沿袭，同时有的内容尚待进一步研究探讨，无特殊需要说明者，在讲解中一般从略。《本草备要》流传版本甚多，本书所据版本为民国新纪元上海同文书局印《增补本草备要》。

本书在编写和审定过程中，一直得到白永波同志的大力支持和指导，得到甘肃中医学院陈实、黄世佐、高慧琴等青年教师及部分同学的帮助，谨此表示衷心的感谢。

本书编写时间仓促，加之水平有限，缺点和错误一定不少，希望在使用过程中发现问题，提出宝贵意见，以便今后改进和提高。

编者

本草备要序

医学之要，莫先于切脉，脉候不真，则虚实莫辨，攻补妄施，鲜不夭人寿命者。其次则当明药性，如病在某经当用某药，或有因此经而旁达他经者，是以补母泻子，扶弱抑强，义有多端。指不一定，自非兼贯博通，析微洞奥，不但呼应不灵，或反致邪失正。先正云：用药如用兵，诚不可以不慎也。古今著本草者，无虑数百家，其中精且详者，莫如李氏《纲目》，考究渊博，指示周明，所以嘉惠斯人之心，良云切至，第卷帙（1）浩繁，卒杂究殫（2），舟车之上，携取为难，备则备矣，而未能要也。他如主治指掌药性歌赋，聊以便初学之诵习，要则要矣，而未能备也。近如《蒙筌》、《经疏》，世称善本。《蒙筌》附类，颇著精义，然文拘对偶，辞太繁缛（3），而阙略尚多。《经疏》发明主治之理，制方参互之义，甚者刊误以究其失，可谓尽善，然未暇详地道，明制治，辨真伪，解处偶有傅会，常品时多芟黜（4），均为千虑之一失。余非岐黄家，而喜读其书，三余之暇，特为诸家本草，由博返约，取适用者凡四百品，汇为小帙，某药入某经治某病，必为明其气味形色所以主治之由，间附古人畏恶兼施制防互济用药深远之意，而以土产、修治、畏恶附于后，以十剂宣、通、补、泻冠于前。既著其功，亦明其过，使人开卷了然，庶几用之不致舛（5）误。以云备则已备矣，以云要则又要矣。通敏之士，由此而究图焉。医学之精微，可以思过半矣。题目曰《本草备要》，用以就正于宗工焉。

休宁切庵汪昂题于延禧堂

（1）帙：音zhì。包书的布套，即书衣。

（2）殫：音dān。尽竭。

（3）辞太繁缛：缛音rù，色彩繁多。辞太繁缛，形容文辞过于繁琐。

(4) 芟黜：芟音shān，除草的意思。黜，贬退。芟黜，喻以象杂草一样消除。

(5) 舛：音chuǎn。错乱。

增补本草备要原序

言之可贵而足以垂后者，必性命之文也，其次则经济之文也。余于理学，既无所窥，又六经（1）四子（2）之书，灿如星日，即汉疏宋注，且有遗讥。况余愚瞽（3）凡民，安敢以管蠡仰测高深也哉。性命之文，吾无及矣。若经济之文，必须见诸实事，方能载诸简编。余少困棘闱，壮谢制举，长甘蓬蘽（4），终鲜通荣，经济之文，吾无望焉耳。至于词章诗赋，月露风云，纵极精工，无裨实用，扬子所谓雕虫篆刻，壮夫不为，不其然乎。窃谓医药之书，虽无当于文章钜（5）丽之观，然能起人沉疴（6），益人神智，弱可令壮，郁可使宽，无关道脉，而能有助刚大之形躯，不系政刑，而实有裨生成之大德。言不堕绮语之障，用有当施济之仁，群居饱食之余，或可以愧小慧而胜犹贤也乎。是用寄意此中，思以寿世。初则谓医学与堪輿（7）不同，堪輿当有秘奥，天机不欲轻泄。若医集所以济生救疾，自应无微不阐，无隐不彰，恣意极言，不遗余蕴。及泛览诸书，惟《灵》、《素》、《难经》，仲景、叔和，奥衍宏深，不易究殚。自唐宋而下，名家百氏方书，非不灿陈，而义蕴殊少诠释。如本草第言治某病某病，而不明所以主治之由；医方第云用某药某药，而不明所以当用之理。千书一律，开卷茫如，即间有辨析病源，训解药性者，率说焉而不详，语焉而不畅，医理虽云深造，文字多欠通明，难以豁观者之心目。良用怆然，不揣固陋，爰採诸家之长，辑为《本草备要》、《医方集解》二篇。理法全宗古人，体裁更为创制。本草则字笺句释，倣传注之详明；医疗则论证释方，兼百家之论辨。书分两帙，用实相资，要令不知医之人，读之了然，庶裨实用。两书甫出，幸海内名贤颇垂鉴许。今本草原刻，字已漫灭，特再加厘订，用酬世好。抑世尚有议余药味之简者，余惟《歌赋》、《汤液》，药仅二百四十种，拙集广至四百种，不为少矣。如食物仅可充口腹，僻药非治所常需者，安能尽录？盖既取其备，又欲其要，应如是止也。兹因重梓，更增备而可用者约六

十品，聊以厌言者之口，仍不碍携者之艰，苟小道之可观，倘不至致远之恐泥也乎。

康熙甲戌岁阳月休宁八十老人切庵汪昂 书于

延禧堂

- (1) 六经：指诗、书、礼、乐、春、秋。
- (2) 四子：即孔丘、孟轲、子思、曾参。
- (3) 瞽：音gǔ。瞎眼，这里作自谦词。
- (4) 蓬蘽：蘽，音léi。蓬蘽，藤蔓繁茂。
- (5) 钜：通“巨”，大或多的意思。
- (6) 沉痾：久治不愈的疾病。
- (7) 堪舆：看地宅。俗称看风水。

本草备要凡例

（一）注本草者，当先注病证，不然，病之未明，药于何有。从前作者罕明斯义，第云某药入某经治某病而已，浅术视之，盖茫如也。唯李氏《纲目》，裒（1）集诸家，附著论说，间及病源。《经疏》因之，释药而兼释病，补前人之未备，作后学之指南。兹集祖述二书，更加增订，药性病情，互相阐发，以便资用。若每处皆释，则重复烦琐，反生厌渎，故前后间见，或因药论辨，读者汇观而统会之可也。

（一）药品主治，诸家析言者少，统言者多。如治痰之药，有治燥痰者，有治湿痰者，诸书第以除痰概之；头痛之药，有治内伤头痛者，有治外感头痛者，诸书唯言治头痛而已。此皆相反之证，未可混施。举此二端，其余可以类推矣。又每药之下，止言某病宜用，而不言某病忌用，均属阙略。兹集并加详注，庶无贻误。

（一）每药先辨其气味形色，次著其所入经络，乃为发明其功用，而以主治之证，具列于后。其所以主治之理，即在前功用之中，不能逐款细注，读者谅之。

（一）徐之才（2）曰：药有宣、上升下行曰宣。通、补、泻、滑、燥、湿、
湿即润也。轻、重十种，是药之大体。而《本经》不言，后人未述。凡用药者审而详之，则靡所遗失矣。今为分阐以冠于诸药之首。此十剂也。陶弘景加寒热二剂，兹不具述。然本集燥剂，即陶氏之热剂，通剂乃徐氏之燥剂，而寒剂则多寓于泻剂也。

（一）药品主治，已注明入某脏某腑者，则不更言入某经络，以重复无用也。

（一）药品稍近遐僻者，必详其地道形色，如习知习见之药，则不加详注。

（一）阴阳、升降、浮沉，已详于药性总义中，故每品之下，不加重注。

（一）药目次第，每药稍从其类，以便查阅。

（一）先哲名言，有言以人重者，有人以言重者，须当仍其名氏，庶乎后学知所禀承，或是或非，有可裁断矣。奈何医集之中，率掠古人之言，混入己作，使读者苍黄莫辨，泾渭难分，习俗移人，贤者不免。甚有合数人之言，砌掇成篇，首尾欠贯，词意多乖，以故医学每鲜佳编，良深慨息。本集采用诸家，悉存原名，使可考据，间有删节数行数句者，以限于尺幅也；有增改数句数字者，务畅其文义也；亦有录其言而未悉其名氏者，以藏书既寡，目力不充，难于尽考也。或时附入鄙见，必加“昂按”二字，以听时贤之论定。其间旁搜远讨，义图贯通，取要删繁，词归雅饬（3），庶几豁观者之心目云耳。

（一）是书篇章虽约，多有补《纲目》、《经疏》之所未备者，故曰备也。

（一）药有气味、形色、经络、主治、功用、禁忌数端。药性歌赋虽便记诵，然限于字句，又须用韵，是以不能详括。兹集文无一定，药小者语简，药大者词繁，然皆各为杼轴，锻炼成章，使人可以诵读。

（一）《本草》一书，读之率欲睡欲卧，以每药之下，所注者不过脏腑经络，甘酸苦澇，寒热温平，升降浮沉，疾候主治而已，未尝阐发其理，使读之者有义味可咀嚼也。即如《证类》诸本，采集颇广，又以众说繁芜，观者罔所折衷也。是编主治之理，务令详明，取用之宜，期于确切。言畅意晰，字少义多，作者颇费匠心，读者幸毋忽视。

（一）是书之作，不专为医林而设，盖以疾疢（4）人所时有，脱或处僻小之区，遇庸劣之手，脉候欠审，用药乖方，而无简便方书与之较证，鲜有不受其误者，是以特著此编，兼辑《医方集解》一书相辅而行。篇章虽约，词旨详明，携带不难，简阅甚

便。倘能人置一本，附之篋笥（5），以备缓急，亦卫生之一助。有识之士，当不以愚言为狂谬也。

（一）昂自壮立之年，便弃制举，蹉跎世变，念著书作诗，无当人意，只堪覆瓿，难以垂远。然禽鹿视息，无所表见，窃用疚心，故疲精瘁神，著辑方书数种，以为有当于民生日用之实。且集诸家大成，贯穿笺释，或可有功前贤，嘉惠来世。易世之后，倘有嗜吾书而为重梓者，庶能传之久远，此区区立言之意也。

（一）是书之作，因阅过伯龄《围棋四子谱》而师其意。盖围棋之谱，自唐宋至今，千有余载，然必如伯龄之谱，有议论，有变换，而后围棋之妙显。本草自《本经》而下，不啻数百千家，然率言其气味主治，而无义味可寻，必须为之字笺句释，明体辨用，而后药性之功全。盖士生千载之后，贵能取前人之言，寸衡铢称，抉髓抡精，庶为有集成之益，无缺略之讥也。故拙著《内经》、《本草》、《方解》、《汤头》数书，皆另为体裁，别开径路，以发前贤未竟之旨，启后人便易之门。窃谓于医学颇有阐微廓清之力，读者倘能鉴别，斯不虚老人之苦心焉耳。

（1）裒：音póu。聚集。

（2）徐之才：南北朝时期北齐医家。

（3）飭：音chì。整齐。

（4）疚：音chèn。热病。这里泛指病。

（5）篋笥：音qiè sì。小竹箱子。

药性总义

- 药性总义

〔自学时数〕8学时

〔面授时数〕2学时

〔目的要求〕

1. 了解中药学的基本理论及其与中医学理论体系密不可分的关系。
2. 熟悉中药的四气五味、升降浮沉、归经、配伍、禁忌、炮制的含义、作用及其与中医辨证论治体系中遣方用药的密切关系。
3. 掌握中药的“十八反”、“十九畏”、“妊娠服药禁忌”。
4. 掌握中药“七情”的意义。
5. 了解炮制的方法及其作用。

〔原文〕

凡药酸属木入肝，苦属火入心，甘属土入脾，辛属金入肺，咸属水入肾，此五味⁽¹⁾之义也。

凡药青属木入肝，赤属火入心，黄属土入脾，白属金入肺，黑属水入肾，此五色⁽²⁾之义也。

凡药酸者能涩能收，苦者能泻能燥能坚⁽³⁾，甘者能补能和能缓，辛者能散能润能横行⁽⁴⁾，咸者能下⁽⁵⁾能软坚，淡者能利窍⁽⁶⁾，能渗泄⁽⁷⁾，此五味之用也。

凡药寒热温凉，气也；酸苦甘辛咸，味也。气为阳，味为阴。气厚者阳中之阳，薄者阳中之阴；味厚者阴中之阴，薄者阴中之阳。气薄则发泄，表散。厚则发热，温燥。味厚则泄，降泻。薄则通，利窍渗湿。辛甘发散为阳，酸苦涌⁽⁸⁾泄为阴，咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。轻清升浮为阳，重浊沉降为阴。阳气出上窍⁽⁹⁾，阴味出下窍⁽¹⁰⁾。清阳发腠理⁽¹¹⁾，浊阴走五脏；清阳实四肢，浊阴归六腑。此阴阳之义也。

凡药轻虚者浮而升，重实者沉而降；味薄者升而生，象春。气薄者降而收，象秋。气厚者浮而长，象夏。味厚者沉而藏，象冬。味平者化而成，象土。气厚味薄者浮而升，味厚气薄者沉而降，气味俱厚者能浮能沉，气味俱薄者可升可降。酸咸无升，辛甘无降，寒无浮，热无沉，此升降浮沉之义也。李时珍曰：升者引之以咸寒，则沉而直达下焦；沉者引之以酒，则浮而上至巅顶。一物之中，有根升梢降，生升熟降者是升降在物亦在人也。凡药根之在土中者，半身以上则上升，半身以下则下降，以升苗者为根，以入土者为梢，上焦用根，下焦用梢，半身以上用头，中焦用梢，半身以下用梢。虽一药而根梢各别，用之而差，服亦罔效。药之为枝者达四肢，为皮者达皮肤，为心为干者内行脏腑；质之轻者上入心肺，重者下入肝肾；中空者发表，内实者攻里；枯燥者入气分，润泽者入血分。此上下内外，各以其类相从也。

凡药色青、味酸、气燥、性属木者，皆入足厥阴肝、足少阳胆经；肝与胆相表里，胆为甲木，肝为乙木。色赤、味苦、气焦、性属火者，皆入手少阴心、手太阳小肠经；心与小肠相表里，小肠为丙火，心为丁火。色黄、味甘、气香、性属土者，皆入足太阴脾、足阳明胃经；脾与胃相表里，胃为戊土，脾为己土。色白、味辛、气腥、性属金者，皆入手太阴肺、手阳明大肠经；肺与大肠相表里，大肠为庚金，肺为辛金。色黑、味咸、气腐、性属水者，皆入足少阴肾、足太阳膀胱经。肾与膀胱相表里，膀胱为壬水，肾为癸水。凡一脏配一腑。腑皆属阳，故为甲丙戊庚壬；脏皆属阴，故为乙丁己辛癸也。十二经中，惟手厥阴心包、手少阳三焦经无所主，其经通于足厥阴、少阳，厥阴主血，诸药入肝经血分者，并入心包；少阳主气，诸药入胆经气分者，并入三焦；命门相火，散行于胆、三焦、心包络，故入命门者，并入三焦。此诸药入诸经之部分也。药有相须者，同类而不可离也；如黄柏、知母，破故纸、胡桃之类。相使者，我之佐使也；相恶者，夺我之能也；相畏者，受彼之制也；相反者，两不相合也；相杀者，制彼之毒也。此异同之义也。肝苦急，血燥苦急，急食甘以缓之；肝欲散，木喜条达。急食辛以散之，以辛补之，以酸泻之。以散为补，以敛为泻。心苦缓，缓则散逸。急食酸以收之；心欲软，急食咸以软之，以咸补之，按水能克火，然心以下交于肾为补，取既济之义也。以甘泻之。脾苦湿，急食苦以燥之；脾欲缓，舒和。急食甘以缓之，以甘补之，以苦泻之。肺苦气上逆，火旺克金。急食苦以泻之；肺欲收，急食酸以收之，以酸补之，以辛泄之。肾苦燥，急食辛以润之；肾欲坚，坚固则无狂荡之患。急食苦以坚之，以苦补之，以咸泻之。此五脏补泻之义也。

风淫⁽¹²⁾于内，治以辛凉，佐以苦甘，以甘缓之，以辛散之。风属木，辛属金，金能胜木，故治以辛凉。过辛恐伤真气，故佐以苦甘。苦胜辛，甘益气也。木性急，故以甘缓之，木喜条达，故以辛散之。热淫于内，治以咸寒，佐以甘苦，以酸收之，以苦发之。水胜火，故治以咸寒。甘胜寒。佐之所以防其过。必甘苦者，防寒之过，而又以泻热气作实也。热淫故以酸收之，热结故以苦发之。湿淫于内，治以苦热，佐以酸淡，以苦燥之，以淡泄之。湿为土气，苦热皆能燥湿。淡能利窍渗湿，用酸者木能制土也。火淫于内，治以咸冷，佐以苦辛，以酸收之，以苦发之。相火畏火也，故治以咸冷。辛能湿润，酸能收敛，苦能泄热，或从其性而升发之也。燥淫于内，治以苦温，佐以甘辛，以苦下之。

燥属金，苦属火，火能胜金，故治以苦温。甘能缓，辛能润，苦能下，故以为佐也。寒淫于内，治以甘热，佐以苦辛，以咸泻之，以辛润之，以苦坚之。土能制水，热能胜寒，故治以甘热，苦而辛，亦热品也。伤寒内热者，以咸泻之；内燥者，以辛润之，苦能泻热而坚肾，泻中有补也。此六淫主治，各有所宜，故药性宜明，而施用贵审也。

人之五脏应五行，金木水火土，子母相生。经曰：虚则补其母，实则泻其子。又曰：子能令母实。如肾为肝母，心为肝子，故入肝者，并入肾与心；肝为心母，脾为心子，故入心者，并入肝与脾；心为脾母，肺为脾子，故入脾者，并入心与肺；脾为肺母，肾为肺子，故入肺者，并入脾与肾；肺为肾母，肝为肾子，故入肾者，并入肺与肝。此五行相生，子母相应之义也。

酸伤筋，敛则筋缩。辛胜酸；苦伤气，苦能泻气。咸胜苦；甘伤肉，酸胜甘；辛伤皮毛，疏散腠理。苦胜辛；咸伤血，咸能渗泄。甘胜咸。此五行相克之义也。

酸走筋，筋病毋多食酸，筋得酸则拘挛⁽¹³⁾、收引⁽¹⁴⁾益甚也。苦走骨，骨病毋多食苦，骨得苦则阴益甚，重而难举也。甘走肉，肉病毋多食甘，肉得甘则壅气、脓肿⁽¹⁵⁾益甚也。辛走气，气病毋多食辛，气得辛则散而益虚也。咸走血，血病毋多食咸，血得咸则凝涩而口渴也。咸能渗泄津液。此五病之所禁也。

多食咸，则脉凝泣涩而变色；脉即血也，心合脉，水克火。多食苦，则皮槁而毛拔；肺合皮毛，火克金。多食辛，则筋急而爪枯；肝合筋，爪者筋之余，为金克木。按肝喜散，故辛能补肝，唯多则为害。多食酸，则肉胝皱⁽¹⁶⁾而唇揭⁽¹⁷⁾；脾合肉，其华在唇，木克土。胝音支，皮厚也。多食甘，则骨痛而发落。肾合骨，其华在发，土克水。此五味之所伤也。药之为物，各有形性气质，其入诸经，有因形相类者，如连翘似心而入心，荔枝核似睾丸而入肾之类。有因性相从者，如属木者入肝，属水者入肾，润者走血分，燥者入气分。本天者亲上，本地者亲下之类。有因气相求者，如气香入脾，气焦入心之类。有因质相同者。如药之头入头，干入身，枝入肢，皮行皮，又如红花、苏木汁似血而入血之类。自然之理，可以意得也。

药有以形名者，人参、狗脊之类是也；有以色名者，黄连、黑参之类是也；有以气名者，豨莶、香薷之类是也；有以味名者，甘草、苦参之类是也；有以质名者，石膏、石脂、归身、归尾之类是也；有以时名者，夏枯、款冬之类是也；有以能名者，何首乌、骨碎补之类是也。

凡药火制四，煨、煨、炙、炒是也；水制三，浸、泡、洗也；水火共制二，蒸、煮也。酒制升提，姜制温散，入盐走肾而软坚，用醋注肝而收敛，童便制，除劣性而降下，米泔制，去燥性而和中，乳制润枯生血，蜜制甘缓益元⁽¹⁸⁾，陈壁土制，借土气以补中州⁽¹⁹⁾，面裹曲制，抑酷性勿伤上膈，黑豆、甘草汤渍⁽²⁰⁾，并解毒致令平和；羊酥、猪脂涂烧，咸渗骨容易脆断。去穰者免胀，去心者除烦，此制治各有所宜也。

一药之为用，或地道不真，则美恶迥别。或市肆饰伪⁽²¹⁾，则气味全乖⁽²²⁾；或收采非时，则良梏⁽²³⁾异质；或头尾误用，则呼应不灵；或制治不精，则功力大减。用者不察，顾归于药之罔功。譬之兵不精练，思以荡寇克敌，适以覆众輿尸也。治疗之家，其可忽诸。

《千金》云：凡药须治择熬泡毕，然后秤用，不得生秤，滋润药先皆增分两，燥乃秤之。

【讲解】

(1) 五味：即辛、甘、酸、苦、咸五种不同的药味，具有五类不同的作用。(2) 五色：指青、赤、黄、白、黑五种颜色。(3) 坚：作固解。即坚固之义。(4) 横行：此作行散解。(5) 下：此作泻下解。

(6) 利窍：此作利尿解。(7) 渗泄：指利小便及通窍。(8) 涌：即涌吐。(9) 上窍：指眼、耳、口、鼻五官。(10) 下窍：指前后二阴，即尿道、肛门。(11) 腠理：指汗孔及皮肤肌肉组织间隙。(12) 淫：即过多或过甚。(13) 拘挛：指肢体牵引不适或自觉紧缩感，以至影响活动。(14) 收引：指筋脉拘急，肢体蜷缩而言。(15) 臌肿：此指腹前肿，《素问·六元正纪大论》：心腹满热，臌胀。(16) 肉胝膈：胝，音zhī，作皮厚解；膈，同皱，皱缩之意。肉胝膈，即指皮肉厚而皱缩。(17) 揭：作掀起解。(18) 益元：即补益元气。(19) 中州：指中焦脾胃。(20) 渍：与泡相似，是用水将药物渐渐渗透而使之柔软的方法。(21) 市肆饰伪：此指药店或药市上装饰伪品充真品出售。(22) 乖：指违反情理，不正常。(23) 楮：指粗劣。

总义论述较广，除药物性能之四气五味，升降浮沉，归经等外，还概括阐明了配伍，炮制，用法等基本知识。

一、药性：

药性就是把药物治病的多种多样的性质和作用加以概括的统称，它主要包括性、味、升降浮沉、归经等内容。

（一）性：即寒、热、温、凉气也。这四种药性，古时称“四气”。其中温热与寒凉属于两类不同的性质，而温与热，寒与凉，仅仅是程度上差异。药物的寒、热、温、凉四性，是古人在临床实践中根据药物作用于人体所发生的反应和治病效果而作出的归纳，如石膏、知母等对发热、烦渴等热证有清热泻火作用，就表明这两种药是寒性的；反之，用干姜、附子等治疗腹中冷痛的寒证有温中散寒的作用，就表明这些药是热性的。一般来说，能减轻或消除热证的药物，是属于寒性或凉性；能减轻或消除寒证的药物，属于温性或热性，即药性与所治疾病的寒热之性是相对的。正如《神农本草经》云：疗寒以热药，疗热以寒药。又《素问·至真要大论》曰：寒者热之，热者寒之。这就是用药的基本规律之一。

此外，还有一些寒热偏胜之性不显著，作用比较和缓的药物，常称之为平性，实际上没有绝对的平性，总有偏温偏凉的区别，所以一般仍称四气。

（二）味：就是酸、苦、辛、甘、咸五种味道，这些味，主要是由味觉器官辨别出来的，或是根据临床治疗中反映出来的效果而确定的。古人在长期医疗实践中，发现不同味的药物有不同的治疗作用，相同味的药物有相近的共同之处，因而总结了五味的用药理论，对于临床用药有重要的指导意义。现将五味的作用分述如下：

酸味有收敛、固涩作用。多用于虚汗、泄泻、遗精、带下等证，如五味子、山茱萸涩精止汗，诃子、五倍子涩肠止泻。

苦味有泄和燥的作用。泄又分通泄、清泄、降泄，如大黄苦寒，通便泄热；杏仁苦温，降气平喘，栀子苦寒，清热泻火。燥即燥湿，可用于湿证。但湿证又有寒湿、湿热的不同，如苍术、厚朴之苦温以祛寒湿，黄连、黄芩之苦寒，以清热燥湿。此外，苦味还有坚阴的作用，

即泻火存阴之义，如黄柏、知母泻相火而存阴液，以治肾阴虚亏的相火亢盛之证。

甘味有补益、和中、缓急的作用。多用于虚证或拘急疼痛等病证。如味甘的人参补气，熟地补血，甘草、蜂蜜和中、缓急止痛等。

辛味有发散、行气、行血的作用。多用于外感表证和气血阻滞的病证。如味辛的紫苏、薄荷可发散表邪，橘皮、木香能行气，川芎能活血等。此外，辛味还有润养的作用，如菟丝子通阳气，辛润养阴。

咸味有泻下、软坚散结的作用。多用于瘰癧、痰核及热结便秘等证，如味咸的海藻、昆布能软坚散结，芒硝泻下通便等。

除上述五味外，还有淡和涩味。淡味有渗湿利尿的作用，如茯苓、泽泻既能渗湿又能利尿，多用于水肿、小便不利等病证。涩味与酸味作用相似。一般将淡附于甘，涩归于酸，故习惯只称五味。

五味中又有阴有阳，《素问·至真要大论》曰：辛甘发散为阳，酸苦涌泄为阴，咸味涌泄为阴，淡味渗泄为阳。可见五味之中，辛、甘、淡属阳，酸、苦、咸属阴。

气与味是药物性能的主要两个方面。它们之间有着不可分割的密切关系，每一种药物都具有性和味，因而两者必须综合起来看，才能比较全面地掌握药性。一般说，气味相同的药物，其主要作用大致相同，如辛温药大都具有发表散寒的作用，苦寒药大都具有清热泻火的作用，而气味不同的药物，作用也就不同。同一种药性各有五味的差别，而同一种药味，又有四性的不同，同是温性药，若味不同，作用大有差异，如麻黄辛温，发汗散风寒；黄芪甘温，补中益气。又同是辛味药，若气不同，作用也不一样，有薄荷辛凉发散风热，附子辛热以祛阴寒等。还有一些药物，一性而兼有二种以上的味，而其作用范围相应的扩大，如当归味辛甘，性温。甘能补、辛能行，既能补血又能活血，常用于血虚、血寒瘀滞之证。因此，在辨认药性时，不能把性和味孤立起来看。掌握四气五味，是研究和运用药物的重要关键，指导用药的基础。药物之所以治病，就因为药物有各自的偏性，唐容川说：设人身之气，偏胜偏衰则生疾病，又借药物一气之偏，以调吾身

之盛衰而使归于和平则无病矣。又如《内经》云：风淫于内，治以辛凉，佐以苦甘，以甘缓之，以辛散之。正是针对人体的病变，利用药物不同的性能，以调整人体内部机能的偏胜偏衰，使达到生理的平衡为目的。

（三）升降浮沉：各种疾病，在病机和证候方面，表现出有向上（如呕吐、气喘）、向下（如渴利、脱肛）、向外（如发热、自汗）、向内（表证不解、疹毒内陷）等病势趋向，在治疗时须针对病情选用相应的能改善或消除这些病证的药物。所以中药的作用同疾病表现的趋向相对来说，也有升、降、浮、沉的性质；升是上升，降是下降，浮是发散，沉是泻利。凡升浮的药，都属阳，主上行向外，有升阳、发表、散寒、开窍等作用；沉降的药，都属阴，主下行向内，有降逆、清热、利水、收敛等作用。升和降，浮和沉都是相对的。

药物作用的升降浮沉与药物的性味有不可分割的关系。李东垣说：药有升降浮沉化生长收藏成，以配四时，春升夏浮，秋收冬藏，土居中化。是以味薄者升而生，气薄者降而收，气厚者浮而长，味厚者沉而藏，气味平者化而成。就气味来看，凡是味属辛甘，性属温热的一类阳性药物，大多能升浮；味属苦咸，性属寒凉的一类阴性药物，大多是沉降的。故李时珍概括地说，酸咸无升，辛甘无降。寒无浮，热无沉。

药物的质地轻重，也是归纳升降浮沉的另一依据。如花叶或质地轻虚的辛夷、桔梗等大多能升能浮；反之，子实及质重的枳实、磁石之类，大多能沉能降。然而，有些药物例外，如“诸花皆升，旋复独降”，川芎既可“上行头目”，又可“下达血海”。这说明在药物升、降、浮、沉与质地关系的一般共性中，又有其特殊性。

此外，药物升降浮沉的性能，还受配伍或炮制的影响。如酒炒则升，姜汁炒则散，醋炒则收敛，盐水炒则下行。另外，升浮药在配伍大队沉降药中，升浮之性会受到制约；沉降药在配伍大队升浮药中，沉降之性也会受到制约。这都说明药性的升降浮沉，在一定条件下，可以互相转化，而不是一成不变的。正如李时珍所言：升者引之以咸寒，则沉而直达下焦，沉者引之以酒，则浮而上至巅顶。此非窥天地之奥而

达造化之权者，不能至此。一物之中有根升稍降，生升熟降，是升降在物，亦在人也。

升降浮沉，是临床用药原则之一。因为人体发生病变的部位有上下，表里的不同，病势也有逆上和下陷的差异。掌握药物作用趋向，可以纠正人体功能的失调，使之恢复正常，病势上逆者，宜降不宜升，如肝阳上亢的头痛，用石决明、牡蛎等潜降；病势陷下者，宜升不宜降，如久泻脱肛，用人参、黄芪、升麻、柴胡等益气升阳。或因势利导，有助于驱邪外出。如表证初起，用麻黄、桂枝等发表祛邪；疹出不透，用薄荷、升麻透毒外出等。

（四）归经：药物在人体所起的作用有它一定的范围，如寒性药物，虽都具有清热作用，但有的偏清肺热，有的偏清心热，各有所长。再如同一补药，也有补肺、补脾、补肾之不同。因此，根据中药对机体各部分的治疗作用，进行归纳，使之系统化，就形成了归经理论。所谓归经，就是指药物对人体某部分的选择性作用。也可以说，药物对某经（某脏腑及经络）或某几经发生明显的作用，而对其他经则作用较小，或没作用。

归经是以脏腑经络理论为基础，以所治具体病证为依据的。经络能沟通人体内外表里。在病变时，体表的疾病可以影响到脏腑，脏腑的疾病也可以反映到体表。因此，人体各部分发生病变时所出现的证候，可以通过经络而获得系统的认识。如肺经病变，每见咳嗽气喘等证，用杏仁、桔梗可治这些病，故其归肺经，肝经病变，证见胁痛、抽搐等证，用柴胡、青皮、全蝎等治这些病，故其归为肝经。由此可见，药物的归经，是具体指出药效的所在，是从临床疗效观察中总结出来的。

掌握药物的归经，有利于临床用药的选择，但并不是说某经疾病就单纯的选用入某经药物，还应注意两点：1、归经与四气五味是从不同角度来说明药性的，是相辅相成的，不能忽略某一方面。因为某一脏腑经络的病变可有不同的性质，归入同一经的物也有其不同的特点，如黄芩、干姜、百合、葶苈子同归肺经，都治疗咳嗽，其作用有清、温、补、泻之不同，黄芩清肺热，干姜温肺寒，百合补肺虚，葶苈子

泻肺实。可见，必须把多种多样的性质结合起来分析，才能切合临床应用。2、由于脏腑经络的病变可以相互影响，故在临床用药时，并不能单纯地使用某一经药物。如肺病而见脾虚者，每用补脾的药物，可以促使肺病的痊愈，这叫培土生金；肝阳上亢由于肾阴不足者，每用滋补肾阴的药物，可以达到平肝潜阳的目的，这叫滋水涵木。总之，要掌握脏腑经络之间的相互联系，才能更好地指导临床用药。正如《备要》中所言：人之五脏应五行，金木水火土，子母相生。经曰：虚则补其母，实则泻其子。又曰：子能令母实。前边列举的例子，肺病补脾（土生金），肝病补肾（水生木）就是这个道理。所以入脾的药对肺、心两经也有一定作用，入肝的药对心、肾二经也有一定影响。入其他脏腑的药物，也可依此类推。

此外，按照五行配五色、五味、五脏的道理，古代医家对药物的色、味与五脏的关系进行了归纳（见下表），作为识别药物的一个方面。

五行	五色	五味	五臭	归经
木	青	酸	臊	足厥阴肝和足少阳胆
火	赤	苦	焦	手少阴心和手太阳小肠
土	黄	甘	香	足太阴脾和足阳明胃
金	白	辛	腥	手太阴肺和手阳明大肠
水	黑	咸	腐	足少阴肾和足太阳膀胱

此外，手厥阴心包和手少阳三焦，则与足厥阴肝，足少阳胆经相通。入足厥阴肝经的药物，亦可入手厥阴心包，入足少阳胆经的药，亦可入手少阳三焦。而且，心包和三焦，同属相火，所以入心和小肠的药物，亦能入心包和三焦。

上述归纳，对一部分药物是符合的，但仍缺乏普遍意义，如白术色白却不入肺，而是取其味甘入脾；白及味苦但不入心，而取其色白入肺

等等。由此可见，五味、五色、五脏的关系是错综复杂的，不可拘执一点，要结合具体情况来识别。

二、配伍：

用药治病，有一药单独应用，有两味以上药物配合同用。病情比较简单的，可选用单味药，有针对性强，简便易用的优点。但病情较复杂的，单方就适应不了，需同时使用两种以上的药物，这就涉及到配伍和如何配伍的问题。所谓配伍，即根据病情、治法和药性，有选择的将两种上的药物配合应用。

古代医家在长期临床实践中，将药物相互关系总结为七个方面，称为药物的“七情”。其中除单行（即单味药应用）外，其余六个方面都是配伍关系。归纳如下：（一）相须：性能功效相类似的药物配合应用，可以增强其原有疗效。如大黄与芒硝配合，能明显地增强攻下泻热的治疗效果。故《本草纲目》曰：相须者，同类而不可离也。

（二）相使：性能功效方面有某种共性的药物配合应用，而以一种药物为主，另一种药物为辅，能提高主药的疗效。如清热泻火的黄芩与攻下泻热的大黄配合时，大黄能提高黄芩清热泻火的疗效。故

《本草纲目》曰：相使者，我之佐使也。（三）相畏：一种药物的毒性反应或副作用，能被另一种药物减轻或消除。如生半夏的毒性能被生姜减轻或消除，即说生半夏畏生姜。（四）相杀：一种药物能减轻或消除另一种药物的毒性或副作用。如生姜能减轻或消除生半夏的毒性和副作用，就说生姜杀半夏的毒。由此可见，相畏、相杀是一种配伍关系的两种提法，对前者而言称“畏”，对后者而言则称“杀”。故《本草纲目》曰，相畏者，受彼之制也；相杀者，制彼之毒也。

（五）相恶：两种药物合用，一种药物与另一药物相作用，而致原有功效降低，甚至丧失药效。如人参恶莱菔子，因莱菔子能削弱人参的补气作用。《本草纲目》相恶者，夺我之能也。（六）相反：即两种药合用，能产生毒性反应或副作用。故《本草纲目》曰：相反者，两不可合也。这是属于配伍禁忌的。

综上所述，药物配伍的变化可归纳为四种情况：（1）产生协同作用而增进疗效（相须，相使）。（2）产生拮抗作用而抵消、削弱原有药效（相恶）。（3）相互作用而减轻或消除毒性和副作用（相杀，相畏）。（4）产生毒副作用（相反）。所以配伍的原则，正如《神农本

《草经·序例》中指出的：当用相须相使者良，勿用相恶相反者，若有毒宜制，可用相畏相杀者，不尔，不合用也。也就是说，要充分利用相须、相使的配伍方法，发挥药物的协同作用，提高疗效。对有毒的、药性较强烈的药，要采用相畏、相杀的配伍方法，以制其毒副作用。而对某些“相恶”、“相反”的药物，则应避使用，以免产生不良反应。

三、禁忌：

在配伍中已提到相恶、相反两种配伍是临床上应禁忌的。古人将两者范围内的主要药编成歌诀（即十八反歌、十九畏歌），以便初学者熟记。今附录如下，以供参考。十八反歌：本草明言十八反，半蒺贝莖及攻乌，藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍叛藜芦。即乌头反半夏、瓜蒌、贝母、白蒺、白及，甘草反海藻、大戟、甘遂、芫花；藜芦反人参、沙参、丹参、玄参、细辛、芍药。十九畏歌，硫黄原是火中精，朴硝一见便相争。水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧。巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情。丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱。川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂。官桂善能调冷气，若逢石脂便相欺。大凡修合看顺逆，炮熅炙煨莫相依。即硫黄畏朴硝，水银畏砒霜，狼毒畏密陀僧，巴豆畏牵牛，丁香畏郁金，牙硝畏三棱，川乌、草乌畏犀角，人参畏五灵脂；官桂畏石脂。以上内容，古今都有不同看法，其中有些问题同实际有出入，有待深入研究，然而，目前临床仍遵循以上原则。

除了配伍禁忌外，某些药物具有损害胎元以致坠胎的副作用，列为妊娠禁忌药。根据药物对于孕妇胎元损害的程度不同，一般分禁忌、慎用二类。禁用药大多毒性较强，药性猛烈，如巴豆、三棱、麝香等，慎用的包括通经去瘀，行气破滞，以及辛热、滑利等药物，如桃仁、肉桂等，但如遇到孕妇病情严重，非用上述药物不能治病时，又得酌情使用。但一般应尽量避免应用，防止发生事故。附：妊娠服药禁忌歌：芫斑水蛭及蟾虫，乌头附子配天雄。野葛水银并巴豆，牛膝薏苡与蜈蚣。三棱芫花代赭麝，大戟蝉蜕黄雌雄。牙硝芒硝牡丹桂，槐花牵牛皂角同。半夏南星与通草，瞿麦干姜桃仁通。硃砂干漆蟹爪甲，地胆茅根都失中。

用药禁忌还需注意服药时饮食的禁忌，就是通常说的忌口。古代文献上有常山忌葱，茯苓忌醋等，说明服用某药时，与某些食物不能同用。另外，服药期间，凡属生冷、粘腻、腥臭等不易消化及有特殊刺激性的食物，都应避免。

四、炮制：

炮制即中药在应用前或制成各种剂型前的加工过程，包括对药材的一般修治整理和较复杂的特殊处理。由于中药材大多是生药，经过特定的炮制处理后才能符合治疗需要，充分发挥药效。因此照不同的药性和治疗要求，而有多样的炮制方法。炮制的作用，大致可归纳以下四方面：（1）消除或降低药物的毒性或副作用。（2）改变药物性能，以适应病情需要，或增强药物疗效。（3）除去杂质和非药用部分，使药物清洁纯净。（4）便于制剂和贮藏。

炮制的方法：除一般的挑、簸、刷等纯净处理，捣、碾等粉碎处理，切、铡等切制处理外，主要是水、火、水火共制三种炮制方法。

（一）火制：主要包括煅、煨、炙、炒四种。

煅：将药物用火直接或间接煅烧，使质地松脆，易于粉碎，充分发挥疗效。如磁石、牡蛎等。

煨：将药物用湿纸或湿面包裹，置热火灰中加热至面或纸焦黑为度，以减轻药物的烈性和副作用。如煨姜、煨肉豆蔻。

炙：用液体辅料（蜜、酒、醋、姜汁、盐水等）拌炒药物，使辅料渗入药物内部，以改变药性，增强疗效或减少副作用的炮制方法。蜜炙黄芪，以甘缓补中，蜜炙百部，增强润肺止咳作用，酒制川芎，增加活血之功，醋制元胡，增强疏肝止痛之效，姜制半夏，抑其毒性，又增强降逆止呕之功效；盐炙杜仲，加强补肾之力等等。

炒：将药物置锅中加热，炒至一定程度取出。根据炒的时间和火力大小，又分炒黄、炒焦、炒炭。如白术炒黄，山楂炒焦，地榆炒炭。还有拌固体辅料（土、麸、米等）炒，可增强药物疗效，减少刺激性。如土炒白术、麸炒枳壳、米炒斑蝥等。

（二）水制：《备要》言浸、泡、洗三法。不外通过水或其他液体，使药物清洁、软化和调整药性。现介绍常用的三种：

润：水或其他液体将药物渐渐渗透，使药物柔软且不损失药效，也便于切片，如槟榔、厚朴。

漂：把药物放在宽水或长流水中浸渍一段时间，并反复换水，以漂去腥味、臭味或盐分，如昆布、海藻、紫河车等。

水飞：是将不溶于水的药物与水同研，其细粉悬浮于水中，倾于容器中，候其沉淀、干燥，收集极细粉末，如朱砂、滑石等。

（三）水火共制：常用方法即蒸煮二种。

蒸：是将药物或加其他辅料，隔水用火蒸熟的方法，如酒蒸大黄、生地蒸成熟地等。

煮：是把药物用清水或与其他液体同煮，如醋煮芫花、芒硝和萝卜汁同煮等。

以上各种炮制方法，可以根据治疗需要，选用各种相应的辅料加工炮制，如《备要》所言：酒制升提，姜制温散，入盐走肾而软坚等。这些都是经验总结，在用药时值得参照。

五. 用量:

中药的用量，大多以重量计算。过去用16进制：1斤=16两=160钱。现在全国已统一采用公制，以克为单位，即1公斤=1000克。为处方和配方简便，旧制换算成公制后的近似值1两=30克，1钱=3克。

一般中药常用内服汤剂量约为5—15克。《备要》引《千金》云，“凡药须治择熬泡毕……”是指出需称量炮制加工后的干燥药材。

除以上论述外，古人在药物性能和宜忌等方面还有很多论述。如《素问·阴阳应象大论》曰，味厚者为阴，薄为阴之阳，气厚者为阳，薄为阳之阴。味厚则泄，薄则通，气薄则发泄，厚则发热。是说味厚的属纯阴（阴中之阴），味薄的属阴中之阳，气厚的属纯阳（阳中之阳），气薄的属阳中之阴。因为味厚属纯阴，所以下泄，味薄为阴中之阳，所以能够宣通。气薄属阳中之阴，所以能够发泄，气厚属纯阳，所以发热。可见这里的气、味，与前所谈的四气五味有所不同。

又曰：阴味出下窍，阳气出上窍，清阳发腠理，浊阴走五脏，清阳实四肢，浊阴归六腑。前者是说味属阴，所以趋向下窍，气属阳，所以趋向上窍。后者是用取类比象的方法说明凡属体内轻清之质，如出于上窍的涕、唾、气、液，卫护体表的卫阳之气和充实四肢的清阳之气，皆属清阳的范围；凡属体内重浊之质，如归六腑出下窍的污秽糟粕之物，以及内藏于五脏的精微物质等，皆属浊阴范围。因为清阳与浊阴的属性不同，故其走注的方向也不同，清阳向上向外，浊阴是向内向下。

此外，药之性味多偏，五脏各有所宜和不宜，是医者用药必须知道的。如《素问·藏气法时论》曰：肝苦急，急食甘以缓之……心苦缓，急食酸以收之。是论五所苦及其治则。五脏所苦，就是五脏的功能失调所出现的主要病理特征。如肝主条达疏泄，若流泄太过，则亢急为病（如肝阳上亢，肝气横逆等），甘主和缓，故以甘味药和缓之。心藏神，焦思苦虑，耗及心神，可致心气缓（如心悸不寐、狂恶失神等），酸主收敛，故以酸味药收敛之等等。

又曰：肝欲散，急食辛以散之，用辛补之，酸泻之……………心欲软，急食咸以软之，用咸补之，甘泻之。是论五脏所欲及其反常的治则。五脏所欲，就是指五脏在生理状态下的性用偏向。如肝性喜条达舒畅，此其生理之常，故谓“肝欲散”。如果反其性而抑郁不舒，即为病理的主要特征。治疗就要顺其性给予疏散解郁之品。心为火脏，心火欲其柔软平和，这是生理之常，故谓“心欲软”。如果心火刚燥太过，烦躁狂越，即为病理表现，治疗时应用咸润之品，滋水济火，使其刚燥缓软等等。

五味入五脏，五脏之病又各有所禁，如酸走筋，筋病毋多食酸，筋得酸，则拘挛收引益甚也。苦走骨，骨病毋多食苦，骨得苦，则阴益甚重而难举也。因此不可偏食五味，多则令人病，如多食咸，则脉凝泣而变色，多食苦，则皮槁而毛拔等。即多食咸味，能使血脉流行凝涩不畅，并且血色改变，多食苦味，能使皮肤枯槁而毫毛脱落等。故五味不可过用、滥用。这些论述在临床实践中都有一定的指导意义。

关于中药的名称，有它一定的意义和来历。有因产地而命名者，如贝母，产于四川的称川贝母，产于浙江象山的称象贝母。有因功能而命名者，如防风，善疏风散邪，益母草多治妇人诸疾，决明子能明目除障等等。有因特殊气味而命名者，如香薷之香，豨莶草之恶。有以味而命名者，如甘草之甘，苦参之苦等。有因形态而命名者，如人参，其根如人形；狗脊形如狗的脊骨等。有因生长特性而命名者，如夏枯草夏至后花叶枯萎，款冬花因至冬而花也。有因颜色而命名者，如黄连其根连珠而色黄，玄参因状如参而色黑。有以药物的性质和药用部位而命名者，如石膏、石脂、当归尾、当归身等。此外，有因故事传说或以发现者的名字命名的，如何首乌、刘寄奴，使君子等等。总之，药物的命名有多种多样，且有一定涵义，这里不过举几个例子。

至《备要》所云：药之为用，或地道不真，则美恶迥别，或市肆饰伪，则气味全乖。是说明药物的品种、产地、采收、贮存、加工炮制等因素对药材质量有很大影响，临床应用时，如不究其源，不知其别，势必影响治疗效果。

如一种药物，由于产地不同，其质量就有差异，所以自古使用中药，特别强调“道地药材”，其意是某药产于某地者为正品，质量高，疗效好。象四川的黄连、贝母、附子，甘肃的当归，宁夏的枸杞子，吉林的人参，河南的山药、地黄等，一般来说，均优于他处的产品。故往往在药名上冠以地名以资区别。又如中药大部分是植物药，其根、茎、叶、花、果实、种子等各个部分，在生长发育过程中，各有不同成熟期。不同时期各部分所含的有效成分的量各不相同，药性的强弱亦有差异，因而采收季节和方法是否恰当，与治疗效果有着密切的关系。如大青叶、枇杷叶等叶类药材，通常在花蕾将放或正盛开时采收，此时正当植物生长茂盛阶段，性味完壮，药力雄厚，花类药材如金银花、槐布等，宜在含苞待放或初放时摘，以免香气走失，花瓣散落。以上仅举其一般而言，实际不可能完全如此，何况节气有迟早气候有常变，都会影响植物的生长，还须结合实际情况而定。

此外，《备要》凡药根之在土中者，半身以上则上升，半身以下则下降等，是指药用根有上中下之分。凡药为枝者，达四肢，为皮者，达皮肤……以上下内外各以其类相从也。

药之为物，各有形性气质，其入诸经……此自然之理可以意会也。

以上论述，都是采用取类比相的方法说明药物的作用部位，仅作参考。

复习思考题

1. 什么叫四气、五味，各有何作用？
2. 试述升降浮沉的含义与作用，升降沉浮的特性与药物性味的关系。
3. 什么叫归经？在临床应用中有何指导意义？
4. 何谓配伍？中药的配伍有几种？临床意义如何？
5. 用药禁忌包括哪些内容？
6. 什么叫炮制？炮制的目的如何？有哪几种常用的炮制方法？

各 论

第一章解表药

- 第一章解表药

〔自学时数〕 12学时

〔面授时数〕 2学时

〔目的要求〕

- 1、了解解表药的含义、功效、分类。
- 2、熟悉解表药主要适用的病证。
- 3、熟悉辛温解表药和辛凉解表药的主要作用。
- 4、掌握辛温解表药中常用药（麻黄 桂枝 苏叶 生姜 防风 白芷 荆芥 羌活）的功效、临证应用，并比较其异同。
- 5、掌握辛凉解表药中常用药（薄荷 蝉蜕 菊花 柴胡 葛根 升麻 桑叶 淡豆豉）的功效、临证应用，并比较其异同。
- 6、熟悉散风寒、散风热、祛风、透疹、宣肺、通阳、祛暑化湿概念。
- 7、在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡能发散表邪，解除表证的药物，称为解表药。

解表药大多属于味辛质轻之品，以入肺和膀胱二经为主。辛能发散，轻扬升浮。肺合皮毛，膀胱经主一身之表，故解表药善走肌表，而具有发汗解表作用，有使肌表之邪外散或从汗解。主要适用于以下病证：

- 1、感受外邪，具有恶寒、发热、头痛、身痛、无汗、脉浮等表证者。
- 2、部分解表药有宣肺气、止咳平喘的作用，可用于表邪犯肺、肺气不宣的喘咳。

3、部分解表药可促使疹子透发，而适用于麻疹、风疹初期、疹出不畅者。

4、某些解表药有缓和疼痛的作用，亦可用于风湿所致的肢体疼痛。

5、解表药还可以通过发汗退肿，用于水肿兼表证者。

解表药辛散发汗，尤其某些发汗力较强的药物，要注意不可过量，以免汗出过多而耗散阳气，损伤津液。同时忌用于多汗及其热病后期津液亏耗，以及久患疮疡、淋病及失血者。

解表药虽有辛散发表之共性，又因其性有温凉之别而分为辛温解表药与辛凉解表药两类。

第一节辛温解表药

辛温解表药，性味多属辛温，以发散风寒为其主要作用，适用于外感风寒所致的恶寒、发热、头痛、无汗、舌苔薄白、脉浮紧等风寒表证。对咳喘、水肿、疮疡及风湿痹痛等兼有表证者亦可应用。

麻黄

〔原文〕辛温微苦。僧继红云：中牟产麻黄地，冬不积雪，性热，故过服泄真气。入足太阳，膀胱。兼走手少阴、阳明，心、大肠。而为肺家主药。能发汗解肌⁽¹⁾，去营中寒邪，卫中风热，调血脉，通九窍，开毛孔⁽²⁾。治中风⁽³⁾伤寒⁽⁴⁾，也中犹伤。头痛温疟⁽⁵⁾，咳逆上气⁽⁶⁾，风寒郁于肺经。经曰：诸气贲郁，皆属于肺。痰哮喘⁽⁷⁾气喘，哮喘宜泻肺气，虽用麻黄而不出汗，本草未载。赤黑斑毒⁽⁸⁾，胃热一曰斑证，表虚不得再汗，非便闭亦不可下，只宜清解其热。毒风疹痹⁽⁹⁾，皮肉不仁，目赤肿痛，水肿风肿。过剂则汗多亡阳⁽¹⁰⁾，夏月禁用。汗者心之液，过汗则心血为之动摇，乃骁悍之剂。丹溪以人参、麻黄同用，亦攻补法也。东垣曰：《十剂》曰轻可去实，葛根、麻黄之属是也。邪客皮毛，腠理闭拒，营卫不行，故谓之实。二药轻清，故可去之。时珍曰：麻黄太阳经药，兼入肺经，肺主皮毛；葛根阳明经药，兼入脾经，脾主肌肉。二药兼轻扬发散，而所入不同。王好古曰：麻黄治卫实，桂枝治卫虚，虽皆太阳经药，其实营卫药也。心主营为血，肺主卫为气。故麻黄为手太阴肺之剂，桂枝为手少阴心之剂。时珍曰：仲景治伤寒无汗用麻黄，有汗用桂枝，未有究其精微者。津液为汗，汗即血也，在营则为血，在卫则为汗。寒伤营，营血内涩，不能外通于卫，卫气闭固，津液不行，故无汗发热而恶寒；风伤卫，卫气外滞，不能内护于营，营气虚弱，津液不固，故有汗发热而恶风。然风寒皆由皮毛而入，皮毛肺之合也。盖皮毛外闭，则邪热内攻，故用麻黄、甘草同桂枝，引出营分之邪，达之肌表，佐以杏仁泄肺而和氣，汗后无大热而喘者加石膏。《活人书》夏至后加石膏、知母，皆泄肺火之药，是麻黄汤虽太阳发汗重剂，实散肺经火郁之药。腠理不密，则津液外泄而肺气虚，虚则补其母，故用桂枝同甘草，外散风邪以救表，内伐肝木以防脾，佐以芍药泻木而固脾，使以姜、枣行脾之津液而和营卫。下后微喘者加厚朴、杏仁以利肺气也。汗复脉沉迟者加人参以益肺气也。《活人书》加黄芩为阳旦汤，以泻肺热也。是桂枝汤虽太阳解肌轻剂，实为理脾救肺之药也。诸家皆以麻黄、桂枝为肺经药，谓伤寒传足不传手者误也。桂能平肝。发汗用茎去节，煮十余沸，掠去浮沫，或用醋汤略泡，晒干备用，亦有用蜜炒者。庶免大发。止汗用根节，无时出汗为自汗，属阳虚；梦中出汗为盗汗，属阴虚。用麻黄根、蛤粉、粟米等分为末，袋盛扑之佳。时珍曰：麻黄发汗驶不能御，根节止汗效如影响，物理不可测如此。自汗有风湿、伤风、风温、气虚、血虚、脾虚、阴虚、胃热、痰饮、中暑、亡阳、柔痉等证，皆可加用。盖其性能周行⁽¹¹⁾身肌表，引诸药至卫分而固腠理。汗虽为心液，然五脏亦各有汗。经曰：饮食饱甚，汗出于胃；惊而夺

精，汗出于心；持重远行，汗出于肾；疾走恐懼，汗出于肝；搖体劳苦，汗出于脾。厚朴、白薇为使。恶辛夷、石膏。

【讲解】（1）解肌：即解除肌表之邪。（2）毛孔：即汗孔。也可称毛窍。（3）中风：一指病名，一指病证。这里指的是后者，即外感风邪所致的病证。症见发热汗出、恶风脉缓等。（4）伤寒：一指病名，一指病因。这里指的是病因，即伤于寒邪而病。（5）温症：病名，为疟疾之一。《素问·疟论》云：此先伤于风，而后伤于寒，故先热而后寒也，亦以时作，名曰温症。临床见证主要是先热后寒，热重寒轻，汗或多或少，口渴喜冷饮。《金匱要略》：温疫者，其脉如平，身无寒但热，骨节疼烦，时呕，白虎加桂枝汤主之。（6）咳逆上气：指咳嗽气喘的病证。上气，即肺气上逆之意。（7）痰哮：哮、病证名。痰哮，即呼吸急促而喉中有痰鸣者。（8）斑毒：斑，证名。指发于肌肤表面的片状斑块。多由外感热病，热郁阳明，迫及营血而发于肌肤，一般为红斑。若热盛毒重则斑见紫或黑色。（9）毒风疹痹：毒风，病因；疹和痹，病证名。疹，指发于皮肤表面的红色小点，形如粟米，抚之碍手者。痹，闭阻不通之意。泛指邪气闭阻肢体、经络、脏腑所引起的多种病证。通常多见风、寒、湿三种邪气，侵犯肌表经络和骨节，发生关节或肌肉疼痛，麻木，屈伸不利的风寒湿痹。亦有因风、湿、热邪引起的风湿热痹。（10）亡阳：阳气衰竭的危重证候。由于大汗不止，或吐泻过剧，或其它原因耗伤阳气，以致阳气突然衰竭，出现大汗淋漓，汗出如珠而粘，手足厥冷，面色苍白，呼吸微弱，脉微欲绝等，类于现代医学之休克现象。（11）周行：原作“行周”，据文义改。

麻黄善能发汗、平喘，兼能利水，为肺经专药。为麻黄科多年生草本状小灌木草麻黄或木贼麻黄和中麻黄的草质茎。去节，名净麻黄；捣绒，名麻黄绒。生用或蜜炙用。

本品味辛性温而质轻，辛能发散，温可祛寒，体轻升浮。入肺与膀胱经。肺主气，司呼吸，外合皮毛；太阳膀胱经主一身之表。故有开毛孔而发汗解表，宣肺平喘之功。治外感风寒，表实无汗之证，及外邪犯肺、肺气壅遏的喘咳，均有较好疗效，所以称之为辛温发汗之主药，平喘止咳的要药。

此外，麻黄既能上开肺气而发汗，又可通调水道下输膀胱而利水，治水肿而兼有表证者甚为适合。

至《备要》言能治“赤黑斑毒，毒风疹痹，皮肉不仁，目赤肿痛”等证。按《本草求真》所谓“审其腠理坚闭，病虚用散，亦当审实以投”。而以麻黄的温散风寒作用，配合相应的药物，也可用治风湿痹痛，风疹瘙痒，以及阴疽、痰核等证。

本品发汗之力较强，表虚自汗及肺虚喘咳者忌用。

《备要》言“夏月禁用”。而《本草正》言“有谓夏月不宜用麻黄者，皆不达。虽在李氏有云，若过发汗则汗多亡阳，若自汗表虚之人，用之则脱人元气，是皆过用、误用而然。若阴邪深入，则无论冬夏，皆所最宜，又何过之有”。

【临证应用】麻黄善于宣肺气，开腠理，透毛窍，散风寒。治外感风寒、恶寒发热、头痛身疼、鼻塞无汗者，常与桂枝相须为用，以增强发汗力量，如麻黄汤；治风寒外束，肺气不宣的咳嗽气喘，多与杏仁相配，可增强平喘功效，如三拗汤。若内兼寒饮，则配桂枝、干姜、细辛、半夏等药，以增温肺化饮之功，如小青龙汤；若热邪壅肺的喘咳，又可与石膏、杏仁等配伍，以清肺平喘，如麻杏石甘汤。用于水肿而兼有表证者，本品发汗利水，有助于水肿消退，与白术、生姜等配伍，如越婢加术汤。

此外，与苡仁等药配伍，治风湿痹痛；与生地、生首乌、丹皮、荆芥、防风、蝉蜕等同用，治风疹瘙痒有效。若用于阴疽痰核，则与白芥子、鹿角胶、肉桂等药相配，以治一切阴疽之证，如阳和汤。

【用量用法】2—10克，煎服。生用发汗力较强，蜜炙用发汗力弱，且有润肺之功。故发汗解表大多生用，平喘止咳一般炙用。至于麻黄捣绒用者，药力尤较和缓。

《备要》言“发汗用茎去节，煮十余沸，掠去浮沫。”前人认为麻黄发汗应去根节，单用节间茎质部分。若茎节同用，则发汗力减弱。现代研究，麻黄去节的茎主含麻黄碱，能松弛支气管平滑肌，而有宣肺平喘作用。其节所含麻黄碱仅为节间茎的三分之一，而主要是伪麻黄

碱，以利水为主。故宣肺平喘主张去节，使药力加强，但节仅占茎的3%，对疗效影响不大，故现用麻黄均不去节。

掠去浮沫一说，前人用麻黄皆先煎，除去水面浮沫，再入他药同煎，认为其浮沫性烈，不除去会使人产生烦闷不适感觉。现一般不去浮沫，与他药同煎，未见明显烦闷症状。

附：麻黄根 即上述植物麻黄的根。味甘性平。入肺经。功专收敛止汗，随证配伍，可治一切虚汗之证。如表虚自汗，则与黄芪、白术等补气固表药同用；阳虚自汗，可与附子、人参等补阳益气药同用；阴虚盗汗，可配地黄、山萸肉、五味子、煅龙骨、煅牡蛎等滋阴收敛药同用，若产后虚汗，则与当归、白芍、黄芪等益气养血、固表止汗药同用。此外，亦可与龙骨、牡蛎等药，研成细末，外扑身上，以治虚汗不止。但有表邪者忌用。

桂枝

〔原文〕辛甘而温，气薄升浮。入太阴肺、太阳膀胱经。温经通脉，发汗解肌。能利肺气。经曰：辛甘发散为阳。治伤风头痛，无汗能发，中风自汗。有汗能止。中，犹伤也，古文通用。自汗属阳虚，桂枝为君，芍药、甘草为佐，加姜、枣名桂枝汤，能和营实表。调和营卫^{（1）}，使邪从汗出，而汗自止。亦治手足痛风^{（2）}、胁风。痛风有风痰、风湿、湿痰、瘀血、气虚、血虚之异，桂枝用作引经。胁风属肝，桂能平肝，东垣曰，桂枝横行手臂，以其为枝也。又曰：气薄则发泄，桂枝上行而解表；气厚则发热，肉桂下行而补肾。王好古曰：或问桂枝止烦出汗，仲景治伤寒发汗数处，皆用桂枝汤。又曰：无汗不得用桂枝，汗多者桂枝甘草汤，此又能闭汗也。二义相通否乎？曰：仲景云太阳病发热汗出者，此为营弱卫强，阴虚阳必凑之，故以桂枝发其汗。此乃调其营气则卫气自和，风邪无所容，遂自汗而解，非若麻黄能开腠理发出其汗也。汗多用桂枝者，以之调和营卫，则邪从汗出而汗自止，非桂枝能闭汗孔也。亦惟有汗者宜之，若伤寒无汗，则当发汗为主，而不独调其营卫矣。故曰：无汗不得服桂枝，有汗不得服麻黄也，《伤寒例》曰：桂枝下咽，阳盛则毙；承气入胃^{（3）}，阴盛则亡。

【讲解】（1）调和营卫：营卫，营气，卫气合称。两气皆水谷所生，营行脉中，有营养周身作用；卫行脉外，有捍卫躯体功能。调和营卫，是解除风邪，调整营卫不和的治法。风邪自表而入，可引致营卫失调，表现为头痛发热，汗出恶风，鼻鸣干呕，脉浮弱等中风表虚之证。主用桂枝汤，以桂枝解肌祛风以通卫，芍药敛阴而和营，使营卫失和的状态得到纠正。（2）痛风：痹证的一种。又称白虎历节。因疼痛较剧，故有人认为即为痛痹。（3）胃：原作“卫”，据文义改。

桂枝长于发汗解肌，又善温通经脉，通阳化气。为樟科常绿乔木植物肉桂的嫩枝，切薄片或小段入药。生用。

本品味辛甘，性温。入肺、心、膀胱经。肺主皮毛属卫，心主血脉属营，膀胱经外主肌表，膀胱府内司小便。辛散温通，能振奋气血，透达营卫，可外行于表，以发汗解肌；横走四肢，通经脉而利关节，借其温通之性，以达活血通经，散寒止痛之效。为外感风寒，风寒湿痹，以及痛经、经闭等证常用要药。因其发汗作用较为和缓，故凡风寒表证，不论无汗或有汗皆可用之，尤对体虚感冒，上肢肩臂疼痛等

更为适宜。桂枝之所以能用之于汗出、恶风的表虚证，主要是配伍酸敛之芍药，取其一散一收，以达调和营卫，散风敛营之功，既使表邪外解，又无大汗之弊。所谓桂枝“无汗能发，有汗能止”之说，就是通过不同配伍所产生的效果。正如《本草求真》所说：“其汗之能发，只是因其卫实营虚，阴被阳凑，故用桂枝以调其营，营调则卫气自和，而风邪莫容，遂自汗而解，非若麻黄能开腠理以发其汗也。其汗之能收，只因卫受风伤，不能内护于营，营气虚弱，津液不固，故有汗发热而恶风，其用桂枝汤为治，取其内有芍药入营以收阴，外有桂枝入卫以除邪，则汗自克见止，非云桂枝能闭其汗孔也。”

桂枝之用于痰饮、水肿者，是取其温通作用，因为水湿阴邪，得阳则化，用本品通阳化气之功，以增化湿利水之效。用于阳气不行，水湿内停而致的痰饮、水肿之证，颇为有效。桂枝之通心阳，散胸中寒邪之功亦较为突出，故又常用于胸痹、胸闷、胸痛及心悸、脉结代之证。由上所见，桂枝的效用极为广泛，正如《本经疏证》所归纳的其用之道有六：曰和营，曰通阳，曰利水，曰下气，曰行瘀，曰补中。

【临证应用】桂枝功能发汗解肌，常用于外感风寒表证。治发热、恶风、汗出而表证仍不解的表虚证，主与白芍配伍，以调和营卫，如桂枝汤；若发热、恶寒、头痛、无汗表实证，则与麻黄相配，以其和营通阳之功，益增麻黄发汗解表之能，如麻黄汤。

桂枝善能温经通脉、散寒止痛，用于风寒湿痹，肩臂肢节酸痛，常与附子同用，以温经散寒，通痹止痛，如桂枝附子汤；若营卫虚弱，血痹麻木者，可与黄芪、芍药等药配伍，以养营固卫，温经通络而止痛，如黄芪桂枝五物汤。治妇女经寒瘀滞，经闭、痛经，以及癥瘕等症，前者常与当归、川芎、吴茱萸等药同用，以温经活血，如温经汤；后者可与桃仁、丹皮等药配伍，以逐瘀消癥，如桂枝茯苓丸。

桂枝具有通阳化气之功，常用于脾阳不运、水湿内停的痰饮，每与茯苓、白术、甘草配伍，以健脾利湿、温化痰饮，如苓桂术甘汤；若脾阳不运，气化失司，膀胱蓄水，小便不利，水肿等证，常与茯苓、泽泻等药同用，以通阳化气，利水渗湿，如五苓散。

此外，桂枝还常用于胸痹、胸闷、气短、胸背痛，以及心悸、脉结代等心阳不振之证，前者常与枳实、薤白等配伍，如枳实薤白桂枝汤；后者主与炙甘草、人参、阿胶等相配，如炙甘草汤，取其助心阳，散阴寒，以起复脉止痛之功。

【用量用法】3—10克，煎服。本品辛温助热，易伤阴动血，凡温热病，阴虚阳盛等证忌用，所谓“桂枝下咽，阳盛则毙”。若阴虚盗汗误用桂枝，势必火邪愈炽，盗汗更甚，造成“亡阴”，以致“动风”或“动血”。孕妇及月经过多者慎用。

紫苏

〔原文〕味辛入气分，色紫入血分，香温散寒，通心理肺，开胃益脾，气香入胃。发汗解肌，和血下气^{（1）}，宽中消痰，祛风定喘，止痛安胎，利大小肠，解鱼蟹毒。多服泄人真气。时珍曰，同陈皮、砂仁，行气安胎；同藿香、乌药，温中止痛；同香附、麻黄，发汗解肌；同川芎、当归，和血散血；同桔梗、枳壳，利膈宽肠；同卜子、杏仁，消痰定喘；同木瓜、厚朴，散温解暑，治霍乱、脚气。气香者良。宜橘皮。忌鲤鱼。苏子与叶同功，润心肺，尤能下气定喘，止嗽消痰，利膈宽肠，温中开郁^{（2）}。有苏子降气汤。梗下气稍缓，虚者宜之。叶发汗散寒，梗顺气安胎，子降气开郁，消痰定喘。表弱气虚者忌用叶，肠滑气虚者忌用子。炒研用。苏叶温散。

【讲解】（1）下气：与降气义同，是治疗气上逆的方法。适用于咳嗽、呕逆等证。（2）开郁：即理气，是疏散肝气郁结的方法，治疗因情志抑郁而引起的气滞证。

紫苏有叶、茎、果实之分。苏叶长于发表散寒，行气宽中；苏梗善能理气安胎；苏子主以降气消痰。为唇形科植物紫苏的叶和茎，其色紫，气芳香。若单用其叶，名紫苏叶；单用其茎，名苏梗；单用其果实，名苏子。

本品辛温芳香。归脾、肺经，主入气分。不但能发散风寒，且可行气宽中，是治外感风寒，发热恶寒，头痛鼻塞，无汗表实证的常用药，又能用于脾肺气滞的咳嗽痰多，胸闷呕恶。然辛散之品，气虚或表虚者忌用。苏梗善理气安胎，气滞胸膈痞闷及胎动不安者常用。气机通畅，则胸闷自除，胎得安和。因其理气宽中之性缓和，体虚者更为适宜。苏子专入肺经，以降气消痰为主要功效，常用于痰饮气逆，咳嗽气喘之证。

【临证应用】紫苏发汗作用不及麻黄、桂枝，多用于外感风寒的轻证，常与荆芥、防风、生姜等同用；兼有咳嗽者，可配杏仁、前胡、桔梗等用，如杏苏散；若兼见气滞胸闷呕恶者，用之更为适宜，可与香附、陈皮等配伍，如香苏散。由于脾胃气滞，消化不良，食少，胸闷呕恶或胎动不安，腹胀呕恶，可与藿香、陈皮、木香、砂仁等同

用；若与半夏、厚朴、茯苓等配伍，如半夏厚朴汤，可治气滞痰结之梅核气，咽中似有物阻，吞之不下，吐之不出之证。

此外，本品煎服或配生姜同煎，还可解鱼蟹毒，治进食鱼蟹引起的腹痛吐泻。

【用量用法】 5—15克。均生用，不宜久煎。

附：苏子 苏子主治喘咳，常与莱菔子、白芥子配伍，如三子养亲汤，以治痰壅气逆，咳嗽气喘。与厚朴、肉桂等配伍，治上实下虚之咳喘，如苏子降气汤。本品系果实，富含油脂，故又兼有润肠通便之功，可配火麻仁、瓜蒌仁、杏仁等，用于肠燥便秘。常用量5—15克。生用或微炒用，炒后润下之性减，力专下气定喘，祛痰止咳。故临床除润肠通便须生用外，一般多炒用，以增强疗效。

荆芥

〔原文〕辛苦而温，芳香而散。入肝经气分，兼行血分。其性升浮，能发汗，又云，止冷汗虚汗。散风湿、清头目，利咽喉。治伤寒头痛。中风口噤，身强项直，口面喎斜，目中黑花。其气温散，能助脾消食，气香入脾，通利血脉。治吐衄肠风^{（1）}，崩中^{（2）}，血痢，产风血运。产后去血过多，腹内空虚，则自生风。故常有崩运之患，不待外风袭之也。荆芥最能散血中之风。华佗愈风散，荆芥三钱，微焙为末，豆淋酒调服，或童便服。诸家云甚效。瘰癧疮肿，清热散瘀，破结解毒，结散热清，则血凉而毒解。为风病、血病、疮家圣药。荆芥功本治风，又兼治血者，以其入风木之脏，即藏血之地也。李士材曰：风在皮里膜外，荆芥主之。非若防风能入骨肉也。连穗用。穗在于巅，故善升发。治血炒黑用。凡血药用山梔、干姜、地榆、棕榈，五灵脂等，皆应炒黑者，以黑胜红也。反鱼蟹、河豚、驴肉。

〔讲解〕（1）肠风：病名。指大便下血，血在粪前，色多鲜红。多因风热客于大肠所致，故名。（2）崩中：指不在行经期间，阴道大量出血或持续出血，淋漓不断的病证。又出血量多而来势急剧的叫血崩，或叫崩中。出血量较少，但淋漓不断的，称为漏下。

荆芥生用，辛散疏风透表，炒用止血。为唇形科一年生草本植物荆芥带花序的全草或花穗。生用、炒用或炒炭用。

本品辛而微温，芳香轻扬。入肺、肝二经。具有祛风解表、止血之功。是一味辛而不烈，温而不燥，性较平和，以辛散疏风为特点的解表药。既散风寒，又散风热。故外感表证，不论风寒、风热，皆可配用。以其轻扬疏散之性，而有散风湿，清头目，利咽喉之功，用治头痛目赤，咽喉肿痛尤为适宜。对麻疹透发不畅，风疹瘙痒以及疮疡肿毒等有效。荆芥入血分，又可起到疏散血中风热，透邪外出作用；对产后冒风、口噤、发痉，也可起到祛风解痉功效。

荆芥炒炭，其性变为苦涩，主入血分而有止血作用，可用于各种出血证。如吐血、衄血、便血、尿血以及妇女崩漏。

【临证应用】荆芥对风寒、风热表证均可使用。治风寒表证，常与羌活、防风、白芷等配伍，如荆防汤；治风热表证，常与薄荷、金银花、连翘等同用，如银翘散。若咽喉肿痛，用之可以利咽喉。古人有“咽痛必用荆芥之论”。配桔梗、生甘草等治现代医学之咽炎、扁桃体炎疗效显著。治疮疡初起兼有表证，恶寒发热，局部红肿疼痛者，多配防风、金银花、连翘等以消肿解毒。

对于小儿麻疹透发不畅，或风疹瘙痒等证，配薄荷、牛蒡子、蝉衣等，可祛风透疹止痒。

各种出血证，如衄血、便血、崩漏等，以荆芥炭配其他止血药使用，疗效更好。

此外本品还可用于产后为风邪所中，项背强直，口噤痉挛之证，有祛风止痉作用。

综上所述，荆芥为轻扬之品，散风清血之药，其功用正如《本草纲目》所概括的：荆芥入足厥阴经气分，其功长于祛风邪，散瘀血，破结气，消疮毒……故风病、血病、疮病为要药。

【用量用法】3-10克。祛风解表透疹生用，若体虚表证而有汗者，用炒荆芥，可缓和其辛散之性。炒炭用于止血。

另外，习惯上茎叶穗同用者称荆芥，单用花穗者称荆芥穗。荆芥穗芳香气烈，效用较荆芥为强。

防风

〔原文〕辛甘微温，升浮为阳。搜肝泻肺，散头目滞气、经络留湿，主上部见血。用之为使，亦能治崩，上焦风邪，头痛目眩，脊痛项强⁽¹⁾，周身尽痛。太阳膀胱经证。徐之才曰：得葱白能行周身。又行脾胃二经，为祛风胜湿⁽²⁾要药。凡风药皆能胜湿。东垣曰：卒伍卑贱之职，随所引而止，乃风药中润剂。若补脾胃，非此引用不能行。散目赤疮疡。若血虚痉急，头痛不因风寒；内伤头痛。泄泻不因寒湿，火升发嗽，阴虚盗汗⁽³⁾，阳虚自汗者并禁用。同黄芪、芍药，又能实表止汗；合黄芪、白术，名玉屏风散。固表圣药黄芪，得防风而功益大。取其相畏而相使也。黄润者良。上部用身，下部用梢。畏草薢，恶干姜、白芷、羌活，杀附子毒。

【讲解】（1）脊痛项强：指脊椎颈项肌肉筋脉牵强引痛。（2）祛风胜湿：即祛风除湿，是治疗风湿之邪留滞于经络、肌肉、关节等的治疗法则。（3）盗汗：指入睡时汗出，醒来即止的一种证状。

防风散邪发表，祛风胜湿止痛，善行周身，为治风通用之品。为伞形科多年生草本植物防风的根。除去芦头上棕毛，晒干，润透切片用。以善祛风邪而得名。

本品辛甘微温，质较柔润。入膀胱、肝、脾三经。具有祛风、解表、胜湿、止痛之功，为治风通用之药。故常用治风寒表证、风湿痹证。防风药性缓和，微温而不燥，甘缓而不峻，有“风药中之润剂”之称，故又可用于风热所致的目赤、咽痛等证。此外，对风疹瘙痒及破伤风等证，亦常配用。前者是祛风止痒之功，后者是祛风止痉之效。

【临证应用】 防风多用于外感表证，头痛、身痛等证。如属外感风寒，常与荆芥、白芷等同用；属外感风湿，可与羌活、藁本配伍；若外感风热，发热头痛、目赤，则与荆芥、黄芩、薄荷等同用。风热发疹或皮肤瘙痒，与荆芥、白蒺藜等同用，可祛风止痒。防风亦为治疗风寒湿痹、关节疼痛常用之品，多与羌活、桂枝、秦艽等配伍。

至于防风治破伤风，角弓反张，配天南星、白附子、天麻等，如玉真散，可以止痉，但效力较弱，只能作为辅助药，难以独胜其功。

此外，防风亦可用于肝脾不和的腹痛、泄泻，《丹溪心法》痛泻要方，即以此配白芍、白术、陈皮等，止痛止泻。

【用量用法】3—10克。入煎剂、酒剂或丸散。主要用于外感风邪。若其他原因所致的泄泻、血虚发痉，及阴虚火旺者均应慎用。

羌活

〔原文〕辛苦性温，气雄而散，味薄上升。入足太阳膀胱。以理游风，兼入足少阴、厥阴 肾、肝。气分。泻肝气，搜肝风，小无不入，大无不通。治风湿相搏，本经头痛。同川芎，治太阳、少阴头痛。凡头痛多用风药者，以巅顶之上，唯风药可到也。督脉为病，脊强⁽¹⁾而厥⁽²⁾，督脉并太阳经。刚痉柔痉，脊强而厥，即痉证也。伤寒无汗为刚痉；伤风有汗为柔痉。亦有血虚发痉者。大约风证宜二活，血虚忌用。中风不语，按古人治中风，多主外感，率用续命、愈风等汤以发表，用三化汤、麻仁丸以攻里。至河间出，始云中风非外来之风，良由心火暴甚，肾水虚衰。东垣则以为本气自病。丹溪以为湿生痰，痰生热，热生风。世人复分北方风劲质厚为真中，南方地卑质弱为类中。不思岐伯云：中风大法有四：一偏枯，半身不遂也；二风痺，四肢不收也；三风癰，奄忽不知人也；四风痺，诸风类痺状也，风证尽矣。何尝有真中、类中之说乎？此证皆由气血亏虚，医者不知养血益气以固本，徒用乌、附、羌、独以驱风。命曰虚虚，误人多矣。真中定重于类中，焉有类中即属内伤，真中单属外感乎？河间、东垣皆北人，安能尽舍北人而专治南病乎？头旋目赤。目赤要药。散肌表八风之邪，利周身百节之痛，为却乱反正之主药。若血虚头痛偏身痛者，此属内证。二活并禁用。

【讲解】（1）脊强：脊部经脉、肌肉强急，身体不能前俯的症状。

（2）厥：指四肢寒冷；或泛指突然昏倒，不省人事的病证。此处指前者。

羌活解表散寒，祛风胜湿，以治上半身痹痛尤效。为伞形科多年生草本植物羌活及同属植物宽叶羌活或川羌活的根茎及根。采挖出晒干，切片生用。

本品辛苦温，气雄而散，上升发表作用较强。其祛风湿之力胜于防风。归膀胱经，主散肌表风寒，治风寒表证，或挟湿邪的头痛，身痛效佳；又入肝、肾经，善祛筋骨间风湿而止痛。故亦为蠲痹止痛常用之品，对上半身肌肉风湿痛尤为适宜。

羌活发散风寒、止痛之效均较强，故曰：小无不入，大无不通。《汤液本草》曰：治足太阳风湿相搏，头痛肢节痛，一身尽痛者，非此不能除。《珍珠囊》谓：去诸骨节痛。《备要》曰：督脉为病，脊强而

厥。因足太阳之脉行于身背，与督脉并行，风寒湿邪干于太阳，故见脊强而厥，发为刚痉、柔痉。上引诸家本草所述，旨在说明羌活能散肌表八风之邪，利周身百节之痛的特点。

至于《备要》所谓治中风不语，也指外感风邪所致，非突然昏仆、不省人事、半身不遂之中风。二者名同而实异，不可混淆。

【临证应用】 羌活多用于外感风寒，恶寒发热，头痛身痛等证，配防风、白芷、细辛等，如九味羌活汤。治风寒湿邪所致的风湿痹痛，肢体、肩背酸痛，尤以上半身疼痛更为适用。多配独活、防风等，如羌活胜湿汤。

【用量用法】 3—10克，煎服。根据临床实践，本品退热之功很好，可配合清热药蒲公英、板蓝根等治风热表证，且一般在热退后不再发热。但羌活升散，温燥性强，易于伤阴耗血，凡血虚痹痛、阴虚外感，表虚多汗者均需忌用。

白芷

〔原文〕辛散风，温除湿，芳香通窍而表汗。行手足阳明， 大肠、胃。入手太阴肺，色白味辛，故入肺。而为阳明主药。 阳明之脉营于面，故治头面诸疾。治阳明头目昏痛， 杨吉老方：白芷汤泡四五遍，蜜丸弹子大，名都梁丸。每服一九，荆芥点腊茶嚼下。杨吉老，名介，治王定国病时在都梁，因以名丸。眉棱骨痛， 风热与痰，同酒浸黄芩为末，茶下。牙痛 上龈属足阳明，下龈属手阳明，二经风热。鼻渊^{（1）}， 肺主鼻，风热乘肺，上烁于脑。故鼻多浊涕而渊。经曰：脑渗为涕。宜同细辛、辛夷治之。目痒泪出，面𦐇干，去声，面黑气。癰疵^{（2）}， 可作面脂。皮肤燥痒，三经风热之病；及血崩血闭，肠风痔瘻，痢疽疮疡，三经湿热之病。活血排脓， 肠有败脓血，淋露腥秽，致脐腹冷痛，须此排之。生肌止痛，解砒毒蛇伤。先以绳扎伤处，酒调下白芷末五钱，种白芷，能辟蛇。又治产后伤风，血虚头痛。 白鱼尾上攻，多在日晚，宜四物加辛、芷。如气虚头痛，多在清晨，宜芎、藁倍参、芪。保寿堂治正偏头痛，白芷、川芎各三钱，搽牛脑上，加酒顿熟，热食尽醉，其病如失。鱼尾，目之上角。 然其性升散，血热有虚火者禁用。色白气香者佳，或微炒用。当归为使，恶旋覆花。

【讲解】（1）鼻渊：又称脑漏，以一侧或双侧鼻窍时流浊涕、鼻塞、甚则头昏脑胀、嗅觉不灵为主证。（2）癰疵：疵，同病。癰疵，癰痕或皮肤黑斑病。

白芷祛风燥湿，通窍止痛，为治头痛要药。为伞形科多年生草本植物兴安白芷或白芷或杭白芷的根。夏秋间叶黄时采挖，除去须根，晒干，切片入药。

本品辛温芳香。入肺、胃、大肠三经。辛散祛风，温燥除湿，芳香通窍，止痛。虽入肺胃大肠三经，能散三经风湿之邪，但以足阳明胃经为主，故为阳明主药。足阳明胃经之脉循行头面，故主治风邪引起的头前额痛、眉棱骨痛、齿龈肿痛、鼻渊等头面诸疾。不论风寒、风热，或血虚，皆可用白芷与相应药配伍，均获良效。此外，借其辛散香燥之性，可收消肿排脓、燥湿止痒之功。所以疮痒痈肿、妇人寒湿带下，及皮肤风湿瘙痒等证亦为常用之品。对血崩血闭、肠风痔瘻等

证，现临床较少应用，然其性升散温燥，能耗血伤气，故不当用于阴虚火旺、血虚有热之证。

【临证应用】 白芷能散风寒、止头痛，治外感风寒引起的头痛鼻塞，常配防风、羌活等同用，如九味羌活汤；风热者，可配葛根、薄荷。用于阳明头痛、眉棱骨痛、头风痛以及鼻渊头痛等。本品芳香上达，祛风止痛，可单用，如都梁丸。或与川芎、羌活、防风等同用，如川芎茶调散。治鼻渊头痛常配辛夷、薄荷、苍耳子等药用，如苍耳散。其他头痛，如血虚及现代医学之神经性或血管痉挛性头痛，用白芷配伍他药，均有一定疗效。治风冷牙痛，可与细辛同用；风热牙痛，多配黄芩、石膏等清热药。

白芷用于疮疡肿痛，未溃者能消散，已溃者能排脓，为外科常用之品，多与银花、连翘、蒲公英等配伍。

用于妇人带下，属寒湿者，配白术、茯苓；属湿热者，配黄柏、车前子。

此外，亦可用于毒蛇咬伤，及皮肤风湿瘙痒证。

【用量用法】 3—10克，煎汤或入丸散服。亦可适量研末搐鼻治头痛、鼻渊。

藁本

〔原文〕辛温雄壮，为太阳经膀胱。风药。寒郁本经，头痛连脑者必用之。凡巅顶痛，宜藁本、防风，酒炒升、柴。治督脉为病，脊强而厥；又能下行去湿，治妇人疝瘕⁽¹⁾，阴寒肿痛，腹中急痛，皆太阳寒湿。胃风⁽²⁾泄泻，夏英公病泄，医以虚治不效。霍翁曰：此风客于胃也。饮以藁本汤而愈。盖藁本能除风湿耳。粉刺⁽³⁾酒齄⁽⁴⁾。音查。和白芷作面脂良。根紫色似芎藭而轻虚，气香味麻。

【讲解】(1)疝瘕：病名。指小腹部热痛，尿道流出白色粘液的病证。(2)胃风：古病名。由风邪入侵于胃所致。常见颈部多汗，怕风，饮食不下，腹满或泄泻等证。(3)粉刺：又称痤疮。是发于颜面和胸背部的毛囊性红色丘疹。(4)酒齄：齄，音zhā，通齄。即鼻赤。多因肺胃湿热上熏所致。证见鼻子表面发红，有时鼻周围有红色丘疹或疮，甚至鼻子肥大，顶端形成结节。

藁本善祛风寒湿邪，为治巅顶头痛之主药。为伞形科多年生草本植物藁本和辽宁藁本的根茎。采挖后去须根，晒干，切片入药。

本品辛温升散，气香雄烈，入膀胱经，善达巅顶，有发表散寒，祛风胜湿、止痛之效。凡外感风寒或风湿所致的头痛、偏头痛，尤为巅顶剧痛必用之品。

《备要》云治督脉为病，脊强而厥，及治妇人疝瘕，阴寒肿痛，腹中急痛，皆指太阳膀胱经寒湿所致者。此外又治胃风泄泻，粉刺酒齄，也多与风邪客于膀胱有关，故都可用藁本治疗。但这几方面均不是主要功用。

【临证应用】藁本主要用于风寒所致的头痛、巅顶剧痛，常配白芷、川芎、防风等同用。血虚头痛及热证均忌用。

【用量用法】2-10克，煎服。

细辛

〔原文〕辛温散风邪，故诸风痹痛，咳嗽上气，头痛脊强者宜之。专治少阴头痛，独活为使。辛散浮热，故口疮喉痹少阴火。鼻渊齿齕⁽¹⁾者虫蚀脓烂。宜之。辛益肝胆，故胆虚惊痫，风眼泪下者宜之。水停心下则肾燥，细辛之辛，能行水气以润之。肾燥者，心亦燥，火屈于水故燥也。经曰：肾苦燥，急食辛以润之。虽手少阴心引经，乃足少阴肾本药，能通精气、利九窍，故耳聋鼻鼈⁽²⁾，音瓮，鼻塞不闻香臭也。风寒入脑，故气不宜通。寒宜表，热宜清；有息肉者，为末吹鼻。倒睫⁽³⁾便涩者宜之。散结温经，破痰下乳，行血发汗。能发少阴之汗。仲景治少阴证反发热，麻黄附子细辛汤，乃治邪在里之表剂。然味厚性烈，不可过用。不可过一钱，多则气不通，闷绝而死。虽死无伤可验。开平狱尝治此，不可不知。味极辛，产华阴者真。杜衡、鬼督邮、徐长卿，皆可乱之。拣去双叶者用。恶黄芪、山茱，畏硝石、滑石，反藜芦。

【讲解】(1)齿齕：即齿龋，古病名。指牙齿蛀空疼痛者。(2)鼻鼈：鼻塞不知香臭。(3)倒睫：指眼睫毛倒入，内刺睛珠，涩痛流泪。

细辛善祛风散寒止痛，温肺化饮，宣通鼻窍，具有通彻表里的特点。为马兜铃科多年生草本植物北细辛或华细辛的全草。习惯以辽宁、吉林等地所产北细辛为佳，所以处方常写北细辛或辽细辛，华细辛则主产陕西。《雷公炮炙论》曰：凡使细辛，一一拣去双叶，服之害人。现全草入药，均不去叶，也无不良反应。生用或炙用。

本品味极辛，性温，香窜而烈。入肺、肾二经。既能外散风寒，又能内化寒饮，并有开窍、止痛之功。故外感风寒之头身疼痛，肺寒停饮，所谓心下水气，痰多喘咳等证皆用。

另外，取其散性，火郁发之，以治喉痹、鼻渊、齿痛诸证。至《备要》云：能入肾润燥，《本草求真》谓：非是火盛水衰，阴被阳涸而成，实因阴盛阳衰、火屈于水而致也。遇此辛以除寒，温以燥湿，则阳得解而不凝矣。至于细辛益肝胆，治胆虚惊痫，风眼泪下者，辛温走窜之品，似不相宜。

【临证应用】细辛虽有较好的散寒作用，但发汗力量较弱，一般解表剂中不作主治药。若阳虚外感，恶寒甚，发热不高，脉反沉者，用本品多与附子、麻黄同用，如麻黄附子细辛汤，细辛外助麻黄以发汗解表，内助附子以扶阳温肾。用于肺寒咳喘，常与麻黄、干姜、五味子同用，与麻黄相配以宣畅肺气；配干姜、半夏以温肺化饮；与五味子同用，则开阖并施，散中有收，如小青龙汤。取其辛香走窜之性，与白芷、辛夷、薄荷伍用，可治鼻渊，见鼻塞流涕者。研末吹鼻，可作通窍醒神救急之用。本品还有良好的止痛作用。常配川芎、羌活治风寒之偏正头痛；单用或与白芷同用煎汤，含漱治牙痛；配羌活、秦艽、防风等又治风湿痹痛。药理研究，本品还有局部麻醉作用，对于粘膜浸润及传导麻醉均有效。

【用量用法】2 — 5克，煎服。外用适量，细辛辛散力强，用量不宜过大。《本草别论》云：若单用末，不可过一钱，多则气闷塞不通者死。故有“细辛不过钱”之说。虽非绝对，但近年有因过用而发生中毒的病例报道，故初学者应予注意。另外本品辛温走窜，易耗气伤阴，故凡气虚多汗、阴虚火旺、血虚内热，以及干咳无痰之证，均须忌用。反藜芦。蜜炙后用可减其温散之性。

辛夷

〔原文〕辛温轻浮。入肺、胃气分。能助胃中清阳上行，通于头脑。温中解肌，通九窍，利关节。主治鼻渊鼻塞肺主鼻，胆移热于脑，则鼻多浊涕而渊，风寒客于脑则鼻塞。经曰：脑渗为涕。王冰曰：胆液不澄，则为浊涕，如泉不已，故曰鼻渊。及头痛面黧，音旱，黑斑，可作面脂。目眩齿痛，九窍风热之病。然性走窜，气虚火盛者忌服。时珍曰：肺开窍于鼻，阳明胃脉环鼻上行。脑为元神之府，鼻为命门之窍。人之中气不足，清阳不升，则头为之倾，九窍为之不利。吾乡金正希先生尝语余曰：人之记性，皆在脑中。小儿善忘者，脑未满也；老人健忘者，脑渐空也。凡人外见一物，必有一形影留在脑中。昂按：今人每记忆往事，必闭目上瞪而思索之，此即凝神于脑之意也。不经先生道破，人皆习焉而不察矣。时珍曰：脑为元神之府，其于此义，殆暗符欤。去外皮毛，毛射肺，令人咳。微炒用。芎莖为使，恶石脂，畏黄芪、菖蒲、石膏。

【讲解】辛夷主散肺经风寒以通鼻窍，为治鼻渊要药。为木兰科落叶灌木植物辛夷的花蕾，或为同科植物玉兰的花蕾。别名木笔花。早春未放时采摘晒干，去枝梗用。

本品辛温气香，轻浮上升，入肺、胃二经。长于散风寒，能行头面而善通鼻窍，为治鼻渊，头痛鼻塞、不闻香臭、浊涕常流等症的常用药。虽有散风寒作用，但一般外感表证很少应用。至于《备要》所言温中解肌，利关节，亦系外散之功。

【临证应用】辛夷用于鼻渊。一般常与苍耳子、白芷、薄荷等同用，如苍耳散；如偏于寒者，多与细辛、羌活、藁本、白芷、防风等配伍，如辛夷散；若偏于热者，也可与清热之黄芩、薄荷、苍耳子等同用。还可与细辛、鹅不食草研末吹鼻，治鼻腔疾病，如急、慢性鼻炎、副鼻窦炎、过敏性鼻炎等，都有较好的疗效。

【用量用法】3—6克，煎服。本品有毛，刺激咽喉，内服时，宜用纱布包煎。外用适量。

苍耳子

〔原文〕甘苦性温。能发汗散风湿，上通脑项，下行足膝，外达皮肤。治头痛目暗，齿痛鼻渊，肢挛痹痛，瘰癧疮疖，采根叶熬，名万应膏。遍身瘙痒。做浴汤佳。去刺，酒拌蒸。忌猪肉。《圣惠方》曰：叶捣汁，治产后痢。

【讲解】苍耳子有祛风湿、通鼻窍的功用。为菊科一年生草本植物苍耳的果实。《本经》名萆耳实。采后晒干，去刺入药。

本品味苦辛，性温，有小毒。入肺经。苦可燥，辛能散，温能通，故有通鼻窍，祛风湿，止痛之功。长于疏散宣通，能上达 巅顶，下走足膝，内通筋骨，外达皮肤，可祛一切风湿之邪。凡风湿郁遏于上的头痛鼻渊，侵于筋骨的风湿痹痛，淫于皮肤的疮疹瘙痒等，均可应用。瘰癧一般不用。

【临证应用】苍耳子治鼻渊头痛，常配辛夷、白芷等，如苍耳散。治外感风寒头痛及头风痛，可配防风、白芷、藁本。头痛属于血虚者，则不宜用。治风湿痹痛，四肢拘挛等证，可配威灵仙、苍术、桂枝、川芎等祛风湿、活血药。

苍耳全草有毒，尤以果实、芽为最，且鲜者较干者毒大。如不慎中毒，可产生头晕头痛，恶心呕吐，腹痛腹泻，黄疸等证，乃至昏迷惊厥，导致死亡。故不宜过量或久服。中毒处理，现代医学用高锰酸钾洗胃，或服泻药，2%盐水灌肠。补液给维生素C、K等，并及时处理循环及肾功能衰竭。轻者可服甘草绿豆汤或板蓝根水煎液以解毒。

【用量用法】8-10克，煎服。或入丸、散。内服不宜过量，不可久服。血虚头痛不宜用。

附：苍耳草 为植物苍耳的茎叶。功效与其子相近。然祛湿止痒之力更强，还能攻毒疗疮。主要用于麻风、皮肤瘙痒，以及疗毒等症。可单用熬膏，如万应膏，内服并可外敷。或配伍大风子，内服治麻风；同野菊花同用，除煎汤内服外，还可捣敷疗毒；配伍白蒺藜、苦参、黄柏等煎汤外洗，治湿疮、疥癣及皮肤瘙痒有效。但有毒，内服不可

过量或持续服用，一般用量6-15克， 水煎或熬膏及入丸、散。外用适量。

香薷

〔原文〕辛散皮肤之蒸热，温解心腹之凝结。属金水而主肺，为清暑之主药。肺气清，则小便行而热降。暑必兼湿，治暑必兼利湿。若无湿，但为干热，非暑也。治呕逆水肿，熬膏服，小便利则消。脚气⁽¹⁾口气⁽²⁾。煎汤含敷。单服治霍乱⁽³⁾转筋⁽⁴⁾。时珍曰：暑有乘凉饮冷，致阳气为阴邪所遏，反中入内，遂病头痛，发热恶寒，烦躁口渴，吐泻霍乱，宜用之，以发越阳气，散暑和脾则愈。若饮食不节，劳役作伤之人，伤暑大热大渴，汗出如雨，烦躁喘促，或泻或吐者，乃内伤之证，宜用清暑益气汤、人参白虎汤之类，以泻火益元可也。若用香薷，是重虚其表，而济之热矣。盖香薷乃夏月解表之药，如冬月之用麻黄，气虚者尤不宜多服。今人谓能解暑，概用代茶，误矣。李士材曰：香薷为夏月发汗之药，其性温热，只宜于中暑之人。若中热者误服之，反成大害，世所未知。按洁古云：中暑为阴证、为不足，中热为阳证、为有余。经曰：气盛身寒，得之伤寒；气虚身热，得之伤暑。故中暑宜温散，中热宜清凉。身寒，寒字当热字看，伤寒必病热。陈者胜。宜冷饮，热服令人泻。

【讲解】（1）脚气：病名。又称脚弱。症见腿脚麻木，痠痛，软弱无力，或挛急，或肿胀，或枯萎等。又有干脚气，湿脚气，脚气冲心等类型。（2）口气：证名。口腔发出的臭气，为宿食或胃热所致。

（3）霍乱：病名。以起病突然，吐泻交作，烦闷不舒为特征。（4）转筋：病证名。因吐泻后津液暴失，筋脉失养而致两腿挛缩。重则腹部拘急，囊缩舌卷。

香薷发汗、利水，为祛暑解表要药。为唇形科多年生草本植物海州香薷的带花全草。生用，切段入药。

本品味辛，性微温，气芳香。入肺、胃经。具有发汗解表，祛暑化湿，利水消肿之功。既能外祛暑邪而解表，又能内化湿浊而和中。前人云：夏月之用香薷，犹冬月之用麻黄。可见发汗之力较强，故善治夏月外伤于寒，内伤于湿，阳气被阴邪所遏，症见恶寒发热，胸闷无汗及腹痛吐泻等阴暑病证。本品能发越阳气，通利水湿，故水肿、小便不利之证，用之有效。

本品主要用作夏令“阴暑”的解表药。若夏伤暑热引起的壮热、烦渴、大汗等“阳暑”病证，非其适用范围，则应忌用。因此，不能视本药为

通治一切暑证之品。正如《本草正义》所说：香薷为治暑要药者，亦指夏月受凉，外寒闭其内热，有发热、恶寒、头痛等证，则香薷通阳解表，是其专职，而又能导水利湿，更与夏日湿热郁蒸、膀胱不利者相合，非谓夏天百病，香薷一物能通治之也。

【临证应用】本品用治夏暑季节外伤于寒，内伤于湿所致的形寒身热，头重头痛，胸闷无汗，吐泻腹痛等证。常与厚朴、扁豆同用，如香薷饮，发汗化湿，以祛暑湿之邪；如暑湿兼有热象者，则加黄连使用；用于水肿，小便不利者，与白术相配，如薷术丸，以健脾利水，对脾虚水肿患者疗效尤佳。又因气味清香，水煎含漱，可治口臭。

【用量用法】 3 — 6克，煎服。利水退肿须浓煎。发汗力强，表虚有汗者忌用。

生姜

〔原文〕辛温。行阳分而祛寒发表，宣肺气而解郁调中，畅胃口而开痰下食。治伤寒头痛，伤风鼻塞，辛能入肺，通气散寒。咳逆呕哕，有声有物为呕，有声无物为哕，有物无声为吐。其证或因寒、因热、因食、因痰，气逆上冲而然。生姜能散逆气，呕家圣药。东垣曰：辛药生姜之类治呕吐，但治上焦气壅表实之病。若胃虚谷气不行，胸闭塞而呕者，惟宜益胃推扬谷气而已，勿作表实用辛药泻之。丹溪曰：阴分咳嗽者，多属阴虚，宜用贝母，勿用生姜，以其辛散也。昂按：人特知陈皮、生姜能止呕，不知亦有发呕之时，以其性上升，如胃热者非所宜也。藿香亦然。胸壅痰膈，寒痛湿泻。消水气，行血痹⁽¹⁾，产后血上冲心，及污秽不尽，煎服亦良。通神明，去秽恶，救暴卒，凡中风、中气、中暑、中恶、暴卒等证，姜汁和童便饮效。姜汁开痰，童便降火也。疗狐臭⁽²⁾，姜汁频涂。搽冻耳。熬膏涂。杀半夏、南星、菌蕈、野禽毒，野禽多食半夏，故有毒，生姜能解之。辟雾露山岚瘴气⁽³⁾。早行含之。捣汁和黄明胶熬，贴风湿痹痛。久食兼酒，则患目发痔。积热使然。疮痈人忌食。秦椒为使，恶黄连、黄芩、夜明砂。糟姜纳入蝉蜕，虽老无筋。

姜皮，辛凉。和脾行水。治浮肿胀满。以皮行皮，五皮散用之。成无己曰：“姜、枣辛甘，能行脾胃之津液而和营卫，不专于发散也。”东垣曰：夜不食姜者，夜主阖而姜主闢也。秋不食姜者，秋主收而姜主散也。妊妇多食，令儿歧指，象形也。

【讲解】（1）血痹：病名。指气血虚弱所致的痹证。主症为身体麻木不仁，肢节疼痛，脉微而涩紧。病由当风睡卧，或劳倦汗出，风邪乘虚侵入，使气血闭阻不通而致。（2）狐臭：病名。又名胡臭、体气、腋气。为湿热内郁或遗传所致。腋下汗液有特殊臭气。它处如乳晕、脐部、外阴等亦可发生。（3）山岚瘴气：又称瘴毒或瘴气。指南方山林间湿热郁蒸所产生的一种病邪。为疫病的一种，通常多指疟疾。

生姜发汗解表，温中降逆，为发表止呕要药。为姜科多年生草本植物姜的根茎。洗净、切片入药。捣汁名姜汁。单独用皮名生姜皮。

本品味辛性温，入肺经。散风寒以解表，并能祛痰止咳。常用于外感风寒表证，见恶寒发热，头痛鼻塞及痰多咳嗽等。入胃经，既能温中

化湿，又善降逆止呕，前人称“姜为呕家圣药”，所以又常用于胃寒或痰湿中阻，以致胃气上逆的恶心呕吐等证。

此外，生姜还能调味开胃，以增进食欲，并能解半夏、南星、鱼蟹之毒。疗狐臭，搽冻疮，取其辛温之性。

【临证应用】本品辛散发表，但力较弱，故多用于感冒之轻证，可煎汤加红糖热服。若外感风寒之重证，则加入辛温解表剂中，作为辅助药，以增强发汗作用，如桂枝汤。用于风寒犯肺，痰饮咳喘、胸脘痞胀，可与半夏、黄连等同用，如生姜泻心汤。生姜尤为呕吐要药，随配伍之不同，可用于胃气上逆的多种呕吐和呃逆之证，常与半夏相配治胃寒之呕吐，即小半夏汤。呕吐偏于热者，则与黄连、竹茹等同用；与丁香、柿蒂配伍，治呃逆有良效。生姜与大枣同用，为调和营卫之剂，以生姜走外，味辛而和卫，大枣入里，味甘而调营，此即古人所说“和卫者必辛，调营者必甘”之意。因进食鱼蟹引起腹痛泄泻，或误食生半夏、生南星中毒而引起的喉舌麻痹，可捣姜汁服或煎汤内服。故姜制半夏、南星可减其毒性。

【用量用法】3-10克。煎汤服，或捣汁冲服。以其性辛温，故于阴虚内热及热盛之证宜忌用。

附：生姜汁 辛散之力较强，功能祛痰止呕，多用于痰迷昏厥及呕吐不止之证。用量3-10滴，冲服。

生姜皮 鲜根茎切下之外皮。味辛性凉，功能行水。主治皮肤水肿，与茯苓皮、大腹皮、桑白皮等药同用，以利水退肿，如五皮饮。用量3-5克，煎服。

葱白

〔原文〕生辛散，熟甘温。陶弘景曰：白冷青热，伤寒汤中不得用青。外实中空，肺之菜也。肺主皮毛、其合阳明，大肠。故发汗解肌，以通上下阳气。仲景白通汤、通脉四逆汤，并加之以通脉回阳。益目睛，白睛属肺。利耳鸣，通二便。时珍曰：葱管吹盐入玉茎中，治小便不通、及转脬危急者极效。治伤寒头痛，时疾热狂，阴毒腹痛。阴证厥逆，用葱白安脐上熨之。气通则血活，气为血帅。故治吐血衄血，便血痢血。《食医心镜》：葱煮粥食，治赤白痢，薤粥亦良。折伤血出，火煨研封，止痛无瘢。乳痈风痹，通乳安胎。妇人妊娠伤寒，葱白一物汤，发汗而安胎，加生姜亦佳。《删繁方》合香豉、阿胶，治胎动。通气故能解毒，杀药毒、鱼肉毒、蚯蚓毒、獬犬毒^{（1）}，诸物皆宜，故曰菜伯，又曰和事草。取白连须用，亦有用青者。同蜜食杀人，同枣食令人病。《百一方》：患外痔者，先用木鳖煎汤熏洗，以青葱涎对蜜调敷，其凉如冰。《独行方》：水病足肿，煮汤渍之，日三五度佳。

【讲解】（1）獬犬：即疯狗。

葱白发表通阳，以祛内外阴寒之邪。为百合科多年生草本植物葱的鳞茎。鲜品生用。

本品味辛性温，辛散温通。入肺、胃经。能宣通上下、通达表里。外可散寒邪以解表，内可通阳气而止痛，故外感风寒，发热恶寒或寒邪入里之腹泻、厥冷脉微，以及寒凝气阻、腹部冷痛，或膀胱气化失司之尿闭等证，皆可应用。至于治吐血衄血，便血痢血者，《纲目》虽云本品有通气之功，通气故能解毒及理血病。气者，血之帅也，气通则血活，故本品治瘀阻血不归经之吐衄尚可，若于血热妄行之失血证，则当忌用。而在前者，亦较少应用。

【临证应用】葱白发汗解表，然力较弱，主用于感冒风寒初起的轻证，常与生姜或豆豉同用，以增强发汗解表之力。前者为葱白汤，后者即葱豉汤。用于阴寒内盛于下、阳气浮越于上的少阴下利脉微证，主要和附子、干姜配伍，如白通汤，方取姜、附散阴寒以回阳，葱白通阳气而止利。亦可炒热外熨腹部，以治寒凝气阻的腹部冷痛及小便利，此亦取其散寒通阳之能。

【用量用法】 6—10克，或3—5段，煎服。外用适量。忌与蜂蜜共服。

胡荽

〔原文〕辛温香窜。内通心脾，外达四肢，辟一切不正之气。痧疹痘疮不出，煎酒喷之。心脾之气，得芳香而运行。含喷遍身，勿喂头面。痘疹家悬挂，辟邪恶。故荽入食，令人多忘。病人不宜食胡荽、黄花菜。

【讲解】胡荽善散风寒，功专透疹。为伞形科一年生草本植物胡荽的全草，又名芫荽。晒干生用或鲜用。

本品辛温香窜，入肺、胃经。能内通心脾、外达四肢，辟除一切不正之气，而有疏散风寒，宣肺透疹的功效。能治麻疹初期透发不畅，或因疹出时复感风寒，致疹出而复隐者。芳香开胃，可作调味之品，但不宜多食。

【临证应用】本品功专发汗透疹，主用于麻疹透发不出，可单用煎汤熏洗，或先将酒水煮沸，然后入药，遂用热气熏手足，并喷其胸部，促使出汗，以利麻疹透出；也可加入其他发散透疹剂中使用。其芳香开胃作用，仅作菜肴之调味品，医用较少。

【用量用法】 3-6克，煎服。外用适量。疹透勿服。

赤柺柳

〔原文〕能使疹毒外出。末服四钱，治痧疹不出，喘嗽闷乱；沙糖调服，治疹后痢。

【讲解】 赤柺柳宣发升散，功专透疹。为柺柳科落叶灌木或小乔木柺柳的嫩枝叶，又名西河柳。晒干，切段生用。

本品味辛、性平。入肺、胃、心经。具有发汗透疹之功。借其辛散宣发之性，可促使疹子外透，用于麻疹初期透发不畅，或因风寒外束、疹毒内陷之证。

【临证应用】 赤柺柳煎汤熏洗，可发汗透疹，或配伍竹叶、牛蒡子、蝉衣等，如竹叶柳蒡汤。此外，煎汤沐浴，可治风疹瘙痒。若配合祛风湿药，可治风湿痹证。

【用量用法】 3—6克，煎服。外用适量。麻疹已透者不宜用。过量可令人心烦。

鸡苏

〔原文〕辛而微温。清肺，下气，理血，辟恶^{（1）}而消谷。治头风目眩，肺痿血痢，吐衄^{（2）}崩淋，喉腥口臭，邪热诸病。《局方》有龙脑鸡苏丸。方茎中虚，似苏叶而微长，密齿面皱，气其辛烈。

【讲解】（1）辟恶：驱除污秽邪恶之气。（2）衄：凡鼻、齿、舌、皮肤等处出血皆曰衄，分别称鼻衄、齿衄、舌衄、肌衄等。这里指鼻中出血。

鸡苏又名龙脑薄荷、水苏，功同紫苏，然偏于理血。为唇形科植物水苏的全草。茎方形，中空。叶较紫苏微长，呈长椭圆形，边缘有锯齿，叶面皱缩，脉多毛刺。

本品味辛性微温。入肺、脾经。功能疏风下气，理血辟恶。用治感冒风邪，气逆血瘀、血热而致的头风目眩，肺痿肺痛，吐血衄血崩漏，痢疾等证。以解散血中之气，气散则血散。能治喉腥口臭，是取其芳香辟浊之力。

【临证应用】鸡苏的功用，类似紫苏、薄荷。《医林纂要》曰：鸡苏功用略似紫苏，而解毒不如；亦略似薄荷，而清凉不及。《本草求真》曰：但苏、薄其性稍凉，水苏其性稍温；苏、薄其性主升，水苏其性主降；薄多于气分疏散，水苏多于血分温利。然临床不及紫苏、薄荷常用。

第二节辛凉解表药

辛凉解表药，性味多为辛凉。以宣散风热为其主要作用。适用于外感风热所致的发热，微恶风寒，口渴，无汗或有汗，舌苔薄白或薄黄，脉微数等表证。对于风热咳嗽，咽喉肿痛，疹出不透及风热性眼病，亦可应用。

薄荷

〔原文〕辛能散，凉能清，《本经》：温，盖体温而用凉也。升浮能发汗。搜肝气而抑肺盛，消散风热，清利头目。治头痛头风^{（1）}，中风失音，痰嗽口气，语涩舌胎，含漱。眼耳咽喉，口齿诸病，凡香通窍而散风热。皮肤瘾疹^{（2）}，瘰癧疮疥，惊热 凡小儿治惊药，俱宜薄荷汤调。骨蒸，破血^{（3）}止痢。能治血痢。血痢病在凝滞，辛能散，凉能清。虚人不宜多服。能发汗疏表，夏月多服，泄人元气。苏产气芳者良。薄荷，猫之酒也；犬，虎之酒也；蜈蚣，鸡之酒也；桑椹，鸠之酒也，莽草，鱼之酒也，食之皆醉。被猫伤者，薄荷汁涂之。

【讲解】（1）头风：病证名。指头痛经久不愈，时作时止，甚至一触即发的病证。（2）瘾疹：病名。即荨麻疹，为常见的皮肤过敏性疾病。皮肤见有大小不等的块状、片状的皮疹，时隐时现，剧痒。（3）破血：用活血力量较峻烈的药物祛除瘀血的治疗方法。

薄荷轻清凉散，以疏散风热，清利头目为其特点。为唇形科多年生草本植物薄荷的茎叶。南北均产，以江苏产者最佳，故有“苏薄荷”之称。

本品辛凉，清轻疏散，芬芳开郁，为手太阴、足厥阴（肺、肝）之药。善解风热之邪，透发斑疹，故常用于风热表证，麻疹初起，疹发不畅通及风疹瘙痒等证。借其轻扬升浮，清利头目的作用，对风热上攻的头痛，目赤，咽喉口齿诸疾均可应用。

此外，本品气味芳香，可疏肝解郁，以治肝郁不舒之证。

【临证应用】薄荷为疏散风热的常用药。外感风热及温病初起，头痛、发热微寒者，多配银花、连翘、荆芥等药，如银翘散。治咽喉肿痛者，配桔梗、甘草；目赤肿痛配桑叶、菊花等。治小儿惊风，多配僵蚕、钩藤；麻疹透发不畅，则配牛蒡子、蝉衣、荆芥伍用，以助疹之透发。

若治肝郁气滞的胸闷，胁肋胀痛，配白芍、柴胡等，如逍遥散。

【用量用法】 2~6克。本品质轻，用量宜小，亦不宜久煎。因发汗力较强，体弱汗多者慎用。

牛蒡子

〔原文〕辛平。润肺解热，散结除风，利咽膈，理痰嗽，消斑疹，利二便，行十二经，散诸肿疮疡之毒，利腰膝凝滞之气。性冷而滑利，痘疹虚寒泄泻者忌服。实如葡萄而褐色，酒拌蒸，待有霜拭去用。根苦寒，竹刀刮净，绞汁，蜜和服，治中风，汗出而愈。捣和猪脂，贴疮肿及翻花疮。肉翻出如花状。

【讲解】牛蒡子外能疏散风热，内可清泄热毒，为风邪热毒常用之药。为菊科二年生草本植物牛蒡的成熟果实。一名大力子，又名鼠粘子（《本草图经》）、恶实（《别录》）。但临床处方少用。果实（瘦果）呈长扁卵形，外皮灰褐色，种仁灰白色，含丰富油性，生用或微炒，捣碎用。

本品辛苦而寒，辛散苦泄，寒可清热。入肺、胃二经。前人云“诸子皆降，唯牛子独升”，故善能疏散风热，清肺利咽，常用于外感风热所致的喉痒咳嗽，咯痰不爽，及咽喉肿痛等证。本品既能外散风热，并可内泄热毒，透发之中又有清泄之功，故能促使疹子透发，以治麻疹透发不畅及风疹、瘾疹作痒之证。

此外，牛蒡子还能散结消肿，体润滑肠，用于热毒疮肿及大头瘟（头面丹毒），疔腮（腮腺炎）等而大便秘结者最为适宜。

牛蒡根，味苦性寒，入肺经。祛风热，消肿毒。治风毒面肿，咽喉热肿，痈疽疥疮，咳嗽等证。但临床很少应用。

【临证应用】牛蒡子用于外感风热，喉痒咳嗽、咯痰不爽等证，常与疏散风热药薄荷、荆芥、桔梗、银花、连翘等同用，如银翘散；用于咽喉肿痛（如咽炎、上呼吸道感染、扁桃体炎等），属于风热者常与薄荷、荆芥等同用；火热毒盛者，可加大黄，共起泻火解毒之能，如牛蒡汤。麻疹初起透出不畅，以及风热发疹、荨麻疹等，本品既散又泄，可促使疹子透发，常与薄荷、荆芥、蝉蜕等同用；若热毒壅盛，则多与大青叶、紫草、银花等同用。与板蓝根、连翘、玄参等清热解毒药配伍，治各种热毒疮肿，以及大头瘟、疔腮等有良效。

【用量用法】 5-15克，煎服。本品性寒滑利，故气虚便溏者慎用。

桑叶

〔原文〕桑叶甘寒，手足阳明大肠、胃。之药。凉血刀斧伤者，为末，干贴之妙。燥湿，去风明目。采经霜者煎汤洗眼，去风泪；洗手足，去风痹。桑叶、黑芝麻等分，蜜丸，名扶桑丸，除湿去风，乌须明目。以五月五日、六月六日、立冬日采者佳。一老人年八十四，夜能细书，询之，云得一奇方，每年九月二十三日，桑叶洗目一次，永绝昏暗。末服止盗汗，严州有僧，每就枕，汗出遍身，比旦，衣被皆透，二十年不能疗。监寺教采带露桑叶，焙干为末，空心米饮下三钱，数日而愈。代茶止消渴。

【讲解】桑叶长于疏散风热，并能清泄肝火。为桑科落叶小乔木植物桑树的叶。多于秋后落霜后采收，习以经霜者为好，故有“霜桑叶”或“冬桑叶”之称。生用或炙用。

本品苦甘性寒。主入肺、肝二经。轻清发散，甘寒清润。既能疏散肺经风热，宣散燥气，又能清泄肝经邪热，以利头目。故凡风热袭肺，发热咳嗽，或燥热伤肺，干咳无痰，以及风热上攻或肝火上炎的头目头痛，目赤涩痛等症，均为常用之品。

此外，桑叶还兼有凉血之功，亦可用于血热吐血，唯药力和缓。

至于《备要》载归胃、大肠经，但临床很少用于此二经之病。根据《本草再新》之归经，入肺、肝二经，与临床应用较为相符，故应改为入肺、肝二经。

【临证应用】桑叶轻清凉散，善能清疏上焦风热，以治外感风热，或温病初起，发热头痛，咳嗽等证，常与菊花、薄荷、连翘、桔梗等同用，如桑菊饮；蜜炙桑叶有润肺之功，对于燥热伤肺，干咳痰稠，鼻咽干燥之证效果更好，常与杏仁、沙参、贝母及麦冬、石膏等配伍，益增清肺热、润肺燥之功，如桑杏汤、清燥救肺汤。配伍菊花、决明子、车前子内服，或煎汤外洗，可清肝明目，治肝经实热或风热所致目赤涩痛、多泪之证。若同黑芝麻配伍，作蜜丸服，如桑麻丸，可治肝阴不足，目暗昏花。本品略有凉血止血作用，单用或入复方，可用于血热吐血之轻证。

【用量用法】 5-10克，煎服。外用洗眼，可用至50-100克。

甘菊花

【原文】味兼甘苦，性禀平和，备受四气，冬苗，春叶，夏蕊，秋花。饱经霜露。得金水之精居多，能益金水二脏，肺肾。以制火而平木。心肝。木平则风熄，火降则热除。故能养目血，去翳膜^{（1）}，与枸杞相对蜜丸久服，永无目疾。治头目眩运，风热。散湿痹、游风^{（2）}。以单瓣味甘者入药，花小味苦者，名苦蕒，非真菊也。《牧暑闲谈》云：真菊延龄，野菊泻人。术、枸杞、地骨皮为使。黄者入阴分，白者入阳分，紫者入血分。可药可饵，可酿可枕。《仙经》重之。宁产白菊，今人用以点茶，夏月饮之，清暑退热解毒。

【讲解】（1）翳膜：指黑睛上出现大小不等、形状不一的瘢痕而言。

（2）游风：病名。又名赤游风、赤游丹。是一种急性的以皮肤表现为红晕，并浮肿形如云片、灼热瘙痒、状若风疹块、但更为肿大之风证。

菊花善疏散风热，清肝明目，又兼滋养肝阴。为菊科多年生草本植物菊的头状花序。花期采收，阴干用。因产地、花色、加工方法的不同，又分白菊花、黄菊花、野菊花等品种。白菊花，系白色头状花序，味偏甘，又称甘菊花；黄菊花系黄色头状花序，以产于浙江杭州一带者品质最佳，故又称杭菊花；紫色者指野菊花，别名苦蕒。历代本草对“甘菊花”一名论述不一，有指白菊和黄菊，以区别于味苦之野菊而言。有指体轻、性平、味甘之白菊花而言。目前所用甘菊花多指白菊花。

本品清香质轻，归肺经，可升散肺经风热；味苦性寒，入肝经，能清泄肝经邪热。苦中带甘，尚能养肝阴、平肝火。常用治外感风热，头痛目赤，或肝阳上亢，头晕目眩等证。所以《备要》说：能益金水二脏，以制火而平木。木平则风息，火降则热除。

【临证应用】菊花治外感风热之发热头痛等证，常与桑叶相须为用，还可配薄荷、荆芥等，如桑菊饮即为常用之方。治目赤肿痛，常与桑叶、决明子等同用。亦可用于肝肾阴虚的眼目昏花，多同枸杞子，地

黄等伍用，如杞菊地黄丸。肝阳上亢的头痛、眩晕等证，与白芍、钩藤，石决明等配伍，则益增平肝息风之功。尚可晒干作枕用。

【用量用法】10~15克。煎服或入丸散。外用适量。或晒干填枕用。

附：野菊花 味苦且辛，性寒。以清热解毒为主要功效，故多用于疮痈。内服配蒲公英、金银花、紫花地丁等则清热解毒之力更增，如五味消毒饮。亦可捣汁内服或打烂外敷。

以上三种菊花虽都能疏散风热，平肝明目，解毒疗疮，但依品类之不同，作用亦各有别。临床疏散风热多用黄菊花；平肝明目多用白菊花；解毒疗疮多用野菊花。

蝉蜕

〔原文〕蝉乃土木余气所化，饮风露而不食。其气清虚而味甘寒，故除风热；其体轻浮，故发痘疹；其性善蜕，故退目翳，催生下胞；其蜕为壳，故治皮肤疮疡瘾疹；与薄荷等分为末，酒调服。其声清响，故治中风失音。又昼鸣夜息，故止小儿夜啼。蝉类甚多，惟大而色黑者入药。洗去泥土翅足，浆水煮，晒干用。 攻毒全用。

蚱蝉，治小儿惊痫夜啼，杀疳去热，出胎下胞。 时珍曰：治皮肤疮疡风热当用蝉蜕，治脏腑经络，当用蝉身，各从其类也。

【讲解】 蝉蜕长于疏散风热透疹，并能明目止痉，为清疏肺肝之品。为蝉科昆虫黑蚱羽化后的蜕壳。拣去杂质，洗净晒干用。现均不去翅足，也不用浆煮。

本品甘寒清热，质轻上浮。入肺、肝二经。既能宣散肺经风热，而达解表透疹之功，又能凉肝息风，而有止痉退翳之效，为清疏肺肝之品。主治外感风热，咳嗽音哑，麻疹透发不畅，风疹瘙痒，小儿惊痫，破伤风，目赤翳障以及疮疡肿毒等证。又可治小儿夜啼，至于治疗中风失音，临床不常应用。

蚱蝉，即昆虫黑蚱的全虫。性味功效与蝉蜕相似，而长于息风定惊，多用于小儿惊风，夜啼等证。

【临证应用】蝉蜕用于外感风热及温病初期，有发热头痛等表证者，常与薄荷、桑叶、连翘等同用，以凉散风热。若风热袭肺而致的发热咽痛，声音嘶哑，可单用或与胖大海配伍，以疏散风热，开宣肺气，如海蝉散。治风热目赤，翳膜遮睛，常配菊花用，如蝉菊散。麻疹初期，透发不畅，可借本品所具宣散作用助其透发，常配牛蒡子、薄荷、葛根等同用；风疹皮肤瘙痒，常与白蒺藜、荆芥、薄荷等同用。用于破伤风，虽可单用，但效力差，需用大量，每日30~60克，研末分三次黄酒送服；重症可与南星、天麻、全蝎、僵蚕等祛风止痉品同用，如五虎追风散；治小儿惊痫，夜啼而惊惕不安者，可与钩藤伍用，以息风定惊。

【用法用量】3—10克，止痉可用至30~60克。煎服，或作丸、散用。

淡豆豉

〔原文〕苦泄肺，寒胜热。陈藏器曰：豆性生平，炒熟热，煮食寒，作豉冷。发汗解肌，调中下气。治伤寒头痛，烦躁满闷，懊憹⁽¹⁾不眠，发斑呕逆，凡伤寒呕逆烦闷，宜引吐，不宜用下药以逆之。血痢温疟。时珍曰：黑豆性平，作豉则温。既经蒸罨，故能升能散。得葱则发汗，得盐则能吐，得酒则治风，得薤则治痢，得蒜则止血。炒熟又能止汗。孟诜治盗汗，炒香渍酒服，《肘后》合葱白煎，名葱豉汤，用代麻黄汤。通治伤寒发表，亦治温病。造淡豉法：用黑大豆水浸一宿，淘净蒸熟，摊匀。蒿复，候上黄衣，取晒，簸净，水拌，干湿得所，安瓮中，筑实。桑叶厚盖，泥封。晒七日取出，曝一时，又水拌入瓮。如此七次，再蒸，去火气，瓮收用。

【讲解】（1）懊憹：证名。为胸隔间自觉烧灼嘈杂的证状。

豆豉具有疏散宣透之性，为解表除烦要品。为豆科植物大豆的成熟种子与桑叶、青蒿加工制成。尚有黑大豆与苏叶、麻黄、羌活等药加工而成者。

本品辛微苦，性寒。入肺、胃经。黑大豆本为营养之品，经与表散药同制发酵后，则具有疏散宣透之性，既能透解表邪，又能宣散郁热。其发汗解表之力颇为平稳，有发汗不甚伤阴之说，故为温热病初起表证之主药。至于用治烦躁满闷，懊憹不眠等邪热郁于胸中所致之症，亦取其宣透之性。故凡温邪初感，或余热内扰，欲透发者，本品最为常用。

本品依其加工所用辅料之不同而性质有异。与桑叶、青蒿同制，则药性偏于寒凉，主要用于风热之证；与麻黄、苏叶等同制，药性偏于辛温，主要用于风寒之证。

【临证应用】豆豉用于感冒或热病初期，发热，恶风寒，头痛等证，属风热者，常配薄荷、银花、荆芥、牛蒡子等同用，如银翘散；属风寒者，常与葱白同用，如葱豉汤。若热病后期，余热未尽，胸中烦闷，懊憹不眠者，可配栀子以清热除烦，如栀子豉汤。

【用量用法】10—15克，煎服。

蔓荆子

（原文）辛苦微寒，轻浮升散。入足太阳、阳明、厥阴 膀胱、胃、肝。经。搜风凉血，通利九窍。治湿痹拘挛，头痛脑鸣⁽¹⁾，太阳脉络于脑。目赤齿痛，齿虽属肾，为骨之余，而上龈属足阳明，下龈属手阳明。阳明风热上攻，则动摇肿痛。头面风虚之证。明目固齿，长发泽肌。去膜，打碎用，亦有酒蒸炒用者。恶石膏、乌头。

【讲解】（1）脑鸣：证名。指头内如虫蛀样鸣响。

蔓荆子善于升散头面风热，主治风热头痛。为马鞭草科落叶小灌木植物单叶蔓荆和蔓荆的果实。阴干、炒至焦黄色用。

蔓荆子味辛苦，性微寒。入膀胱、肝、胃经。辛可散风，微寒能清热，质轻上行，善于升散头面风热，故常用于外感风热所引起的头痛头晕，以及头风痛等证。亦能散肝经风热，清利头目，以治目昏多泪，目赤肿痛等证。其治湿痹拘挛，亦是取其散风胜湿之效，唯现在应用较少。

【临证应用】蔓荆子治疗外感风热所致的头昏头痛，以偏头痛证为优，可单用蔓荆子浸酒服，或配伍防风、菊花、川芎等，以增强祛风止痛效果。与菊花、蝉蜕、白蒺藜等同用，治疗风热上扰或肝经风热所致之目昏，目赤肿痛，多泪等证。与防风、秦艽、木瓜等配伍，可用于风湿痹痛、肢体挛急之证。

【用量用法】6~12克，煎服或浸酒，并入丸、散用。

葛根

〔原文〕辛甘性平，轻扬升发，入阳明经。能鼓胃气上行，生津止渴。风药多燥，葛根独能止渴者，以能升胃气，入肺而生津耳。兼入脾经，开腠发汗、解肌退热，脾主肌肉。为治脾胃虚弱、泄泻之圣药。经曰：清气在下，则生飧(sūn)泄。葛根能升阳明清气。疗伤寒中风、阳明头痛⁽¹⁾，张元素曰：头痛如破，乃阳明中风，可用葛根葱白汤；若太阳初病，未入阳明而头痛者，不可便服升葛汤发之，反引邪气入阳明也。仲景治太阳、阳明合病，桂枝汤加葛根、麻黄；又有葛根黄芩黄连解肌汤，是用以断太阳入阳明之路，非太阳药也。血痢温疟，丹溪曰：治疟，无汗要有汗，散邪为主，带补；有汗要无汗，扶正为主，带散。若阳疟有汗，加参、芪、白术以饮之；无汗，加芩、葛、苍术以发之。肠风痘疹。能发痘疹。丹溪曰：凡斑疹已见红点，不可更服升葛根，恐表虚反增斑烂也。又能起阴气，散郁火，解酒毒，葛花尤良。利二便，杀百药毒。多用反伤胃气。升散太过。

生葛汁，大寒。解温病大热，吐衄诸血。

【讲解】(1)阳明头痛：指头痛而在阳明经脉循行部位者。

葛根以升阳散邪为特点，有解表透疹，生津止泻作用。为豆科多年生落叶藤本植物葛的根。生用，或煨用。

本品辛甘性凉，具有轻清升散之性。入脾、胃经，而以阳明胃经为主。阳明主肌肉，故能解肌退热，透发斑疹；又能鼓舞脾胃清阳之气上升，而奏生津止渴、止泻之效。常用于肌表有热之外感，或斑疹不透，热病口渴，酒毒烦热，消渴，以及泄泻等证。

【临证应用】葛根解肌发汗，对邪郁肌表，身热不退，不论口渴或不渴，有汗或无汗皆可应用。尤其以表证兼有项背强急者最为适宜。治风寒表证常与桂枝、麻黄、白芍等同用，如葛根汤；若风热表证兼有内热者，则与柴胡、黄芩、石膏等同用，以解肌清热，如柴葛解肌汤。借其发散之性可助疹透发，治麻疹初起，疹出不畅，常与升麻同用，如升麻葛根汤。治湿热泻痢多与黄芩、黄连配伍，如葛根芩连汤，此方擅治泄泻热痢兼有表证者。若是脾虚泄泻，则多与党参、白

术、木香等伍用，如七味白术散。治热病烦渴及消渴证，可单用或配麦冬、天花粉、地黄等生津药，则疗效甚佳，如玉泉丸。

现代医学研究和临床实践说明，葛根有较强的解热作用，又能缓解肌肉痉挛。其所含葛根黄酮能扩张脑及冠状血管，用于高血压脑病，可改善头痛、眩晕、耳鸣、肢体麻木等证；用于冠心病防治，也可收到一定疗效。

《备要》言能解酒毒，然以葛花解酒醒脾更优，可用于饮酒过度，头痛，头昏，呕吐，烦渴等伤及胃气之证。素有葛花解醒汤，即以本品配桂皮、白蔻仁等组成。

【用量用法】 10-20克，煎服。生用解表，透疹，生津；煨用止泻。葛花用量3-10克。

柴胡

【原文】苦平微寒，味薄气升为阳。主阳气下陷，引清气上行，而平少阳、厥阴之邪热。肝、胆、心包、三焦、相火。时珍曰：行少阳，黄芩为佐；行厥阴，黄连为佐。宣畅气血，散结调经，昂按：人第知柴胡能发表，而不知柴胡最能和里，故劳药、血药往往用之。补中益气汤、逍遥散皆用柴胡，取其和中，皆非解表也。为足少阳胆。表药。胆为清静之府，无出无入，其经在半表半里，法当和解，小柴胡汤之属是也。若病在太阳，服之太早，则引贼入门；若病入阴经，复服柴胡，则重虚其表，最宜详慎。治伤寒邪热，仲景有大小柴胡等汤。痰热结实，虚劳肌热，寇宗奭曰：柴胡，《本经》并无一字治劳。《药性论》、《曰华子》皆言补劳伤。医家执而用之，贻误无穷。时珍曰：劳有五。若劳在肝、胆、心、心包有热，则柴胡乃手足厥阴、少阳必用之药；劳在脾胃有热，或阳气下陷，则柴胡为升清退热必用之药。性劳在肺肾者，不可用耳。寇氏一概摈斥，殊非通论。昂按：杨氏秦艽扶羸汤，治肺痿成劳，咳嗽声嘎，体虚自汗，用柴胡为君，则肺劳亦有用之者矣。《药性论》，甄权著。呕吐心烦，邪在半表半里，则多呕吐。诸疟寒热，李东垣曰：诸疟以柴胡为君，佐以引经之药。李士材曰：疟非少阳经慎用。俞嘉言曰：疟发必有寒有热。盖外邪伏于半表半里，适在少阳所主之界，入与阴争，阳胜则热；出与阳争，阴胜则寒。即纯热无寒为瘧疟、温疟；纯寒无热为牝疟；要皆自少阳而造其极偏，补偏救弊，亦必返还少阳之界，使阴阳协和而后愈也。谓少阴而兼他经则有之；谓他经而不涉少阳，则不成其为疟矣。脉纵屡迁，而弦之一字，实贯彻之也。昂按：疟之不离少阳，犹咳之不离于肺也。谈薮（suo）云：张知阁久病疟，热时如火，年余骨立。医用茸、附诸药，热益甚。孙琳投以小柴胡汤，三服脱然。琳曰：此名劳疟，热从髓出，加以刚剂，气血愈亏。热有在皮肤、在脏腑、在骨髓。在骨髓者，非柴胡不可。若得银柴胡，只须一服。南方者力减，故三服乃效也。时珍曰：观此则得用药之妙的矣。昂按，据孙氏之说，是柴胡亦能退骨蒸也。头眩目赤，胸痞胁痛⁽¹⁾，凡胁痛、多是肝木有余，宜小柴胡汤加青皮，川芎、白芍。又左胁痛，宜活血行气；右胁痛、宜消食行痰。口苦耳聋，皆肝胆之邪。妇人热入血室⁽²⁾，冲为血海，即血室也，男女皆有之。柴胡在脏主血，在经主气。胎前产后诸热，小儿痘疹，五疳羸热⁽³⁾。散十二经疮疽、血凝气聚，功同连翘。连翘治血热，柴胡治气热，为少异。阴虚，火炎气升者禁用。银州者，根长尺余，微白，治劳瘵良。北产者，如前胡而软者良；南产者，强硬不堪用。外感生用，内伤升气，酒炒用根；中节下降用梢；有汗咳者蜜水炒。前胡、半夏为使，恶皂角。

【讲解】（1）胸痞：证名。胸中满闷而不痛者称为胸痞。（2）血室：历代医家对血室有不同认识。一般有三种看法：一指冲脉，二指肝脏，三指子宫。现多指第三种说法。（3）五痞：痞，病名。泛指小儿因多种慢性疾病所致形体干瘦，津液干枯之证。五痞是以五脏分类命名的痞证，即心痞、肝痞、脾痞、肺痞、肾痞五类。

柴胡善长和解退热，疏肝解郁，又能升阳举陷。为伞形科多年生草本植物柴胡和狭叶柴胡的根或全草。前者生产辽宁、甘肃、河北等地，习称“北柴胡”；其根头膨大，少弯曲，而质坚且较韧，不易折断，故亦称“硬柴胡”。后者主产湖北、江苏、四川等地，习称“南柴胡”；其根有分支，多弯不直，质较轻软，性脆易折断，又称“软柴胡”。以上两种柴胡均入药，处方名可通用“柴胡”。《备要》言银州者，根长尺余，微白，治劳痞良。系指石竹科银柴胡，不得与本品混淆。

本品苦辛微寒，为少阳胆经之药。以肝胆为表里之脏，故亦入肝经。因其气香质轻，可升可散，有清轻升发、疏泄之性。且有较好的退热作用，尤善疏散少阳半表半里之邪，还可升清阳之气而举陷，调达肝气而解郁调经。常用治邪在少阳，寒热往来，阳气下陷，久泻脱肛；肝气郁结，胸胁胀痛，及妇女月经不调等。无论虚证实证，皆可配伍应用。然性升发，凡虚人气逆，或阴虚火旺，肝阳上亢者悉宜禁用。

【临证应用】柴胡为治疗少阳证的要药。凡伤寒邪在少阳，寒热往来、胸胁苦满、口苦咽干，目眩等症，皆可与黄芩等配伍，以和解表里，如小柴胡汤。此方系柴胡与黄芩、半夏、党参、甘草及姜、枣组成，以治少阳证及疟疾。对于感冒发热，可借其透表泄热之功，常配葛根等同用。现在以柴胡制成单味或复方注射剂，对外感发热有较好的解热效果。

若是肝气郁结的胸胁肋胀痛，妇女月经不调，则多配当归、白芍等使用。如临床常用的逍遥散、加味逍遥散、柴胡疏肝散等，即以本品配当归、白芍、香附等，以疏肝解郁止痛。治气虚下陷的脱肛，子宫下垂等证，常配升麻、黄芪、白术等益气升阳之品，如补中益气汤。

此外，柴胡配黄连可清散郁火；配枳实可升清降浊；配常山可截疟等。据不同的配伍，柴胡可发挥其不同的疗效。

至于《备要》载柴胡产银州，根长尺余，治劳瘵者，是指银柴胡而言。银柴胡为石竹科植物银柴胡的根。其根呈圆柱形，长15—40厘米，淡黄棕色，味甘微苦，切片生用。主产于陕西、宁夏、内蒙古、甘肃等地，习以产银州（今陕西省延安一带）者良。味甘性微寒，主入肝经。功善凉血退热。且退热而不苦泄，理阴而不升腾，为清退虚热之良药，多用于阴虚发热，骨蒸劳热，盗汗及小儿疳热之证。银柴胡之与柴胡，实为二物而效殊。二者虽均可退热，而前者善退虚热，专治阴虚发热，无升散之性，且有凉血之功；柴胡透表泄热，善治寒热往来，有升散之功，而无凉血之能。

【用量用法】3—10克，煎服。可生用，也可酒炒或醋炒用。生用时和解退热功效较著，故若治寒热往来，外感发热多用生品；柴胡经炒，可减其寒凉之性，增加升举之功，故治气虚下陷证宜炒用。醋炒后可增强舒肝活血、止痛的功效，故治肝气郁结诸证，多用醋炒，疗效显著。此外还有用鳖血拌炒者，借鳖血滋阴柔润之性，防止劫伤肝阴之弊，肝郁而阴亏者适用。

升麻

〔原文〕甘辛微苦，足阳明、太阴胃、脾。引经药，参、芪上行，须此引之。亦入手阳明、太阴。大肠、肺。表散风邪，引葱白，散手阳明风邪；同葛根，能发阳明之汗；引石膏，止阳明头痛齿痛。升发火郁，能升阳气于至阴^{（1）}之下，引甘温之药上行，以补卫气之散而实其表。柴胡引少阳清气上行，升麻引阳明清气上行，故补中汤用为佐使。若下元虚者，用此升之，则下元愈虚，又当慎用。治时气毒痢^{（2）}，头痛阳明头痛，痛连齿颊。寒热，肺痿^{（3）}吐脓，下痢后重，后重者，气滞也。气滞于中，必上行而后能下降。有病大小便秘者，用通利药而罔效，重加升麻而反通。朱丹溪曰：气升则水自降。经曰：地气上为云，天气下为雨，天地不交，则万物不通也。久泄经曰：清气在下，则生飧泄。脱肛，崩中，带下，能缓带脉之缩急，足寒阴痿，目赤口疮，痘疮升葛汤，初发热时可用，痘出后气弱或泄泻者可少用。否则，见点之后，必不可用，为其解散也。斑疹，成朵如锦纹者为斑，隐隐见红点者为疹。盖胃热失下，冲入少阳，则助相火而成斑；冲入少阴，则助君火而成疹。风热疮痍。解百药毒，吐蛊毒^{（4）}，杀精鬼。性阳气升，味甘故也。阴虚火动者忌用。朱肱《活人书》言瘀血入里，吐衄血者，犀角地黄汤，乃阳明圣药，如无犀角，代以升麻。二药性味相远，何以为代？盖升麻能引诸药同入阳明也。朱二允曰：升麻性升，犀角性降。用犀角止血，乃借其下降之气，清心肝之火，使血下行归经耳。倘误用升麻，血随气升，不愈涌出不止乎？古方未可尽泥也。里白外黑，紧实者良，名鬼脸升麻。去须、芦用。或有参，芪补剂，须用升、柴，而又恐其太升发者，升麻、柴胡并用，蜜水炒之。别有一种绿升麻，缪仲醇用治带下，每每有验。

【讲解】（1）至阴：至，到达。阴指太阴，太阴为三阴之始，故称脾为至阴。（2）痢：指有强烈传染性的致病邪气。（3）肺痿：病名。指肺叶枯萎，而以咳吐唾沫为主证的慢性虚弱性疾患。（4）蛊毒：病名。指人体感染后发生的蛊胀病。

升麻为升散之品，能升举清阳，发表透疹，兼有清热解毒之功。为毛茛科多年生草本植物大三叶升麻或兴安升麻和升麻的根茎。干燥根呈扭曲不整齐的圆柱形，表面黑色，粗造，有多数圆形空洞，洞内壁呈网状花纹，黑白相兼者称“花升麻”，或“鬼脸升麻”，质地较佳。生用或炙用。

本品辛甘微寒，轻浮上升，既能升散，又能清泄，故有升阳举陷，发表透疹，清热解毒之功效。适用于气虚下陷的久泻脱肛，崩中带下，以及风袭肌表，阳明头痛，痘毒斑疹，疮疡肿毒诸证。但因升散力强，阴虚火旺，麻疹已透，肝阳上升及气逆不降者忌用。

此外，《本经》记载能解百毒，辟瘟疫瘴气，邪气蛊毒。

【临证应用】升麻解表透疹，常与葛根配伍，用于麻疹初期，以透发邪毒外出，如升麻葛根汤，但麻疹已透，或有呼吸促迫者，不可应用，升麻入脾、胃经，善解阳明热毒，治胃热齿痛，口舌生疮，配黄连、石膏、生地等药；风热上壅，咽喉肿痛，多配玄参、桔梗等伍用；热毒疮疡，颜面丹毒，又可配大青叶、石膏等同用。

中气下陷的少气乏力，久泻脱肛，子宫下垂；气不摄血的崩漏下血，均可与人参、黄芪等补中益气之品配伍应用，共收培中举陷之功。

【用量用法】3—10克，煎服。生用发表透疹，清热解毒力胜；炙用辛散发表之力已缓，而升提脾胃之气加强，故升举阳气选用炙升麻较佳。

浮萍

〔原文〕辛散轻浮。入肺经，达皮肤，能发扬邪汗，丹溪曰：浮萍发汗，甚于麻黄。止瘙痒、消渴。捣汁服。生于水，又能下水气，利小便，治一切风湿瘫痪。浮萍一味，蜜丸酒服，治三十六种风。浓煮汁浴，治恶疾疮癩遍身。烧烟辟蚊。紫背者良。

【讲解】浮萍主解表透疹，利水消肿。为浮萍科多年生水生漂浮草本植物紫萍的全草。其叶面绿，背紫，故又称“紫背浮萍”。同科植物浮萍（青萍）亦可供药用，然以紫背者用多。

本品味辛性寒，入肺与膀胱经。体轻上浮升散，达皮表，开毛窍，故有发汗解表，透疹，祛风止痒之功。肺为水之上源，肺气通利则水下达于膀胱，故又能利水消肿。所以，不论外感风热，风疹瘙痒，湿淫于内的浮肿，小便不利，均可获良效。

【临证应用】浮萍用于外感风热，发热无汗等证，可配荆芥、薄荷等疏散风热药伍用。麻疹透发不畅，可借其发散之性助其透发，常配薄荷、牛蒡子、蝉蜕等药。风热瘾疹，皮肤瘙痒，亦可配荆芥、防风、白蒺藜、白鲜皮相伍内服，或煎汤外洗。治水肿时，可配车前子、茯苓、泽泻等。

本品与麻黄均为发散之品，然浮萍性寒，升散风热；麻黄性温，解散风寒。浮萍力缓，夏秋常用；麻黄力猛，冬月多服。

【用量用法】3—10克，煎服。外用适量。

木贼

〔原文〕温微甘苦，中空轻扬，与麻黄同形性，亦能发汗解肌，升散火郁风湿，入足厥阴少阳血分。益肝胆，治目疾，退翳膜。翳乃肝邪郁遏，不能上通于目。及疝痛脱肛，肠风痔瘻，赤痢崩中诸血病。

【讲解】木贼表散风热，专治目疾。为木贼科多年生常绿草本隐花植物木贼的全草。夏季采收，去须根、切段用。

本品味甘苦，性平，中空轻扬，外形与麻黄相类。入肝、胆、肺三经。其功以治目疾、退目翳为主，虽兼有发散风热之力，但少用于一般的风热表证，而多用于风热引起的目赤多泪翳障之证。

《备要》云能治疝痛，脱肛，肠风痔瘻，赤痢崩中诸血病。临床均须审其因风热而成者方可用之。

【临证应用】木贼临床上主治风热引起的目赤多泪，翳障，常与菊花、蝉蜕、谷精草等配用。其余方面极少用。

【用量用法】3-10克，煎服。

小结

本章根据解表药的不同性质，分为辛温解表药和辛凉解表药。

一、辛温解表药：

均系辛温之品，都有发汗解表的作用，适用于风寒表证。但又各有特性，主治证候亦有区别。

麻黄、桂枝、细辛发散风寒之力较强。麻黄、桂枝均主散太阳经肌表之风寒，然麻黄发汗作用大于桂枝，故用于无汗之表实证；桂枝不论有汗无汗皆可应用。麻黄又能开宣肺气，利水退肿，常用于肺气不宣的咳喘及水肿兼表证者；桂枝还可温通血脉，通阳化气，善治妇人血寒经闭，风湿痹证及阳虚不能化气的痰饮蓄水等证。细辛善散少阴经寒邪，多用于外感风寒，发热脉沉者，且有祛风湿，止痛及温肺化饮之功，可用于头痛齿痛，风湿痹痛及肺寒痰饮喘咳。惟药性较为峻烈，用时宜慎，用量不可过大。

紫苏、荆芥、防风三药发汗作用不及麻、桂之峻，较为缓和，为一般风寒感冒常用之品。其中紫苏散寒力较强，并有行气安胎之功，风寒感冒兼有胸腹胀满，恶心呕逆者更为适宜；荆芥辛散疏风，无论风寒、风热皆可应用，兼能透疹止血，疹出不透及各种出血皆可选用；防风祛风为主，本品甘缓不峻，为风药中之润剂，功同荆芥。外感风邪，二药常相须为用。但防风还能胜湿止痛，也是治风湿痹证的要药。

羌活、藁本、白芷均有发表、祛风湿止痛的作用，用治感冒头痛。然羌活、藁本温燥升散，入太阳经，以治巅顶头痛连及后脑者；白芷归阳明经，治前额头痛，眉棱骨痛，牙痛及鼻渊等证。羌活还有通痹止痛的作用，且善于上行，用治风湿痹痛以上半身为佳。白芷又能消痈排脓，用于疮疡肿毒及寒湿带下，风湿瘙痒。

辛夷、苍耳善能宣通肺窍，是治鼻渊的专药。苍耳子还能祛风湿，治皮肤湿疹瘙痒。

生姜发表散寒，又为温中止呕要药。葱白发表通阳，既可外散风寒表邪，又治寒邪入里，下痢脉微之证。胡荽发表透疹，主治麻疹不透；但多煎汤熏洗，很少内服。香薷长于解暑化湿，为治夏日外感风寒，内伤于湿，阳气被阴邪所遏的恶寒无汗，吐泻等证的主药。桉柳为透发麻疹之专药，内服外洗均效。然辛散力强，麻疹已透则不宜用。鸡苏功用与紫苏相类似，惟临床少用。

二、辛凉解表药：

均为辛凉之品，具有发散风热的作用，适用于风热表证及温热病初起或麻疹透发不畅等证。其中各药之作用也互有异同。

薄荷、牛蒡子、蝉蜕有发散风热，宣肺透疹的功效，为风热感冒，温病初期及疹发不透的常用药。三药中薄荷发散力较强，牛蒡子、蝉蜕次之。薄荷善散头面风热，兼理气解郁，可治头痛目赤及肝郁不舒之证；牛蒡子又能清热解毒，疮疡肿毒、咽喉疼痛常用；蝉蜕甘寒质轻，长于定惊止痉，明目退翳，多用于小儿惊风，破伤风及眼科疾患。

桑叶、菊花发散之力不及薄荷，但能清肝火。二者都可散头面风热，治外感风热，头痛目赤，并常相须为用。但桑叶兼能润肺止咳，肺燥咳嗽用之较好；菊花清肝明目作用较桑叶为胜，并能养肝，肝火或阴虚阳亢的头痛眩晕，目赤等证，用之为宜；野菊花尤善清热解毒，是治疗疮肿毒的良药。

柴胡、葛根、升麻都有升阳发散作用，其退热之功惟柴胡为首，主散少阳半表半里之邪，以治寒热往来之证。又能疏解肝郁，治肝郁胁痛或月经不调等证。葛根是阳明经之主药，既可解肌退热，治表证发热，项背强痛，又能鼓舞脾胃之气而生津止渴，升阳止泻；升麻退热之力较差，而升举阳气之功最强，可用于透疹和阳气下陷的久泻久痢，脱肛等证。故柴胡、升麻常同用于中气下陷证，而葛根、升麻常并用于透疹。

蔓荆子、淡豆豉发散之力均较弱。前者散头面风热，主治风热头痛，目赤多泪；后者以解表除烦为能，治外感轻证及热病心胸烦乱之证。

浮萍长于发汗利水，可治外感风热，风疹瘙痒，以及水肿多用。木贼能疏散风热，治风热目赤，翳膜遮睛的主药。

解表药功用归纳简表

分类	药名	性味	归经	功效	主 治	用 量	备 注
辛温解表药	麻黄	辛、微苦	肺、膀胱	发汗、平喘、利水	①外感风寒表实证 ②咳嗽 ③水肿兼表证者	2—10克	麻黄根止汗主治自汗盗汗

分 类	药 名	性味	归经	功效	主 治	用 量	备 注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	桂枝	辛、甘、温	心、肺、膀胱	发汗解表，温经通阳	①外感风寒表证 ②风寒湿痹 ③痰饮、水肿 ④胸痹 ⑥经闭、痛经、癥瘕	3—10克	
	紫苏	辛、温	肺、脾	发表散寒，行气宽中解鱼蟹毒	①风寒表证 ②胸闷呕吐，胎动不安 ③鱼蟹中毒	5—15克	苏子降气化痰，主治咳嗽气喘
	荆芥	辛、微温	肺、肝	祛风解表，止血	①风寒或风热表证 ②风疹瘙痒或麻	3—10克	止血须炒

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
					疹透发不畅 ③ 咽喉肿痛及疮疡初起兼表证者 ④ 吐、衄、便血等出血证		炭用
	防风	辛、甘、微温	膀胱、肝、脾	祛风、解表、胜湿、止痛、解痉	①风寒表证 ②风湿痹痛 ⑧破伤风	3—10克	
	羌活	辛、苦、温	膀胱、肾	解表、散寒、祛风、胜	①风寒感冒 ②风湿痹痛	3—10克	

分 类	药 名	性味	归经	功 效	主 治	用 量	备 注
				湿、 止痛			

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
辛温解表药	白芷	辛、温，	肺、胃、大肠	解毒、祛风、除湿、消肿、排脓、止痛	①外感头痛、鼻渊 ②阳明头痛、眉棱骨痛、齿痛 ⑧疮疡肿毒 ④寒湿带下	3-10克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	藁本	辛、温	膀胱	发表散寒，祛风胜湿，止痛	①风寒头痛、巅顶痛 ②寒湿痹痛	2—10克	
	细辛	辛、温	肺、肾	祛风散寒，止痛，温肺，化饮，通窍	①头痛、牙痛、痹痛 ②风寒表证 ③寒饮喘咳 ④鼻渊	2—5克	反藜芦
	辛夷	辛、温	肺、胃	散风寒，通鼻窍	风寒头痛、鼻渊	3—6克，	布包煎服
	苍耳子	辛、苦、温、	肺	通鼻窍，祛风	①鼻渊 ②风湿痹痛	3—10克	苍耳草功能祛

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
		有小毒		湿，止痛			风、解毒
	香薷	辛、微温	肺、胃	发汗解表，和中化湿，利水消肿	①夏令暑湿表证、泄泻 ②水肿	3—6克	
	生姜	辛、微温	肺、胃	发汗解表，温中止呕，温中止咳	①风寒表证 ②胃寒呕吐 ③肺寒咳嗽	3—10克	捣汁冲服每次3—10滴。生姜皮功能行水，主治皮肤水肿。
	葱白	辛、温	肺、胃	发汗解表，散寒通	①风寒表证 ②厥冷脉微	6—10克	不宜与蜂蜜同用

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				阳， 解毒 散结	③疮 疡肿 毒 (外 用)		

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
辛温解表药	胡荽	辛、温	肺、胃	发汗透疹	麻疹初期，透发不畅	3-6克	
	桉柳	辛、平	肺、胃、心	发汗透疹	麻疹初期，透发不畅	3-6克	
	鸡苏	辛、微温	肺、脾	疏风解表 下气理血	功同紫苏，临床少用	3-10克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
辛凉解表药	薄荷	辛、凉	肺、肝	疏散风热 清利头目 利咽、透疹	①风热表证 ②风热上攻的头痛、目赤 ③麻疹初期,疹发不畅 ④肝郁气滞的胸胁疼痛等证	2-6克	不宜久煎

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	牛蒡子	辛、苦、寒	肺、胃	疏散风热 解毒透疹 利咽散肿	①风热表证,咽喉肿痛 ②麻疹初期,疹出不畅 ③热毒疮肿	5-15克	
	桑叶	苦、甘、寒	肺、肝	疏风清热 清肝明目	①外感风热 ②肺热燥咳 ⑨目疾	5-10克	
	菊花	辛、甘、苦、微寒	肝、肺	疏风清热 明目	①外感风热或温病初起 ②目赤肿痛 ⑨肝阳	10-15克	野菊花善清热解毒,主用于痈肿疗毒。

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
					头痛、眩 晕		
	蝉 蜕	甘、寒	肺、肝	疏风清热，透疹，明目退翳，息风止痉	①外感风热及温病初起 ②麻疹初起，疹出不畅 ③风热目赤、目翳 ④小儿夜啼及破伤风	3—10克	
	淡豆豉	辛、微苦、寒	肺、胃	解表除烦	①外感表证 ②热病心烦	6—12克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	蔓荆子	辛、苦、微寒	膀胱、肝、胃	疏散风热，清利头目	①风热头痛、目赤 ②风湿痹痛，肢体挛急	6-12克	
	葛根	辛、甘、凉	脾、胃	发表解肌，升阳透疹，解热生津	①外感风热，项背强痛 ②麻疹初期，疹出不畅 ⑧泄泻痢疾 ④消渴	10-20克	解表生用 止泄煨用 葛花主用于解酒
	柴胡	苦、辛、微寒	肝、胆	和解退热，疏肝解郁，	①往来寒热 ②肝气郁结，胸胁	3-10克	银柴胡专退阴分虚热、治骨

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				升举阳气	胀痛、月经不调等证 ③中气下陷的脱肛等		蒸潮热
	升麻	辛、甘、微寒	肺、脾、大肠、胃	发表透疹，清热解毒，升阳举陷	①麻疹初期，疹发不畅 ②咽痛、头痛等热毒证 ③气虚下陷证	3-10克	
	浮萍	辛、寒	肺、膀胱	发汗解表，透疹，	①风热表证 ②麻疹透发	3~10克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				祛风 止 痒, 利水 消肿	不畅 ③风 热瘾 疹、 皮 肤 癌痒 ④水 肿兼 表证		
	木 贼	甘、 苦、 平	肺、 肝、 胆	疏散 风热 明目 退翳	风热 目 赤、 目翳	3-10 克	

复习思考题

1. 试述解表药的定义，适用范围及使用时的注意点。
2. 如何区别辛温解表药和辛凉解表药的临床应用？
3. 麻黄、桂枝、细辛的功效和应用各怎样？主要差别是什么？
4. 羌活、白芷、防风在功效和应用上有何异同？分别说明其要点？
5. 试述紫苏、荆芥、香薷、生姜、辛夷的功效和临床应用。
6. 薄荷、牛蒡子、蝉衣在功效和应用上有何异同？
7. 桑叶与菊花功效和适应证各如何？试比较之。
8. 分析比较柴胡、葛根、升麻三药的相同点和不同点。
9. 应用麻黄、桂枝、细辛、薄荷、葛根时必须注意哪些问题？

第二章 泻下药

- 第二章 泻下药

〔自学时数〕8学时

〔面授时数〕2学时

〔目的要求〕

- 1、了解泻下药的含义、功效、分类。
- 2、熟悉泻下药的共同功用。
- 3、熟悉攻下药、润下药、峻下逐水药的主要适应证。
- 4、掌握攻下药、润下药、峻下逐水药中常用药（大黄 芒硝 火麻仁 郁李仁 甘遂 巴豆）的功效、临证应用，并比较其异同。
- 5、熟悉泻下攻积、泄热通肠、软坚泻下、温下寒积、润下通便、峻下泻水、泻水涤饮的概念。
- 6、在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡能引起腹泻或滑利大肠、促使排除肠内积滞和体内积水为主要作用的药物，统称为泻下药。

泻下药适用于里实证，其主要功用大致可分为三点：

- 1、通利大便，以清除肠道内的宿食燥屎及有害物质，使从大便排出。
- 2、清热泻火，使体内热毒通过泻下而得到缓解。
- 3、逐水消肿，使水湿之邪从二便排出，以达到祛除停饮，消退水肿的目的。

根据泻下作用不同，可分为攻下药、润下药和峻下逐水药三类。

使用泻下药应注意，里实兼有表邪者，当先解表而后攻里，必要时攻下药与解表药同用，表里双解，以免表邪内陷；里实而正虚者，应与补益药同用，攻补兼施，使攻邪而不伤正。攻下药与峻下逐水药作用较猛，后者尤为峻烈，奏效迅速，但易伤正气，宜于邪实而正气不虚之证。对久病正虚，年老体弱以及妇女胎前产后，月经期等均应慎用或忌用。

第一节攻下药

本类药具有较强的泻下作用，性味多属苦寒，既能泻下通便，又能清热泻火，适用于肠道积滞，大便不通所引起的各种里实证，尤以实热积滞，燥屎坚结者最为适宜；对于血热上攻所致的头痛头晕，目赤肿痛及吐血衄血等证，无论有无便秘，均可用其导热下行，这就是“上病下取”的治法；痢疾初起，里急后重，泻而不畅者，亦可用此类药，以起到“通因通用”的作用。目前还常用攻下药配清热解毒、活血化瘀等药物，根据“通因通用”、“通则不痛”等原理，治疗多种急腹证，均取得较好效果。

大黄

〔原文〕大苦大寒。入足太阴，脾。手足阳明、厥阴大肠、胃、心包、肝。血分。其性浮而不沉，其用走而不守。若酒浸，亦能引至至高之分。仲景太阴门调胃承气汤，大黄注曰酒浸；阳明门大承气汤，大黄注曰酒洗；少阳阳明小承气汤，大黄不用酒制，皆有分别。东垣曰：邪气在上，非酒不至。若用生者，则遗至高之邪热，病愈后，或目赤喉痹头痛，膈上热疾生也。用以荡涤肠胃，下燥结而除瘀热。治伤寒时疾，发热谵语，大肠有燥粪，故谵语，宜下之。谵，音占。温热瘴疟(1)，下痢赤白，腹痛里急，黄疸水肿，癥瘕积聚(2)，积久成形谓之积，属阴；聚散无常谓之聚，属阳。积多是血，或食或痰，聚多是气。留饮(3)宿食(4)，心腹痞满，二便不通，皆土郁夺之。吐血衄血，血闭血枯，损伤积血，一切实热，血中伏火。行水除痰，蚀脓消肿，能推陈致新，然伤元气而耗阴血。下多亡阴。若病在气分，胃虚血弱人禁用。病在气分而用之，是为诛伐无过。东垣曰：能推陈致新，如定祸乱以致太平，所以有将军之号。时珍曰：仲景泻心汤，治心气不足，吐衄血者，用大黄、黄连、黄芩，乃泻心包、肝、脾、胃四经血中之伏火也。又治心下痞满，按之软者，用大黄黄连泻心汤，亦泻脾胃之湿热，非泻心也。病发于阴而反下之，则痞满。乃寒伤营血，邪结上焦。胃之上脘当心，故曰泻心。经曰：太阴所至，为痞满。又曰：浊气在上，则生膜胀是已。病发于阳而反下之，则结胸，乃热邪陷入血分，亦在上脘。故大陷胸汤、丸皆用大黄，亦泻脾胃血分之邪，而降其浊气也。若结胸在气分，只用小陷胸汤；痞满在气分，只用半夏泻心汤。或问心气不足而吐衄，何以不补心而反泻心！丹溪曰：少阴不足，亢阳无辅，致阴血妄行，故用大黄泻其亢甚之火。又心本不足，肝肺各受火邪而病作，故用黄芩救肺，黄连救肝。肺者阴之主，肝者心之母，血之合也。肺肝火退，则血归经而自安矣。寇宗奭曰：以苦泄其热，就以苦补其心，盖一举而两得之。李士材曰：古人用大黄，治虚劳吐衄，意甚深微。盖浊阴不降，则清阳不生，瘀血不去，则新血不生也。川产锦纹者良。有酒浸酒蒸，生熟之不同，生用更峻。黄芩为使。欲取通利者，不得骤进谷食，大黄得谷食，便不能通利耳。《夷坚志》：汤火伤者，捣生大黄醋调敷，止痛无瘢。

【讲解】（1）瘴疟：指感受山岚瘴毒而发的一种危重症疾。（2）癥瘕积聚：癥瘕和积聚，都是腹内积块，或胀或痛的病证。癥、积是有块状物可扪到，有形而固定不移，痛有定处；瘕、聚无形，聚散无

常，推之游移不定，痛无定处。（3）留饮：痰饮的一种。因饮邪日久不化，留而不去，故名。（4）宿食：指饮食停积于肠胃的一种病证。

大黄以清泻为主要功效。具有泻下攻积，清热泻火，解毒及活血祛瘀作用。为蓼科多年生草本植物掌叶大黄，唐古特大黄或南大黄的根状茎。掌叶大黄和唐古特大黄，又称北大黄，主产于青海、甘肃等地；南大黄主产于四川、湖北、云南、贵州。

大黄别名众多。如就其性而言，因能推陈出新，有锐不可当之势，古人誉为“将军”。四川南大黄产量较大，为通用之品，故又称川军。从其状而言，断面棕黄红色，有类白色菱形的网状纹理，排列整齐，极似缎面的织锦者，称锦纹大黄，或简称锦纹。此种药材主产于青海，品质优良，奉为道地药材。

本品苦寒沉降。入脾、胃、大肠，心及肝经。力猛善行，能直达下焦，荡涤肠胃积滞，清泻血分实热，并借其入血降泄之力，又有活血逐瘀之功，故为攻积泻火逐瘀之要药。凡大便燥结，积滞泻痢，湿热黄疸，水肿；热病便秘、高热神昏；热毒炽盛的吐血衄血，热毒疮痈，以及血滞经闭，癥瘕积聚，跌打损伤，瘀阻疼痛等证，本品均能治之。然其药性峻烈，易伤正气，如非实证，不可轻用。孕妇或经期、产后、哺乳期均慎用。

【临证应用】大黄苦寒泄热，以治热结便秘最为适宜。温热病热结便秘，高热不退，神昏谵语，常用大黄通腑泄热。据病情不同，配用芒硝、枳实、厚朴等，如大承气汤，小承气汤即是代表方剂。近代用于热性疾病后期的治疗中，以“釜底抽薪”之法达到急下存阴之效，排除燥屎，而致热尽身凉。中西医结合治疗肠梗阻，肠粘连等，运用复方大承气汤，也取得了较好疗效。大黄配附子、人参等温里祛寒药，又可治脾阳不足，寒积便秘，如温脾汤。此外，痢疾初起，里急后重，腹痛泻而不爽者，可用大黄通便，配黄连、木香、芍药等伍用，此即“通因通用”之法。

《内经》曰：病在上，取之下。凡血热妄行之吐血衄血，火热上炎的目赤咽痛，牙痛，可以大黄苦寒降泄上炎之火，常配黄连、黄芩等同用，如泻心汤。热毒痈肿，丹毒烫伤，可以内服，亦可外敷。如治肠

痛的大黄牡丹汤，即以大黄配芒硝、丹皮、桃仁等同用。亦可研末外敷消肿止痛。

大黄用于瘀血阻滞的病证，无论新瘀宿瘀，均可获效。治产后腹痛，腹中有瘀血者，配桃仁、蟅虫，如下瘀血汤；血瘀经闭，配当归、红花、益母草；跌打损伤，瘀阻作痛，配桃仁、红花。近代研究，对胃及十二指肠溃疡出血，疗效甚佳。

此外，大黄治湿热黄疸，配茵陈、栀子，如茵陈蒿汤；治湿热淋浊，配木通、车前子、栀子等用之，如八正散。

【用量用法】3-12克，煎服。一般分生用、制用、炒用的不同。生大黄泻下力较强，欲攻下宜用生者。入汤剂宜后下，或开水泡服，若久煎则泻下成分破坏，作用减弱。酒制大黄，又称酒军、熟军，系生大黄用黄酒拌蒸，使泻下清热之力缓和，然活血作用较好，瘀血证及不宜攻下者适用。大黄炒炭，多用于出血证。外用适量。

朴硝 芒硝 元明粉

〔原文〕辛能润燥，咸能软坚，苦能下泄，大寒能除热。朴硝酷涩性急，芒硝经炼稍缓。能荡涤三焦，肠胃实热，推陈致新。按致新则泻亦有补，与大黄同。盖邪气不除，则正气不能复也。治阳强(1)之病，伤寒经曰：人之伤于寒也，必病热。盖寒郁而为热也。疫痢(2)，积聚结癖(3)，留血停痰，黄疸淋闭(4)，瘰癧(5)疮肿，目赤障翳。通经堕胎。丰城尉家有猫，子死腹中，啼叫欲绝。医以硝灌之，死子即下。后有一牛，亦用此法得活。本用治人，治畜亦验。《经疏》曰：硝者，消也。五金八石，皆能消之，况脏腑之积聚乎？其直往无前之性，所谓无坚不破，无热不荡者也。病非热邪深固闭结不通，不可轻投，恐误伐下焦真阴故也。成无己曰：热淫于内，治以咸寒。气坚者，以咸软之；热盛者，以寒消之。故仲景大陷胸汤、大承气汤、调胃承气汤，皆用芒硝以软坚去实热。结不至坚者，不可用也。佐之以苦，故用大黄相须为使。许誉卿曰：芒硝消散，破结软坚；大黄推荡，走而不守。故二药相须，同为峻下之剂。王好古曰：本草言芒硝堕胎，然妊娠伤寒可下者，兼用大黄以润燥，软坚泻热，而母子相安。经曰有故无殒亦无殒也，此之谓软。谓药自病当之，故母与胎俱无患也。硝能柔五金，化七十二种石为水。生于卤地，刮取煎炼，在底者为朴硝，在上有芒者为芒硝，有牙者为马牙硝。置风日中，消尽水气，轻白如粉，为风化硝。大黄为使。《本经》、《别录》朴硝、硝石虽分二种，而气味主治略同。后人辩论纷然，究无定指。时珍曰：朴硝下降，属水性寒；硝石为造炮，焰硝上升，属火性温。昂按：世人用硝，从未有取其上升而温者，李氏之说恐非确论。

〔元明粉〕辛甘而冷，去胃中之实热，荡肠中之宿垢。润燥破结，消肿明目。血热去，则肿消而目明。昂按：泻痢不止，用大黄、元明粉以推荡之，而泻痢反止。盖宿垢不净，疾终不除，经所谓通因通用也。朴硝煎化，同莱菔煮，再用甘草煎，入罐火煅，以去其咸寒之性，阴中有阳，性稍和缓，大抵用代朴硝。若胃虚无实者禁用。俱忌苦参。

【讲解】(1)阳强：此指火热强盛的病证。(2)疫痢：指痢疾有较强传染性者，类似现代医学之中毒性痢疾。(3)积聚结癖：指腹内结块，隐匿于两胁之间。(4)淋闭：淋指小便时点滴而下，闭指尿闭不出。此指小便急迫、涩痛、排尿困难，甚或点滴不出的病证。(5)瘰癧：又名老

鼠疮。病发于颈项和耳前者，亦名痂子颈。另外，腋下及鼠蹊部亦多发病。

朴硝、芒硝、元明粉以润泻为主要功效，具有泻热导滞，润燥软坚作用。芒硝为含硫酸钠的天然矿物经精制而成的结晶体。取天然产品用热水溶解、过滤，冷却析出的结晶，通称朴硝或皮硝；再取萝卜切片，置锅内加水与朴硝共煮，滤去萝卜及杂质，将滤液冷却，结成白色细芒状结晶，即芒硝；芒硝经风化而成粉者，名风化硝；将芒硝同甘草煎炼，析出的晶块，经风化后成为白色粉末为玄明粉，又叫元明粉。

本品咸苦性寒。入胃、大肠经。咸能软坚，苦则泄降，寒可胜热。故能荡涤肠胃实热而除燥，以治实热积滞，大便燥结，谵语发狂等证。但本品泻热推荡之力颇猛，若病非实热燥结者，切勿妄投。故成无己说：结不至坚者，不可用也。孕妇忌用。此外，外敷痈肿疮毒，目赤咽痛，口疮等证，有清热消肿之功。

【临证应用】本品能泻热通便，润燥软坚，用于肠胃实热积滞，大便燥结不通。常与大黄相须为用，以增强泻下热结的作用，如调胃承气汤。用于咽喉肿烂，口疮，可与冰片、硼砂配伍，如冰硼散。若治目赤肿痛，可用元明粉适量置豆腐上蒸化，取汁点眼。治乳痈和哺乳期妇女断奶，可用芒硝外敷，以消肿块，并能回乳。此外，还有利胆作用，用于现代医学的胆囊炎、胆结石，常与郁金、枳壳、木香、川楝子等疏肝理气药同用。

本品因加工不同，而有朴硝、芒硝、元明粉之分，三者功用大致相同，但朴硝杂质较多，多作外用；芒硝质较纯，常作内服；元明粉质最精纯，并已脱水，成白色粉末，便于制散剂用，多作口腔病、眼病外用药。

【用量用法】10—15克，入药汁溶化后服。外用适量。

芦荟

〔原文〕大苦大寒。功专清热杀虫，凉肝明目，镇心除烦。治小儿惊痫五疳敷齿蠹湿癣，甘草末和敷。吹鼻杀脑疳(1)、除鼻痒。小儿脾胃虚寒作泻者勿服。出波斯国，木脂也。味苦色绿者真。

【讲解】(1)脑疳，疳疾的一种，指患儿头部生疮，或毛髮焦枯等局部病征。

芦荟以泻下为主要功效，并能清肝杀虫。为百合科多年生常绿肉质植物库拉索芦荟及好望角芦荟的汁液经浓缩的干燥物。研末，或作丸剂用。

本品极苦寒。入肝、大肠经。为苦寒泻下的润剂，又善清泄肝火，并能杀虫疗疳。常用于热结便秘，尤以肝经实热，目赤头胀兼便秘之证最为适宜。又用于小儿虫积疳热。惟气味恶浊，且有刺激性，量大易败胃，故脾胃虚寒，食少便溏者及孕妇忌用。

【临证应用】芦荟治便秘以热结便秘为宜。对兼见烦躁失眠者，常与安神之朱砂同用，如更衣丸。若与清肝火的龙胆草、栀子、青黛等配伍，如当归龙荟丸，可治大便秘结，头晕头痛，烦躁易怒，惊痫等肝经实热之证。与补气、健脾、驱虫的药物配伍，如肥儿丸，治疗虫积腹痛、面色萎黄、消瘦的小儿疳积证；此外，亦可外用治疗癣疮，取其杀虫之功。

【用量用法】 1-2克，宜入丸散，不作汤剂。外用适量，研敷患处。

第二节润下药

本类药多为植物种子或种仁，含丰富油脂，能润燥滑肠，使大便软化而易于排出。适用于年老体弱，久病产后等所致的血虚、阴虚肠燥便秘者。使用润下药时，应根据病情配伍其它药，以增强疗效。如热盛津伤的便秘，可配伍养阴药；血虚者，配补血药；气滞者，配行气药等等。

大麻仁

〔原文〕甘平滑利，脾胃大肠之药。缓脾润燥，治阳明病胃热汗多而便难。三者皆燥也，汗出愈多，则津枯而大便愈燥。仲景治脾约有麻仁丸。成无己曰：脾欲缓，急食甘以缓之。麻仁之甘，以缓脾润燥。张子和曰：诸燥皆三阳病。破积血，利小便，通乳催生。又木穀也，亦能治风。极难去壳，帛裹置沸汤，待冷，悬井中一夜，晒干，就新瓦上掇去壳，捣用。畏茯苓、白薇、牡蛎。

【讲解】大麻仁以润下为主要功效，有润燥滑肠，通便的作用。大麻仁，即火麻仁。为桑科一年生植物大麻的成熟果实。拣去杂质及残留外壳，取净仁，打碎用。

本品味甘性平，质润多脂。入脾、胃、大肠经。功能润滑肠道，为常用的润下通便药。常用于津枯肠燥，便秘之证。因兼有补益作用，故对老人体虚津枯及妇人血虚肠燥便秘，用之最为相宜。

【临证应用】用于老人，产妇及体弱肠燥便秘者，可与当归、地黄、杏仁等养血滋阴润燥之品同用，如益血润肠丸。若热邪伤阴，肠胃燥热，大便秘结或痔疮便秘，以及习惯性便秘等，可与大黄、枳实、厚朴、白芍、杏仁等同用，如麻子仁丸。

【用量用法】10-20克，煎服或入丸、散用。

郁李仁

〔原文〕辛苦而甘，入脾经气分。性降，下气行水，破血润燥。治水肿癰急(1)，大肠气滞，关格(2)不通。用酒能入胆，治悸，目张不眠。一妇因大恐而病，愈后目张不瞑。钱乙曰：目系内连肝胆，恐则气结，胆横不下。郁李润能散结，随酒入胆，结去胆下，而目瞑矣。然治标之剂，多服渗人津液。去皮、尖，蜜浸、研。

【讲解】(1)癰急：是指小便频数，点滴而下。(2)关格：指大小便不通。大便不通曰内关；小便不通曰外格；二便均不通曰关格。

郁李仁质润多脂，功专润肠通便。为蔷薇科落叶灌木欧李或郁李的成熟种子。去壳取仁，捣碎用。

本品辛苦性平。入大、小肠经。辛开苦降，甘润滑利，善导大、小肠的秘结，通利周身之水气，为宣散行气，除胀消积之品，但无滋养补虚之功。主治气滞肠燥，大便不通，以及水肿腹满，脚气浮肿兼小便不利之证，但服后令人津液耗损，燥结愈甚。故实证宜之，虚证慎用。孕妇忌服。

【临证应用】郁李仁润肠通便，功效类似麻仁而较强，常与杏仁、柏子仁、桃仁等同用，如五仁丸，以治肠燥便秘之证。用于浮肿脚气，可与大腹皮、薏苡仁、赤小豆等同用，以利水消肿。

【用量用法】5~10克，煎服。

海松子

〔原文〕甘温。润肺温胃，散水除风。治咳嗽松子一两，胡桃二两，炼蜜和服，治肺燥咳嗽。虚秘。同柏子仁、麻仁，溶蜡为丸，名三仁丸。出辽东、云南。松须五鬣。

【讲解】海松子功专润肺滑肠。为松科常绿乔木红松的种子，又名松子、松子仁。多产于东北、云南等地。

本品味甘性温，质润。入肺、大肠经。具有润肺滑肠之功。与柏子仁有相同功效，而滋润过之。然柏子仁能养心安神，此则以润滑为主，故多用于燥咳咯血，肠燥便秘，以及头目眩晕等证。

【临证应用】治肺燥咳嗽，常与胡桃仁同用。若配大麻仁、柏子仁等，可治老人虚秘。

【用量用法】5-10克，煎服，或入膏、丸用。

蜂蜜

〔原文〕草木精英，合露气以酿成。生性凉，能清热；熟性温，能补中。甘而和，故解毒；柔而滑，故润燥。甘缓可以去急，故止心腹肌肉疮疡诸痛；甘缓可以和中，故能调营卫，通三焦，除众病，和百药，故丸药多用之。而与甘草同功。止嗽治痢，解毒润肠，最治痢疾，姜汁和服甚佳。明目悦颜。同薤白捣，涂烫火伤，煎炼成胶，通大便秘。乘热纳谷道中，名蜜煎导。然能滑肠，泄泻与中满者忌用。以白如膏者良。汪颖曰：蜜以花为主，闽广蜜热，川蜜温，西蜜凉。安宣州有黄连蜜，味小苦，点目热良。西京有梨花蜜，色白如脂。用银石器，每蜜一斤，入水四两，桑火慢熬，掠出浮沫，至滴水成珠用。忌葱、鲜菖苳同食。昂按：生葱同蜜食杀人，而菖苳蜜渍点茶者颇多，未见作害，岂醺过则无患乎？抑药忌亦有不尽然者乎？

黄蜡，甘温。止痛生肌，疗下痢，蜜质柔性润，故滑肠胃；蜡质坚性涩，故止泻痢。**续绝伤**。按：蜜、蜡皆蜂所酿成，而蜜味至甘，蜡味至淡。故今人言无味者，谓之嚼蜡。

【讲解】蜂蜜善能润肺滑肠，并可缓急止痛。为蜂蜜科昆虫中华蜜蜂或意大利蜂在蜂巢内酿成的蜜糖。又名白蜜。原蜜加水稀释、煮沸，滤去杂质，再浓缩后药用。

本品味甘质润，生则性凉，熟则偏温。入肺、脾、大肠经。功能滑肠通便，润燥止咳。甘则补中缓急止痛，并能解毒。常用于肠燥便秘，肺燥干咳，胃脘疼痛，以及疮疡烫伤等证。本品虽有补益之功，但属润滑之品，多食能助湿，令人中满，且可滑肠，故有湿热痰滞，胸闷不舒及脾虚便溏者均不宜用。

【临证应用】蜂蜜用于肠燥便秘，除润肠外且能补益，故尤适用于体虚津亏之便秘，可单用30克，每天清晨空腹冲服。或微火炼浓，制成栓剂，纳入肛门内，如仲景蜜煎导法。用于肺虚久咳不止，或肺燥干咳、咽干等，可单用，每次一汤匙，每日两次，开水冲服。因其有润肺止咳作用，故止咳药常用蜜炙，以加强疗效。治脘腹疼痛，常与甘

草同用。与乌头配伍，如大乌头煎，以止寒疝腹痛，手足厥冷之证，既能缓急止痛，又能解乌头毒。

【用量用法】15-30克，冲服，或入丸，膏剂。外用适量。

蓖麻子

〔原文〕辛甘有毒。性善收，亦善走，能开通诸窍经络。治偏风不遂，**喝斜**捣饼左贴右，右贴左，即止。**口噤，鼻塞耳聋**，捣烂绵裹，塞耳塞鼻。**喉痹舌胀**；油作纸烧烟熏。**能利水气，治水臃浮肿**；研服，当下青黄水，壮人只可五粒。**能出有形滞物，治针刺入肉**，捣敷伤处，频看，刺出即去药，恐努出好肉。**竹木骨鲠**，蓖麻子一两，凝水石二两，研匀，以一捻置舌根，噙咽，自然不见。**胞胎不下**。蓖麻一粒，巴豆一粒，麝香一分，贴脐中并足心，胎下即去之。若子肠挺出者，捣膏涂顶心，即收。**能追脓拔毒，敷瘰癧恶疮，外用屡奏奇功**。鹤鹑油，能引药气入内；蓖麻油，能拔病气出外，故诸膏多用之。**然有热毒，气味颇近巴豆，内服不可轻率**。去皮，黄连水浸，每晨用清水吞一粒至三四粒，治大风疥癩。形如牛蛭，黄褐有斑。盐水煮，去皮研，或用油。忌铁。食蓖麻，一生不得食炒豆，犯之胀死。

【讲解】蓖麻子为消肿拔毒，泻下通滞之品。为大戟科一年生草本植物蓖麻的种子。外种皮平滑，有光泽，显淡红棕色相间的斑纹，气微弱，味油腻性。敲碎种子外壳，拣取种仁用。

本品味甘辛，性平，有毒。归大肠、肺经。具有消肿拔毒之功，可治痈疽肿毒，瘰癧喉痹，疥癣癩疮等证；又可泻下通滞，疗水肿腹满，大便燥结。《本草求真》云：性味颇类巴豆，既有收引拔毒之能，复有开窍通利之功。

【临证应用】蓖麻子去壳，和少量食盐、稀饭捣匀外敷，治疗疮脓肿。配蛤粉等分，研膏外涂，治汤火伤。配松香等药，拔毒疗疮，如千捶膏。蓖麻子尚有通络除痹的作用，故又可用治口眼喝斜，以仁捣烂，右斜贴左，左斜贴右。若取蓖麻子油15-30毫升服之，可起泻下作用，排出稀便。

此外，据报道，用蓖麻子仁捣烂做成膏剂，贴百会穴，可治现代医学的胃下垂及子宫下垂等证。

【用量用法】外用适量。很少内服。

第三节峻下逐水药

本类药均有毒，药性猛烈，能引起剧烈腹痛，有强烈的泻下作用，能使体内大量水分从肠道排出，部分药物还兼有利尿作用，适用于胸腹积水，水肿痰饮等证。

本类药物有毒而力峻，对体质虚弱者及孕妇应慎用或忌用。另外，在使用时必须注意炮制、剂量、用法及禁忌，以确保用药安全。

甘遂

〔原文〕苦寒有毒，能泻肾经及隧道水湿，直达水气所结之处，以攻决为用，为下水之圣药。仲景大陷胸汤用之。主十二种水，大腹肿满，名水臌。喻嘉言曰：胃为水穀之海，五脏六腑之源。脾不能散胃之水精于肺，而病于中；肺不能通胃之水道于膀胱，而病于上；肾不能司胃之关，时其输泄，而病于下。以致积水浸淫，无所底止。肾者，胃之关也。前阴利水，后阴利穀。王好古曰：水者，脾、肺、肾三经所主。有五脏六腑、十二经之部分，上头面，中四肢，下腰脚，外皮肤，中肌肉，内筋骨。脉有尺寸之殊，浮沉之别，不可轻泻，当知病在何经何脏，方可用之。按水肿有痰裹、食积、瘀血，致清不升浊不降而成者；有湿热相生，隧道阻塞而成者；有燥热冲击，秘结不通而成者，证属有余；有服寒凉伤饮食，中气虚衰而成者，有大病后正气衰惫而成者，有小便不通，水液妄行，脾莫能制而成者，证属不足。宜分别治之，然其源多由中气不足而起。丹溪曰：水病当以健脾为主，使脾实而气运，则水自行。宜参、苓为君，视所挟证加减，苟徒用利水药，多致不救。瘕痞积聚，留饮宿食，痰迷癫痫。虚者忌用。皮赤肉白，根作连珠，重实者良。面裹煨熟用。或用甘草、莽苈汁浸三日，其水如墨，以清为度，再面裹煨。瓜蒂为使，恶远志，反甘草。仲景治心下留饮，与甘草同用，取其相反以立功也。有治水肿及肿毒者，以甘遂末敷肿处，浓煎甘草汤服之，其肿立消。二物相反，感应如此。

【讲解】甘遂为泻水逐饮之峻药。为大戟科多年生草本植物甘遂的块根。根呈连珠状纺锤形，外表棕褐色，除去外皮为白色。晒干，醋制过用。

本品味苦性寒，有毒。入肺、肾、大肠经。泄降除热，性善走泄下行，为泻水逐饮之峻药。甘遂既可用于痰饮内停，胸腹积水，又可用于水溢肌表之肿胀。外用还有消肿散结之功，可治一切肿毒之证。此外，取其驱逐痰涎之功，可治风痰癫痫。

【临证应用】甘遂泻水之力颇峻，服后可致连续泻下，使潴留之水饮排出体外。治身面浮肿，大腹肿满，及胸胁积液，可单味应用，或配大黄、芒硝，如大陷胸汤；亦可配大戟、芫花等同用，并常以大枣煎汤送服，以保护脾胃，减少反应，如十枣汤。现有用甘遂配大黄、厚

朴、桃仁等同用，如甘遂通结汤，治疗现代医学之重证肠梗阻、肠腔积液较多者，有一定疗效。

本品研末水调外敷，可治痈肿疮毒。但因毒性较大，无论内服、外用、均宜审慎，故虚弱者及孕妇忌用。

甘遂生用泻下力强，毒性也大，只可外用。经醋制后，毒性和泻下作用都相应减少，方可内服。因其有效成分不溶于水，宜入丸、散剂，不作煎剂。本药反甘草。

【用量用法】0.5—1克，入丸散剂，不作煎剂。《备要》言面裹煨熟用，传统有用面皮包裹，置火中煨至面皮焦黑为度的制法，借以减缓毒性。现多加麦麸同炒至焦黄色，去麸切片入药，称煨甘遂，但仍以醋拌炒为常用。外用适量。

大戟

〔原文〕苦寒有毒。能泻脏腑水湿，行血发汗，利大小便。治十二种水(1)，腹满急痛，积聚癥瘕，颈腋痈肿，风毒脚肿。通经堕胎。误服损真气。时珍曰：痰涎为物，随气升降，无处不到。入心则迷，成癫痫；入肺则塞窍，为咳喘背冷；入肝则胁痛干呕，寒热往来；入经络则麻痹疼痛；入筋骨则牵引隐痛；入皮肉则瘰癧痈肿。陈无择并以控涎丹主之，殊有奇效。此乃治痰之本。痰之本，水也，湿也。得气与火，则结为痰。大戟能泄脏腑水湿。甘遂能行经络水湿，白芥子能散皮里膜外痰气，惟善用者能收奇功也。又曰：钱仲阳谓肾为真水，有补无泻。复云痘证变黑归肾者，用百祥膏下之，非泻肾也。泻其腑，则脏自不实。腑者，膀胱也。百祥为大戟一味，能行膀胱之水故也。窃谓非独泻腑，乃肾邪实而泻肝也。实则泻其子，大戟浸水青绿，肝胆之色也。痘证毒盛火炽，则水益涸，风挟火势，则土受亏，故津液内竭，不能化脓，而成黑陷之证。泻其风火之毒，所以救肾扶脾也。昂按：泻心乃所以补心，泻肾即所以救肾，邪热退，则真阴复矣。《机要》用大戟一两，枣三枚，同煮焙干，去戟，用枣丸服，名枣变百祥丸。杭产紫者为上，北产白者伤上。浆水煮，去骨用。得大枣则不损脾。畏菖蒲，反甘草。

【讲解】(1)十二种水：是指十二脏腑之水，即多种水病。《金匱要略》分为风水、皮水、正水、石水、黄汗五水。又：五脏证候分“五水”，但临床上一分为“阴水”、“阳水”两大类。

大戟以泻水逐饮为主要功效。为大戟科多年生草本植物大戟，或茜草科多年生草本植物红芽大戟的根。前者又称京大戟，后者则又称红大戟。《备要》中所载的为京大戟，但目前使用最广的为红芽大戟。醋制过用。

本品苦寒有毒。入肺、肾、大肠。性善行而下泄，故能通利二便。其泻水逐饮之功，与甘遂相似，可用于水肿胀满，胸腹积水等证，并可攻毒消肿，用治疮疡肿毒。本品系逐水峻剂，易损真气。

【临证应用】大戟逐水作用与甘遂相似，而力稍逊。用于重证的水肿胀满，胸腹积水，可单用，或与甘遂、芫花同用，如十枣汤、舟车丸。治痰饮停滞胸膈所致的胸满胁痛，可与甘遂、白芥子同用以祛痰逐饮，如控涎丹。

借本品消肿散结之功，可治热毒痈肿，多作外敷。

此外，京大戟与红大戟虽俱有泻水作用，然京大戟的泻下作用比红大戟强。一般泻水逐饮常用京大戟，而消肿解毒多用红大戟。

【用量用法】1.5—8克；散剂每次0.5—1克。须醋煮或醋炒以减毒。孕妇忌用，体弱者慎用。反甘草。

芫花

〔原文〕苦寒有毒，去水饮痰癖(1)，疗五水(2)在五脏，皮肤胀满，喘急，痛引胸胁，咳嗽瘴疟。五水者，风水、皮水、正水、石水、黄汗也。水积胸中，坚满如石，名石水；汗如柏汁，名黄汗。久不愈，必致痈脓。时珍曰：仲景治伤寒太阳证，表未解，心下有水而咳，干呕发热，或喘或利者，小青龙汤主之；表已解，有时头痛，汗出恶寒，心下有水，干呕，痛引两胁，或喘或嗽者，十枣汤主之。盖青龙散表邪，使水从汗出，《内经》所谓开鬼门也；十枣逐里邪，使水从二便出，《内经》所谓洁净府，去陈莖法也。十枣汤：芫花、甘遂、大戟等分，枣十枚。叶似柳，二月开花紫碧色，叶生花落。陈久者良。醋煮过，水浸曝用。根疗疥，可毒鱼。反甘草。斗讼者，取叶擦皮肤，辄作赤肿，假伤以诬人。

【讲解】(1)痰癖：病名。指水饮久停为痰，流移胁肋之间，以致时有胁痛的病证。(2)五水：一般为皮水、风水、正水、石水、黄汗。这里指的是按五脏证候而分的心水、肝水、肺水、脾水、肾水。

芫花泻水逐饮，尤善于泻身半以上胸胁之水。为瑞香科落叶灌木植物芫花的花蕾。叶似柳对生，呈椭圆形或长椭圆形，花先叶而开，淡紫色。醋炒用。

本品苦辛气温，有毒。入肺、肾、大肠经。苦泄逐水，辛宣祛痰，泻水逐饮之功与甘遂、大戟相似，但花性轻扬，故以泻身半以上胸胁之水为专长，多用于痰饮喘咳，痛引胸胁，及腹水胀满之证。

【临证应用】芫花用于身面浮肿，大腹水肿，胸胁积液，常与甘遂、大戟等合用；研末外敷有杀虫疗疮作用，可治头疮疥癣。以其毒大性猛，非元气充实者不可轻用。

此外，芫花根也可入药，可治水肿痈肿。其性亦毒，故《备要》书言可毒鱼。

【用量用法】1.5—3克；入丸散剂，每次0.5—1克。切勿过剂，用时须以醋煮或醋炒，以减低毒性。宜以陈久者用之。孕妇忌服。反甘草。

堇花

〔原文〕辛散结，苦泄热。行水捷药，主治略同芫花。

【讲解】堇花功用与芫花相同。为瑞香科植物堇花的花蕾。醋炒用。

本品苦辛而温，有毒。入肺、肾、大肠经。以其辛散、苦泄，能泻水，破积聚。故主治水腫痰飲，咳逆上氣等證。堇花來源亦為瑞香科植物，功效和主治二藥基本相同，現臨床主要用芫花，本品較少應用。

【用量用法】1—3克，煎湯或入丸劑。孕婦忌用。

巴豆

〔原文〕辛热有大毒。生猛而熟少缓。可升可降，能止能行，开窍宣滞，去脏腑沉寒，最为斩关夺门之将。破痰癖血痕(1)，气痞食积，生冷硬物所伤，大腹水肿，泻痢惊痫，口喎(2)耳聋，牙痛喉痹(3)。缠喉急痹，缓治则死。用解毒丸：雄黄一两，郁金一钱，巴豆十四粒去皮油，为丸。每服五分，津咽下。雄黄破结气，郁金散恶血，巴豆下稠涎。然系厉剂，不可轻用。或用纸捻蘸巴豆油燃火刺喉，或捣巴豆绵裹，随左右纳鼻中，吐出恶涎紫血即宽。鼻虽小、生疮无碍。其毒性又能解毒杀虫，疗疮疡蛇蝎诸毒。峻用大可劫病，微用亦可和中，通经烂胎。巴豆禀火烈之气，烂人肌肉。试以少许擦皮肤，即发一泡，况肠胃耶，不可轻用。王好古曰：去心皮膜油生用，为急治水穀道路之剂。炒去烟令紫黑用，为缓治消坚磨积之剂。可以通肠，可以止泻，世所不知也。时珍曰：一妇年六十余，溏泻五载，犯生冷、油腻肉食即作痛，服升涩药，泻反甚，脉沉而滑，此乃脾胃久伤，积冷凝滞，法当以热下之。用蜡匮巴豆丸五十粒，服二日，不利而愈。自是每用治泻痢，愈者近百人。一名刚子。雷敩曰：紧小色黄者为巴，三棱色黑者为豆，小而两头尖者为刚子。刚子杀人。时珍曰：此说殊乖，盖紧小者为雌，有棱及两头尖者是雄，雄者更峻耳。用之得宜，皆有功力。不去膜则伤胃，不去心则作呕，藏器法连白膜服。或用壳、用仁、用油，生用、炒用、醋煮烧存性用。研去油，名巴豆霜。芫花为使，畏大黄、黄连、凉水。中其毒者，以此解之，或黑豆、绿豆汁亦佳。得火良。

巴豆油，作纸捻燃火，吹息，或薰鼻或刺喉，能行恶涎恶血，治中风中恶(4)，痰厥(5)气厥(6)，喉痹不通，一切急病，大黄、巴豆，同为峻下之剂，但大黄性寒，腑病多热者宜之；巴豆性热，脏病多寒者宜之。故仲景治伤寒传里多热者，多用大黄；东垣治五积属脏者，多用巴豆。与大黄同服，反不泻人。

【讲解】(1)血痕：属于妇女癥瘕一类疾病，少腹有积气或包块疼痛。(2)口喎：指口角歪斜的证状。(3)喉痹：病名。为咽喉肿痛病证的统称。痹，闭塞不通之意。是咽喉局部气血瘀滞痹阻的病理变化。凡咽喉肿痛诸病，感到阻塞。不利，吞咽不顺，甚至吞咽难下的，均属喉痹范围。(4)中恶：病名。古人指中邪恶不正之气及怪异鬼祟而病者。(5)痰厥：厥证之一。指因痰盛气闭而引起的昏厥。(6)气厥：指因气机逆乱而引起的昏厥。

巴豆辛热大毒，为热性峻泻药，善泻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽。为大戟科乔木植物巴豆的成熟种子。别名江子、刚子。用仁或制霜用。巴豆仁，是将巴豆用粘稠米汤或面汤浸拌，置日光下曝晒或烘裂，去皮，取净仁，炒至焦黑用；巴豆霜，是取净巴豆仁碾碎，用多层吸油纸包裹加热微烘，压榨去油后碾细，过筛。

本品味辛、性热，有大毒。入胃、大肠、肺经。味辛可散结聚之邪；性热可祛寒凝之积，能荡涤肠胃沉寒痼冷、宿食积滞，为热性峻泻药。推荡脏腑，开通闭塞，故前人喻其有“斩关夺门之功”。适用于寒积腹痛，大便秘结，而病情急剧，气血未衰者。取巴豆之强烈泻下作用，以消腹水，用于大腹水肿者。巴豆祛痰作用甚强，能祛除痰涎，以利呼吸，用于喉痹，痰涎壅塞气道，呼吸急促，甚至窒息欲死者。此外，巴豆局部外用，可促使痈肿溃破及蚀疮，治痈肿脓成未溃及疥癣恶疮等证。

巴豆壳为巴豆的种皮，性同巴豆，而力稍缓，亦可入药。

巴豆油为巴豆种仁中所含脂肪油，性同巴豆，然泻下力尤为峻猛，口服半滴到一滴，1—2小时即能多次发生大量水泻。尚可用治中风痰厥，气厥中恶，喉痹及一切急证，咽喉不通，牙关紧闭。《本草纲目》云：以研烂巴豆绵纸包，压取油作捻，点灯吹灭，熏鼻中，或用热烟刺入鼻内，即时出涎或恶血便苏。但能导致严重的口腔刺激证状及胃肠炎，引起口腔粘膜烧灼感，乃至起泡糜烂，及峻泻，并伴有剧烈腹痛。

本品得热则助泻，得冷则泻止，如服后欲泻不泻者，可进热粥以助药力。若泻下不止，速进冷粥或冷开水以解药效；中毒而腹痛大泻不止者，急用黄连或绿豆煎汤以解之。

【临证应用】巴豆配大黄、干姜，如三物备急丸，用治冷食积滞、腹痛便秘之证。巴豆霜与绛矾配伍，名含巴绛矾丸，治疗晚期血吸虫病的腹水证。巴豆配伍桔梗、贝母，用于肺痈，咳嗽胸痛、痰多腥臭之证。若配伍乳香、没药等制成膏药外贴患处，可用于疮疡脓成而未溃者。

此外，以巴豆霜与神曲、胆南星、朱砂同用，即万应保赤散，治小儿乳食停积，痰多惊悸，胃呆腹痛，大便酸臭等证。

【用量用法】大多制成巴豆霜用，以减低毒性。内服0.1—0.3克，不入煎剂，多配入丸、散剂用。巴豆毒性较大，泻下峻猛，故体虚者及孕妇均当忌用。畏牵牛。

牵牛子

〔原文〕辛热有毒，属火善走。入肺经，泻气分之湿热，肺主气，火能平金而泻肺。能达右肾命门，走精隧，通下焦郁遏，及大肠风秘(1)气秘(2)，利大小便，逐水消痰，杀虫堕胎。治水肿喘满，痃癖(3)气块。若湿热在血分，胃弱气虚人禁用东垣曰：牵牛苦寒误矣。其味辛辣，久嚼猛烈雄壮，所谓苦寒安在哉，乃泻气之药，比诸辛药泄气尤甚。若湿从下受，下焦主血，血中之湿，宜苦寒之味，而反用辛热之药，泄上焦之气，是血病泻气，使气血俱损也，王好古曰：以气药引，则入气；以大黄引，则入血。时珍曰：一妇肠结，年几六十，服养血润燥药，则泥结，服硝黄药，则若罔知，如此三十余年。其人体肥膏粱而多郁，日吐酸痰乃宽。此乃三焦气滞，有升无降，津液皆化为痰，不能下润肠腑，非血燥也。润剂留滞，硝黄入血，不能入气，故无效。用牵牛为末，皂角膏丸，才服便通。外甥素多酒色病，二便不通，胀痛呻吟七昼夜，用通利药不效。予言此乃湿热之邪在精道，隧路壅塞，病在二阴之间，故前阻小便，后阻大便，病不在大肠膀胱也。用楝实、茴香、穿山甲诸药，倍牵牛，三服而平。东垣补下焦阳虚，天真丹用牵牛盐水炒黑，佐沉香、杜仲、肉桂、破故纸诸药，深得补泻兼施之妙，有黑白二种，黑者亦名黑丑。力速。取子淘去浮者，舂去皮用。得木香、干姜良。此药汉前未入本草，故仲景方中无此。《别录》始载之，宋后始多用者。

【讲解】(1)风秘：由于风搏肺脏，传于大肠，津液干燥所致的大便秘结。(2)气秘：因气滞或气虚所致的便秘，这里指前者。(3)痃癖：古病名。与积聚相类，是脐腹部或胁腹部患有癖块的泛称。

牵牛子功能泻下逐水，去积杀虫。为旋花科一年生攀缘草本植物裂叶牵牛或圆叶牵牛的成熟种子。有黑白两种，表面灰黑色者称黑丑，淡黄色者为白丑。同等入药，两种混合使用，名二丑。生用或炒用。

本品苦寒，有毒。性降下行，通泻之力甚强。归肺、肾、大肠经。入肺可祛痰逐饮，入肠可泻下通便，入肾可行水利尿。适用于水肿胀满，湿热积滞，二便不利等证，兼能杀虫，以治虫积腹痛。然其泻力甚强，若非体壮邪实者，不可轻用。

【临证应用】牵牛子泻水利尿，使水湿从二便排除，其逐水力虽较甘遂、大戟、芫花稍缓，但仍属峻下之品，水肿痰饮，正气未衰者适

宜，可单用或入复方应用。如《千金方》单用牵牛为末服，治水肿尿涩；《儒门事亲》禹功散，以本品配茴香，治诸水饮病。借本品苦寒泻下之功，治湿热积滞之便秘甚效。如《简易方》以牵牛研末，姜汤送服，治大便不通；《本草衍义》以此配桃仁，研末，蜜丸服，治大肠便秘。

此外，牵牛尚有驱杀蛔虫的作用，并可借其泻下作用排除虫体，常配槟榔同用，如牛榔丸，治蛔虫腹痛。

【用量用法】3—10克，打碎煎服；入散剂1.5—3克。生用力猛，炒后辛毒走泄之性略减，利水通便作用缓和。孕妇及体虚者忌用。

商陆

〔原文〕苦寒有毒，诸家辛酸，时珍苦寒。沉阴下行，与大戟、甘遂同功。疗水肿胀满，肿属脾，胀属肝。肿则阳气犹行，如单胀而不肿者名臌胀，为木横克土，难治。肿胀朝宽暮急为血虚；朝暮俱急，为气血两虚。肿胀由心腹而散四肢者吉；由四肢而入心腹者危。男自下而上，女自上而下，皆难治。瘕疝痈肿，喉痹不通，薄切醋炒，涂喉中良。湿热之病。泻蛊毒，敷恶疮，堕胎孕，令人见鬼神。取花白者良。赤者伤人，只堪贴脐，入麝三分捣贴，小便利则肿消。黑豆汤浸蒸用。得蒜良。

【讲解】商陆功专泻下逐水。为商陆科多年生草本植物商陆的根。切片、晒干，醋制用。

本品味苦性寒，有毒。入肺、肾、大肠三经。苦寒沉降，其性下行，既能峻泻通便，又可降泄利尿。适用于水肿胀满，二便不通的实证。逐水消肿之力逊于甘遂、大戟、芫花，但亦有毒，内服用量过大，亦可引起中毒。外用还有解毒消肿之效。

【临证应用】商陆用于水肿胀满，小便不利，可配槟榔、椒目、茯苓等利水行气药同用，如疏凿饮子。古方有用商陆煮粥，或与鲤鱼一起煮食治水肿的方法。外敷疮痈更少应用。

【用量用法】5—10克，煎服。内服须经醋制，以减其毒性。外用适量。体虚及孕妇忌用。

续随子

〔原文〕辛温有毒，行水破血。治癥瘕痰饮，冷气胀满，蛊毒鬼疰(1)。利大小肠，下恶滞物，涂疥癣疮。玉枢丹用之，治百病多效。《经疏》曰：乃以毒治毒之功。去壳，取色白者压去油用。时珍曰：续随子、大戟、泽漆、甘遂，茎叶相似，主疗亦相似，长于利水，用之得法，皆要药也。

〔讲解〕(1)鬼疰：即癆瘵。是指具有传染性的慢性消耗性疾病。如现代医学之结核病。

续随子以逐水退肿为主要功效。为大戟科二年生草本植物续随子的成熟种子。又名千金子。用时去壳取仁，碾碎，置蒸器内蒸透，用吸油纸包裹压去油，即成续随子霜。

本品味辛性温，有毒。入肝、肾、大肠经。其泻下逐水作用甚为峻烈，且能利尿，宜于水肿腹满，二便不利之实证。本品能破瘀血，消癥瘕，通月经，用于癥瘕经闭，瘀滞之证。此外，外用可治顽癣，赘疣以及毒蛇咬伤。

【临证应用】续随子用于水肿腹胀可单用，或配大黄末，酒水为丸服，可泻下逐水以消水肿。《圣济总录》续随子丸，以本品配轻粉、青黛为末，糯米饮粘合为丸，用治癥瘕。治瘀滞经闭，可与其他活血调经药同用。外用敷治顽癣、疥疮。

【用量用法】1—2克，制霜入丸散用。外用适量。体虚者及孕妇忌用。

泽漆

〔原文〕辛苦微寒。消痰退热，止嗽杀虫，利大小肠。治大腹水肿，益丈夫阴气。生平泽，叶圆黄绿，颇似猫睛，一名猫儿眼睛草，茎中有白汁粘人。时珍曰：《别录》云是大戟苗，非也。功相类耳。

【讲解】泽漆利水消肿，功类大戟。为大戟科二年生草本植物泽漆的全草。山沟、路边、湿地皆可生长，叶倒卵形，色黄绿，颇似猫睛，故又名猫儿眼睛草。茎中有白汁可粘人。晒干，生用。

本品辛苦微寒有毒。入大肠、小肠、肺经。功能利水消肿，清肺化痰，止咳平喘，兼能杀虫。主水肿胀满，痰饮咳喘及瘰癧等证。至于益丈夫阴气之说，当是《本草述》所言，水者，阴气也，邪水之阴，非真阴也。行水之品岂有不伤阴者？故体虚者慎用。

【临证应用】泽漆苦寒泄降，利水消肿作用较强，主治四肢面目浮肿或大腹水肿。可配白术、茯苓、泽泻等健脾利水药同用。与半夏、紫菀、桂枝等同用，如泽漆汤，治痰饮咳喘。借其化痰散结之功，用于瘰癧结核亦效，常以之熬膏，内服外用治颈淋巴结核，效果良好。现有以之配黄药子等治淋巴肉瘤者，供参考。

【用量用法】5—10克。制膏可供内服或外用。

小结

本章药物分攻下药、润下药、峻下逐水药三类。

攻下药，作用较猛，能起荡涤肠胃的作用，适用于正气不虚的里实证，若邪实正虚者，当与补益药配伍而攻补兼施为宜。

其中大黄，苦寒攻下，具有泻热通便，泻火解毒，凉血祛瘀之功，凡肠胃实热，血分热毒所致之证皆可应用。芒硝咸寒，有润燥软坚作用，能使肠中燥屎软化，而易于排出。若与大黄同用，则泻下之力更强。芦荟除有通便泻下作用外，还能清肝杀虫。凡肝经实火伴大便秘结，或小儿虫疳，目赤头痛皆可应用。

润下药作用和缓，以润肠缓下为主，适用于体虚肠燥便秘者。火麻仁、郁李仁都是植物种仁，含丰富油脂，可润燥滑肠。两者比较，火麻仁润下缓，兼能滋养补虚，多用于虚证；郁李仁润下力较强，兼能利水消肿，用于实证为宜。蜂蜜可以润肠通便，润肺止咳，滋养补虚，既可应用于肠燥便秘，还能用于虚证的补益和虚劳咳嗽等证。

峻下逐水药作用较猛，并有毒性，服后能引起剧烈腹泻，排出大量水分，应用于水肿胀满，痰饮积聚等重证、实证。甘遂、大戟、芫花三药毒性猛烈，通利二便的作用基本相同，治水肿胀满、痰饮等实证可暂用，不能久服。牵牛子不仅逐水，还能驱虫，消除宿食停滞。商陆功用与甘遂、大戟、芫花相同，唯力稍逊。巴豆性味辛热，专攻下寒积，逐水消肿，非冷积、大腹水肿之实证，不得轻用，只入丸散，不入煎剂。薤花功同芫花，临床少用。续随子功效与巴豆相似，而力稍逊，以制霜用多。泽漆逐水消肿，药力最缓，兼能散结，可治瘰癧。

复习思考题

- 1、试述泻下药的定义、功效、适应证和注意事项。
- 2、攻下药、润下药，峻下逐水药的性能各有何特点？
- 3、阐明大黄、芒硝、甘遂、巴豆的功效和适应证。

4、分析比较大黄与芒硝、火麻仁与郁李仁、大戟与牵牛子的相同点和不同点。

5、应用大黄、芒硝、甘遂、大戟、巴豆时必须注意哪些问题？

泻下药功用归纳简表

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
攻下药	大黄	苦、寒	脾、胃、 、大肠、肝、心	泻下攻积，清热泻火，解毒，活血祛瘀	①热结便秘及热痢初起 ②血热妄行的吐血、衄血 ③热毒疮疡 ④瘀血证 ⑤湿热黄疸	3—12克外用适量	泻下宜生用，不宜久煎酒制活血，止血炒炭孕妇慎用

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	芒硝	咸、苦、寒	胃、大肠、胃	泻下、软坚、清热	①实热燥结 ②咽痛、□疮、目赤、疮疡	10—15克	孕妇忌用。入汤剂烊化
	芦荟	苦、寒	肝、大肠	泻下	①热结便秘 ②小儿疳积	1—2克外用适量	不入汤剂

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
润下药	火麻仁	甘、平	脾、大肠、胃	润肠通便	肠燥便秘	10—15克	
	郁李仁	，辛、苦、平	大肠、小肠	润肠通便 利水消肿	①肠燥便秘 ⑧水肿	3—10克	
	蜂蜜	甘、平	肺、脾、大肠	润肠通便 润肺止咳 补中缓急	①肠燥便秘 ②肺燥干咳及虚劳久咳 ③脾胃虚弱证	15—30克	冲服，或入丸膏。外用解毒疗疮
	蓖麻子	辛、甘、平、有毒	大肠、肺	泻下通滞，消肿	①便秘 ②疗疮肿毒	多作外用	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
峻下逐水药	甘遂	苦、寒、有毒	肺，肾、大肠	泻水逐饮 消肿散结	①水肿，胸腹积液 ②痈肿疮毒	0.5—1克	入丸、散剂服，不作煎剂。醋制可减毒孕妇忌用。反甘草
	大戟	苦、寒、有毒	肺、肾、大肠	泻水逐饮， 消肿散结	①水肿，胸腹积液②疮疡肿毒	1.5—3克，散剂用 0.5—1克	醋制用，反甘草孕妇忌用

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
峻下逐水药	芫花	苦、辛、温、有毒	肺、肾、大肠	泻水逐饮	水肿，胸腹积液	1.5—3克 入散剂用0.5-1克	反甘草 孕妇忌用

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	茺花	苦、辛、寒有毒	肺、肾、大肠	泻水逐饮，功似芫花	水肿，痰饮	1—3克	孕妇忌用 临床少用
	巴豆	辛、热、有大毒	胃、大肠、肺	泻下冷积，逐水退肿，祛痰利咽，蚀疮	①寒积便秘 ②水肿胀满 ③喉痹 ④疮疡脓成未溃者	制霜用：0.1—0.3克，多入丸散	畏牵牛 孕妇忌用 一名江子
	牵牛子	苦、寒、有毒	肺、肾、大肠	泻下逐水，去积，杀虫	①水肿，胸腹积液 ②大便秘	3—10克 入散剂用1.5—3克	孕妇忌用

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
					结 ③虫积腹痛		
	商陆	苦、寒、有毒	肺、肾、大肠	泻下利水，消肿散结	①水肿，小便不利 ②痈肿	5—10克 外用适量	孕妇忌用
	续随子	辛、温、有毒	肝、肾、大肠	逐水退肿，破血消癥	①水肿，二便不利 ②癥瘕，经闭	1—2克 制霜入丸散用	孕妇忌用 又名千金子
	泽漆	辛、苦、微寒、有毒	大肠、小肠、肺	利水消肿，化痰，散结	①水肿 ②痰饮喘咳 ③瘰癧	5—10克	

第三章清热药

- 第三章清热药

〔自学时数〕16学时

〔面授时数〕4学时

〔目的要求〕

1. 了解清热药的含义、功效、分类、适用证。
2. 熟悉清热泻火药的共同功用。
3. 掌握清热泻火药中常用药（石膏 知母 栀子 夏枯草 芦根）的功效、临证应用，并比较其异同。
4. 熟悉清热燥湿药的共同功用。
5. 掌握清热燥湿药中常用药（黄芩 黄连 黄柏 龙胆草）的功效、临证应用，并比较其异同。
6. 熟悉清热凉血药的共同功用。
7. 掌握清热凉血药中常用药（犀角 生地黄 玄参 牡丹皮）的功效、临证应用，并比较其异同。
8. 熟悉清热解毒药的共同功用。
9. 掌握清热解毒药中常用药（金银花 连翘 大青叶 牛黄 鱼腥草 土茯苓 败酱草 射干 马齿苋）的功效、临证应用，并比较其异同。
10. 掌握清虚热药中常用药（青蒿 白薇 地骨皮 胡黄连）的功效、临证应用，并比较其异同。
11. 熟悉清热泻火、清热解毒、清热凉血、清热燥湿、清热生津、清虚热的概念。
12. 了解寒凉伤阳、苦寒败胃、苦燥伤津、甘寒助湿的含义。
13. 在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡以清解里热为主要作用的药物，称之为清热药。清热药多属寒凉之性，具有清热泻火，凉血解毒及退虚热等功效。主要应用于热病、热痢、痈肿疮毒、咽喉肿痛、目赤肿痛及阴虚内热等里热证。应用清热药时，首先应辨明热证属气属血，属虚属实，在脏在腑来决定用药的

主次和先后。如兼有表证，应先解表或表里同治；气分热兼血分热者，宜气血两清。本类药性多寒凉，易伤阳气，故阳气不足，脾胃虚弱者应慎用。使用时，亦要注意中病即止，避免克伐太过，损伤正气。

清热药数量颇多，虽都具有清解里热的作用，按其药物各自的特点，有的以泻火为主，有的以解毒为主等，又可分为清热泻火药，清热燥湿药，清热凉血药，清热解毒药，退虚热药五类。只有了解清热药的共性，又掌握他们的特点，才能有选择性的用药，以加强疗效。

第一节 清热泻火药

热为火之渐，火为热之极，火热二者只是程度上的不同，清热的药物，大抵皆能泻火。

清热泻火药的主要功用，一是清解气分实热，用于高热烦渴，神昏谵语，小便短赤，舌苔黄燥，脉象洪实等里热炽盛之证；一是泻脏腑之火热，如清心热、肝热、肺热等，用时应加以区别。

石膏

〔原文〕甘辛而淡，体重而降，足阳明经胃。大寒之药。色白入肺，兼入三焦。诸经气分之药。寒能清热降火，辛能发汗解肌，甘能缓脾益气，生津止渴。治伤寒郁结无汗，阳明头痛，发热恶寒，日晡潮热（1），肌肉壮热，经曰：阳盛生外热。小便赤浊，大渴引饮，中暑自汗，能发汗，又能止自汗。舌焦，胎厚无津。牙痛。阳明经热，为末擦牙固齿。又胃主肌肉，肺主皮毛，为发斑发疹之要品。色赤如锦纹者为斑，隐隐见红点者为疹，斑重而疹轻。率由胃热，然亦有阴阳二证，阳证宜用石膏。又有内伤阴证见斑疹者，微红而稀少，此胃气极虚，逼其无根之火游行于外，当补益气血，使中有主，则气不外游，血不外散，若作热治，死生反掌，医者宜审。但用之甚少，则难见功。白虎汤以之为君，或自一两加至四两，竹叶、麦冬、知母、粳米，亦加四倍。甚者加芩、连、柏，名三黄石膏汤。虚者加人参，名人参白虎汤，然能寒胃，胃弱血虚及病邪未入阳明者禁用。成无己解大青龙汤曰，风，阳邪伤卫；寒，阴邪伤营。营卫阴阳俱伤，则非轻剂所能独散，必须重轻之剂同散之，乃得阴阳之邪俱去，营卫俱和，石膏乃重剂，而又专达肌表也。质重气轻，又成氏以桂、麻为轻剂，石膏为重剂也。东垣曰：石膏足阳明药，仲景用治伤寒阳明证，身热、目痛、鼻干、不得卧，邪在阳明，肺受火制，故用辛寒以清肺气，所以有白虎之名，肺主西方也。按阳明主肌肉，故身热；脉交额中，故目痛；脉起于鼻，循鼻外，金燥，故鼻干；胃不和，则卧不安，故不得卧。然亦有阴虚发热，及脾胃虚劳，伤寒阴盛格阳、内寒外热、类白虎汤证，误投之不可救也。按阴盛格阳、阳盛格阴二证，至为难辨。盖阴盛极而格阳于外，外热而内寒；阳盛极而格阴于外，外冷而内热。经所谓重阴必阳，重阳必阴，重寒则热，重热则寒是也。当于小便分之，便清者，外虽燥热，而中实寒；便赤者，外虽厥冷，而内实热也。再看口中之燥润及舌苔之浅深，苔黄黑者为热，宜白虎汤。然亦有舌黑属寒者，舌无芒刺，口有津液也，急宜温之，误投寒剂即死矣。亦名寒水石，时珍曰：古方所用寒水石是凝水石。唐家诸方用寒水石即石膏。凝水石乃盐精渗入土中，年久结成，清莹有棱，入水即化。辛咸大寒，治时气热盛，口渴水肿。莹白者良。研细，甘草水飞用。近人因其寒，或用火煨，则不伤胃，味淡难出。若入煎剂，须先煮数十沸。鸡子为使，忌巴豆、铁。

【讲解】（1）日晡潮热：指下午3～5时左右发热，或热度增高。

石膏功专清解，内清肺胃之火，外解肌肤之热。为单斜晶系含水硫酸钙矿石。除去杂质碾碎，研细。生用或煅用。

本品辛甘大寒。入肺、胃二经。味辛能散，大寒清热，外能解肌肤之热，内能清肺胃之火，于清热泻火中而具热退津生之意，除烦止渴之能，故为清解肺胃气分实热之要药。凡温病邪在气分，壮热烦渴，脉洪大等实热亢盛之证。及邪热深入，波及营血，壮热不退而发斑疹之气血两燔，或肺热喘咳，或胃火上炎的头痛、牙痛和齿龈肿痛等证，皆为主药，正如《本草经疏》所载：甄权用以治伤寒头痛如裂，壮热如火；东垣用以治胃热肺热，散阳邪，缓脾益气者，邪热去则脾得缓而无气回也；洁古又谓止阳明经头痛，发热恶寒，口晡潮热，大渴引饮，中暑及牙痛者，无非邪在阳明经所生病也，理阳明而蔑不济矣。足阳明主肌肉，手太阴主皮毛，故又为发斑、发疹之要品。然系大寒之品，非实热证者不宜用，脾胃虚寒及阴虚内热者忌服。

【临证应用】 石膏具有较强的清热泻火作用。凡急性热病，邪在气分，壮热烦躁、口渴引饮，汗出、脉洪大，甚至神昏谵语者，常与知母相须为用，以加强疗效，如白虎汤。若热毒雍盛，发斑发疹，色紫暗者，可于白虎汤中加入凉血解毒药犀角、玄参同用，共奏清热化斑之功，如化斑汤。用于肺热实喘、咳嗽痰稠，心烦口渴者，常与麻黄、杏仁配伍，以清宣肺热、止咳平喘，如麻杏石甘汤。治胃热头痛、牙痛、齿龈肿痛，可与生地、知母、牛膝等配伍，如玉女煎。治胃中实火上炎，牙缝出血，可与黄连、升麻、丹皮等配伍，如清胃汤。近年常与银花、大青叶、连翘等清热解毒药同用，以治现代医学的流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、流行性感冒、肺炎等病，每获良效。

石膏煅后，清解之性变为收敛，研末外用，有生肌敛疮之功。用于疮疡溃而不敛、创伤、水火烫伤及湿疹等，常与铅丹或黄柏、青黛等制散外用。

至于《备要》所言寒水石，应为硫酸盐类矿物芒硝的晶体，但近代寒水石的药材商品，有红石膏与方解石二种，前者北方多用，后者南方多用。

【用量用法】15~60克，大剂量可用至150克，煎服。外用适量。清热泻火生用，生肌敛疮煅用，入汤剂宜打碎先煎。

知母

〔原文〕辛苦寒滑。上清肺金而泻火，泻胃热，膀胱邪热，肾命相火。下润肾燥而滋阴，入二经气分。黄柏入二经血分，故二药必相须而行。消痰定嗽，止渴安胎。莫非清火之用。治伤寒烦热，蓐劳⁽¹⁾产劳。骨蒸，退有汗之骨蒸，燥渴虚烦，久疟下痢。治嗽者，清肺火也；治渴者，清胃热也；退骨蒸者，泻肾火也。利二便，消浮肿。小便利则肿消。东垣曰：热在上焦气分，结秘而渴，乃肺中伏热，不能生水，膀胱绝其化源，宜用渗湿之药，泻火清金，滋水之化源。热在下焦血分，便闭而不渴，乃真水不足，膀胱干涸，无阴则阳无以化。宜用黄柏、知母大苦寒之药，滋肾与膀胱之阴，而阳自化，小便自通。丹溪曰：小便不通，有热有湿，有气结于下，宜清、宜燥、宜升。又有隔二隔三之治。如肺不燥，但膀胱热，宜泻膀胱，此正治；如因肺热，不能生水，则清肺，此隔二之治；如因脾湿不运，而精不上升，故肺不能生水，则燥胃健脾，此隔三之治。泻膀胱，黄柏、知母之类；清肺，车前、茯苓之类；燥脾，二术之类。昂按：凡病皆有隔二隔三之治，不独便闭也。然苦寒伤胃而滑肠，多服令人泻。李士材曰：苦寒肃杀，非长养万物者也。世以其滋阴，施之虚损之人，则如水益深矣，特表出以为戒。得酒良。上行酒浸，下行盐水拌。忌铁。

【讲解】(1)蓐劳：病名。多因产后气血耗伤，调理失宜，感受风寒，或忧劳思虑等所致。常见虚羸喘乏，寒热头痛自汗，肢体倦怠等证。

知母以清润为特点，既能清火，又善滋阴。为百合科多年生草本植物知母的根茎。药材有两种，剥去栓皮者，称光知母，品质较佳；带皮的干燥根茎，名毛知母，品质次之。临床多用前者。切片，生用或盐水炒用。

本品苦甘寒，质柔润。入肺、胃、肾三经。苦寒能清热、泻火，甘寒质润能滋阴润燥，故以清润为专长。上清肺，中凉胃，下泻相火，而滋肺胃肾之阴。凡燥热伤阴，不论实证虚证，均可应用。用治温热病，壮热烦渴，肺胃燥热证及阴虚火旺之潮热骨蒸、消渴等。然苦寒清润，有伤胃作泻之虑。阴虚便秘者，甚为适合。若脾虚便溏或寒饮咳嗽者，则非所宜。

有用酒炒，取其入上焦清金泻火；盐水喷炒，咸而入肾，引药下行，清泻相火。

【临证应用】 知母用于温热病，壮热烦渴、脉洪大等肺胃实热证，与石膏配伍有协同之效，如白虎汤。对于肺肾阴亏、阴虚火旺所致之证，常与黄柏相须为用，如知柏地黄丸。治肺热咳嗽或阴虚燥咳，常与贝母同用，以清肺化痰止咳，如二母丸。还常配天花粉、麦冬等用于消渴，如玉液汤。

知母与石膏，均能清肺胃实热。然石膏辛甘大寒，重在清解；知母苦寒滋润，重在清润。故清宣肺热多用石膏，清热润燥多用知母。里热重，津已伤者宜用知母；里热重，津未伤者宜用石膏。气分热盛伤津之证，二药常相须为用。

【用量用法】 6—12克，煎服。多生用，盐水炒用，是取其入肾泻火之义。

梔子

〔原文〕苦寒。轻飘象肺，色赤入心，泻心肺之邪热，使之屈曲下行，从小便出，海藏曰：或用于利小便药，非利小便，乃肺清则化行，而膀胱津液之府，得此气化而出也。而三焦之郁火以解，热厥⁽¹⁾厥有寒热二证。心痛以平，丹溪曰：治心痛，当分新久。若初起因寒因食，宜当温散。久则郁而成热，若用温剂，不助痛添病乎？古方多用梔子为君，热药为之响导，则邪易伏。此病虽日久，不食不死。若痛止恣食，病必再作也。吐衄血淋，血痢之病以息。最清胃脘之血。炒黑末服，吹鼻治衄。《本草汇》曰：治实火之血，顺气为先，气行则血自归经，治虚火之血，养正为先，气壮则自能摄血。丹溪曰：治血不可单行单止，亦不可纯用寒药。气逆为火，顺气即是降火。治心烦懊憹不眠，仲景用梔子豉汤，王好古曰：烦者气也，燥者血也。故用梔子治肺烦，香豉治肾燥。亦用作吐药，以邪在上焦，吐之则邪散，经所谓其高者因而越之也。按梔豉汤，吐虚烦客热；瓜蒂散，吐痰食宿寒。五黄⁽²⁾古方多用梔子、茵陈。五淋⁽³⁾，亡血津枯，口渴目赤，紫癜白癰⁽⁴⁾，胞鼓⁽⁵⁾疮疡。皮腠，肺所主故也。生用泻火，炒黑止血，姜汁炒止烦呕，内热用仁，表热用皮。

【讲解】（1）热厥：厥证之一，指热邪过盛，热郁于里不能外达引起的厥证。（2）五黄：指五种黄疸证，即：黄疸、谷疸、酒疸、女劳疸、黑疸。（3）五淋：指五种淋证，石淋，气淋，膏淋，劳淋，热淋。（4）白癰：病名。症见皮色变白，四肢顽麻，肢节发热，手足无力，视物不清。类似现代医学之结核型麻风病。（5）胞鼓：指鼻子上所生的如水泡的红斑，类似酒渣鼻。

梔子以清泄为主要功效，善泻火除烦，泄热利湿。为茜草科常绿灌木植物梔子的成熟果实。又名山梔。生用，炒焦或炒炭用。

本品味苦性寒，入心、肺、胃、三焦经。苦寒清降，泄三焦之火而利小便，故有清热利湿之功。轻清上行，善泻心肺胸膈之热，邪热得清，则心胸烦热可解，躁扰不宁自除，故有泻火除烦之效。本品尚可入肝，并有凉血止血作用。故凡热病，热蕴胸膈，心烦懊憹，或热郁血分，吐衄下血，或湿热蕴结之黄疸，淋病，小便不利等，均以之为要药。

【临证应用】梔子与淡豆豉合用，如梔子豉汤，以透邪泄热，除烦解郁，治热郁胸膈，心烦懊憹不眠。配黄连、连翘、黄芩等凉血解毒、泻火除烦之品，如清瘟败毒饮，治热毒炽盛，高热烦躁，神昏谵语等证。与茵陈、大黄合用，以清利湿热，利胆退黄，如茵陈蒿汤，治湿热郁结之黄疸发热，小便短赤等症，可增利湿退黄之效。与利尿通淋药车前子、木通、篇蓄等同用，如八正散，治疗淋闭小便不利。与生地、茅根等清热凉血药同用，有凉血止血作用，治疗热郁血分，血热妄行之吐衄下血。此外，生梔子研末醋调外敷，对外伤性肿痛有消肿止痛作用；涂敷疔肿 及水火烫伤，亦有疗效。

梔子生用清热泻火力强，炒焦后能止血。梔子皮偏于达表去肌热，梔子仁偏于走里清内热。

【用量用法】3—10克，煎服。外用适量。脾虚便溏、食少者忌用。

芦根

〔原文〕甘益胃，寒降火。治呕哕反胃，胃热火升，则呕逆食不下。《金匱》方：芦根煎服。消渴客热，伤寒内热，止小便数。肺为水之上源，脾气散精，上归于肺，始能通调水道，下输膀胱。肾为水脏，而主二便，三经有热，则小便数，甚至不能少忍，火性急速故也。芦中空，故入心肺，清上焦热，热解则肺之气化行，而小便复其常道矣，能解鱼蟹河豚毒。取逆水肥厚者，去须节用。

【讲解】芦根长于清热生津，止呕除烦。为禾本科多年生草本植物芦苇的地下茎。采挖后去泥土、须根，剥去皮膜，洗净晒干备用。用鲜者，疗效更佳。

本品甘寒质轻，入肺、胃二经。长于清肺热而祛痰排脓，清胃热而生津止呕，且有清热而不伤胃，生津而不恋邪的特点。故常用治温病初起或热病伤津，烦热口渴，胃热呕逆及肺热咳嗽、肺痈等证。又因肺为水之上源；肺热清，气化行，小便自利，故言能清热利尿。亦治小便短赤，热淋涩痛。

此外，本品兼有宣透之性，疹出不透亦可用之。

【临证应用】芦根用于温病初起，发热咳嗽，咽痛，可配菊花、桑叶、银花等，常用方剂如桑菊饮、银翘散中皆用之。治热病津伤，烦热口渴，多与石膏、麦冬、天花粉等配伍；治胃热、呕逆，可单用煎浓汁频饮，或与竹茹、生姜汁合用，如芦根饮。治肺热咳嗽，痰稠色黄者，配桔梗、杏仁、黄芩等用；若肺热成痈，咳吐脓血，则配鱼腥草、银花、薏苡仁等共奏清热排脓之效。古用苇茎汤治肺痈，苇茎者，系芦苇地上茎，现所用者皆为芦根。

民间以芦根解鱼蟹毒，如中河豚鱼毒者，以鲜品500克捣汁服 或水煎频服。

总之，芦根质轻，药力薄弱，多作辅助药用，一般不用为主药。

【用量用法】15—30克，煎服。鲜品可加倍使用，或捣汁服。

天花粉

〔原文〕酸能生津，甘不伤胃，微苦微寒。降火润燥，滑痰解渴，古方多用治消渴。生肌排脓消肿，行水通经，止小便利。膀胱热解，则水行而小便不数。治热狂时疾，胃热疸黄(1)，口燥唇干，肿毒发背(2)，乳痈(3)疮痔。脾胃虚寒者禁用。即栝蒌根。畏恶同。澄粉食，大宜虚热人。

【讲解】(1) 疸黄:即指身黄、目黄、小便黄的黄疸病。(2) 发背:病名。指痈疽发于脊背者。(3) 乳痈，与现代医学之急性乳腺炎同。

天花粉以清热生津为主要功效。为葫芦科多年生宿根草质藤本植物栝蒌的干燥块根。

本品味甘微苦，性微寒。入肺、胃经。能清肺胃之热，生肺胃之津，兼有解毒，消肿，排脓之效。为热病津伤口渴及消渴病的要药，并可治肺热咳嗽及疮疡肿毒等证。

【临证应用】天花粉用于温热病，邪热伤津，口干烦渴及消渴病。本品善能清胃热、生津，如热盛者，配知母、石膏、芦根等；如阴伤者，可配麦冬、生地、石斛等养阴生津之品；配葛根、知母、山药等药，可治消渴症，如玉液丹。与贝母、桔梗、知母等同用，用于肺热、肺燥干咳嗽痰稠以及咯血等症，起清肺热，润肺燥作用。对于疮疡肿毒、未溃者可以消肿；已溃者可资排脓，内服常与银花、连翘、贝母等配伍用，以内消肿毒；亦可研末，水调外敷，或配伍黄柏、白芷、大黄等，消肿散结，如如意金黄散。然本品性寒，脾胃虚寒，大便溏泄者忌用。

近年来以天花粉针剂注射，用于妊娠引产，并试用于现代医学之恶性葡萄胎及绒毛膜上皮癌，也有疗效。

【用量用法】10—15克，煎服。外用适量。

竹叶

〔原文〕辛淡甘寒。凉心缓脾，消痰止渴。除上焦风邪烦热，叶生竹上，故治上焦。仲景治伤寒发热大渴，有竹叶石膏汤，乃假其辛寒，以散阳明之邪热也。咳逆喘促，呕哕吐血，中风失音，小儿惊痫。竹生一年以上者，嫩而有力。

【讲解】竹叶功专清热除烦，兼能利尿。为禾本科多年生常绿乔木或灌木植物淡竹的叶。生用或鲜用。

本品辛甘淡寒。入心、胃经。甘寒清心胃之热以治热病烦渴呕哕吐血之证；辛寒能散上焦风热，并导心经之火而利小便，以治小便短小涩痛、尿血及口舌生疮等证。具有清上导下之功，为清热除烦利尿常用之品，中风失音，小儿惊痫较少应用。入药以鲜者为佳，不宜久煎。

【临证应用】竹叶用于热病烦渴，常与石膏、麦冬等配伍，如竹叶石膏汤。用于心火上炎，口舌生疮，或心热下移小肠所致的小便黄赤短少，淋痛尿血等，可与生地、木通等配伍，如导赤散。

【用量用法】5—15克，煎服。

夏枯草

〔原文〕辛苦微寒，气禀纯阳。补肝血，缓肝火，解内热，散结气。治瘰癧（1）湿痹（2），目珠夜痛。蒺全善曰：目珠连目本，即目系也。夜痛及点苦寒药更甚者，夜与寒皆阴也。夏枯气禀纯阳，补厥阴血脉，故治此如神，以阳和阴也。按目白珠属阳，故昼痛，点苦寒药（3）则效；黑珠属阴，故夜痛，点苦寒药反剧。冬至生，夏至枯，故名，用茎叶。

【讲解】（1）瘰癧：瘰，即瘰癧，病名。指甲状腺肿大一类的疾患。癧，即瘰癧，病名。详前瘰癧条。（2）湿痹：痹证的一种，指风寒湿邪侵袭肢节经络，以湿邪偏胜者，主证为肢体重着，肌肤麻木，或痛处固定，阴雨则发。（3）药：原脱，据文义补。

夏枯草能清肝火，散郁结，是治肝热痰火郁结之要药。为唇形科多年生植物夏枯草带花的果穗。因其夏至则枯，故名。

本品苦辛性寒，主入肝经。苦寒泄热，辛能散结，故有清肝火、散郁结之功，对瘰癧瘰癧，目赤肿痛及头痛眩晕诸证，均为常用之药。

【临证应用】夏枯草用于痰火郁结的瘰癧瘰癧，可单用煎服或熬膏服，或与元参、牡蛎、昆布等化痰软坚散结药同用。若与石决明、菊花、黄芩等清肝泻火药配伍，可治肝火上炎所致的目赤肿痛，头痛眩晕等证。治目珠疼痛，属于痛久伤血者，则须与当归、生地、白芍等补血养肝药配伍。近年来用于现代医学的高血压病，属于肝热阳亢型的也获良效。在治疗肿瘤的方剂中，亦常加入本品，如治淋巴瘤时，被视为主要药物之一。

【用量用法】10—15克，煎服或熬膏服，或煎汤代茶。

决明子

〔原文〕甘苦咸平。入肝经，除风热。治一切目疾，故有决明之名。又曰益肾精。瞳子神光属肾。陈日华曰：明目甚于黑豆，作枕治头风。状如马蹄，俗呼马蹄决明。捣碎煎，恶大麻仁。

【讲解】决明子长于清肝明目，兼能益肾通便。为豆科一年生草本植物决明的成熟种子。其干燥种子呈菱方形，状如马蹄，故有马蹄决明之称。生用，或炒用。

本品甘苦微寒，质油润。入肝、肾、大肠经。苦寒入肝经以清肝火；味甘补肾而润肠燥；气禀轻扬而善散风热，能升能降，为其特长。有较好的明目作用，遂以其功而命名，故为眼科常用药，尤以治风热郁火之目赤肿痛，应用最多。

【临证应用】决明子既能清肝火，又能益肾阴，兼能散热。治肝火上炎或肝经风热所致的目赤肿痛，羞明多泪，头痛等证，可与菊花、蔓荆子、木贼、川芎等用，如决明子散。若肝肾不足之青盲内障，可与生地、枸杞、玄参等同用，如决明丸。用于热结便秘或肠燥便秘，可单用煎服或研末用，亦可与火麻仁、郁李仁等配伍。与野菊花、黄芩、夏枯草等同用，治疗肝阳上亢之眩晕效果良好。此外据现代研究尚可降低血清胆固醇。

【用量用法】 5—15克，煎服，或单味开水泡服。大便溏泻，血虚眩晕者忌服。

穀精草

〔原文〕辛温轻浮。上行阳明胃，兼入厥阴。肝。明目退翳之功，在菊花之上。亦治喉痹齿痛，阳明风热。收穀后，荒田中生，叶似嫩秧，花如白星。小儿雀盲者，羯羊肝一具，不洗，竹刀割开，入穀精煮熟食之。或作丸，茶下。

【讲解】穀精草为明目专剂，对风热目疾，翳膜遮睛之证，尤为适用。为穀精科一年生草本植物穀精草和赛穀精草的全草和花序。又名移星草。头状花序，呈扁圆形，小花灰白色，排列甚密，表面附有白色细粉，生于水稻田，秋季采收。生用。

本品辛甘性平。入肝、胃经。体轻性浮，有疏散肝经风热以明目退翳之效，而为治疗目疾之专药。用于肝经风热，目赤肿痛，羞明多泪及目生翳膜等证，尤以风热目疾，翳膜遮睛之证最为适用。此外，本品亦可用于阳明头痛，咽喉肿痛，齿痛等风热之证。《本草纲目》曰：穀精草体轻性浮，能上行阳明分野。凡治目中诸病，加而用之，甚良。明目退翳之功，似在菊花之上也。

【临床应用】穀精草治疗肝经风热，目赤肿痛，羞明多泪及翳膜遮睛等证，常与菊花、决明子、夏枯草配伍用，或配荆芥、龙胆草、赤芍等同用，如穀精龙胆散，或配木贼、蝉衣等，如神消散。治风热头痛，咽喉肿痛，可与防风、荆芥、银花、马勃等用。

【用量用法】 6—15克，煎服。

密蒙花

〔原文〕甘而微寒。入肝经气血分，润肝燥。治目中赤脉，青盲（1）肤翳，赤肿眵_{音鴟}，眼脂。泪，小儿疳气（2）攻眼。产蜀中。叶冬不凋，其花繁密蒙茸，故名。拣净酒浸一宿，候干，蜜拌蒸，晒三次。

【讲解】（1）青盲：病证名。指眼外观无异常而视力逐渐减退以致失明者。多因肝肾亏损，精血虚弱，不能上达于目所致。（2）疳气：疳，病名：泛指小儿因多种慢性疾患而引起的以面黄肌瘦，肚腹膨胀，精神萎靡为特征的疾病。

密蒙花功专清养，为眼科明目常用之品。为马钱科落叶灌木植物密蒙花树的花蕾，常由多数小花蕾簇生为花序，表面灰黄色，密被毛茸。如《本草求真》曰：因冬不凋，花开蒙密，故以蒙名。生用，或蜜拌蒸用。

本品味甘，性微寒。入肝经。盖肝开窍于目，目得血而能视，肝虚则目盲无所见，肝热则目赤多眵。本品既可清肝热，又能养肝血，润肝燥，故不论实证虚证之目疾，如目赤肿痛，羞明，多眵多泪，及目昏干涩，目生翳障等，均可应用，尤以肝肾虚而有热者，最为适宜。

【临证应用】密蒙花用于肝热目疾，赤肿多泪，常配菊花、木贼、石决明等同用，以清肝热而明目退翳。用于肝虚而有热，目昏干涩或生翳障者，可与枸杞子、菟丝子、沙苑子等养肝明目药同用。

【用量用法】6—10克，煎服。

青葙子

〔原文〕味苦微寒。入厥阴。肝。祛风热，镇肝明目。治青盲障翳，虫疥恶疮。瞳子散大者忌服。能助阳火。类鸡冠而穗尖长。

【讲解】青葙子功专清肝明目，主治肝火上炎之目疾。为苋科一年生草本植物青葙的成熟种子。穗状花序单生于茎顶或分枝末端，圆柱或圆锥状。《本经》名为草决明，但现商品草决明即决明子。生用。本品味苦，性微寒，入肝经。苦寒清降，专泻肝经实火，而有明目退翳之功，亦为眼科常用之品。用于肝火上炎，目赤肿痛，目生翳膜，视物昏暗等证，对热毒上冲，赤肿翳膜者，效果尤佳。此外，以其清泄肝火之作用，还用于现代医学之高血压属于肝阳上亢者。

《备要》云治“虫疥恶疮”。《本草求真》释曰：凡人一身风痒，虫疥得蚀……多缘热盛风炽所致。服此……三虫皆杀，风痒即绝，无非因其血热除，血脉和，而病自可愈耳，无他义也。

本品清热之力较强，且有扩散瞳孔之功，故对肝肾阴虚及瞳孔散大者忌用。

【临证应用】青葙子常与决明子同用，清泄肝火，明目退翳，以治肝火上炎之目赤肿痛，目生翳膜之证，还常用于现代医学之高血压病。然此两药性能有所不同，决明子甘苦微寒而气清，既能疏风热，又兼益肾阴，且质润通便，故可用于风热、肝火阴亏之目疾；青葙子苦寒而善降，功专清肝泻火，故只用于肝火上炎之目疾。

【用量用法】5~15克，煎服。

夜明砂

〔原文〕辛寒。肝经血分药，活血消积。治目盲障翳，加石决明猪肝煎，名决明夜灵散，治鸡盲眼。疔魅音奇，小儿鬼魅。惊疳，蝙蝠及矢，并治惊疳疳痢，厥阴之病。血气腹痛。《经疏》曰：辛能散内外滞气，寒能除血热气壅，明目之外，余皆可略。吴鹤皋曰：古人每用虻虫、水蛭治血积，以其善吮血耳。若天鼠矢乃食蚊而化者也，当亦可以攻血积，《本草》称其下死胎，则其能攻血块又何疑。同鳖甲烧烟辟蚊。蝙蝠矢也。食蚊，砂皆蚊眼，故治目疾。淘净焙用。恶白薇、白薇。

【讲解】夜明砂功专清肝明目。为蝙蝠科动物蝙蝠的粪便。洗净晒干药用。

本品味辛性寒。为肝经血分之药。辛能散血消积，寒能清除血热，功专清肝明目，以治青盲翳障。至于用于疔疾疳积，是取其散血清热之功，然临证少用。正如《本草经疏》云：主疗虽多，性有专属，明目之外，余皆可略。

【临证应用】夜明砂主用于青盲雀目，内外翳障等证。治青盲可配柏叶、牛胆汁为丸，临睡前竹叶汤下，如明目柏叶丸；治雀目可配石决明、猪肝用米泔水煎，食肝及药汁，如决明夜灵散；今与猪肝、苍术、穀精草等水煎连肝同服，治雀盲证及小儿麻疹后角膜软化证有效。治小儿疳积腹痛，《全幼心鉴》与黄连为丸服，或配驱虫药用。

【用量用法】 3-10克，煎汤或入丸散服。

熊胆

〔原文〕苦寒。凉心，平肝明目杀虫。治惊痫五痔。涂之即瘥。通明者佳。性善辟尘，扑尘水上，投胆少许，则豁然而开。

【讲解】熊胆苦寒，功专清热明目，止痉。为熊科动物黑熊或棕熊的干燥胆汁。胆囊呈长扁卵形，上部狭细，下部膨大。囊内干燥胆汁，习称“胆仁”，呈块状、颗粒状或稠膏状。有光泽，颜色不一，金黄色，透明光亮如琥珀，味苦回甜者习称“金胆”；黑色、呈稠膏状者，习称“墨胆”；黄绿色、光亮较差，习称“菜花胆”。以个大，胆仁金黄色，明亮，味苦回甜者为佳。研细末用。

本品味苦，性寒。入肝、胆、心经。性善清泄肝热，既能明目退翳。又有止痉之功，并兼解毒消肿。故凡肝火上炎的目赤肿痛，羞明翳障，肝热生风的惊风癫痫抽搐及胆汁外泄的黄疸等证均可应用。外用还可敷痔漏疮肿。本品产量不多，价值昂贵，故一般少用。无实热者不宜用。

【临证应用】熊胆用于目赤翳障，常与冰片各少许，水化点眼，日2—3次。用于孕妇子病，可单用温开水化服。治小儿痰热惊痫，用清热化痰之竹沥化服甚效。治疮痈肿毒，痔疮肿痛，可用水调化涂于患处。此外，借清热解毒之功，与郁金、丹参、茵陈等药同用，可治黄疸、胆石证等。

【用法用量】1~2克。多入丸散服，不入煎剂。外用适量。

西瓜

〔原文〕甘寒。解暑除烦，利便醒酒，名天生白虎汤。西瓜、甜瓜，皆属生冷，多食伤脾助湿。《卫生歌》曰：瓜桃生冷宜少食，免致秋来成疟痢。瓜性寒，曝之尤寒。《稽食赋》曰：瓜曝则寒，油煎则冷，物性之异也。

【讲解】西瓜清热解暑，有天生白虎汤之誉。为葫芦科一年生蔓性草本植物西瓜的果瓢。取汁饮用。

本品味甘性寒。入心、胃、膀胱经。有清热解暑，除烦止渴，利小便之功。治暑热烦渴，热盛津伤，小便不利，喉痹，口疮等证。《本草逢原》云：西瓜，能引心包之热，从小肠膀胱下泄。能解太阳阳明中喝及热病大渴，故有天生白虎汤之称。白虎汤由生石膏、知母、甘草、粳米组成，具清热生津之效。

【临证应用】西瓜治阳明热盛，烦渴舌燥者，取汁一碗，徐徐饮之。治水肿小便不利，亦可饮服。中寒湿盛者忌服。另外，西瓜皮称“西瓜翠衣”，亦入药用，性味、功效与西瓜同。

【用量用法】西瓜皮入煎剂，每次10~30克。

第二节 清热燥湿药

清热燥湿药，多为苦寒之品，苦能燥湿，寒能清热，故常用于湿热内蕴或湿邪化热之证，如烦热口苦，胸痞泄泻，痢疾黄疸，湿疹，痈肿疮毒等证。

本类苦寒性燥之品，多易伤阴败胃。凡脾胃虚弱，津液亏耗者慎用。必需用时，可酌情配伍养阴益胃之品同用。

黄芩

〔原文〕苦入心，寒胜热。泻中焦实火，除脾家湿热。治痢痢

（1）**腹痛**，便血曰痢，寒痛忌用。凡腹痛有寒热虚实，食积、瘀血、痰湿之不同。寒宜温，热宜清，虚宜补，实宜下，食宜消导，瘀血宜行散，痰湿宜化痰利湿。痛时手不可按者为实痛，按之痛止者为虚痛。**寒热往来**，邪在少阳。**黄疸五淋**，血闭实热在血分。**气逆**，**痈疽疮疡**，及诸失血。**消痰**丹溪以黄芩降痰假其降火也。按痰因火动，当先降火。**利水**，**解渴安胎**，胎孕宜清热凉血，血不妄行则胎安。**养阴退阳**，**补膀胱水**。酒炒则上行，泻肺火，利胸中气肺主气，热伤气，泻热所以保肺。**治上焦之风热湿热**，丹溪曰：黄芩上中二焦药。**火嗽喉腥**，五臭，肺为腥。**目赤肿痛**。**过服损胃**，**血虚寒中者禁用**。得柴胡退寒热，得芍药治病，得厚朴、黄连止腹痛，得桑皮泻肺火，得白术安胎之圣药。时珍曰：仲景治少阳证小柴胡汤，太阳少阳合病下利黄芩汤，少阳证下后心满泻心汤，并用之。盖黄连苦寒，入心泻热，除脾家湿热，使胃火不流入肺，不致刑金，即所以保肺也。肺虚不宜者，苦寒伤土，损其母也。少阳证虽在半表半里，而心膈痞满，实兼心肺上焦之邪；心烦喜呕，默默不欲食，又兼脾胃中焦之证，故用黄芩以治手足少阳相火，黄芩亦少阳药也。杨士瀛曰，柴胡退热，不及黄芩。时珍曰：柴胡乃苦以发之，散火之标也；黄芩乃寒能胜热，折火之本也。东垣治肺热，身如火燎，烦躁引饮，而昼盛者，宜一味黄芩汤，以泻肺经气分之火。黄芩一两煎服。《本事方》用治崩中暴下。**黄明者良**。**中虚名枯芩**，即片芩。**泻肺火**，**清肌表之热**。**内实名条芩**，即子芩。**泻大肠火**，**补膀胱水**。**上行酒炒**。**泻肝胆火**，**猪胆汁炒**。**山茱萸、龙骨为使**，**畏丹皮、丹砂**。

【讲解】（1）痢痢：指便血和痢疾。

黄芩功能清热燥湿，兼有止血安胎作用。为唇形科多年生草本植物黄芩的根。习惯将中心空而发黑，外表呈黄棕色，颇似腐木的老根称枯芩或片芩；将中实色青，外呈黄色的细条嫩根称为子芩或条芩。切片，生用，酒炒或炒炭用。

本品苦寒。苦能燥湿，寒能清热，为清热燥湿常用之品。入肺、胆、大肠、胃、心经。其功用以泻肺经之热为主，但通过适当配伍又能清诸经之湿热，故可用于湿热诸证，如湿热黄疸，泄痢热淋，痈肿疮

毒，吐衄出血等证。然苦寒之品，能伤脾胃，故凡脾胃虚寒，少食便溏者忌服。

【临证应用】 黄芩善清肺火，对邪热犯肺，身热咳嗽，痰黄粘稠之证，效果尤佳。单用即为黄芩散，或配知母、桑白皮、麦冬等，如清肺汤，治肺热咳嗽气促。本品通过配伍，应用极广，配柴胡，如小柴胡汤，以解少阳之邪，而治寒热往来；配芍药，如黄芩汤，以清大肠湿热而治泻痢腹痛；配木通、生地，如火府丹，以导小肠热而通淋；配山栀、茵陈等以治黄疸；配白蔻仁、滑石等以清热化湿而治湿温发热，胸闷，如黄芩滑石汤；配黄连、栀子、石膏等，可清气分实热，以治热病神昏及热毒疮疡。

此外，本品尚有止血安胎的作用，治血热妄行的吐血、衄血、便血等证，可炒炭与生地、白茅根等伍用。胎热不安者，以黄芩配白术、当归、白芍等以清热安胎，如当归散。

【用量用法】 3-10克，煎服。清热多用生黄芩，安胎多用炒黄芩。酒炒，则上行而清上焦之热；炒炭则多用于止血。枯芩和子芩，历代医家认为前者体轻性浮，功偏清泻肺火，解肌表之热；后者坚重性沉，功偏泻大肠下焦之火。

黄连

〔原文〕大苦大寒。入心泻火，王海藏曰：泻心实泻脾也。实则泻其子。镇肝凉血，凡治血，防风为上部之使，黄连为中部之使，地榆为下部之使。燥湿开郁，解渴单用能治消渴。除烦，益肝胆，厚脾胃，消心瘀，能去心窍恶血。止盗汗。凉心。治肠癖泻痢，便血曰癖，有脏连丸。湿热郁而为痢，黄连治痢要药。噤口者热壅上焦，同人参煎汤呷之，但得下咽便好。喻嘉言曰：下痢必先汗解其外，后调其内。首用辛凉以解表，次用苦寒以攻里。《机要》曰：后重宜下，腹痛宜和，身重宜除湿，脉弦宜去风，风邪内结宜汗，身冷自汗宜温，脓血粘稠宜重剂以竭之。下痢，赤属血分，白属气分。戴氏曰：俗谓赤热白寒者非也，通作湿热处治，但有新久虚实之分。痞满燥湿开郁。张仲景治九种心下痞，五等泻心汤皆用之。腹痛，清热。心痛伏梁（1）心积，目痛眦伤，人乳浸点或合归、芍等分，煎汤热洗，散热活血。痈疽疮疥，诸痛痒疮，皆属心火。酒毒胎毒（2）。小儿初生，合甘草为末，蜜调令咽之。明目《传信方》：羊肝一具，黄连一两，捣丸，名羊肝丸，凡是目疾皆治。定惊，镇肝。止汗解毒，除疳同猪肚蒸为丸，杀虻。虻得苦则伏，虚寒为病者禁用。久服黄连、苦参反热，从火化也。昂按：炎上作苦，味苦必燥，燥则热矣。且苦寒沉阴肃杀，伐伤生和之气也。韩恣曰：黄连与肉桂同行，能交心肾于顷刻。时珍曰：治痢用香连丸；姜连丸用黄连、干姜；姜黄散用黄连、生姜；左金丸用黄连、吴茱萸。治口疮用黄连细辛；止下血用黄连大蒜。一阴一阳，寒因热用，热因寒用，最得制方之妙。出宣州者粗肥，出四川者瘦小。状类鹰爪连珠者良，去毛。治心火生用，虚火醋炒，肝胆火猪胆汁炒，上焦火酒炒，有吞酸嘈杂等证，亦有吐酸者名酢心，宜黄连吴茱萸降火开郁。酢，音醋。中焦火姜汁炒，下焦火盐水或童便炒，食积火黄土炒，治湿热胃在气分，吴茱萸汤炒，在血分干漆水炒，点眼赤人乳浸。时珍曰：诸法不独为之引导，盖辛热制其寒苦，咸寒制其燥性，用者详之。黄芩、龙骨为使，恶菊花、玄参、僵蚕、白鲜皮，畏款冬、牛膝，忌猪肉，时珍曰：方有脏连丸，黄连猪肚丸，岂忌肉而不忌脏腑乎。杀乌头，巴豆毒。黄连泻心火，佐以龙胆泻肝胆火，白芍泻脾火，石膏泻胃火，知母泻肾火，黄柏泻膀胱火，木通泻小肠火。黄芩泻肺火，梔子佐之；泻大肠火，黄连佐之；柴胡泻肝胆火，黄连佐之，泻三焦火，黄芩佐之。郑真一曰：热郁恶心，兀兀欲吐黄连数分甚效。

【讲解】（1）伏梁：古病名。指脘腹部痞满或有肿块的一类疾患。

（2）胎毒：小儿在胎育期间，禀受母体内蕴之毒邪，出生后发病者称

之为胎毒。

黄连清热燥湿，泻火解毒，尤以泻心胃之火为主。为毛茛科多年生草本植物黄连、三角叶黄连或云连的根茎。产于四川者称川连，为道地药材。其中根茎多分枝，呈稍弯曲状，形如鹰爪、鸡爪的，称鹰爪连、鸡爪连，质优。云连主产云南，功用与川连相同。

本品大苦大寒。归心、胃、肝、大肠经。大寒清热解毒，大苦燥湿泻火，故有清热燥湿，泻火解毒之功。为清心除烦，消痞止痢，治湿热郁结之主药。尤长于泻心胃火，清胃肠湿热。故凡心火亢盛之烦热神昏，或心烦失眠，血热妄行之吐衄，胃肠湿热的痞满呕吐，泻痢腹痛等证，皆为要药。本品既长于泻心火，又善于解热毒，故亦为外科疗毒痈肿、口舌赤烂等证的常用之品，不论内服外用，均有良效。

黄连功效较广，用法众多，现以生用、炒用为主。生用偏清心火，炒用缓其寒性，免伤脾胃之阳气，酒炒上行头目，偏治上焦之火。其他尚有姜汁炒黄连，主治中焦之火以止呕；吴茱萸汤炒黄连，善清气分湿热；猪胆汁炒黄连，专泻肝胆实火；盐水炒黄连，善治下焦之火。此外，还有黄土、乳汁、干漆等炒制者，但总不外乎“制其弊，助其效”，不再举例。

《本草经集注》曰：胜乌头。《补缺肘后方》曰：治药中巴豆，下痢不止。故《备要》言能杀乌头、巴豆之毒。

【临证应用】黄连泻心火，用于心火亢盛的烦躁不眠，甚至热病神昏谵语，常配栀子、黄芩等，如黄连解毒汤，以增强泻火作用；热迫血而妄行的吐血衄血，常配大黄、黄芩，如泻心汤，以泻火止血。黄连治肠胃湿热证，尤可获较好的疗效，如与木香同用，即香连丸，可清湿热，行气滞而治泄痢腹痛；与葛根、黄芩等配伍，如葛根芩连汤，治痢疾初起，兼表证者；配竹茹、半夏、橘皮，即黄连橘皮竹茹半夏汤，则可清热降逆止呕；配吴茱萸同用，即左金丸，治肝火犯胃的呕吐吞酸。

此外，肝火偏旺，目赤肿痛者，可以配决明子、菊花、龙胆草等清热明目药内服，或用人乳浸后点眼。治痈肿疗毒，口舌生疮，湿疮瘙痒

等，配黄芩、栀子、连翘等内服，亦可制膏外用。

本品少量服用，有健胃之功，可促进消化。然苦寒颇甚，若过量服用，易致败胃，反使消化不良。故凡胃寒呕吐，脾虚泄泻之证均忌用。同时本品性燥，多用则伤胃津，若用于火盛津伤者，应配伍养阴药，以免伤津。

【用量用法】 2-10克，煎服，或入丸散。外用适量。

黄柏

〔原文〕苦寒微辛，沉阴下降。泻膀胱相火，足太阳引经药。补肾水不足，坚肾润燥，《发明》曰：非真能补也，肾苦燥，急食辛以润之；肾欲坚，急食苦以坚之也，相火退而肾固，则无狂荡之患矣，按肾本属水，虚则热矣，心本属火，虚则寒矣。除湿清热，疗下焦虚，骨蒸劳热，阴虚生内热。诸痿瘫痪，热胜则伤血，血不荣筋，则软短而为拘；湿胜则伤筋，筋不束骨，则弛长而为痿。合苍术名二妙散，清热利湿，为治痿要药。或兼气虚血虚，脾虚肾虚，湿痰死血者，当随证加治。目赤耳鸣，肾火。消渴便闭，黄疸水肿，王善夫病便闭，腹坚如石，腿裂出水，饮食不下，治以利小便药，遍服不效。东垣曰：此奉养太过，膏粱积热，损伤肾水，致膀胱干涸，小便不化，火又逆上，而为呕哕。《难经》所谓关则不得小便，格则吐逆者。《内经》所谓，无阴则阳无以化也。遂处以北方大苦寒之剂，黄柏、知母各一两，酒洗焙研，桂一钱为引，名滋肾丸，每服二百丸，未几，前阴如刀刺火烧，溺出床下成流，肿胀遂消。水泻热痢，痔血肠风，漏下赤白，皆湿热为病。诸疮痛痒，头疮研末敷之。口疮，蜜炒研含。凡口疮用凉药不效者，乃中气不足，虚火上炎，宜用反治之法，参术甘草补土之虚，干姜散火之标，甚者加附子，或噙官桂，引火归元。杀虫安蚘。久服伤胃，尺脉弱者禁用。若虚火上炎，服此苦寒之剂，有寒中之变。时珍曰：知母佐黄柏，滋阴降火，有金水相生之义。古云黄柏无知母，犹水母之无虾也。盖黄柏能制命门膀胱阴中之火，知母能清肺金滋肾水之化源。丹溪曰：君火者，人火也，心火也，可以水灭，可以直折，黄连之属可以制之；相火者，天火也，龙雷之火也，阴火也，不可以水湿制之，当从其性而伏之，惟黄柏之属可以降之。按火有虚火、实火、燥火、湿火、郁火、相火之异。虚火宜补，实火宜泻，燥火宜滋润，郁火宜升发。湿火由湿郁为热，多病臃肿，经所谓诸腹胀大，皆属于热，诸病臃肿，皆属于火是也。宜利湿清热而兼补脾。相火寄于肝肾，乃龙雷之火，非苦寒所能胜，宜滋阴养血，壮水之主，以制阳光。又按诸病之中，火证为多，有本经自病者，如忿怒生肝火，焦思生心火之类是也；有子母相克者，如心火克肺金，肝木克脾土之类是也；有脏腑相移者，如肺火咳嗽，久则移热于大肠而泄泻，心火烦焦，久则移热于小肠，而为淋闭之类是也。又有别经相移者，有数经合病者，当从其重者而治之。川产肉厚色深者良。生用降实火，蜜炙则不伤胃，炒黑能止崩带，酒制治上，蜜制治中，盐制治下。又末乳调，能涂冻疮。

【讲解】黄柏长于泻肾之相火，清下焦湿热。为芸香科落叶乔木植物黄柏（关黄柏）和黄皮树（川黄柏）除去栓皮的树皮。关黄柏主产

于辽宁、吉林、河北等地，以辽宁产量最大；川黄柏主产于四川、贵州、湖北、云南等地，以四川、贵州产量最大。气微味苦，嚼之有粘性，能使水染成黄色，以片张厚大，鲜黄色，无栓皮者为佳。切片，生用或盐水炒用。

本品苦寒沉降，主入肾与膀胱，兼入大肠经。苦能燥，寒清热，其泻火、燥湿之功与黄连相似，但偏于下焦，以泻肾之相火，清下焦湿热为其主要作用。故凡阴虚火旺，骨蒸盗汗和遗精，以及湿热蕴结所致的泻痢、肠风下血、黄疸、淋浊、带下、足膝肿痛，及疮疡肿毒、湿疹等证，皆为要药。其退虚热、治骨蒸，是取其以泻为补之意，使火去而不复伤阴，并非其具有滋阴作用。生用降火力大，盐水炒可增强入肾泻火之功。

【临证应用】黄柏用于阴虚发热，盗汗遗精等证，常与知母相须为用，并与地黄、龟板等养阴药配伍，以滋肾阴，泻相火，退虚热，如知柏地黄丸，大补阴丸；用于痢疾，常与白头翁、黄连等相配伍，如白头翁汤；治湿热黄疸，可配栀子、甘草等，即栀子柏皮汤；治妇人湿热带下，秽浊黄稠，多配车前子、白果等，如易黄汤；治湿热下注所致的足膝肿痛，常与苍术、牛膝、苡仁等同用，如四妙丸。若与清热利尿通淋药木通、车前子、竹叶等同用，可治热淋、小便热赤涩痛之证。

用于热毒疮疡，皮肤湿疹，既可内服，又可外用。内服常配黄连、栀子、丹皮等药同用，外用可配大黄、苦参、滑石等研末撒敷，或煎水外洗。

【用量用法】3-10克，煎服，或入丸散。外用适量。本品苦寒性甚，易损胃气，脾胃虚寒者忌用。

龙胆草

〔原文〕大苦大寒，沉阴下行。益肝胆而泻火。相火寄于肝胆，有泻无补，泻其邪热，即所以补火也。兼入膀胱肾经，除下焦之湿热，与防己同功。酒浸亦能外行上行。治骨间寒热，肾主骨。惊痫邪气，肝经风火。时气温热，热痢疸黄，寒湿脚气，足伤湿热，则成脚气。肿而痛者，为湿脚气，宜清热利湿搜风。又有挛缩枯细，痛而不肿者，名干脚气，宜养血润燥。咽喉风热，赤睛胬肉(1)，泻肝胆火，能明目。元素曰：柴胡为主，龙胆为使，目疾要药。昂按：若目疾初起，宜发散，忌用寒凉。痈疽疮疥，过服损肾。甘草水浸一宿，曝用，小豆、贯众为使。忌地黄。

【讲解】(1)胬肉：努，即胬。指眼眦部长出大片红肉，其状如蝇翅，横贯白睛，甚则攀入黑睛，遮盖瞳神的病证。

龙胆草以泻肝火，清下焦湿热为主要功效。为龙胆科多年生草本植物龙胆和三花龙胆或东北龙胆的根。切段生用。

本品大苦大寒，性沉而降，能直达下焦，归肝、胆二经。以泻肝胆实火，清下焦湿热为其所长，是治肝经热盛及下焦湿热的要药。故目赤头痛，耳聋耳肿，胁痛，口苦喉痛及惊风抽搐等肝火肝风之证，用之效佳。对湿热黄疸，阴囊肿痛，阴痒带下及淋浊等下焦湿热之证，效亦显著。

龙胆草与黄柏，清下焦湿热之功相似，而龙胆草长于泻肝胆实火，黄柏主泻肾火而清虚热。

【临证应用】龙胆草治肝胆实火所致的头痛，目赤肿痛，胁痛及耳鸣耳肿等，常配栀子、柴胡、生地等，如龙胆泻肝汤，治湿热黄疸，常配茵陈、山栀同用；治阴肿阴痒、白带，多与苦参、黄柏等配伍。对于肝经热盛生风所致的高热惊厥，手足抽搐，多与钩藤、牛黄等同用，以奏清肝息风之效，如凉惊丸。若与石决明、野菊花、钩藤同用，治肝火头痛、头晕有较好的疗效。

此外，少量龙胆草可以健胃，用于食欲减退，食后腹胀。然本品大苦大寒，过服易伤脾胃，影响消化，故不宜多服久服，脾胃虚寒者不宜

用。

【用量用法】3—6克煎服，或入丸散。外用适量。

苦参

〔原文〕苦燥湿，寒胜热。沉阴主肾，补阴益精，养肝胆，安五脏，湿热去则血气和平，而五脏自安。利九窍，生津止渴，明目止泪。泪为肝热。治温病血痢，纯下清血者，风伤肝也，宜散风凉血；下如豆汁者，湿伤脾也，宜清热渗湿。肠风溺赤，黄疸酒毒。热生风，湿生虫，又能祛风逐水杀虫。治大风疥癩^{（1）}。然大苦大寒，肝肾虚而无热者勿服。张从正曰：凡药皆毒也，虽苦参、甘草，不可不谓之毒，久服必偏胜为患。经曰：五味入胃，各归所喜攻，久而增气，物化之常也。气增而大，天之由也。王冰注曰：气增不已，则脏有偏胜，偏胜则脏有偏绝，故令人暴夭。《笔谈》曰：久用苦参擦牙，遂病腰痛，由其气伤肾也。经又曰：大毒治病，十去其六；无毒治病，十去其九；谷肉果菜，食养尽之，无使过之，伤其正也。按人参补脾，沙参补肺，紫参补肝，丹参补心，玄参补肾，苦参不在五参之内，然名参者皆补也。药能医病，不能养人；食能养人，不能医病。糯米泔浸去腥气，蒸用。玄参为使，恶贝母、菟丝子、漏芦、反藜蘆。苦参一两，或酒煎，或醋煮，能吐天行时毒。

【讲解】（1）癩：即疔风，又名大风、大麻风、麻风。为接触传染性皮肤疾病。

苦参以燥湿杀虫为主要功效。为豆科多年生落叶亚灌木植物苦参的根。采挖后去芦头、须根，晒干切片入药。

本品性寒甚苦，归心、肝、胃、大肠、膀胱经。功能清热燥湿、祛风杀虫，兼利小便。苦参沉降下行，常用于下焦湿热之证，如热痢、黄疸、热淋及阴痒等证，以其杀虫止痒作用，又可用于皮肤疾患，如疥癣、湿疹等证。还有利尿之功。至于《备要》所云补阴益精，养肝胆，安五脏，利九窍，生津止渴，是说湿热清而五脏得安，津液遂存，并不是真有补益的功效。

【临证应用】苦参多用于湿热泄痢，可单味煎服，或配木香、甘草等同用，如香参丸，其效与黄连相近；治黄疸可配山栀、龙胆草等；治妇人赤白带下，多配黄柏、蛇床子等，近年来用治现代医学的阴道滴虫有效。苦参治疗各种皮肤疾患。可煎服，也可外用。如以之煎汤浴

洗，治皮肤瘙痒，脓疱疮；治疥癣，常配枯矾、硫黄等制膏涂擦。与大风子、苍耳子等同用，还可用于麻风。

其治湿热蕴结的小便不利，配石苇、车前子、蒲公英等清热利湿药可获效。

【用量用法】3~10克，煎服。外用适量。本品大苦大寒，凡脾胃虚寒，食少便溏者忌用。反藜芦。

白鲜皮

〔原文〕气寒善行，味苦性燥。行水故燥。入脾胃除湿热，兼入膀胱小肠。行水道，通关节，利九窍，为诸黄风痹之要药。一味白鲜皮汤，治产后风。时珍曰：世医止施之疮科，浅矣。兼治风疮疥癣，女子阴中肿痛。湿热乘虚客肾与膀胱所致。根黄白而心实，取皮用。恶桑螵蛸、桔梗、茯苓、萆薢。

【讲解】白鲜皮善祛湿热，为治皮肤病，湿热痒疮之要药。为芸香科多年生草本植物白鲜的根皮。干燥根皮表面黄白色，内面淡黄色。切片，生用。

本品苦寒，善祛湿热。湿热蕴于肌肉，则外生湿疹疥癣，皮肤瘙痒；湿热下注则为阴部肿痒，赤白带下。本品归脾、胃经。走肌肉以祛风除湿，入膀胱经，兼利小便，使湿热从小便出，故为治皮肤病，湿热痒疮之要药。本品治黄疸湿痹之证，即是取其气寒性燥，能化湿热的功用。

【临证应用】白鲜皮用于湿热疮毒，湿疹疥癣，肌肤湿烂多脓或流黄水和皮肤瘙痒等证，常与金银花、黄柏、荆芥、苍术等同用，以增强清热除湿解毒之功，如白鲜皮汤。若与苦参、蛇床子、川椒等煎汤外洗，可治妇人阴痒带下。配合其它相应的药物，亦可用于湿热黄疸和湿热痹证。

【用量用法】 6~10克，煎服。外用适量。

秦皮

〔原文〕苦寒，色青性涩。补肝胆而益肾。以能平木，能除肝热。故治目疾洗目赤，退翳膜。惊痫；以其收涩而寒，故治崩带下痢；仲景白头翁汤用之。以其涩而补下焦，故能益精有子。时珍曰：天道贵涩，惟收涩故能补。今人只知其治目一节，几于废弃，良为可惋。出西土，皮有白点，渍水碧色，书纸不脱者真。大戟为使，恶吴茱萸。

【讲解】秦皮清热燥湿，兼收敛之功。为木樨科落叶乔木植物苦枥白蜡树或小叶白蜡树的树皮。主产于吉林、辽宁、河北等地。树皮表面灰褐色，有浅色斑点，水浸液呈黄碧色，并有兰色荧光。切块，晒干生用。

本品苦涩性寒，入肝、胆、大肠经。清热燥湿之中兼有收敛作用，且能清肝胆之火。常用于治疗湿热泻痢及肝热目疾，目赤肿痛等症。味涩，又兼止带之功，可治湿热带下。

【临证应用】秦皮用于湿热痢疾，里急后重，常与白头翁、黄连、黄柏同用，如白头翁汤。用于肝胆郁热，目赤肿痛，目生翳膜等证，可单用煎汁外洗，或与黄连、竹叶等煎服。《本经》云：治风寒湿痹。经观察，本品确有减轻肌肉风湿疼痛的作用。湿热带下亦可配用。

秦皮与黄连皆为苦寒之品，均有止痢治目疾之功，但黄连苦寒清热力大，善泻心火，入胃止呕；秦皮性涩收敛，兼止湿热带下。

【用量用法】3~10克，煎服。外用适量。

第三节清热凉血药

清热凉血药，多为苦甘咸寒之品。具有清解营分、血分热邪之功，适用于温热病热入营血，而见高热心烦、神昏舌绛，及血热发斑、吐血、衄血等证。

邪热入于营血，易伤阴耗液。本类药中有的兼有养阴作用，用于热病伤阴者更为适宜，可起到标本兼顾之功。

另外，清热凉血药，不宜用于热在气分之证，以免邪热遏伏，发生变证，若气血两燔，则须与清热泻火药同用。

本类药，性寒滋腻，易伤脾败胃，脾胃虚弱者应忌用。

犀角

〔原文〕苦酸咸寒。凉心泻肝，清胃中大热，祛风利痰，辟邪解毒。治伤寒时疫(1)，发黄(2)发斑，伤寒下早，热乘虚入胃则发斑；下迟，热留胃中亦发斑。吐血下血，蓄血(3)谵狂，痘疮黑陷。消痈化脓，定惊明目。妊妇忌之。能消胎气。时珍曰：五脏六腑，皆禀气于胃。风邪热毒，必先干之，饮食药物，必先入胃。角，犀之精华所聚，足阳明胃药也。故能入阳明，解一切毒，疗一切血，及惊狂斑痘之证。《抱朴子》曰：犀食百草之毒及棘，故能解毒，饮食有毒，以角搅之，则生白沫。乌而光润者胜，角尖尤胜。鹿取茸，犀取尖，其精气尽是在也。现成器物，多被蒸煮，不堪入药。入汤剂磨汁用，入丸散锉细。纸裹纳怀中，待热捣之立碎。《归田录》曰：人气粉犀。升麻为使。忌盐。

【讲解】(1)时疫：指有季节性流行性传染病。(2)发黄：指由各种原因引起遍身皮肤或眼巩膜发黄的证状。(3)蓄血：病证名。指外感热病，邪热入里，与血相搏，而致瘀热蓄结于内的病证。

犀角以清心火，凉血解毒为主要功效。为犀科脊椎动物的角。商品分暹罗角和广角两类。暹罗角的原动物为亚洲所产印度犀、爪哇犀和苏门答腊犀。广角的原动物为非洲产的黑犀和白犀。暹罗角主产于印度、尼泊尔、缅甸、泰国、马来西亚及印度尼西亚等地。广角主产于非洲东部及东南部，均系进口药材。药用锯成小条，名犀角条；或刨成薄片，名犀角片；或锉成细末，名犀角粉；或磨汁服。

本品性属阴寒，味兼苦咸。归心、肝、胃三经。入心、肝血分，则可凉血定惊；入阳明胃经，又能清热解毒，尤善清心经邪热，解血分热毒而为清心火、解血毒之专病。故凡一切热证，邪入心肝之高热神昏，痉厥抽搐，或温毒内陷营血之发斑发黄，以及热盛迫血妄行之吐血衄下血等证，均为要品。其气清香，有清透不遏之功，故对斑疹热毒壅盛、不能透发者，用之尤佳。此外，也可用治热毒壅盛的疮疡肿毒或疗毒走黄等证。寒凉之品，血分之药，非热入营血者不宜轻用。

【临证应用】犀角用于温热病，热盛火炽，壮热不退，神昏谵语，常与连翘、麦冬、元参等配伍，如清宫汤；对温热病邪热入营，而见烦

渴舌赤，夜寐不安者，可配银花、黄连、玄参等药以清营透热，如清营汤。若热陷心肝，症见高热烦躁、惊厥抽搐者，又常与羚羊角等息风止痉药配伍，如紫雪丹。用于血热妄行的吐血衄血等症，本品有较强的凉血止血作用，常与生地、丹皮等配伍，如犀角地黄汤。若温热病，热毒炽盛，发斑发疹，其色紫暗以及发黄者，常与石膏、玄参等配伍，如化斑汤。发黄则与清热解毒的大青叶、栀子等配伍，如犀角大青汤。疮痈肿，由于热毒壅盛而病势严重者，也可用本品以清解热毒。

【用量用法】1 — 3克，多制散冲服，或磨汁服。孕妇慎用。畏川乌、草乌。

生地黄

〔原文〕甘苦大寒。入心肾。泻丙火，小肠为丙火，心与小肠相表里，导赤散与木通同用。清燥金。肺、大肠火。消瘀通经，平诸血逆。治吐衄崩中，唾血者，血随唾出，咯血者，随痰咯出，或带血丝，出肾经及肺经。自两胁逆上吐出者，属肝经。衄血者，血溢于脑，从鼻而出，咳血者，咳出痰内有血，并属肺经。吐出呕出成盆成碗者，属胃经。经漏不止曰崩，血热则妄行，宜以此凉之。虚人忌用，用干地黄可也。伤寒阳强，痘证大热。痘证用之甚多，本草未载。多服损胃。生掘鲜者，捣汁饮之。或用酒制，则不伤胃。生则寒，干则凉，熟则温。故分为三条，以便施用。近日都用浙产长细者为鲜生地。

【讲解】鲜生地功以清热凉血为主，并能养阴生津。为玄参科多年生草本植物怀庆地黄或地黄的根。挖出晒干用称干地黄，如随用随挖，或挖出鲜根埋于泥土中，随用随取，则称鲜地黄或鲜生地。古时“鲜地黄”也称生地黄，如《本草逢原》曰：采得鲜者，即为生地黄。但现在生地黄多指干地黄，《备要》文中生地黄则指鲜地黄而言。地黄古时以河南怀庆产者油性大，根断面外层杏黄色，中心类白色，呈菊花心状，品质最优，称怀地黄，系道地药材。

本品甘苦大寒，体润多汁，入心、肝、肾经。功能清热凉血，养阴生津，故凡急性热病，血热壅盛的发斑发疹及吐血、衄血、尿血、崩漏下血等用之均宜。

【临证应用】鲜生地对急性热病，热入营血，身热口干舌绛，斑疹出血等症，常配犀角、玄参等用；热病津伤，口渴多饮者，可直接用鲜品捣汁冲服，效果尤佳。然大苦大寒，最易伤阳碍胃，故凡脾虚有湿，食少便溏者忌用。

【用量用法】10~30克，煎服或鲜品捣汁冲服。

干地黄

〔原文〕甘苦而寒，沉阴而降。入手足少阴心、肾。厥阴心包肝。及手太阳经。小肠。滋阴退阳，生血凉血。治血虚发热，经曰：阴虚生内热。劳伤咳嗽，咳嗽阴虚者，地黄丸为要药，亦能除痰。丹溪曰：久病阴火上升，津液生痰不生血，宜补血以制相火，其痰自除。痿痹惊悸，有触而心动曰惊，无惊而自动曰悸，即怔忡也。有因心虚火动者，有因肝虚胆怯者，有因水停心下者，火畏水故悸也。地黄能交心肾而益肝胆，亦能行水，故治之。吐衄尿血，痛为淋血，不痛为尿血。由心肾气结，或忧思房劳所致，多属虚寒，不可专作热治。血运崩中，经曰：阴虚阳搏谓之崩，足下热痛，折跌绝筋。生地一斤，瓜姜糟一斤，生姜四两，炒熟，罨伤折处，冷则易之。又生地汁三升，酒升半，煮服，下扑损瘀血，填骨髓，长肌肉，利大小便，调经安胎。又能杀虫，治心腹急痛，《海上方》：捣汁和面作饅食，能利出虫，忌用盐。《本草汇》曰：丹溪云气病补血，虽不中病，亦无害也。不知血药属阴，其性凝滞，若胃虚气弱之人，过服归、地等剂，反致痞闷，饮食减少，变证百出，至死不悟，岂不惜哉！大抵血虚，固不可专补其气；而气虚亦不可徒补其血也。凡劳病，阳虚宜四君补气；阴虚宜四物补血；阴阳俱虚者，宜合用，名八珍汤。江浙生者，南方阳气力微；北方生者，纯阴力大，以怀庆肥大菊花心（1）者良。酒制则上行外行，姜制则不泥膈。恶贝母，畏茺莢。忌莱菔、葱蒜、铜铁器。得酒、门冬、丹皮、当归良。

【讲解】（1）菊花心：地黄断面，射线在木质部中形成的裂隙，呈放射状，状如菊花，故名菊花心。

干地黄清热凉血，养阴生津，尤善长滋阴养血。干地黄与鲜地黄来源相同。干地黄放干燥后切片生用，或炒炭用。干、鲜两者性味、归经也相同，然又各有侧重。鲜者苦重于甘，其气大寒；干者甘重于苦，寒性略减。两者虽都有清热、养阴、凉血之功，却同中有异。鲜地黄清热凉血突出，干地黄滋阴养血为胜。故干者多用于阴虚发热，潮热骨蒸，消渴，血热吐衄，肠燥便秘以及月经不调等。另外可交心肾以治心悸怔忡。

《备要》云有酒制、姜制者，古时取地黄酒炒，旨在防苦寒伤阳碍胃；用姜制以防滞腻泥膈，现已少用。

【临证应用】 干地黄治温热病，热入营血，发热口干，舌绛等证，常与犀角、玄参等配用，以增强清营养阴功效，如清营汤。对温热病后期，余热未清，阴津已伤，阴虚内热者尤为适宜，常与青蒿、知母、鳖甲等配伍，如青蒿鳖甲汤。治血热妄行的吐血、衄血等出血证，配侧柏叶、生艾叶、生荷叶同用，如四生丸。若血热毒盛，发斑发疹而色紫暗者，可与犀角、丹皮、赤芍等配伍，以凉血消斑，如犀角地黄汤。

本品清热力较弱而长于养阴，配麦冬、玉竹可养胃阴以生津，如益胃汤；配山茱萸、山药、茯苓等可滋肝肾之阴，如六味地黄丸。配当归、黄芩、黄芪等，养阴清热，如当归六黄汤。治消渴又常与葛根、花粉、五味子配伍用，如玉泉散。有时还与麦冬、元参配伍，如增液汤，以润肠通便，治肠燥便秘。

【用量用法】 10~30克，煎服。本品甘润性寒而滞，最易伤阳碍胃，故凡脾虚湿滞，食少腹满便溏者忌用。

玄参

〔原文〕苦咸微寒。色黑入肾。能壮水以制火，散无根浮游之火，肾水受寒，真阴失守、孤阳无根，发为火病。益精明目，利咽喉，通二便。治骨蒸（1）传尸（2），伤寒阳毒发斑（3），亦有阴证发斑者。懊憹郁闷不舒。烦渴，温疟洒洒，喉痹咽痛，本肾药而治上焦火证，壮水以制火也。肾脉贯肝膈，入肺中，循喉咙，系舌本。肾虚则相火上炎，此喉痹咽肿咳嗽吐血之所由来也。潮热骨蒸，亦本于此。此与黄芪能治下焦带浊崩淋同义。瘰癧结核，寒散火，咸软坚。痈疽鼠瘻（4）。音漏。脾虚泄泻者忌用。蒸过焙用，勿犯铜器。恶黄芪、山茱萸、姜、枣，反藜芦。

【讲解】（1）骨蒸：形容其发热自骨髓透发而出，多由阴虚内热所致。（2）传尸：即肺癆，又称劳瘵、传尸劳、尸注等。（3）阳毒发斑：又称阳斑。凡发斑因于外感热病，属于实热性者，统属阳斑范围。（4）鼠瘻：颈腋部淋巴结核，即瘰癧，溃后久不收口，形成瘻管，故名。

玄参滋肾养阴，泻火解毒。为玄参科多年生草本植物玄参的根。又名元参、黑参。挖出根，反复堆、晒，至内部色黑，切片生用。

本品甘苦咸寒，苦寒则能泻火解毒，甘寒则能滋水养阴，咸寒质润，又能软坚润燥。入肾经，能壮肾水制浮游之火，具有清上彻下之功，为滋阴降火之要药。常用治热病伤阴，心烦口渴、懊憹不眠，或肾水不足，虚火上扰之咽痛目赤，骨蒸劳热，及温病伤阴劫液，津枯便秘，阳毒发斑和瘰癧痰核，痈肿等证。

玄参性寒滑肠，故凡脾虚泄泻，食少便溏者不宜使用。

《备要》言蒸过焙用，系传统认为生用寒性较甚，清热解毒之力强，经蒸制后则长于滋阴、泻无根之火。现多生用。

【临证应用】玄参用于温热病热入营血，阴伤口渴，或发斑疹等证，常配生地、赤芍、丹皮等同用。热病伤津之津枯便秘，常配麦冬、生地等以滋阴增液，或再加大黄、芒硝，泄热通便，如增液承气汤。本品为治咽喉肿痛常用药，属风热外感者，可配牛蒡子、桔梗、薄荷

等；属阴虚火旺者，可配麦冬、桔梗、生地等，后者尤为适宜。对于痈肿疮疡，多与银花、连翘、紫花地丁等配伍。治脱疽，常与银花、甘草、当归配伍，如四妙勇安汤。治瘰疬、痰核，可配贝母、牡蛎等药，如消瘰丸。

【用量用法】10—15克，煎服或入丸、散剂。反藜芦。

牡丹皮

〔原文〕辛甘微寒。入手足少阴心，肾。厥阴。心包、肝。泻血中伏火，色丹故入血分。时珍曰：伏火即阴火也，阴火即相火也。世人专以黄柏治相火，不知丹皮之功更胜，故仲景肾气丸用之。和血凉血而生血，血热则枯，凉则生，破积血，积瘀不去则新血不生。通经脉，为吐衄必用之药。血属阴本静，因相火所逼，故越出上窍。治中风五劳（1），惊痫（2）癰疽。筋脉伸缩抽掣为癰疽，或手足抽掣，口眼喎斜，卒然眩仆，吐涎身软，时发时止为病。皆阴虚血热，风火相搏，痰随火涌所致。除烦热，疗痈疮，凉血。下胞胎，退无汗之骨蒸。张元素曰：丹皮治无汗之骨蒸，地骨皮治有汗之骨蒸。神不足者手少阴，志不足者足少阴，故仲景肾气丸用丹皮，治神志不足也。按《内经》曰：水之精为志，故肾藏志；火之精为神，故心藏神。单瓣花红者入药，肉厚者佳。酒拌蒸用。畏贝母、菟丝、大黄，忌蒜、胡荽，伏砒。时珍曰：花白者补，赤者利，人所罕悟，宜分别之。

【讲解】（1）五劳：指肺劳、肝劳、心劳、脾劳、肾劳五种虚劳证。
（2）惊痫：泛指惊风、痫证各种病证。

牡丹皮功专凉血散瘀，且具有凉血而不留瘀，活血而不妄行的特点。为毛茛科多年生落叶小灌木植物牡丹的根皮。药材以条壮皮厚粉性足者为佳。生用者，系原药材去外皮及木心，洗净切片晒干用。简称丹皮。炒用者，可减轻寒凉辛散之性；或以酒炒，以加强辛散化瘀作用。

《纲目》记载丹皮“赤花者利，白花者补。”《本草正义》亦有“赤者行性多，白者行性缓”一说，故《备要》谓花红者入药。

本品苦辛微寒。入心、肝血分。苦寒清血热，辛散行瘀血，故有清热凉血，活血散瘀之功，具有凉血而不留瘀，活血而不妄行的特点。其气清芳，入肾经，又善清透阴分伏热，故凡热入营血之吐衄发斑，或血滞经闭，痈肿疮毒，创伤瘀血，及阴虚发热，无汗骨蒸等多用之。

【临证应用】牡丹皮用于温热病热入血分而发斑疹及吐血衄血，配清热凉血药可收化斑止血之功，如犀角地黄汤，即以本品与生地、犀角等同用。用于阴分伏热，或夜热早凉，以及阴虚内热等，常与知母、

鳖甲等同用，以退虚热。此种凉血退热之功，还可配白芍、黄芩、柴胡等，如宣郁通经汤，用于妇人月经先期等血分有热、有瘀之证。血滞经闭，痛经癥瘕等证，常与桂枝、桃仁等同用，如桂枝茯苓丸。跌打损伤，瘀滞疼痛，又常与乳香、没药等配伍。

此外，本品能凉血消痈，又常用治痈肿疮毒，治外痈可配金银花、连翘、白芷等药；治肠痈等内痈多配桃仁、冬瓜仁、大黄等，如大黄牡丹汤。

总之，丹皮为临床常用之品，凡血分有热有瘀之实热证，皆可应用。然月经过多及孕妇慎用。

本品功效与赤芍相似，均能凉血散瘀，故二药常相须为用。但丹皮清热凉血作用较佳，既能清血分实热，又能治阴虚发热；赤芍活血祛瘀之力为优，并善止痛。

本品与生地均能治阴虚发热，但生地重在甘寒滋阴，能使阴生而热退；丹皮清芳透达，使热退而有利阴生，故二者常相须为用。

【用量用法】6—12克，煎服或入丸散。

紫草

〔原文〕甘咸气寒。入厥阴心包、肝。血分。凉血活血，利九窍，通二便。咸寒性滑。治心腹邪气，即热也。水肿五疸，痼癬(1)恶疮，血热所致。及痘疮血热毒盛，二便闭涩者。血热则毒闭，得紫草凉之，则血行而毒出，大便利者忌之。《活幼心书》曰：紫草性寒，小儿脾实者可用，脾虚者反能作泻。古方惟用茸，取其初得阳气，以类触类，用发痘疮。今人不达此理，一概用之误矣。泻者忌用。去头须酒洗。

【讲解】(1)痼癬：痼，音ge。痼癬即湿疹。

紫草以凉血、解毒透疹为主要功效。为紫草科多年生草本植物紫草和新疆紫草的根。晒干，切片入药。

本品甘寒质润，入心、肝血分。长于凉血活血，解毒透疹。凡血热毒盛，斑疹紫黑，麻疹欲出不畅，兼大便秘结者用之最宜。其它疮疡湿疹，烧伤等亦可应用。

【临证应用】紫草多用于麻疹或温热病发斑疹，因血热毒盛，透发不畅或斑疹紫黑、大便秘结者，可配大青叶、连翘、牛蒡子、赤芍等同用。因本品能滑肠，脾虚便溏者忌用。

此外，临床尚可用其预防麻疹，常同甘草配伍煎服，可减少发病或减轻症状。

治疮疡湿疹、烫伤等，可单用或配白芷、血竭等熬膏外用，如生肌玉红膏。

【用量用法】 6~12克。外用适量。

童便

〔原文〕咸寒。时珍曰温。能引肺火下行从膀胱出，乃其旧路，降火滋阴甚速，润肺散瘀。咸走血。治肺痿失音，吐衄损伤，凡跌打损伤，血闷欲死者，攀开口以热尿灌之，下咽即醒。一切金疮受杖，并宜用之，不伤脏腑，若用他药，恐无瘀者，反致误人矣。胞胎不下。皆散瘀之功。凡产后血晕，败血入肺，阴虚久嗽，火蒸如燎者，惟此可以治之。晋·褚澄《劳极论》曰：降火甚速，降血甚神；饮溲溺百无一死，服寒凉药百无一生。取十二岁以下童子，少知识，无相火。不食荤腥酸咸者佳。去头尾，取中间一节清澈如水者，用当热饮。热则真气尚存，其行自速；冷则惟有咸寒之性。入姜汁、行痰。韭汁散痰。更好，冬月用汤温之。李士材曰：炼成秋石，真元之气渐失，不及童便多矣。《普济方》：治目赤肿痛，用自己小便，乘热抹洗，即闭目少顷，此以真气退其邪热也。

【讲解】童便具有滋阴降火，止血消瘀之功。取十岁以下健康儿童的小便，故名为童便。一般去头尾，用中间一段。

本品味咸性凉，入肺、肝、肾经。有滋阴降火之功，可治阴虚发热；还能止血消瘀，用治劳伤咳血、吐血、衄血、产后血瘀、血晕、跌打损伤、血瘀作痛等证。《本草经疏》曰：人尿为除劳热骨蒸，咳嗽吐血及妇人产后血晕闷绝之圣药。其味咸而走血，咸寒能伏虚热，使火不上炎而血不妄溢，是以能疗诸血之证也。

【临证应用】用于吐血不止，童便加糖矫味，乘热服，每次150—300毫升，日服二次。

人中黄

〔原文〕甘寒入胃。清痰火，消食积，大解五脏实热。治天行热狂，痘疮血热，黑陷不起。纳甘草末于竹筒中，紧塞其孔，冬月浸粪缸中，至春取出洗，悬风处阴干，取甘草用。亦有用皂荚末者。竹须削去青皮。一云即粪缸中多年黄泥(1)，煨存性用。

【讲解】 (1) 泥：(Yin印)沉淀的渣滓。

人中黄功能清热凉血解毒。制法：用甘草磨成细粉，装入一端有节的竹筒内，另一端用布塞紧，松香封口，将竹筒刮去箴青，浸入清水粪坑中2—3月。一般多于冬季浸入，至翌年春取出，用清水漂2—3星期，每天换水一次，至无臭味为度。阴干后，劈开竹筒，取出甘草，晒干即成。

本品味甘性寒，入心、胃经。有清热凉血解毒之功，用治伤寒热病，大热烦渴，热毒斑疹，丹毒疮疡等证。

【临证应用】 人中黄配黄连、石膏煎服，可治温疫热毒；配伍金银花、丹皮、生山栀，以治丹毒。

【用量用法】 6—9克，煎服(布包)或入丸散。

人中白

〔原文〕咸平。降火散瘀，治肺瘀鼻衄，刮人中白，新瓦火上煨干，调服即止。劳热消渴，痘疮倒陷，牙疳口疮，即溺涎，煨研用。以蒙馆童子便桶，山中老僧溺器刮下者尤佳。

【讲解】(1)煨:(fū复)原作“逼”，据文义改。火烤为煨。

人中白功专清热降火消瘀。为人尿自然沉结的固体物。煨人中白，即取人中白置坩锅内，炭火煅至红色，取出，放凉；飞人中白，即取人中白研成细末，再水飞至无声为度。

本品味咸性寒，入肺、肝，膀胱经。可清热降火、消瘀，治劳热肺痿，衄血吐血，喉痹牙疳，口舌生疮等证。《纲目》曰：人中白，降相火、消瘀血，盖咸能润下走血故也。今人病口舌诸疮，用之有效，降火之验也。

【临证应用】煨人中白，研入麝香少许，酒下，治鼻衄；配枯矾，研匀外用，治口舌生疮；用人中白研极细末，好酒调下，治跌扑损伤、闪挫，骨伤极重者。

【用量用法】3-6克，内服，入散剂。外用适量，研末吹或调敷患处。

芸苔

〔原文〕辛温。散血消肿，捣贴乳痈丹毒，孙思邈曰：捣贴丹毒，随手即消，其效如神。动疾发疮。即油菜。道家五葷之一。

芸苔子与叶同功，治产难。

【讲解】芸苔功能行血散结。为十字花科植物油菜的嫩茎叶。其种子也供药用，称芸苔子。

本品性味辛凉。入肺、脾、肝经。功能消肿散血，主治劳伤吐血，血痢丹毒，热毒疮疡，乳痈等。

芸苔子性味辛温，功能行血破气，消肿散结，可治产后血滞腹痛，血痢肿毒，痔漏等症。

【临证应用】芸苔及芸苔子临床少用，今列举一二供参考。

《近效方》治热肿：蔓菁根三两，芸苔苗叶根三两。上二味捣，以鸡子清和，贴之，干即易之。

《千金方》治小儿赤丹：芸苔菜汁服三合，滓敷上。

《产乳集验方》芸苔散：芸苔子（炒）、当归、桂心、赤芍药等分（为末），每酒服二钱。治产后恶露不下，血结冲心刺痛，并治产后心腹诸疾。

《圣惠方》用芸苔子半两（生用）、甘草半两，捣细罗为散，每服二钱，以水一中盏，煎至五分，食前温服。治大肠风毒，下血不止。

【用量用法】芸苔内服多煮熟或捣汁用，外用煎水洗或捣敷。芸苔子内服煎汤，5—10克，或入丸散；外用研末调敷或榨油涂。

第四节 清热解毒药

清热解毒药具有清火热、消肿毒的特点，适用于各种热毒证，如痈肿疮疖，丹毒斑疹，咽喉肿痛，以及痢疾，虫蛇咬伤等证。

临床应用本类药物时，应根据热毒表现的不同证候，结合药物的特点，针对性地选择适宜的药物，或配伍有关药用。如热毒邪气在血分者，应配清热凉血之品；火热炽盛者，应配泻火药；挟湿者当配伍燥湿或利湿药物等等。对于虚人还要适当配伍补益药以固护正气。但疮疡、喉痹、痢疾等属阴证寒证者，则不宜应用。

金银花

〔原文〕甘寒入肺。散热解毒，清热即是解毒。补虚凡物甘者皆补。疗风，养血止渴。丹溪曰：痈疽安后发渴，黄芪六一汤吞忍冬丸切当。忍冬养血，黄芪补气，

渴何由作。治痈疽疥癣，杨梅恶疮（1），肠澼血痢，五种尸症

（2）。经冬不凋，一名忍冬。又名左缠藤。花叶同功，花香尤佳，酿酒代茶，熬膏并妙。忍冬酒，治痈疽发背一切恶毒，初起便服奇效。干者亦可，惟不及生者力速。忍冬五两，甘草二两，水二碗，煎至一碗，再入酒一碗略煎，分三服，一日一夜吃尽。重者日二剂，服至大小肠通利，则药力到。忍冬丸，照前分两，酒煮晒干，同甘草为末，以所煮余酒打糊为丸。陈藏器曰：热毒血痢，浓煎服之。为末，糖调常服，能稀痘。

【讲解】（1）杨梅恶疮：由梅毒引起的各种皮肤病变。因疮形似杨梅，故名。（2）尸症：即劳瘵。与现代医学之结核病相似。

金银花为治热毒疮痈，风热表证的要药。为忍冬科多年生常绿缠绕性木质藤本植物忍冬的花蕾。又名忍冬花、二宝花。生用，或炒炭用。或制为露剂。

本品味甘性寒，入肺、胃、大肠、心经。古人认为：六淫为害，以火为最，火盛者谓之毒。解毒之药必治火，治火之药亦解毒。因此，药性寒凉而入心经的金银花，既能清热，又能解毒，为外科常用的清热解毒药，以治疮痈疔肿诸证。

本品轻扬入肺经，善散肺经之邪热，故又为宣散风热之佳品，用于外感风热或温热病初起，发热而微恶风寒者。本品炒炭，则入血分，以治热毒血痢，既可清热解毒，又能止血。还可将金银花加水蒸馏，制成金银花露，为清凉解暑之品，供夏季饮用，可清热解暑，并清利头目，还能防治热疖痄子等证。

《备要》所谓补虚、养血，治五种尸症等功，《本草求真》阐释甚为明了。指出：殊不知书言能补虚者，因其芳香味甘，性虽入内逐热，而气不甚迅利伤损之意也。书言能养血者，因其毒结血凝，服此毒气顿解，而血自尔克养之谓也。……至云能治五种尸症，亦不虚。（飞

尸、遁尸、风尸、沉尸、尸症，五症病因不一，但此专主风湿内结为热而言。）

江浙地区，地处东南，天气炎热，其处人们常以金银花代茶饮用，具有清热解暑之功。

【临证应用】金银花善治热毒疮痈，疔肿疔毒等证，无论外疮内痈，均常应用，取其清热解毒之功，可单用或与蒲公英、野菊花、紫花地丁等同用，以加强解毒消肿作用，如五味消毒饮。若肿毒较重，为促进消散或加速溃破，可与穿山甲、皂角刺等配伍，如仙方活命饮。用鲜品捣烂外敷，亦有较好疗效。治肠痈，又可配当归、苡仁、黄芩等药，如清肠饮。咽喉肿痛者，则多与解毒清咽之品如大青叶、山豆根等配合使用。

本品轻宣疏散，用于外感风热或温热病初起，常与连翘、荆芥等配伍，以增强其疏散清热之功，如银翘散；若热入气分，壮热烦渴，可与石膏、知母、连翘等同用，则泻火解毒作用更为显著。若热入营血，斑疹隐隐不显，舌红而干，神烦少寐者，可与生地、丹皮等同用，可奏清营护阴，凉血解毒之功。

用于热毒泻痢，腹痛下脓血，可单用浓煎服。重证可与黄连、白芍、白头翁等同用。

【用量用法】10—30克，煎服。外用适量。凡热毒疮痈，用量宜重；温病发热，用量宜轻，且宜生用；治血痢便血，则须炒炭用。

附：**忍冬藤** 为忍冬的茎叶，又名银花藤。性味功效与金银花相似，解毒作用虽不及银花，但有通经活络的作用，可消除经络之风湿热邪而止疼痛，故可用于风湿热痹，关节红肿疼痛，屈伸不利之证。

连翘

〔原文〕微寒升浮，形似心，实似莲房有瓣，苦入心，故入手少阴厥阴心、心包。气分而泻火，兼除手足少阳，三焦、胆。手阳明经大肠。气分湿热。散诸经血凝气聚。营气壅遏，卫气郁滞，遂成疔肿。利水通经，杀虫止痛，消肿排脓。皆结者散之。凡肿而痛者为实邪，肿而不痛为虚邪，肿而赤者为结热，肿而不赤为留气停痰。为十二经疮家圣药。经曰：诸疮痛痒，皆属心火。

【讲解】连翘以清心泻火，解毒疗疮为特长。为木樨科落叶灌木植物连翘的果实。白露前采初熟果实，色尚青绿，称青翘；寒露采熟透果实，则为黄翘。以青翘入药为佳。生用。

本品味苦，性微寒。入心、肺经。苦以泄火，寒能清热，且轻清上浮，能透达表里，以清心泻火、散上焦风热为特长，多用于外感风热或急性热病，烦热神昏，以及血热发斑等证。

经曰：诸痛痒疮，皆属于心。连翘既能清心，又能宣畅气血以散血结气聚，故有消肿散结之功，以治疮疡肿毒，瘰疬结核之证，被历代医家称为疮家圣药。此外，本品具有利小便作用，可治热结尿闭，小便淋痛。

【临证应用】连翘清热透邪，多用于外感风热或温病初起，头痛发热，口渴等证，常与金银花相须为用，或加牛蒡子、薄荷等同用；治温热病热入心包，高热烦躁神昏，常以连翘心配犀角、莲子心等同用，如清宫汤。

治疗疮疡痈肿，可配金银花、天花粉等解毒消肿之品；治瘰疬多与夏枯草、玄参、贝母等药配用，以解毒散结。

另有连翘心，即青翘晒干，筛取籽实者便是。连翘心尤长于清心热，治热陷心包，神昏谵语之证。

【用量用法】 6-15克，煎服。

蒲公英

〔原文〕甘平。花黄属土，入太阴阳明。脾、胃。化热毒，解食毒，消肿核，专治乳痈。乳头属厥阴，乳房属阳明。同忍冬煎，少入酒服，捣敷亦良。疗毒（1）。亦为通淋（2）妙品。诸家不言治淋，试之甚验。擦牙乌髭发，《瑞竹堂》有还少丹，方取其通肾。东垣曰：苦寒肾经君药。白汁涂恶刺。凡螳螂诸虫，盛夏孕育，游诸物上，必遗精汁，干久则有毒。人手触之成疾，名狐尿刺，惨痛不眠，百疗难效，取汁厚涂即愈，千金方极言其功。叶如萵苣，花如单瓣菊花，四时有花，花罢飞絮。断之茎中有白汁。郑方升曰：一茎两花，高尺许者，掘下数尺，根大如拳，旁有人形拱抱，捣汁酒服，治噎膈如神。

【讲解】（1）疗毒：疗疮之重者。疗疮为外科常见病，以其坚硬根深，形如钉状，故名。（2）通淋：为治疗尿急、短、赤、涩、痛，淋漓不断之淋证的一种方法。

蒲公英长于清热解毒，散结消肿，为外科常用要药。为菊科多年生草本植物蒲公英及其多种同属植物的带根全草。又名黄花地丁。茎中含白色汁液；叶根生，排成莲座状，叶片矩圆状披针形，被白色绒毛；花茎上部亦密被白色丝状毛；头状花序，顶生，全部为舌状花，两性。鲜用，或生用。

本品苦甘性寒，入肝、胃经。功能解热毒，消痈肿，常用于热毒痈肿疮疡及内痈等证。本品尚能疏郁通乳，对乳痈初起，红肿坚硬，脓肿尚未形成者，有显著疗效，故为治疗乳痈之要药。

本品既能清热解毒，还能利湿，用于湿热黄疸及湿热下注，小便淋沥涩痛等证。

本品尚可用于肝火上炎，目赤肿痛，而奏清肝明目之功。至于云其解食毒，擦牙乌髭发，《本草求真》谓：况此属土，花黄，故于食滞可解，毒气可散；又能入肾凉血，故于髭发可染。

【临证应用】蒲公英常用于热毒痈肿，疗疮肿毒，肺痈肠痈，目赤肿痛等证。治痈肿疗毒，常配银花、紫花地丁、野菊花等，如五味消毒饮。治乳痈可单用，以鲜品内服或捣敷，亦可配银花、连翘、穿山甲

等。若治肺痈咳吐脓血，则多与鱼腥草、芦根、冬瓜仁、桔梗等清热祛痰排脓药同用。配大黄、赤芍、牡丹皮、金银花等同用，则用于肠痈热毒壅盛之证；配板蓝根、元参，可治咽喉肿痛；配茵陈，治湿热黄疸；配金钱草、白茅根等，治小便淋沥涩痛。若目赤肿痛，可与黄芩、菊花、决明子等配用，亦可单味煎汤熏洗。

近年来，常用于治疗现代医学之上呼吸道感染，肺炎、急性肝炎、急性胆囊炎、尿路感染，以及胃、十二指肠溃疡等病，均获较好疗效。

【用量用法】10—30克，煎服。外用适量。若用量过大，可致缓泻。

紫花地丁

〔原文〕辛苦而寒。治痈疽发背，疗肿瘰癧，无名肿毒。叶如柳而细，夏开紫花结角，生平地者起茎，生沟壑者起蔓。

【讲解】紫花地丁为痈肿疗毒通用之药，治疗毒尤为特长。为堇菜科多年生草本植物紫花地丁，或豆科植物米口袋的带根全草。鲜用，或生用，切段入药。书载植物形状似为后者：其叶丛生、卵形或长卵形，花紫色，花冠蝶形，荚果圆筒形。

本品苦辛寒，入心、肝经。苦泄辛散，寒能清热，故能清热解毒、消散痈肿，为治血热壅滞、红肿热痛的疗痈疮疖通用之药，而以治疗疗毒为其特长。

【临证应用】紫花地丁治疗热毒疗疮痈肿，可单用鲜品捣汁服，并以其渣敷患处，或配银花、蒲公英、野菊花；鲜品取汁服，其渣加雄黄少许捣匀外敷，可治毒蛇咬伤；若为肝热目赤肿痛，可配清肝明目药菊花、夏枯草、青葙子等同用。

【用量用法】10-16克，煎服。外用适量。

大青叶

〔原文〕微苦咸，大寒，解心胃热毒。治伤寒时疾热狂，阳毒发斑，热甚伤血，里实表虚，则发斑。轻如疹子，重如锦纹，紫黑者，热极而胃烂也，多死。

《活人书》：治赤斑烦痛，有犀角大青汤。黄疸热痢，丹毒喉痹。处处有之，高二三尺，茎圆叶长，叶对节生，八月开小红花成簇，实大如椒，色赤。用茎叶。

【讲解】大青叶大寒清热解毒，又善凉血消斑。大青叶植物来源众多，常用的有十字花科二年生草本植物菘蓝，或爵床科多年生灌木状草本植物马蓝，蓼科一年生草本植物蓼蓝，马鞭草科落叶灌木植物路边青的叶或枝叶等，生用或鲜用。

本品味苦大寒。苦能泄降，大寒清热。归心、胃经。善清心、胃热毒，还能凉血消斑。故凡温热病热入气分，壮热、烦渴、神昏，以及热毒深入血分的发斑，发黄，均可使用。余如血热毒盛的丹毒、疔腮、咽喉肿痛、疮疡肿毒等证亦常配用。

【临证应用】大青叶大寒清热，温病初起，发热口渴者，可配银花、荆芥、牛蒡子等辛凉解表、清热解毒之品同用。温病热毒入于血分，壮热烦躁，发斑神昏者，可配犀角、山梔等凉血解毒药，以凉血消斑，如犀角大青汤。治咽喉肿痛，可鲜品打汁服，或配银花、山梔等内服。

丹毒、疮疡肿毒，以本品配银花、升麻、玄参等内服，或单用鲜品捣烂外敷。

近年来用本品治疗现代医学之病毒性及细菌性感染，如流行性腮腺炎，流行性脑脊髓膜炎，病毒性肺炎，传染性肝炎，流感，扁桃腺炎等，皆取得较好效果。

【用量用法】10—30克，煎服，或鲜品捣汁饮服。外用适量。

附：板蓝根 为菘蓝或马蓝的根，味苦性寒，功效与大青叶相似，亦为清热解毒要品。常用于温热病热毒发斑，咽喉肿痛，及大头瘟，疔

腮，痈肿疮毒等多种热毒之证。如温热病初起发热头痛，可与银花、连翘、荆芥、薄荷等同用。治大头瘟，头面红肿，咽喉肿痛和痄腮，常与黄连、连翘、牛蒡子、玄参等配伍，如普济消毒饮。

青黛

〔原文〕咸寒，色青泻肝。散五脏郁火，解中下焦蓄蕴风热，《衍义》曰：一妇患脐腹二阴偏生湿疮，热痒而痛，出黄汁，二便涩。用鳊鲠、松脂、黄丹之类涂之，热痛愈甚，其妇嗜酒，喜食鱼虾发风之物。乃用马齿苋四两研烂，入青黛一两和涂，热痛皆去，仍服八正散而愈。此中下焦蓄蕴风热，毒气若不出，当作肠风内痔，妇不能禁酒物，果仍发痔。治伤寒发斑，吐咯血痢，阴虚火炎者忌用。合杏仁研，置柿饼中煨食，名圣饼子，治咯血。小儿惊痫，痘热丹热，敷痈疮蛇犬毒。即靛花，取娇碧者，水飞净用。内多石灰，故须淘净。

【讲解】青黛有清热解毒，凉血散肿的功效。为菰蓝、马蓝、蓼蓝、草大青等植物（详见大青叶）叶中的色素，经加工制取，干燥而成的粉末状物。又称靛花、靛花沫。

本品咸寒，寒能泄热，咸入血分。主入肝经。故能清热解毒，凉血清肿，主治热病发斑，血热妄行的吐血，咯血，血痢及小儿惊风，丹毒疮痛等证。

【临证应用】青黛凉血解毒，清肝、肺、胃诸经郁热。治热毒发斑，常与石膏、生地等同用，如青黛石膏汤；治血热所致的吐衄出血，可单用或配侧柏叶、白茅根等同用。

肝胆火郁的小儿惊风，发热痉挛，可配钩藤、牛黄等药而奏息风止痉之效，如凉惊丸。治热毒痈疮、疔腮肿痛，可单用或配银花、连翘、元参等服用，亦可调敷患处。

据研究，应用青黛口服，对现代医学之慢性粒细胞性白血病有一定疗效。从青黛中提取有效成分靛玉红，用治上述疾病也可获效。

【用量用法】1—3克。因其难溶于水，故只作丸散，或入汤剂冲服，不入煎剂。外用适量。

败酱草

〔原文〕苦平。解毒，排脓，行经破血，治痈肿及内痈。

【讲解】败酱草以清热解毒，消痈排脓为主要功效。为败酱科多年生草本植物黄花败酱或白花败酱的带根全草。阴干，切段，生用。我国北方习惯以菊科植物茺菹菜的带根全草作败酱用；南方地区习惯以十字花科植物蔊菜的根、果实、全草作败酱用。

本品味辛苦性微寒，入大肠、胃经。辛以散结活血排脓，苦寒清热解毒。毒解瘀散则痈肿自消，故为疮疡肿毒之常用药。因其辛散入肠胃，可行肠胃之瘀滞，而治内痈，尤多用于肠痈证。亦可治肺痈咳唾脓血。

【临证应用】败酱草用于肠痈成未脓者，常与金银花、丹皮、蒲公英等同用。若肠痈已成脓，则与苡仁、附子配伍，即薏苡附子败酱散。治肺痈可配鱼腥草、芦根、桔梗等。血滞，胸腹疼痛，可单用或与郁金、当归、川芎、元胡等同用。

【用量用法】10—15克，煎服。外用适量。

土茯苓

〔原文〕甘淡而平。阳明胃、大肠。主药，健脾胃，祛风湿，脾胃健则营卫从，风湿除则筋骨利，利小便，止泄泻。治筋骨拘挛，杨梅疮毒，杨梅疮，古方不载。明正德间起于岭表，其证多属阳明、厥阴而兼及他经。盖相火寄于厥阴，肌肉属于阳明故也。医用轻粉劫剂，其性燥烈，入阳明劫去痰涎，从口齿出，疮即干愈。然毒气窜入经络筋骨，血液枯槁，筋失所养，变为拘挛痲漏，竟致废痲。土茯苓能制轻粉之毒，去阳明湿热，用一两为君，苡仁、金银花、防风、木通、木瓜、白鲜皮各五分，皂角子四分，气虚加人参七分，血虚加当归七分，名搜风解毒汤。**瘰癧疮肿**。湿郁而为热，营卫不和，则生疮肿。经曰：湿气害人，皮肉筋脉是也。土茯苓淡能渗，甘能补，患脓疥者，煎汤代茶，甚妙。**大如鸭子，连缀而生，可名冷饭团**。有赤白两种，白者良，可煮食，亦呵生啖。忌茶。杨梅毒用为主药。

【讲解】土茯苓善能解毒除湿，且利关节。为治疗梅毒之要药。为百合科多年生常绿藤本植物土茯苓的根茎。干燥根茎为不规则块状，表面呈土棕色或棕色。富粉质。故有红土苓和冷饭团之名。切片，生用。

另外，同属植物暗色菝葜的根茎，又名白土苓，在少数地区亦作土茯苓使用。

本品味甘淡，性平。入肝、胃经。功能利湿导热，尤长于解毒，历来为治梅毒要药。土茯苓尚能利关节，解轻粉、水银毒，故对梅毒或因梅毒服用轻粉等汞剂而致肢体拘挛者，功效尤佳。现常用于热毒疮痈，热淋尿赤涩痛，以及湿疹湿疮，瘰癧等证。惟系淡渗之品，易于伤阴，故肝肾阴虚者慎用。据文献记载，服药时不可饮茶，否则能引起脱发，宜引起注意。

【临证应用】土茯苓用于杨梅疮毒或因服汞剂所致的肢体拘挛，可较大剂量单用煎服或与金银花、白鲜皮、威灵仙、甘草等同用，如复方土茯苓汤；用于痲肿疮疖，可与金银花、蒲公英、连翘等配用；用于湿疹湿疮等皮肤病，可配苦参、黄柏、白鲜皮、地肤子等清利湿热之品同用。治热淋，常与木通、萹蓄、瞿麦等利尿通淋药同用。

【用量用法】 15—60克，煎服。

马勃

〔原文〕辛平轻虚。清肺解热，东垣普济消毒饮中用之。散血止嗽。治喉痹咽痛，吹喉中良，或加白矾或硝扫喉，取吐痰愈。鼻衄失音。外用敷诸疮良。生湿地朽木上，状如肺肝，紫色虚软，弹之粉出，取粉用。

【讲解】马勃味辛质轻，长于宣散，以利咽消肿为主要功效。为马勃科植物大颞马勃、紫颞马勃与脱皮马勃的干燥子实体。此子实体呈扁球形或类球形，外皮灰棕色至黄棕色，纸质。体轻泡，柔软有弹性，内藏大量孢子，轻微捻动即有粉尘状孢子飞出。除去外层硬皮，切成方块或研粉用。

本品辛平质轻，入肺经。善能宣散肺经郁热，尤长于利咽消肿，为治肺经风热，咽喉肿痛的常用药，亦可用于肺热咳嗽，失音。单用敷压伤口即可止血，故又常用于外伤出血之证。张寿颐曰：寇宗奭治喉痹咽疼，盖既散郁热，亦清肺胃，确是喉证良药。东垣普济消毒饮用之，亦是此意。内服外敷，均有捷验，诚不可以微贱之品而忽之。

《备要》云：外用敷诸疮良。《本草从新》释曰：每见用寒凉药敷疮者，虽愈而热毒内攻，变生他病，为害不小，惟马勃辛平而散，甚为稳妥。

本品系辛散轻扬之品，故若肺无邪热者不宜用。

【临证应用】马勃治肺经邪热所致的咽喉肿痛、咳嗽失音等证，常与桔梗、板蓝根、玄参等配伍，如普济消毒饮。用于外伤出血，可单用其块或其粉敷压伤口。此法又可用治冻疮。若用于吐血衄血，可配其他清热止血药。

【用量用法】3—6克，煎服，或入丸散用。外用适量。

山豆根

〔原文〕苦寒。泻心火以保金气，去肺、大肠之风热。心火降，则不灼肺而金清；肺与大肠相表里，肺金清，则大肠亦清。消肿止痛。治喉痛喉风

（1），龈肿齿痛，含之咽汁。喘满热咳，腹痛下痢，五痔诸疮，解诸药毒，敷秃疮蛇狗蜘蛛伤，疗人马急黄。血热极所致。苗蔓如豆，经冬不凋。

【讲解】（1）喉痛喉风：喉痛，指发生于喉间及其附近部位的痛疡的通称。喉风，咽喉部突然肿痛，呼吸困难，吞咽不适，痰涎壅盛，语言难出等危急证候的总称。

山豆根苦寒降泄，为治热毒炽盛，咽喉肿痛之要药。为豆科植物柔枝槐（广豆根）的根。此外，尚有北豆根，为防己科多年生藤本植物蝙蝠葛的根茎。切片，生用。北豆根为北方所习用。

本品味苦性寒，入肺经。以喉属太阴，龈属阳明，肺胃火毒上攻，则咽喉牙龈肿痛。本品性善泄降下行，能清泄肺胃之火，而有解毒利咽消肿之功，故为治咽喉病证之要药，对热毒蕴结，咽喉肿痛者尤佳。

此外，本品还可用于湿热所致黄疸。对肺热咳嗽及痈肿疮毒，则有清肺热和散肿止痛之效。

北豆根功效与之相似，但除清热解毒，治咽喉肿痛外，据现代医学研究，尚能降血压，可用于高血压病。

【临证应用】山豆根治咽喉肿痛之轻证，可单用煎服，并含漱；重证者，配玄参、射干、板蓝根等清热解毒药，以增强疗效。也可连翘、桔梗、牛蒡子等宣散肺经风热药同用，以治风热所致者。此外，本品还有抗癌作用，可用于多种癌肿，尤其对早期喉癌、肺癌有一定疗效。

苦寒之品，不宜用于脾胃虚寒，食少便溏者。

【用量用法】6—10克，煎服，或磨汁服。外用含漱，或研末涂敷患处。

射干

〔原文〕苦寒有毒。能泻实火，火降则血散肿消，而痰结自解，故能消心脾老血，行太阴肺、脾。厥阴肝。之积痰。治喉痹咽痛为要药。搗汁醋和，噙之引涎。《千金方》：治喉痹有乌扇膏。治结核瘰疬，便毒疮母。鳖甲煎丸，治疟母用之，皆取其降厥阴相火也。通经闭，利大肠，镇肝明目。扁竹花根也。叶横铺如乌羽及扇，故一名乌扇、乌翼，泔水浸一日，薑竹叶煮半日用。

【讲解】射干清热解毒，尤长于利咽祛痰。为鸢尾科多年生草本植物射干的根茎。又名乌扇（《本经》）、乌翼（《别录》）。切片，生用。

本品味苦性寒，入肺经。肺热炽盛，上炎灼喉，则咽喉肿痛；热郁于肺，蒸液为痰，则咳喘痰多。火降血行则肿痛自消，痰消结散则喘咳自平。射干苦寒入肺，善能降火解毒，行血消肿而利咽喉，清肺祛痰而平喘咳，故可用于咽喉肿痛及痰多喘咳之证。《本草纲目》称本品治喉痹咽痛为要药。惟其性苦寒善降，虚人服之易泄，宜注意。

【临证应用】射干用于咽喉肿痛，系痰热壅盛者，可单用鲜品捣汁含咽，或以醋研汁噙，引涎出即可。亦常与黄芩、桔梗、牛蒡子、甘草等清肺利咽药相配用，或与升麻、马勃同用，如射干汤，以祛痰散结，利咽消肿。治肺热咳嗽痰多者，可与桑白皮，马兜铃、桔梗等清肺化痰止咳药同用，如射干兜铃汤。若与麻黄、细辛、半夏等温肺化痰药配伍，如射干麻黄汤，以治寒痰壅塞，痰鸣气喘，咳嗽痰多之证。

【用量用法】6—10克，煎服。泄降之品，孕妇忌用或慎用。

白头翁

〔原文〕苦坚肾，寒凉血。入阳明胃、大肠。血分。治热毒血痢，仲景治热痢，有白头翁汤，黄连、黄柏、秦皮。东垣曰：肾欲坚，急食苦以坚之。痢则下焦虚，故以纯苦之剂坚之。温疟寒热，齿痛骨痛，肾主齿骨，龈属阳明。鼻衄秃疮，瘰癧疔瘰，血痔偏坠。捣敷患处。明目消疣。有风反静，无风则摇，近根处有白茸。得酒良。

【讲解】白头翁功专凉血止痢。为毛茛科多年生草本植物白头翁的根。全株密被白色长柔毛，根顶端丛生白色茸毛。切片，生用。

本品苦寒泄降，入大肠经。善能清肠胃热毒而长于凉血止痢。为治热毒下痢之要药，常用于痢疾偏血热者。

《备要》云治温疟寒热，及明目消疣。《本草求真》释云：何以用此以治温疟寒热，齿痛骨痛，鼻衄秃疮疔瘰等证？亦因邪结阳明，服此热解毒清，则肾不躁扰而骨固，胃不受邪而齿安，毒不上侵而衄止，热不内结而疔与瘰皆却，风无热炽，而小儿头秃除矣，总皆清解热毒之力也。至于明目消疣，临床很少应用。

【临证应用】白头翁为治痢要药，用于湿热泻痢或热毒下痢，证见发热腹痛，下痢脓血，里急后重等证者，常与黄连、黄柏、秦皮等解毒治痢药同用，如白头翁汤。若下痢日久，正气已虚，则需配伍党参、白术等益气健脾药。此外，本品与柴胡、黄芩、槟榔、青蒿等配伍，可用于温疟之证。

【用量用法】6-15克，煎服，或入丸散。

马齿苋

〔原文〕酸寒。散血解毒，祛风杀虫。治诸淋疳痢，《海上方》：捣汁合鸡白服，治赤白痢。血癖（1）恶疮，多年恶疮，敷两三遍即瘥。烧灰煎膏，涂秃疮湿癣。小二丹毒（2）。捣汁饮，以滓涂之。利肠滑产。叶如马齿，有大小两种，小者入药，性至难燥。去茎用。亦忌鱼蟹同食。

【讲解】（1）血癖：瘀血阻滞于两胁而成的痞块。（2）丹毒：病名。因患部皮肤红如涂丹，热如火灼故名。发无定处者名赤游丹；发于头部者名抱头火丹；发于小腿者名流火。

马齿苋功能凉血解毒，为治湿热泻痢之品。为马齿苋科一年生肉质草本植物马齿苋的全草。

本品味酸性寒，入心、肝、大肠。味虽为酸，但性寒滑利，既能清热解毒，凉血消肿，又能滑利大肠而使陈垢去，肠胃洁，邪热除，肠胃畅，故为治热痢脓血常用要药。血热则妄行，凉血不仅能消肿以治热毒疮痈丹毒，并能止血，故可用于血淋、热淋及崩漏等证。惟性寒滑利，冷痢或脾虚泄泻者忌用。

【临证应用】 马齿苋用于湿热下痢脓血，里急后重，可单用鲜品捣汁服或与黄连、枳实等同用。治热毒疮疡和丹毒，可单用煎服，并以鲜品捣烂外敷患处。若与凉血止血药同用，对崩漏下血也有一定止血作用。

【用量用法】 30—60克，鲜品加倍，煎服。外用适量。

白蔹

〔原文〕苦能泄，辛能散，甘能缓，寒能除热。杀火毒，散结气，生肌止痛。治痈疽疮肿，面上疮疮，金疮扑损，箭簇不出者，同丹皮或半夏为末酒服。敛疮方多用之，故名。每与白及相须。搽冻耳。同黄柏末油调。蔓赤，枝有五叶，根如卵而长，三五枝同窠，皮乌肉白。一种赤蔹，功用皆同。郑奠一曰：能治温疟血痢，肠风痔瘡，赤白带下。

【讲解】 白蔹以散结生肌为主要功效。为葡萄科多年生藤本植物白蔹的块根。藤本蔓生，攀缘他物而上升。其叶互生，掌状复叶，具柄。块根呈纺锤形，两头略尖，较弯曲，外皮红棕色，断面白色或淡红色。趁鲜切片，晒干生用。

本品苦辛微寒。入心、胃、肝经。长于散结消痈，敛疮生肌。用于疮痈肿毒之证，内服、外用，随证施治，未脓可消，已脓可拔，脓尽可敛，配合适宜，奏效颇著。故为热毒痈肿、汤火烫伤及热毒留滞、疮溃不敛之要药。

【临证应用】 白蔹用于疮疡肿毒及火烫伤。疮痈初起未成脓者，无论内服外用，都可获散结消肿之效，可单用内服，或与连翘、金银花、赤芍等清热解毒，凉血止痛药配伍，亦可研末外敷或同赤小豆同研，鸡蛋清调敷患处。治疮痈已脓者，可促使内托排脓，配白芷、花粉、穿山甲等同用；疮痈溃后脓净不敛者，可与当归、乳香、没药等养血生肌药同用。亦可与白芨等研末外用，以敛疮生肌。如白蔹散。治烧伤烫伤，可单用为末敷患处。

【用量用法】 5—10克，煎服。外用适量。反乌头。

漏芦

〔原文〕 咸软坚，苦下泄，寒胜热。入胃、大肠，通肺、小肠。散热解毒，通经下乳，排脓止血，生肌杀虫。治遗精尿血，痈疽发背，古方以漏芦汤为称首。及预解时行痘疹毒。取其寒胜热，又能入阳明故也。出闽中，茎如油麻，枯黑如漆者真。甘草拌蒸，连翘为使。

【讲解】 漏芦为下乳汁，消痈肿之专药。为菊科多年生草本植物祁州漏芦或禹州漏芦的根。以外皮灰黑色、条粗、质坚、不裂者为佳。其茎直上，单一，密生蛛丝状毛及白色柔毛。《曰华子本草》名之为鬼油麻。切片，生用。

本品苦寒滑利，入胃经。功能清热解毒，促使痈肿消散。常用于疮痈肿痛，疗毒发背等证。因其独入阳明，既能泄热解毒，又善消痈通乳，故尤多用于乳闭、乳痈之证。然系苦寒之品，痈肿属阴性者忌用。

所谓治遗精尿血，《本草求真》解释说：然书又云，遗精尿血能止，亦因毒解热除自止之意，非因漏芦寓有收涩之力也。现临床一般少用。

【临证应用】 漏芦用于疮痈肿毒，尤多用于乳痈。本品具有消痈肿、下乳汁之功，多与连翘、大黄、公英等清热泻火，解毒疗疮药同用；用于热邪壅滞，乳汁不下，乳房胀疼，本品除能清解邪热外，尚能促进乳汁排泄，常与善能下乳的穿山甲、王不留行等配伍。

【用量用法】 6-12克，煎服。

山慈姑

〔原文〕甘微辛，有小毒。功专清热散结。治痈疮疗肿，瘰癧结核，醋磨涂。解诸毒蛊毒，蛇虫狂犬伤。根与慈姑、小蒜相类，去毛壳用。玉枢丹中用之。《广笔记》曰：出处州遂昌县洪山，无毛，云真者有毛，误也。

【讲解】 山慈姑善能消痈散结。为兰科植物杜鹃兰和独蒜兰的假球茎。别名毛慈姑。此外，百合科多年生草本植物老鸦瓣的鳞茎，亦作山慈姑用，又名光慈姑。生用。

本品味辛性寒，有小毒，入肝、胃经。本品内服、外用都有清热解毒、消痈散结之效，用于痈疽发背、疗肿恶疮等证。

【临证应用】 山慈姑用于热毒痈疽发背，疗毒恶疮，前人皆以醋磨涂敷，今人多与雄黄、朱砂等解毒疗疮之品配伍，如紫金锭，可内服或外敷。

【用量用法】 3~6克，多作丸或散剂内服，较少入煎。外用适量。

绿豆

〔原文〕 甘寒。行十二经。清热解毒，一切草木金石砒霜毒皆治之。利小便，止消渴，治泻痢。连皮用。其凉在皮。

绿豆粉扑痘疮溃烂良。一市民诵《观音经》甚诚，出行折一足，哀叫菩萨。梦僧授一方，绿豆粉新铄炒紫色，井水调，厚敷纸贴。杉木扎定，其效如神。

【讲解】 绿豆功能清热解毒，为消暑之佳品。为豆科一年生草本植物绿豆的种子。打碎入药，或连皮研粉用。

本品甘寒淡渗，入心、胃经。能清心胃之热而解毒，消暑除烦而止渴，并兼能利尿。凡中巴豆、附子等诸热药及酒食诸毒，大量服之，均可解救，故为解毒良药。用以解除暑热烦渴，疮疡肿毒等证，亦均有效。

【临证应用】 绿豆用于暑热烦渴，热病津伤之证，以及夏令炎热之际，均可单味煎汤饮服，以消暑、除烦、止渴。用治痈肿疮毒，单用本品煎汤频饮；用于砒石、附子、巴豆、苍耳草等一切草木金石诸药中毒，均可连皮生研，冷开水浸泡，绞汁顿服。亦可与黄连、甘草等同用，以增清热解毒之效。外用，与大黄研末，用鲜薄荷打汁调涂治疮痈，丹毒红肿热痛之证。

【用量用法】 30-60克。消暑止渴，可煮服； 解毒急救，宜冷开水浸泡，连皮生研绞汁服。外用适量。

菱

〔原文〕 甘寒，安中消暑，止渴解酒。有两角、三角、四角、老嫩之殊。《武陵记》：以三角、四角者为菱，两角者为菱。菱花随月而转，犹葵花之向日。

【讲解】 菱甘凉，生食清暑，熟食健脾。为菱科一年生水生草本植物菱的果肉。又名芰（《尔雅》郭璞注），俗名菱角。

菱角味甘，性凉。入大肠、胃经。生食清暑解热，除烦止渴；熟食益气健脾，以治暑热烦渴，泄泻等证。

【用量用法】 生用或熟用。临床作为药用较少。

橄榄

〔原文〕 甘涩而温。肺胃之果，清咽生津，除烦醒酒，解河豚毒，投入煮佳。及鱼骨鲠。如无橄榄，以核磨水服。橄榄木作舟楫，鱼拨着即浮出，物之相畏有如此者。

橄榄核烧灰，敷疔疮良。

【讲解】 橄榄长于清肺利咽，兼能生津解毒。为橄榄科常绿乔木植物橄榄的果实。又名青果。鲜用，或生用，或烧存性用。

本品味甘涩酸，性平，主入肝经。具有清肺生津，利咽解毒之功，可治咽喉肿痛，烦渴，肺热咳嗽、咳血，及河豚鱼、酒中毒等。

橄榄核为橄榄的果核。甘涩而温，无毒。烧存性研末调敷，可治冻疮及鱼骨梗喉。

【临证应用】 橄榄鲜用，即鲜青果，同鲜莱菔水煎服，可治风火喉痛，喉间红肿，如《王氏医案》之青龙白虎汤。治肺热咳嗽、咽喉肿痛，常与胖大海、桔梗、银花、甘草等配用。若河豚鱼或酒中毒，可单用鲜橄榄榨汁频服。

【用量用法】 6—15克，大剂量可用至30~60克。煎服，或捣汁，或熬膏。外用，烧存性研末调敷。

梨

〔原文〕 甘微酸寒。润肺凉心，消痰降火，止渴解酒，利大小肠。治伤寒发热，热嗽痰喘，中风失音。捣汁频服。《圣惠方》梨汁煮粥，治小儿心脏风热昏躁。切片贴汤火伤。多食冷利，脾虚泄泻，及乳妇血虚人忌之。生者清六腑之热，熟者滋五脏之阴。实火宜生，虚火宜熟。《泊宅篇》有仕宦病消渴，医谓不过三十日死，即弃官归，途遇一医，令致北梨二担，食尽则瘥，宦如其言，食及五六十枚而病愈。杨吉老介医术甚著，一士有疾，厌厌不聊，往谒之。杨曰：汝证热已极，气血全消，三年当以疽死，不可为也。士不乐而退，闻茅山一道士，医术通神，但不肯以技自名。乃衣僮仆之服，诣山拜之，愿执役席下。道士喜留，只事左右，历两月久，觉其与常隶别，扣所从来，再拜谢过始以实告。道士笑曰：世间那有医不得的病，试诊脉。又笑曰：吾亦无药与汝，便可下山买好梨，日食一颗，梨尽取干者泡汤，和滓食之，疾当自平。士人如戒，经一岁复见吉老，颜貌腴泽，脉息和平。惊曰：君必遇异人。士人以告。杨衣冠焚香，望茅山设拜，盖自咎其学之未至也。捣汁用，熬膏亦良。加姜汁、蜂蜜佳，清痰止嗽。与莱菔相间收藏则不烂，或削梨蒂扞莱菔上。

【讲解】 梨功能清热生津，润肺化痰。主要为蔷薇科植物白梨、沙梨、秋子梨等栽培种的果实。鲜用。

本品味甘微酸，性凉，入肺、胃经。具有清热生津，润肺化痰之功。用治热病津伤，烦渴消渴，热咳燥咳，及气喘失音，便秘等证。外用捣敷，可治烫火伤。

【临证应用】 梨用于温热病津伤口渴，便秘等症，常以其汁与荸荠汁、鲜苇根汁、藕汁、麦冬汁配伍，如五汁饮；用于外感温燥，干咳无痰，或痰少而粘，气喘音哑等证，常用梨皮与桑叶、桔梗、沙参、栀子、杏仁等配伍，以加强清肺润燥之功。

【用量用法】 内服：生食，或捣汁，或熬膏，适量。外用：切薄片或捣敷患处。甘寒之品，脾虚便溏及寒嗽者忌服。

甘蔗

〔原文〕 甘寒。和中助脾，除热润燥，止渴治消渴。消痰，解酒毒，利二便。《外台方》嚼咽或捣汁，治发热口干便涩。治呕哕反胃，《梅师方》：蔗汁、姜汁和服，大便燥结。蔗汁熬之，名石蜜，即白霜糖。唐大历间，有邹和尚始传造法。性味甘温，补脾缓肝，润肺和中，消痰治嗽，多食助热损齿生虫。紫沙糖功用略同。

【讲解】 甘蔗功专清热生津。为禾本科多年生草本植物甘蔗的茎秆。捣汁生用。

本品味甘性寒，入肺、胃经。具有清热生津，下气润燥之功，用治热病津伤，心烦口渴，反胃呕吐，肺燥咳嗽，大便燥结等症。兼解酒毒。《随息居饮食谱》誉之“榨浆名为天生复脉汤。”

【临床应用】 甘蔗用于热病烦渴，常单用捣汁服。若配生姜汁，可治反胃吐食。然其性寒，脾胃虚寒者慎用。

【用量用法】 捣汁内服，适量。

茶

〔原文〕 苦甘微寒。下气消食，去痰热，除烦渴，清头目，得春初生发之气，故多肃清上膈之功。《汤液》曰：茶苦寒下行，如何是清头目？《蒙筌》曰：热下降，则上自清矣。醒昏睡，清神。解酒食油腻烧炙之毒，利大小便。多饮消脂最能去油。寒胃。故浓茶能引吐。《千金》疗卒头痛如破，非中冷、中风，由痰厥气上冲所致，名厥头痛，单煮茶恣饮取吐，直吐出胆汁乃已，渴而即瘥。酒后饮茶，引入膀胱、肾经。患痼疝水肿，空心亦忌之。与姜等分浓煎，名姜茶饮，治赤白痢。茶助阴，姜助阳，使寒热平调。并能消暑，解酒食毒。陈细者良，粗者损人。

【讲解】 茶功能清头目，除烦渴，利尿。为茶科常绿灌木植物茶的芽叶。生用。

本品苦甘性凉，入心、肺、胃经。功能清头目，除烦渴，化痰消食，利尿解毒。可治头痛目昏，多睡善寐，心烦口渴，食积痰滞，疟痢等证。并能醒酒。《本草求真》曰：茶禀天地至清之气，得春露以培，生意克足，纤芥滓秽不受，味甘气寒，故能入肺而清痰利水，入心以清热解毒，是以垢腻能涤，炙搏能解。凡一切食积不化，头目不清，痰涎不消，二便不利，消渴不止，及一切便血、吐血、衄血、血痢、火伤目疾等证，服之皆能有效。

【临证应用】 茶叶用于风热上攻，头目昏痛，可单用煎服，或与防风、川芎、白芷、薄荷、荆芥等配伍，共奏疏风清热止痛之效，如川芎茶调散；配伍黄柏、薄荷、煅硼砂、冰片，各研极细，和匀吹之，治诸般喉症；小便不通、脐下胀满者，可以与海金沙捣散，以生姜、甘草煎汤调服。本品单味浓煎服，则可治痢疾。茶叶研末，调敷，治脚趾缝烂疮。

【用量用法】 3 — 9克，煎服或泡茶。

芭蕉根

〔原文〕味甘大寒。治天行热狂(1)，烦闷消渴，产后血胀(2)，并捣汁服。**涂痈肿结热**。为末油调敷，霜后者佳。

【讲解】(1)天行热狂：指流行热病发狂。(2)产后血胀：产后恶露不下，腹部胀痛。

芭蕉根功主清热解毒。为芭蕉科植物芭蕉的根茎。

本品味甘性大寒，功能清热止渴，利尿解毒。故可用于治疗热病烦闷、消渴以及产后血瘀腹胀。外用治热毒痈肿，疔疮丹毒。

【临证应用】芭蕉根临床极少应用。据《日华子本草》载，单用捣汁服，可治天行热狂，烦闷消渴；捣烂外敷，可治肿毒游风。《浙江民间草药》记载治疗现代医学之高血压病，单味煎服或与猪肉煮食。

【用量用法】10-30克，煎服或捣汁服。外用适量，捣敷患处。

枳椇子

〔原文〕甘平。止渴除烦，润五脏，解酒毒。葛根解酒，而发散不如枳椇。屋外有枳椇树，屋内酿酒多不佳。赵以得治酒毒房劳病热者，加葛根于补气血药中，一贴微汗，反懈怠，势如故，知气血虚，不禁葛根之散也，必得枳椇方可，偶得干者加入即愈。《东坡集》曰：杨颖臣病消渴，日饮水数斗，饭亦倍进，小便频数，服消渴药日甚。延张肱诊之，笑曰：君几误死！取麝香当门子以酒濡作十许丸，枳椇子煎汤吞之遂愈。问其故，肱曰：消渴消中，皆脾弱肾败，土不制水而成。今颖臣脾脉极热，肾脉不衰，当由酒果过度，积热在脾，所以多食多饮，饮多溲不得不多，非消非渴也。麝香坏酒果，枳椇能胜酒，故假二物以去酒果之毒也。雷敦曰：凡使麝香，用当门子尤妙。俗名鸡距，以实拳曲如鸡距，蜀呼为棘枸。经霜黄赤，甚甘。其叶入酒，酒化为水。

【讲解】枳椇子功专解酒。为鼠李科落叶赤木植物枳椇的带有肉质果柄的果实或种子。又名木蜜。生用。自河北、河南，以至广东、贵州、云南均有分布。

本品味甘酸，性平，入心、脾经。功能清热除烦、解酒。治酒醉烦热，口渴呕吐，二便不利。

【临证应用】枳椇子用于饮酒过多，烦热口渴，可与葛花同用。与甘蔗配伍，可治吐血。然临床少用。

【用量用法】 内服，煎汤10~15克；浸酒或入丸剂。脾胃虚寒者禁用。

第五节 清虚热药

清虚热药药性亦多寒凉，具有凉血退热的功效，适用于阴虚发热，骨蒸潮热，手足心热以及口燥咽干，虚烦不寐，盗汗等证，亦可用于温热病后期，邪热未尽，伤阴劫液或发夜热早凉等证。使用本类药时，多与养阴药配伍，以标本兼治。

青蒿

〔原文〕苦寒。得春木少阳之令最早，二月生苗。故入少阳、厥阴胆、肝。血分。治骨蒸劳热，童便捣叶，取汁熬膏。蓐劳虚热，凡苦寒之药，多伤胃气，惟青蒿芬香入脾，独宜于血虚有热之人，以其不犯胃气也。风毒热黄，久疟久痢，瘙疥恶疮，鬼气尸疰。时珍曰：《月令通纂》言伏内庚日，采蒿悬门庭，可辟邪，冬至元旦，各服一钱亦良，则青蒿之治鬼疰，盖亦有所伏也。补中明目。童便浸叶用，熬膏亦良。使子勿使叶，使根勿使茎。

【讲解】青蒿为清热解暑，凉血退蒸之良药。为菊科一年生草本植物青蒿和黄花蒿的全草。而以黄花蒿应用最多、最普遍。同属植物牡蒿，在部分地区亦作青蒿用。鲜用或切段生用。

本品辛苦而寒，气芳香，入肝、胆、肾经。苦寒清热，芳香而散，善能清泄肝胆和血分之热，使阴分伏热升透而外出。故不论温邪伤阴发热，或骨蒸劳热，凡热自阴分而来者，皆为要药。以其芳香疏达，又能清透解肌，祛暑截疟，故在夏令暑热外感及疟疾等证，亦为常用。本品虽具苦寒之性，然芳香而不伤胃，故血虚阴虚之证，用之最宜。但大便溏泻或汗出过多者则当慎用。

【临证应用】青蒿有良好的退虚热作用，常用于温病后期。温热之邪伏于阴分，证见夜热早凉，热退无汗或阴虚发热，骨蒸盗汗之证，多与鳖甲、丹皮、生地等养阴退热药同用，如青蒿鳖甲汤。用于疟疾寒热往来，可单用鲜品捣汁服即有效。若兼暑湿之邪而有恶心胸闷，热多寒少者，可配伍黄芩、半夏、竹茹等药，如蒿芩清胆汤；用于暑热外感，发热无汗等证，可与藿香、佩兰、滑石等清热解暑药同用。若以鲜青蒿与鲜车前草配伍，治小儿暑热腹泻，小便不利之证，亦颇有效。此外对血虚有热的风热瘙痒及血热出血之证，鲜品捣汁服，有止痒止血之功。

青蒿与柴胡功用相似，均入肝胆，都能治疟疾，寒热往来之证。但柴胡偏于升散，长于疏肝解郁，并能升举清阳，多用则有伤阴之虞；青蒿清凉芳香，善解暑热，且无伤阴之弊，故常用于阴虚发热之证。

【用量用法】 5—15克，煎服。或鲜品绞汁服。芳香之品，不宜久煎。

白薇

〔原文〕 苦咸而寒，阳明冲任（1）之药。利阴气，下水气。主中气身热支满（2），忽忽（3）不知人，阴虚火旺，则内热生风，火气焚灼，故身热支满，痰随火涌，故不知人。血厥（4），汗出过多血少，阳气独上，气塞不行而厥，妇人尤多。此证宜白薇汤。白薇、当归各一两，参五钱，甘草钱半，每服五钱。热淋，温疟洒洒（5），寒热酸痛，寒热作，则营气不能内营，故酸痛。妇人伤中淋露（6），血热。《千金》白薇散治胎前产后遗尿不知时，白薇芍药等分，酒调服。丹溪曰：此即河间所谓热甚廷孔郁结，神无所依，不能收禁之意也。廷孔，妇人溺孔也。产烦虚呕。仲景安中益气竹皮丸用之。《经疏》曰：古方调经种子，往往用之。盖不孕缘于血热血少，而其源起于真阴不足，阳甚而内热，故营血日枯也。益阴清热，则血自生旺而有子矣。须佐以归、地、芍药、杜仲、苁蓉等药。似牛膝而短小柔软。去须，酒洗用。恶大黄、大戟、山茱、姜、枣。

【讲解】（1）冲任：指冲、任二脉。（2）支满：指胸胁胀满。（3）忽忽：形容快的意思。（4）血厥：病名。指因失血过多或思怒气逆，血郁于上而引起的昏厥重证。（5）洒洒：形容如寒风冷雨浸淋肌肤的感觉。（6）淋露：形容淋漓不断的证候。

白薇善清血热，退虚热。为萝藦科多年生草本植物白薇和蔓生白薇的根及根茎。切段生用。

本品苦咸性寒。主入肝、胃二经。苦主泄降，咸入血分，寒能清热。既清血分之热，又退阴虚发热。退虚热之中，略有透解之性。故凡一切热病，邪入营血，身热经久不退；或热病后期，余热未尽，阴伤发热；或产后虚热，以及一切原因不明之虚性发热，皆为恒用之品，有较显著的退热作用，但血分无热或脾胃虚寒者不宜服用。

【临证应用】白薇用于热入营血，身热经久不退或骨蒸潮热及产后虚热等证，常与生地、青蒿、地骨皮、丹皮等相配；与人参、当归等配伍，以增补气益血退热之功，用治产后气虚血亏之发热，如白薇汤。本品还可用于肺热咳嗽，多与贝母、桑皮、枇杷叶等配伍，共奏清热化痰之效。此外，本品还兼有利尿通淋作用，如《千金方》治胎前产

后的热淋血淋，配白芍等分为末冲服，或与生地、木通、滑石、淡竹叶等配伍。

【用量用法】 6—12克，煎服或入丸、散剂服。

地骨皮

〔原文〕 甘淡而寒。降肺中伏火，泻肝肾虚热，能凉血而补正气。故内治五内邪热（1），热淫于内，治以甘寒。地骨一斤，生地五斤，酒煮服，治带下。吐血尿血，捣鲜汁服。咳嗽消渴，清肝。外治肌热虚汗，上除头风痛，能除风者，肝肾同治也。肝有热，则风自生，与外感之风不同，热退则自息。中平胸胁痛，清肝。下利大小肠。疗在表无定之风邪，传尸有汗之骨蒸。李东垣曰：地为阴，骨为里，皮为表。地骨皮泻肾火，牡丹皮泻包络火，总治热在外，无汗而骨蒸；知母泻肾火，治热在内有汗而骨蒸。四物汤加二皮，治妇人骨蒸。朱二允曰：能退内潮，人所知也；能退外潮，人实不知。病或风寒散而未尽，作潮往来。非柴葛所能治用地骨皮走表又走里之药，消其浮游之邪，服之未有不愈者，特表明之。时珍曰：枸杞、地骨，甘寒平补，使精气充足，则邪火自退。世人多用苦寒，以苓连降上焦，知柏降下焦，致伤元气，惜哉！予尝青蒿佐地骨退热，累有殊功。甘草水浸一宿用。肠滑者忌枸杞子，中寒者忌地骨皮。掘鲜者同鲜小蓟煎浓汁，浸下疳甚效。

【讲解】（1）五内邪热：指五脏内之热邪。

地骨皮善能凉血退蒸，又能清泄肺热。为茄科落叶灌木植物枸杞的根皮。切段，生用。

本品味甘性寒。入肺、肾二经。既能泻肺火，又善清虚热，为退热除蒸良药。主要用于阴虚血热，骨蒸潮热，盗汗和小儿疳积发热，以及邪热袭肺，肺失肃降，咳嗽气喘或咳血等证。本品能泻热而止烦渴，又可清血热，故可用于消渴尿多和血热妄行的吐血、衄血等证。性寒而降，脾胃虚寒及表邪发热者忌用。

【临证应用】 地骨皮善清虚热，用于阴虚血热，骨蒸潮热，盗汗等证，常与知母、鳖甲等同用，如地骨皮汤；治肺热咳喘，常与桑白皮、甘草同用，如泻白散，共奏清肺泻热作用；用于血热吐血、衄血，多与侧柏叶、藕节、白茅根等凉血止血药同用，清血热而收止血之效。若与生地黄、天花粉等养阴生津药配伍，可治消渴尿多之证。此外，还能泄肾经虚火而止虚火牙痛。

地骨皮与丹皮皆能清退虚热，同为治骨蒸之品，然地骨皮甘寒主在清泄，用于有汗之骨蒸；丹皮辛寒偏于清透，多用于无汗之骨蒸。正如《本草求真》所云：虽与丹皮同治骨蒸之剂，但丹皮味辛，能治无汗骨蒸，此属味甘，能治有汗骨蒸。且丹皮原属入血散瘀之品，汗者血也，无汗而见血瘀，则于辛于寒最宜。

【用量用法】 6—15克，煎服。

胡黄连

〔原文〕 苦寒。去心热，益肝胆，厚肠胃。治骨蒸劳热，五心心窝，左右手心、足心。烦热，三消(1)渴而多饮为上消，肺热也，心移热于肺，传为膈消是也；多食善饥为中消，胃热也，瘵成为消中是也；渴而小便数有膏为下消，肾热而水亏也。五痔，牝痔、牡痔、脉痔、肠痔、血痔，湿热下流伤血分，无所施泄，则逼肛门而为痔肿。温疟泻痢，女人胎蒸(2)。消果子积，为小儿惊疳良药。朱二允曰：解吃烟毒，合茶服之甚效。性味功用同黄连，故名。出波斯国，今秦陇南海亦有之，心黑外黄，折之尘出如烟者真。畏恶同黄连。

【讲解】 (1)三消：根据消渴的多饮、多食、多尿三个主证，区分为上、中、下三消。(2)胎蒸：指孕妇发生劳热骨蒸之证。

胡黄连能退虚热，除疳热，清湿热。为玄参科多年生草本植物胡黄连的根茎。干燥根茎呈圆柱形，表面灰黄色；质硬而脆，易折断，折断时有粉尘飞出；断面皮部灰黑色、木部黄白色。以条粗，折断时有粉尘，断面灰黑。味苦者为佳。古人认为功似黄连，来自西域，故名胡黄连。主产印度，进口为主，西藏亦有少量生产。切片，生用。

本品味苦、性寒。入心、肝、胃、大肠经。功能退虚热，消疳积，清湿热。故可用治阴虚发热，潮热骨蒸，小儿疳积。又有类似黄连的除湿热、解毒作用，也可治湿热泻痢及痔疮等证。

【临证应用】 胡黄连借其清虚热之功，治阴虚骨蒸，潮热盗汗等证，常配银柴胡，地骨皮等药、如清骨散。治小儿疳积，消化不良，腹胀体瘦，与党参、白术、使君子等同用，如肥儿丸，治湿热泻痢，配伍与黄连相同，但不如黄连多用而效佳。

【用量用法】 3—10克，煎服。

小结

本类药物均为寒凉之品。主要用于热性病证。根据各药清热作用的不同特点，可分为清热泻火、清热凉血、清热燥湿及清热解毒、清虚热五类。

一、清热泻火药：本类药物多入气分，均有不同程度的清热泻火作用，适用于热病口渴，壮热烦躁等证，临证时可根据热性病的病变部位和病势轻重选择使用。其中石膏、知母、芦根均为清肺胃气分热之主药，石膏、知母常同用于肺胃大热，津伤烦渴之证，然石膏大寒，清热之力最强，主在清解，多用于肺胃热盛之证；知母质润，清热泻火之力不如石膏，但能滋阴润燥，重在清润。因此，除治热病烦渴，肺热燥咳外，又治阴虚劳热、消渴及相火亢盛之证，实热、虚热均可用。芦根甘寒，清热生津而无恋邪之弊，宜用于热病津伤，烦热口渴，胃热呕哕与肺痈。

栀子清热泻火，药力较缓，常用于热病初起和发热心烦之证，兼可清利湿热，也是治黄疸、淋证的常用药。还可凉血止血解毒，治吐衄等各种出血征。

竹叶善清心胃之火，为治热病心烦，口舌生疮常用之辅助药。淡竹叶长于利尿渗湿，多用于小便不利之证。

夏枯草功能清肝明目，舒肝散结，为治肝火郁结，目赤肿痛及痰火凝结，瘰疬癭瘤之主要药物。据现代医学研究，降压作用较好，治高血压头痛眩晕。西瓜清暑生津。

决明子、谷精草、密蒙花、青葙子、夜明砂、熊胆，均为清肝明目之品，以治肝热目赤肿痛之证，为眼科常用药。其中决明子善解肝经郁热，并有平肝降压，润肠通便之功。穀精草长于疏风明目，善治风热目赤，且能退翳。密蒙花兼能养肝，治视物模糊之虚证较好。青葙子长于泻火明目，治肝火上炎，目赤肿痛等实证为优。熊胆兼能清肝止痉。

二、清热燥湿药：本类药亦多为苦寒之品，均以清热燥湿为主，并有泻火解毒作用。适用于湿热蕴结及痈肿疮毒等证。其中黄芩、黄连、黄柏三药功效相近，然黄芩偏治上焦，善清肺热，并有安胎降压之功；黄连偏走中焦，长于泻心火而除烦，清胃热而止呕，又是治痢要药；黄柏偏治下焦，主泻肾火，除下焦湿热，多用于阴虚阳亢及下焦湿热疮毒等证。

龙胆草为泻肝经实火，清下焦湿热之品，凡肝胆实火，目赤头痛，口苦胁痛，惊风抽搐及湿热下注，阴痒带下，尿频尿痛，湿疹瘙痒等证均常用之。

苦参能燥湿祛风，主治疥癣湿疹、皮肤瘙痒等证，内服、外用均有良效。还善治泻痢、小便不利。白鲜皮功同苦参，兼能除痹退黄。秦皮善治湿热泻痢，兼能明目。

三、清热凉血药：本类药入心、肝血分，有清热凉血作用，适用于热入营血或热邪伤阴之证。

犀角善清心火，凉血解毒之力最强，凡热入营血，高热神昏，惊狂抽搐，发斑发黄，吐血衄血等血热毒盛之证，均以其为主药。但物稀价昂，现多以水牛角代之。

生地、元参清热凉血之中又有养阴生津之功，常同用于热病阴伤之证，但生地凉血养阴之功较强，玄参降火解毒之力为胜，故血热妄行之吐衄多用生地；热毒咽痛，瘰癧脱疽多用元参。

丹皮寒凉辛散，既能凉血，又能活血散瘀，有凉血而不留瘀，活血而不妄行的特点。故血热、血瘀之证皆可治之，还可用于阴虚发热，无汗骨蒸等证。赤芍功似丹皮，而活血祛瘀之力更强，并善于止痛，但无退虚热作用。此药在补血药白芍下。

紫草清热凉血，又善解毒透疹，最宜于斑疹紫暗，血热毒盛之证，并可作预防麻疹之用。

人中黄、人中白均有清热凉血之功，可用于热毒斑疹，疮疡等证。童便除能凉血止血，又能滋阴降火，治阴虚发热，咳血吐血，衄血血瘀

作痛均可。芸苔一药虽有散血，消肿之功，临床却很少用。

四、清热解毒药：本类药物清热之中尤以解毒见长。主用于痈肿疮毒，咽喉肿痛，急性热病及热毒血痢等证。其中银花、连翘、公英、地丁等均为治痈肿疮毒之要药。银花、连翘皆可清上焦风热，治风热感冒，温病初起之证。银花炒炭，可止血治热毒血痢。连翘又长于散结，治瘰癧结核。连翘之心，入心清心，可治烦热神昏。蒲公英兼有疏郁通乳之功，善治乳痈。紫花地丁凉血解毒之力较强，是治疗毒要药。

大青叶、板蓝根、青黛同出一物，均有清热解毒，凉血消斑作用。大青叶多用于热毒斑疹，咽喉肿痛；板蓝根多用于大头瘟、疔腮等证，二药可用于病毒感的疾病；青黛内服能清肝凉血治咳嗽咯血之证，外用治口腔咽喉肿烂及皮肤疮疡之证。

白头翁、鸦胆子、马齿苋，均为治痢之药。然白头翁长于凉血解毒，多用于热毒血痢；鸦胆子长于燥湿杀虫，多用于阿米巴痢疾，并能截疟；马齿苋解毒滑肠，治细菌性痢疾多用，并可消痈肿。

马勃、山豆根、射干均用于咽喉肿痛。马勃轻清辛散，偏重治风热所致的咽痛为佳；山豆根大苦大寒，治热毒所致的咽痛为宜；射干兼能消痰，治痰热之咽痛较好。马勃外用能敛疮止血，山豆根又能抗肿瘤，射干还可降气祛痰。

土茯苓利湿解毒，可用于杨梅疮毒，汞中毒及多种皮肤病。败酱草善散肠中瘀滞，主治肠痈。白蔹、漏芦皆能治疗疮毒，但白蔹治疮疡能消肿，治溃疡可生肌；漏芦能消痈下乳，善治乳痈。山慈菇并能散结消肿，可用于热毒痈肿，瘰癧痰核，内服外敷均可。绿豆清热解毒，既可用于暑热烦渴，又善解一切草木金石诸药中毒。

此外，橄榄、梨、甘蔗等也有清热解毒之功，橄榄尤善利咽喉化痰止咳，梨和甘蔗皆为润燥生津之佳品。枳椇子功专解酒，治酒醉烦热，口渴呕吐等症。茶叶清头目、除烦渴、化痰消食，并善利尿解毒。芭蕉根主能解毒疗疮，兼能生津止渴。

五、清虚热药：本类药性多寒凉，具有养阴退热的功效，适用于骨蒸潮热，低热不退等证。其中青蒿长于清透阴分伏热，且能解暑治疟；银柴胡专退虚热而无升散之弊；白薇善治久热不退及产后血虚发热；地骨皮治有汗之骨蒸，且能降肺火，并为肺热咳嗽，烦热消渴的常用药；胡黄连能消痞退蒸，为治小儿疳疾、劳热骨蒸之品。银柴胡退虚热，除骨蒸，为治骨蒸劳热之专用药，已附于柴胡下。

复习思考题

- 1、何谓清热药？根据其作用可分为几类？各类清热药的适应证是什么？
- 2、试述石膏、知母、栀子、芦根与夏枯草的功效和适应证。
- 3、分析比较石膏与知母、栀子与夏枯草功效不同之处。
- 4、黄芩、黄连、黄柏、龙胆草在功效和适应证上有何异同点。
- 5、应用石膏、黄连时须注意哪些问题？
- 6、阐明你对犀角、玄参、生地、丹皮的功效和适应证的认识。
- 7、分析比较生地与玄参、丹皮与紫草的相同点和不同点。
- 8、试述金银花、连翘、蒲公英、大青叶、射干、山豆根、白头翁、败酱草的功效和适应证。
- 9、犀角和鸦胆子的用量用法及使用时的注意点是什么？
- 10、常用的清虚热药有哪些？它们之间有何差别？
- 11、在清热药中，还有哪些药物尚兼有退虚热作用？各有什么特点？

清热药功用归纳简表

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
清热泻火药	石膏	辛、甘、大寒	肺、胃	清热泻火，除烦止渴	①壮热烦渴 ②肺热咳嗽 ③胃火头痛、牙痛 ④疮溃不敛、烫伤、湿疹	15-60克生用内服，煅后外用	入汤剂先煎

分 类	药 名	性味	归经	功 效	主 治	用 量	备 注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	知母	苦、甘、寒	肺、胃、肾	清热泻火，滋阴润燥	①热病烦渴 ②肺热或肺燥咳嗽 ③骨蒸潮热 ④消渴	6-12克	
	栀子	苦、寒	心、肺、胃、三焦	泻火除烦，清热利湿，凉血止血	①热病心烦 ②湿热黄疸 ③血热妄行的吐血衄出血	3-10克外用适量	
	芦根	甘、寒	肺、胃	清热生津，	①热病烦渴	15-30克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				止呕, 除烦	②肺热咳嗽、肺痛 ③胃热呕吐	鲜品加倍	
	天花粉	甘、微苦、微寒	肺、胃	清热生津, 消肿排脓	①热病烦渴 ②痈肿疮疡	10-15克	天花粉针剂可用于中期妊娠引产
	竹叶	辛、甘、淡、寒	心、胃	清热除烦, 生津、利尿	①热病心烦 ②口舌生疮	6-15克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
					③热淋		
	夏枯草	苦、辛、寒	肝	清肝火，散郁结，降血压	①肝火上炎的目赤肿痛、头晕 ②瘰癧、癭瘤	10-15克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
清热泻火药	决明子	甘、苦、微寒	肝、肾、大肠	清肝、明目、通便	①目赤肿痛 ②便秘	5-15克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	磐精草	辛、甘、平	肝、胃	疏散风热,明目退翳	风热目疾	6-15克	
	密蒙花	甘、微寒	肝	清肝、明目、退翳	肝热或肝虚目疾	6-10克	
	青葙子	苦、微寒	肝	泄火清肝,明目退翳	肝火上炎,目赤肿痛	5-15克	青光眼忌用
	夜明砂	辛、寒	肝	清肝明目	青盲翳障	3-10克	
	熊胆	苦、寒	肝、胆、心	清肝、明目、止痉	①肝热目疾 ②惊风癫痫 ③黄疸	1-2克	多入丸散服,不入

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
							煎剂
	西瓜皮	甘、寒	心、胃	清解暑热，泻火除烦	暑热烦渴、小便不利等证	10-30 西瓜皮入煎克剂	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
清热燥湿药	黄芩	苦、寒	肺、胃、胆、大肠、心	清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎	①肺热咳嗽 ②湿温、黄疸、泻痢等湿热证 ③血热妄行的吐、衄、便血等证 ④胎热不安	3-10克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	黄连	大苦、大寒	心、肝、胃、大肠	清热燥湿，泻火解毒	①泄泻、痢疾、呕吐等肠胃湿热证 ②热病心烦、口舌生疮 ③热毒疮疡、耳目肿痛	2-10克 外用适量	

分类	药名	性味	归、经	功效	主治	用量	备注
清热燥湿药	黄柏	苦、寒	肾、膀胱、大肠	清热燥湿，泻火解毒，退虚热	①湿热泻痢、淋浊、白带、黄疸等证 ②疮疡肿毒，湿疹 ③阴虚发热、骨蒸盗汗及遗精等证	3-10克外用适量	

分类	药名	性味	归、经	功效	主治	用量	备注
	龙胆草	大苦、大寒	肝、胃	清热燥湿，泻肝火	①湿热黄疸、阴囊肿痛、白带、湿疹等证 ②肝热抽搐、惊厥 ③肝胆实火所致的头痛、胁痛	3-6克	
	苦参	苦、寒	心、肝、胃、大肠、膀胱	清热燥湿，祛风杀虫，利尿	①黄疸、泻痢、带下、阴痒等证 ②皮肤瘙痒、疥癣等 ③小便不利	3-10克外用适量	反藜芦
	白鲜	苦、寒	脾、胃、	清热燥	①湿热疮毒，	6-10	

分 类	药 名	性 味	归、 经	功 效	主 治	用 量	备 注
	皮		膀胱	湿， 止痒	风 疹、疥 癣 ②湿痹	克 外用 适量	
	秦 皮	苦、 寒	肝、 胆、 大肠	清热 燥 湿， 清肝 明目	①热毒 泻痢 ②肝热 目赤肿 痛	3- 10 克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
清热凉血药	犀角	苦、咸、寒	心、肝、胃	凉血止血，泻火解毒，安神定惊	①血热妄行的吐血、衄血等证 ②热病惊狂、发斑 ③疗疮肿毒	1—3克研粉冲服	孕妇慎用 畏川乌、草乌

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	干地黄	甘、苦、寒	心、肝、肾	清热凉血，养阴生津	①热病伤津或发斑②吐衄下血③消渴	10—30克	鲜地黄清热凉血功胜，干地黄滋阴凉血力强
	玄参	甘、苦、咸、寒、	肺、胃、肾	清热、解毒、养阴	①热病伤津或发斑②咽喉肿痛③瘰癧疮毒	10—15克	反藜芦
	牡丹皮	苦、辛、微寒	心、肝、肾	清热、凉血、散瘀	①热病发斑②吐衄下血③血滞经闭、痛	6—12克	孕妇慎用

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
					经、 癥瘕 ④痢 肿疮 毒⑥ 无汗 骨蒸		
	紫草	甘、 寒	心、 肝	凉血 活血， 解毒 透疹	①热 病发 斑② 疮疡、 湿疹、 火烫伤③ 预防 麻疹	3 — 10 克外用油浸或熬膏	脾虚 便溏 者忌 服
	童便	咸、 凉	肺、 肝、 肾	降火 凉血	咳 血、 吐血	无 定 量	
	人中黄	甘、 寒	心、 胃	清 热、 凉 血、 解 毒	热毒 发 斑， 丹毒 疮疡	6 — 9 克	包煎

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	人中白	咸、寒	肺、肝、膀胱	清热降火	①劳热②吐血、衄血③喉痹、口疮	3-6克外用适量	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
清热凉血药	芩苔	辛、凉	肺、脾、肝	清热散结	劳伤吐血	无定量	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	金银花	甘、寒	肺、胃、大肠、心	清热解毒，宣散风热	①外感风热或温病初起②痈肿疮疡③热毒泻痢	10—30克 外用适量	忍冬藤能清经络热邪，主治风湿痹痛
	连翘	苦、微寒	心、肺	清热解毒，消痈散结，宣散风热	①外感风热或温病初起②疮毒痈肿、瘰癧痰核	6—15克	
	蒲公英	苦、甘、寒	肝、胃	清热解毒，消痈肿	乳痈疗疮	10—30克 外用适量	
	紫花	苦、辛、	心、肝	清热解	①痈疽疗	10—15克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	地丁	寒		毒，消痈肿	疮②毒蛇咬伤	外用 适量	
	大青叶	苦、大寒	心、胃	清热解毒，凉血消斑	①热病神昏、发斑、吐衄 ②丹毒，咽喉肿痛	10—30克 外用 适量	板蓝根功似大青叶；尤以解毒散结见长
	青黛	咸、寒	肝	清热解毒，凉血消肿	①血热吐衄、咯血、血痢 ②惊风丹毒、痈肿	1—3克	难溶于水，故多入丸散，或汤剂冲服
	败酱草	辛、苦、微寒	胃、大肠	清热解毒，消排脓，	热毒痈肿，尤多	10—15克 外用 适量	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				祛瘀 止痛	用于 肠痈		
	土茯苓	甘、淡、平	肝、胃	解毒、 除湿， 利关节	①梅毒 ②湿热 疮毒	15— 60克	

	分类药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
清热解毒药	马勃	辛、平	肺	宣肺、利咽，解毒、止血	①肺热咳嗽，咽喉肿痛②血热吐血、衄血	3—6克	

	分类药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

	分类药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	山豆根	苦、寒	肺	清热解毒，利咽喉，消肿止痛	咽喉肿痛	6-10克	
	射干	苦、寒	肺	清热解毒，祛痰利咽	①咽喉肿痛②喘咳痰多	6-10克	孕妇忌用或慎用
	白头翁	苦、寒	大肠	清热、解毒、凉血	热毒泻痢(细菌性痢疾、阿米巴痢疾均效)	6-15克	
	马齿苋	酸、寒	大肠、肝、心	清热解毒，	①湿热泻痢，②热毒疮痈	30-60克	

	分类药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				凉血 止血		外用 适量	
	白 薇	苦、 辛、 微寒	心、 胃、 肝	清热 解毒， 敛疮 生肌	疮痈肿 毒及火 烫伤	5- 10 克 外用 适量	
	漏 芦	苦、 寒	胃	清热 解毒， 消痈 肿， 下乳 汁	①疮痈 肿痛② 乳汁不 下	6- 12 克	
	山 慈 姑	辛、 寒、 有小 毒	肝、 胃	清热 解毒， 消痈 散结	痈疽发 背、疔 肿恶疮	3- 6克 外用 适量	

	分类药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	绿豆	甘、寒	心、胃	清热解毒，消暑	①暑热烦渴②痈肿疮毒③巴豆、附子等药物中毒	30-60克外用适量	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
清热解毒药	橄榄	甘、酸涩、平	肝	清热解毒，利咽，生津	①咽喉肿痛②烦渴、咳嗽③河豚鱼中毒	6—15克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	茶	苦、甘、凉	心、肺、胃	清头目，除烦渴，利尿	①头痛心烦②善寐、痢疾	3—9克	多泡服
	梨	甘、微酸、凉	肺、胃	清热生津，润肺止咳	①热病烦渴②肺热咳嗽		捣汁服
	甘蔗	甘、寒	肺、胃	清热生津，润燥	①热病烦渴②燥咳、便秘		捣汁服
	芭蕉根	甘、大寒		清热解毒	①热毒痈肿、丹毒②热病烦渴	10—30克	
	枳椇子	甘、酸、平	心、脾	除烦解酒	醉酒、烦热	10—15克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
清虚热药	青蒿	苦、辛、寒	肝、胆、肾	退虚热，凉血，解器，截疟	①疟疾 ②阴虚发热③暑热外感	5-15克或绞汁鲜用	不宜久煎
	白薇	苦、咸、寒	肝、胃	清热凉血，退虚热	①热病后期，邪入营血②阴虚发热③热淋、血淋	6-12克	
	地骨皮	甘、寒	肺、肾	凉血退蒸，清泄肺热	①阴虚发热②肺热喘咳	6-15克	
	胡黄连	苦、寒	心、肝、胃、大肠	退虚热，除疳热	①阴虚发热②湿热泻痢	3-10克	

第四章 芳香化湿药

• 第四章 芳香化湿药

〔自学时数〕4 学时

〔面授时数〕1 学时

- 1、了解芳香化湿药含义、功效、主要适用症。
- 2、熟悉芳香化湿药与健脾、和胃、温里、清热、理气、行水、燥湿、渗湿等药配伍应用的理论依据（联系中医基本理论）。
- 3、掌握芳香化湿药中常用药（苍术 厚朴 藿香 砂仁 白豆蔻）的功效、临证应用，并比较其异同。
- 4、熟悉化湿、燥湿概念之不同。
- 5、在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡具有芳香辟浊，化湿醒脾作用的药物，称为芳香化湿药。

芳香化湿药，味多辛苦，性偏温燥，既可化中焦脾胃之湿，又可疏畅气机，健脾和胃，适用于脾为湿困，运化失职所致的脘腹胀满，呕恶泛酸，食少体倦，大便稀溏，口淡不渴，舌苔白腻，脉濡缓等证。又因暑多夹湿，故暑湿、湿温等证，亦可选用本类药物。

临床应用时，应根据不同证候作适当配伍。如脾胃虚弱者，配补脾健胃药；寒湿中阻者，配温里药；湿热壅滞者，配清热燥湿药；根据湿性粘滞，易于阻滞气机的特点及“治湿不利小便，非其治也”的原则，还常与行气药和利水渗湿药同用。

本类药物性多温燥，易伤阴耗气，阴虚、血虚、气虚者慎用。

此外，芳香化湿药多含挥发油，易于挥发，入煎剂时不宜久煎，要后下，以免损失药力，降低疗效。

藿香

〔原文〕 辛甘微温。入手足太阴。肺、脾。快气和中，开胃止呕，胃弱、胃热而呕者忌用。去恶气，进饮食。治霍乱吐泻，心腹绞痛，肺虚有寒，上焦壅热。能理脾肺之气。古方有藿香正气散，正气通畅，则邪逆自除。出交广，方茎有节，叶微似茄叶。古惟用叶，今枝茎亦用之，因叶多伪也。

【讲解】 藿香功能芳香化湿，解暑止呕。为唇形科多年生草本植物广藿香或藿香的地上部份。广藿香的老茎略呈四方柱形，四角钝圆，叶片呈灰绿色或黄绿色，多皱折或破碎，两面均密生毛茸，质柔而厚；藿香的茎呈四方柱形，四角有棱背，叶多已脱落，剩余的叶灰绿色，皱折或破碎，两面微具毛。广藿香主产于广东省，藿香又名土藿香，全国大部分地区均产。生用或鲜用。亦有单用其梗或叶者。

本品味辛，性微温。入脾、胃、肺经。辛散发表而不峻烈，微温化湿而不燥热，既能解表邪，又可化内湿。其气芳香，为芳香化湿、和中止呕之要药。用于湿阻中焦，中气不运，脘腹胀满，食欲不振，恶心呕吐。对于寒湿、湿热、脾胃虚弱等原因所致的呕吐，均有和中止呕之效，尤其是湿浊中阻，苔垢浊腻的呕吐，更为必选之品。

藿香性温而不燥，化浊而又能发表。暑常挟湿，故暑月外感风寒，内伤生冷而致恶寒发热，头痛脘痞，呕恶泄泻者，也为常用之药。《本草正义》赞其为“善理中州湿浊痰涎，为醒脾开胃，振动清阳妙品”。

【临证应用】 藿香用治湿阻中焦，中气不运所致之证，常与苍术、厚朴、半夏、陈皮等同用，以化湿调中，如不换金正气散。治暑月外感风寒，内伤生冷所致之证，常与紫苏、半夏、厚朴等同用，以发表解暑，和中化湿，如藿香正气散。湿温证初起，湿热并重者，多与清热去湿药滑石、黄芩、茵陈蒿等同用，如甘露消毒丹。用于寒湿内阻，脘痞呕吐之证，单用即有效，若配伍半夏，则止呕效果更好，如藿香半夏汤。若与苏梗、香附、砂仁等行气安胎药同用，亦可用于妊娠呕吐；与清热的黄连、竹茹等配伍，可治呕吐由湿热所致者。若脾胃虚

弱者，须配党参、白术等同用。此外，本品与猪胆汁为丸服，还可用于鼻渊，鼻流浊涕之证，如藿胆丸。

藿香和紫苏均有发表和中作用，但藿香长于醒脾化湿，紫苏长于发汗解表。

藿香和香薷均可发表解暑，但藿香化湿和中，醒脾开胃作用较佳；香薷发汗之力较胜，并能利水。

【用量用法】5—15克，鲜品加倍，煎服。藿香叶偏于发表，藿香梗偏于和中。鲜藿香解暑化湿力尤强。均不宜久煎。阴虚火旺者不宜应用。

苍术

〔原文〕甘温辛烈。燥胃强脾，发汗除湿，能升发胃中阳气，东垣曰：雄壮上行，能除湿，下安太阴，使邪气不传入脾。止吐泻，逐痰水，许叔微云：苍术能治水饮之癖囊，盖燥脾以去湿，崇土以填脾。日用苍术一斤，大枣五十枚，去皮捣，麻油半两，水二盏研，滤汁和丸，名神术丸。丹溪曰：实脾土，燥脾湿，洵是治痰之本。消肿胀满，辟恶气，辟一切岚瘴邪恶鬼气。暑湿月，焚之佳。《夷坚志》曰：有士人游西湖，遇一女子，明媚动人，重币求之不得。又五年重寻旧游，怅然空反。忽遇女子，士欣然并行，寓旅馆留半岁，将议偕逝，女曰：向自君去，忆念苦甚，惑疾而亡，今非人也。但君浸阴气深，当暴泻，宜服平胃散以补安精血。士惊惋曰：药味皆平，何得取效？女曰：中有苍术除邪气，乃为上品也。散风寒湿，为治痿要药。阳明虚则宗筋纵弛，带脉不引故痿蹙。苍术阳明经药。经曰：治痿独取阳明。合黄柏为二妙散，加牛膝名三妙散。又能总解痰、火、气、血、湿、食六郁，丹溪曰：诸郁皆因传化失常，气不得升降。病在中焦，将欲升之，必先降之；将欲降之，必先升之。越鞠丸用苍术、香附。苍术能径入诸经，疏泄阳明之湿，通行敛涩，香附乃阴中快气之药，一升一降，故郁散而平。及脾湿下流，肠风带浊。带浊赤者湿伤血分，从心小肠来；白者湿伤气分，从肺大肠来。并有寒热二证，亦有因痰而带浊者，宜二陈加二术升柴。燥结多汗气者忌用。南阳文氏值乱逃往壶山，腹饥，因有人教以饵术，遂不饥。数十年后归家，颜色更少，气力转健。术一名山精，一名山姜。《导仙录》曰：子欲长生，当服山精，子欲轻翔，当服山姜。昂按：苍术善发汗，安能长远服食，文氏《仙录》之说，要亦方书夸张之言也。出茅山，坚小有朱砂点者良。糯米泔浸焙干，同芝麻炒，以制其燥。

二术皆防风、地榆为使，主治略同，第有止汗发汗之异。古文本草不分苍白，陶隐君即弘景。言有两种，始各施用。生用或炒用。

【讲解】苍术外可祛风湿之邪，内可化脾胃之湿，为治湿要药。为菊科多年生草本植物茅苍术（南苍术）和北苍术的根茎。茅苍术产于江苏、湖北、河南等地，以江苏茅山一带产者质量最优，《本草正》说：茅山者，其质坚小，其味甘醇，补益功多，大胜他术。其形态特点：横断面灰白色，散布多数橙黄色斑点，即所谓硃砂点。本品温燥辛烈，用时都以水或米泔水浸泡后切片入药。古时也有与芝麻同炒用者，以减其燥烈之弊。

本品苦温性燥，辛香主散，内可化脾胃之湿而健运中焦，外可散风寒湿邪而透表发汗，故为燥湿健脾、祛风除湿要药。凡湿浊困脾，脾失健运的脘痞呕恶，腹痛泄泻，湿痰留饮，水肿胀满等证，及外感寒湿，头痛身重，肢节痠痛，寒热无汗，风湿痹痛均用本药。总之，湿邪为病，不论上下表里，皆可随证配用。但由于本品性偏温燥，而易于伤阴，故阴虚内热，汗多者不宜用。

苍术与白术来源于同一科属的植物，古时二者通用，后始分为两种。

【临证应用】苍术气香，实为健脾燥湿之要药。湿阻中焦，脘腹胀满，大便泄泻者，本品配厚朴、陈皮、甘草，即平胃散，以除湿散满。用于风湿痹证，尤以湿邪偏胜而见肢节肌肉痠重肿痛者，常配防己、薏苡仁等，以加强祛湿作用。如痹证湿热偏胜，关节肿痛而红，可配黄柏，即二妙散；若再加牛膝，成三妙散；复加薏苡仁为四妙散。皆可治湿热下注，足膝肿痛、痿软无力之证。因本品兼能发汗，配羌活、防风、细辛等亦适用于外感表证，肢体痠痛较重者。

此外，历代本草记载，苍术还能治夜盲症，有明目作用，早在《太平圣惠方》中，即用苍术为主，治青盲雀目。近来多与猪肝或羊肝配伍应用，治疗夜盲及现代医学之角膜软化证。

【用量用法】 3—10克，煎服。祛风胜湿宜生用，燥湿健脾宜炒用。多以麦麸拌炒，以缓其辛散之性，增强化湿和胃作用。

厚朴

〔原文〕 苦降能泻实满，辛温能散湿满。王好古曰：《别录》言厚朴温中益气，消痰下气。果泄气乎？益气乎？盖与枳实、大黄同用，则泻实满，所谓消痰下气是也。与橘皮、苍术同用，则除湿满，所谓温中益气是也。与解利药同用，则治伤寒头痛；与泻利药同用，则厚肠胃。大抵味苦性温，用苦则泻，用温则补也。同大黄、枳实，即承气汤；同橘皮、苍术，即平胃散。按胀满证多不同，清补贵得其宜。气虚宜补气，血虚宜补血，食积宜消导，痰滞宜行痰，挟热宜清热，湿盛宜利湿，寒郁者散寒，怒郁者行气，蓄血者消瘀，不宜专用行散药。亦有服参、芪而胀反甚者，以挟食、挟血、挟热、挟寒，不可概作脾虚气弱治也。入足太阴、阳明，脾、胃。平胃调中，佐苍术为平胃散，平湿土之太过，以致于中和。消痰化食，厚肠胃，行结水，破宿血，杀脏虫。治反胃呕逆，喘咳泻痢，冷痛霍乱。误服脱人元气，孕妇忌之。榛树皮也，肉厚紫润者良。去粗皮，姜汁炙，或醋炒用。干姜为使，恶泽泻、硝石，忌豆，犯之动气。

【讲解】厚朴善除肠胃之气滞，而燥脾家之湿浊。为木兰科植物厚朴或凹叶厚朴的树皮或根皮。主产于四川、湖北、浙江、贵州等地。四川产者佳，故有川朴之名。皮粗肉细，内色深紫，油性大，香气浓，嚼无残渣，称为紫油厚朴。浸泡去粗皮切丝生用，或与生姜共制，切片用，为姜厚朴。

本品味苦辛，性温，其气芳香。入脾、胃、肺、大肠经。味辛能行气而消胀，味苦能下气以平喘，气香能化湿以散满，性温能散寒以止痛。善除肠胃之气滞，而燥脾家之湿浊，为燥湿、行气、导滞常用药。既能下有形之积（食、湿、痰），又能散无形之滞（气、寒）。故凡食积停留，气滞不通，脘腹胀痛，大便秘结，或湿滞中焦而致胸腹胀满，呕吐泻痢，以及痰饮阻肺，肺气不降之咳喘等证，均为常用之品。惟性偏温燥，行气力强，故内热津枯，脾胃气虚者慎用。

花功用相同，而性稍和缓。

【临证应用】厚朴为消胀除满之要药。凡湿阻、食积、气滞所致的脘腹胀满之证，均为适用。若湿阻中焦，常与苍术、陈皮同用，如平胃散，以燥湿运脾；食积便秘，可配大黄、枳实，如小承气汤，以消积

导滞；寒气阻滞，则多与干姜、木香、陈皮等同用，如厚朴温中汤，以温中行气散满。至于虚寒胀满，应与人参、甘草、生姜等配伍，以补气温中而除胀满，如厚朴生姜甘草半夏人参汤。此外，治湿痰壅肺，咳嗽气喘痰多者，常与杏仁或麻黄等配伍，如桂枝加厚朴杏仁汤，或厚朴麻黄汤，以降气平喘。

厚朴花，为厚朴的花蕾。性味功效与厚朴相同，而性较和缓，多用于湿浊、气滞之轻证。

【用量用法】3—10 克，煎服。

砂仁

〔原文〕 辛温香窜。补肺益肾，和胃醒脾，快气调中，通行结滞。治腹痛痞胀，痞滞，有伤寒下早，里虚邪入而痞者，有食壅痰塞而痞者，有脾虚气弱而痞者，须分虚实治之，不宜专用利气药，恐变为鼓胀。鼓胀内胀而外有形，痞胀惟觉痞闷而已，皆太阴为病也。噎膈呕吐，上气咳嗽，赤白泻利，湿热积滞，客于大肠，砂仁亦入大、小肠经。霍乱转筋，奔豚崩带。祛痰逐冷，消食醒酒，止痛安胎，气行则痛止，气顺则胎安。散咽喉口齿浮热，化铜铁骨鲠。王好古曰：得檀香、豆蔻入肺，得人参、益智入脾，得黄柏、茯苓入肾，得赤石脂入大小肠。《医通》曰：辛能润肾燥，引诸药归宿丹田，地黄用之拌蒸，亦取其能达下也。《经疏》曰：肾虚气不归元，用为向导，殆胜桂、附热药为害。出岭南，研用。

【讲解】砂仁善能化湿行气，温脾止泻。为姜科多年生草本植物阳春砂、海南砂或缩砂的干燥果实。生用，打碎入药。阳春砂产于我国广东阳春、信宜等县；海南砂主产于我国广东、海南岛及湛江地区；缩砂产于越南、泰国、缅甸、印度尼西亚等地。

砂仁味辛，性温。入脾、胃经。本品辛散温通，芳香化湿，为化湿行气，温脾止泻，安胎常用之药。具有性温而不燥烈，行气而不破气，调中而不伤中的优点。故常用于湿阻中焦，脾胃气滞及脾胃虚寒所致诸证。并能醒脾开胃，调气和中，行郁消滞，降胃阴而下食，达脾阳而化穀，吐泻用之皆良，咳嗽痰饮用之皆妙。

砂仁安胎之效在于理气，故气滞胎动不安者，疗效较佳。

《玉楸药解》云：清升浊降，全赖中气，中气非旺，则枢轴不转，脾陷胃逆。凡水胀肿满，痰饮咳嗽，噎膈泄利，霍乱转筋，胎坠肛脱，谷宿水停，泄啻吞酸诸证，皆升降反常，清陷浊逆故也。泄之则益损其虚，补之则益增其满，清之则滋其下寒，温之则生其上热。唯以养中之味，而加和中之品，调其滞气，使枢机回旋运动，则升降复职，清浊复位，然后于补中扶土之内，温升其肝脾，清降其肺胃，无有忧矣。和中之品，莫如砂仁，冲和调达，不伤正气，调醒脾胃之上品也。

【临证应用】砂仁用于脾胃湿阻及气滞所致脘腹胀痛，不思饮食，呕吐，泄泻等证。如湿阻者，可配厚朴、苍术、白豆蔻等以增化湿行气之效。食积气滞者，常与木香、枳实等同用，如香砂枳术丸，以增行气消痞之功。若脾虚气滞者，则配党参、白术等同用，如香砂六君子丸，以增益气健脾之力。用于寒湿泻痢，可单用研末冲服，或配干姜、附子等温里药。用于妊娠恶阻，胎动不安，则多与白术、苏梗等配伍。

【用量用法】 3—6 克，煎服。入汤剂宜后下。

白豆蔻

〔原文〕 辛热。流行三焦，温暖脾胃，三焦利，脾胃运，则诸证自平矣。而为肺家本药。肺主气。散滞气，消酒积，除寒燥湿，化食宽膨。治脾虚疟疾，感寒腹痛，吐逆反胃，肺胃火盛及气虚者禁用。白睛翳膜，白睛属肺，能散肺滞。太阳经目眦红筋。太阳脉起目眦。番舶者良，研细用。

【讲解】白豆蔻功能化湿行气。为姜科多年生草本植物白豆蔻的干燥成熟果实。去皮或连皮打碎，生用。主产于越南、泰国等地。我国广西、云南亦有栽培。

本品味辛，性温。入肺、脾、胃经。其气清芳，上行于肺以宣肺理气，中入脾胃以化湿温中，为化湿行气，温中止呕要药。凡上、中二焦的一切寒湿气滞诸证，如胸闷不畅，脘腹胀满疼痛，不思饮食，呕吐呃逆等证，皆可应用。至于治白睛翳膜，目眦红筋者，亦以散滞气之功，但临床很少应用。

【临证应用】白豆蔻用于湿阻脾胃，胸脘痞满，常与藿香、厚朴、陈皮等同用，以增化湿、行气、散满之功；用于湿温病初起，胸闷不饥，舌苔浊腻，湿邪偏重者，常配苡仁、杏仁、通草、滑石等，如黄芩滑石汤，以增清热化湿之效。用于呕吐，呃逆，噎气等证，本品温中下气而止呕，以胃寒气逆者适宜，可单用为末服，或配藿香、半夏等，如白豆蔻汤。若脾胃虚寒者，可与党参、半夏、生姜等同用。

白豆蔻与砂仁，性味相同，功亦类似，均为化湿醒脾，行气宽中之要药。但白豆蔻芳香之气清，温燥之性较弱，主入上中二焦，多用于湿阻中满，胃寒呕吐，并治湿温初起；砂仁芳香之气浊，温燥之性较强，主入中下二焦，多用于脾寒泄泻，又可治胎动不安。

【用量用法】3—6克，宜研末入丸散剂，入汤煎宜后下。本品为辛燥助热耗气之品，故火升作呕、热证及气虚诸证均不宜用。

草豆蔻

[原文] 辛热香散。暖胃健脾，破气开郁，燥湿祛寒，除痰化食。治瘴疠寒疟，佐常山能截疟，或与知母同用，取其一阴一阳，治寒热瘴疟。盖草果治太阴独胜之寒，知母治阳明独胜之火。寒客胃痛，散滞气，利膈痰。因滞因寒者多效。霍乱泻痢，噎膈反胃，痞满吐酸，痰饮积聚。解口臭气，酒毒鱼肉毒。故食料用之。过剂助脾热，耗气损目。闽产名草蔻，如龙眼而微长，皮黄白薄而棱峭，仁如砂仁，而辛香气和；滇广所产名草果，如诃子，皮黑厚而棱密，子粗而辛臭，虽是一物，微有不同。面裹煨熟，取仁用。忌铁。

【讲解】草豆蔻功能燥湿，温中行气。为姜科多年生草本植物草豆蔻的干燥近成熟的种子。蒴果圆球形，外被粗毛，熟时黄色。种子呈圆球或椭圆形，表面灰棕色，被一层白色透明的假种皮，背稍隆起，气芳香，味辛辣。去壳取仁，生用，打碎入药。主产于广西、广东等地。

本品辛温芳香，且气清爽。入脾、胃经。燥湿行气，温中止呕的作用类似白豆蔻，而其温燥之性尤过之。用于寒湿阻滞脾胃，脘腹胀满疼痛及呕吐泄泻等证，尤于脾胃虚寒，胃疼呕吐之证，用之最宜。借其辛温芳香之气，又能除口臭气，解酒及鱼蟹毒。

【临证应用】草豆蔻用于中寒脘腹冷痛，呕吐泄泻之证，湿邪偏盛者，可配厚朴、苍术、半夏等；寒甚者，可配肉桂、干姜。若脾胃虚弱不思饮食，呕吐胀满者，可配白术、生姜、甘草等药。

【用量用法】3—6 克，入汤剂宜后下。

附：草果

草果为姜科多年生草本植物草果的干燥成熟果实，表面灰棕至红棕色，有显著纵沟及棱线，种子破碎时发出特异的臭气，味辛辣。炒至焦黄色并微鼓起，捣碎取仁用，或将净草果仁姜汁微炒用。主产于云南、广西、贵州等地。

草果味辛性温。入脾、胃经。本品辛温燥烈而气臭浊，善化脾胃湿邪，多用于寒湿阻滞脾胃，脘腹胀满，疼痛吐泻等证，可与厚朴、苍术等伍用。本品燥湿，散寒，又能除痰截疟，治寒湿郁伏于脾胃之疟疾及山岚瘴气，秽浊湿邪所致的瘴疟，用之颇为适宜。与常山、知母等同用，功效更佳。李时珍云：草果与知母同用，治瘴疟寒热，取其一阴一阳无偏性之害，盖草果治太阴独胜之寒，知母治阳明独胜之火也。

【用量用法】 同草豆蔻。此三药皆温燥伤阴，故阴虚之体，非其所宜。

小结

芳香化湿药是一类具有芳香辟浊、化湿醒脾、开胃和中作用的药物。其中藿香气味辛香，功能化湿解暑，疏散表邪，为暑令常用之品，对湿困脾胃，暑湿中阻等证，皆有疗效。

苍术、厚朴均具芳香燥散之性，苍术辛香燥烈之性尤强，外可祛风湿，内可燥脾湿，凡湿邪为病，不论上下表里，皆可随证选用；厚朴苦温燥散，长于燥湿散满，行气导滞，为痰湿食滞，寒凝气阻所致诸证的常用之品。厚朴花功同厚朴，而力稍逊。

砂仁、蔻仁，性味、功用相近，常用于脘腹胀痛，呕恶泄泻等证，然白豆蔻芳香气清，功偏中上二焦，多用于湿浊阻胃之呕吐；砂仁芳香气浊，功偏中下二焦，多用于寒湿气滞的泄泻等证。砂仁壳、豆蔻壳性味功效与砂仁、豆蔻相同，但温性略减，力较薄弱。

草豆蔻与草果，温燥之性较大，均以燥湿祛寒为主要功用，然前者善于温胃以止呕，后者善于祛痰以截疟。

芳香化湿药功用归纳简表

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
藿香	辛、微温	脾、胃、肺	化湿、解暑，止呕	①湿阻中焦，脘闷呕恶 ②暑湿及湿温证 ③呕吐	5-10克，鲜品加倍	
苍术	辛、苦、	脾、胃	燥湿健	①湿阻中焦证	3-10克	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	温		脾，祛风湿	②风湿痹痛 ③夜盲症		
厚朴	苦、辛、温	脾、胃、肺、大肠	行气，燥湿，消积，平喘	①湿阻中焦，脘腹胀满，积滞便秘 ②咳嗽气喘	3-10克	
砂仁	辛、温	脾、胃	化湿，行气，温中，安胎	①湿阻中焦及脾胃气滞证 ②妊娠恶阻	3-6克	
白豆蔻	辛、温	肺、脾、胃	化湿，行气，温中，止呕	①湿阻中焦及脾胃气滞证 ②呕吐	3-6克	豆蔻壳功同豆蔻，然力较弱
草豆	辛、温	脾、胃	燥湿，	寒湿郁滞，脘	3-6克	草果功与草豆

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
蔻			温中， 健脾	腹胀满		蔻相近，尚有截疟之功

复习思考题

- 1、试述芳香化湿药的共性及其应用范围。
- 2、分析比较藿香与紫苏、苍术与厚朴、砂仁与白豆蔻的功效和临床应用。

第五章利水渗湿药

- 第五章利水渗湿药

〔自学时数〕6学时

〔面授时数〕2学时

〔目的要求〕

- 1、了解利水渗湿药含义、功效、主要适用症。
- 2、熟悉利水渗湿药与解表、宣肺、健脾、补肾、补气、清热、燥湿等药配伍应用的理论依据（联系中医基本理论）。
- 3、掌握利水渗湿药中常用药（茯苓 薏苡 车前子 滑石 木通 竹叶 萆薢 猪苓 泽泻）的功效、临证应用，并比较其异同。
- 4、熟悉淡渗利湿、清热利湿、通淋、利湿退黄等概念。
- 5、在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡以通利水道，渗除水湿为主要功效的药物，称为利水渗湿药。

本类药物能使尿量增加，小便通畅，故又称为利尿药。还因这些药大部分是味淡气平之品，故又称淡渗利湿药。

本类药物适用于水湿停蓄体内所致的小便不利，淋沥涩痛，水肿痰饮，淋浊泄泻，湿温黄疸以及关节肿痛，湿热疮疹等证。

临床应用时，须视病情选用有关药物，并作适当配伍。如水肿骤起，有表证者配宣肺发汗药；水湿泛滥之水肿，常与健脾利湿药配伍，水肿日久，脾肾阳虚者，配伍补肾药；黄疸湿温等配清热燥湿药；行水必先行气，故又常与行气药配伍应用。

利水渗湿药，易耗津液，故阳虚津伤的小便不利，应慎用。

茯苓

〔原文〕甘温。益脾助阳，淡渗利窍除湿。色白入肺泻热，而下通膀胱。能通心气于肾，使热从小便出，然必其上行入肺，清其化源，而后能下降利水也。宁心益气，调营理卫，安魄安魂。营主血，卫主气，肺藏魄，肝藏魂。治忧恚惊悸，心肝不足。心下结痛，寒热烦满，口焦舌干，口为脾窍，舌为心苗。火下降则热除。咳逆肺火。呕哕，胃火。膈中痰水，脾虚。水肿淋沥，泄泻渗湿。遗精。益心肾。若虚寒遗溺泄精者，又当用温热之剂峻补其下，忌用茯苓淡渗之药。小便结者能通，多者能止。湿除则便自止。生津止渴，湿热去则津生。退热安胎。松根灵气结成，以大块坚白者良。去皮，乳拌蒸，多拌良。

白者入肺、膀胱气分，赤者入心、小肠气分，时珍曰：白入气，赤入血。补心脾白胜，利湿热赤胜。恶白藟，畏地榆、秦艽、龟甲、雄黄，忌醋。

皮专能行水，治水肿肤胀。以皮行皮之义，五皮散用之。凡肿而烦渴，便秘溺赤，属阳水，宜五皮饮、疏凿饮；不烦渴，大便溏，小便数，属阴水，宜实脾饮、流气饮。腰以上肿宜汗，腰以下肿宜利小便。

【讲解】茯苓既能利水渗湿，又能健脾宁心。为多孔菌科真菌茯苓的菌核。寄生于松科植物赤松或马尾松等树根上。野生或栽培。主产于云南、湖北、四川、安徽等地。以云南产者质佳，故有云茯苓之称。茯苓菌核在加工时分为：其黑褐色外皮为茯苓皮，近外皮部的淡红色部分为赤茯苓，内部白色部分为白茯苓，中间带有松根的白色部分为茯神，其松根为茯神木，即黄松节。均生用，用朱砂拌者称朱茯苓或朱茯神。

茯苓味甘淡，性平。甘则能补，淡则能渗，性平和缓，入心、脾、肺、肾四经。既能健脾宁心，又善利水渗湿。茯苓的特点是性质和平，补而不峻，利而不猛，既可扶正，又可祛邪。故凡脾虚及水湿内停所致之证，如泄泻小便不利，水肿胀满及痰饮诸证，均为常用之品，尤其对脾虚湿盛之证，有标本兼顾之效。停饮所致的眩晕，心悸和咳嗽痰多之证，亦持为要药。至于茯苓的安神宁心作用，主要在于

健脾，因脾为后天之本，气血生化之源，脾虚则生化不足，必导致心神失养而惊悸不眠。《备要》载治心下结痛，寒热烦满，口焦舌干……以及小便结者能通，多者能止，生津止渴等。《本草经疏》曰：心下结痛，寒热烦满，口焦舌干，亦手少阴受邪也。甘则补中，淡则利窍，补中则心脾实，利窍则邪热解，心脾实则忧悲惊悸自止，邪热解则心下结痛、寒热烦满、咳逆、口焦舌干自除。

【临证应用】茯苓常与白术同用，其健脾利湿之功益彰，许多治疗脾虚湿盛之方均配伍之。如用于脾虚水湿停滞之水肿胀满，小便不利之五苓散，即茯苓与白术、桂枝、猪苓、泽泻相配；治痰饮内停的苓桂术甘汤以及治脾虚泄泻的参苓白术散等方中二药均同用。若再与党参、甘草等补气药同用，则健脾力增，如四君子汤，以治脾虚体倦，食少便溏等证。若与利尿药猪苓、泽泻等同用，以加强利尿渗湿作用。并随湿热、寒湿等不同性质，配伍有关药物同用，如湿热配车前子、木通；寒湿配附子、干姜等。用于心脾不足之惊悸失眠，常与酸枣仁、远志、龙眼肉等安神药配伍，则宁心安神力强，如归脾汤。

茯苓皮专行皮肤水湿，主要用于皮肤水肿。

赤茯苓长于渗利湿热，主用于小便短赤或淋漓不畅。

【用量用法】10—15克，煎服或入散剂。用于安神，多以朱砂拌用。

附：茯神

〔原文〕主治略同茯苓，但茯苓入脾、胃之用多，茯神入心之用多。开心益智，安魂养神，疗风眩（1）心虚，健忘多恚。即茯苓抱根生者。昂按：以其抱心，故能补心也。去皮及中木用。

茯神心木名黄松节。疗诸筋挛缩，偏风喎斜（2），心掣健忘。心木一两，乳香一钱，石器炒研，名松节散。每服二钱。木瓜汤下，治一切筋挛疼痛。乳香能伸筋，木瓜能舒筋也。

【讲解】（1）风眩：属眩晕的一种。又称风头眩，由于体虚，风邪入脑所致。证见头晕眼花，呕逆；甚则厥逆，发作无常。（2）偏风喎斜：偏风又称偏枯，多由营卫俱虚，真气不能充于全身，或兼邪气侵袭，因而发生半身不遂或口眼喎斜。

茯神长于安心宁神。茯神即茯苓带有松根的白色部分，切成方形薄片，亦称抱茯神，朱砂拌者称为朱茯神。茯神性味与茯苓相同，主入心脾经。偏于宁心安神。多用于心神不宁，惊悸失眠。《本草纲目》曰：后人治心病必用茯神，故洁古张氏于风眩心虚，非茯神不能除。

茯神心木又名黄松节，即菌核中间的松根。味甘，性平。功能平肝安神，治疗惊悸健忘，中风口眼喎斜，筋挛疼痛。

【临证应用】茯神以宁心安神为主，常与人参、地黄、朱砂、酸枣仁等同用，如茯神丸，治惊悸、健忘、失眠等证。

【用量用法】10—15克，煎汤或入丸散剂。

猪苓

〔原文〕苦泄滞、淡利窍、甘助阳。入膀胱肾经。升而能降，开腠发汗，利便行水，与茯苓同而不补，治伤寒瘟疫（1）大热，《经疏》曰：大热利小便，亦分消之意。懊恼消渴，肿胀淋浊，泻痢疟疟（2）。

疟多由暑，暑必兼湿。经曰：夏伤于暑，秋必疟疟。然耗津液，多服损肾昏目。肾水不足则目昏。仲景五苓散，猪苓、茯苓、泽泻、白术、桂，为治水之总剂。昂按：经曰：膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。用肉桂辛热引入膀胱，所以化其气也。除桂名四苓散。《资生经》曰：五苓散能生津液，亦通大便。曾世荣治惊风，亦用五苓散。白茯苓安心神，泽泻导小便，小肠利而心气平，木得桂而枯，能抑肝而风自止，可谓善用五苓者矣。多生枫树下，块如猪屎，故名。马屎曰通，猪屎曰苓。苓即屎也，古字通用。肉白而实者良，去皮用。

【讲解】（1）瘟疫：病名。感受疫疠之气，造成流行的急性传染病的总称。（2）疟疟：疟（jiē皆）疟，是疟疾的通称，以疟发该时，或日作、或间日作。

猪苓功专利水渗湿。为多孔菌科真菌猪苓的菌核。多寄生于枫树、桦树、柞树根上。以个大、外皮黑褐色光亮，肉色粉白，体较重者为佳。生用，切片入药。

猪苓味甘淡，性偏凉。入肾、膀胱经。是常用的利水渗湿药，其利水渗湿之功强于茯苓，但无茯苓补益作用。故凡水湿停聚之证，如小便不利，水肿泄泻，淋浊带下等，皆可应用，尤以偏热者更为适宜。淡渗之品，易耗阴液，故无水湿者不宜应用。

【临证应用】猪苓治小便不利，水肿，每与茯苓、泽泻等利湿药同用，如四苓散，也可以猪苓一味为末，热水调服。若水湿滞留兼阴虚者，可与阿胶、滑石、茯苓、泽泻等同用，如猪苓汤，以滋阴利水。

【用量用法】5—10克，煎服，或入丸、散剂服。

泽泻

〔原文〕甘淡微咸。入膀胱，利小便，泻肾经之火邪，功专利湿行水。治消渴痰饮，呕吐泻痢，肿胀水痞，脚气疝痛，淋漓阴汗，阴间有汗。**尿血泄精**，既利水而又止泄精，何也？此乃湿热为病，不为虚滑者言也。虚滑则当用补涩之药。**湿热之病**，湿热既除，则清气上行。又能养五脏，益气力，起阴气，补虚损，止头旋，有聪耳明目之功。脾胃有湿热，则头重耳鸣目昏。渗去其湿，则热亦随去，土乃得令，而清气上行。故《本经》列之上品，云聪耳明目，而六味丸用之，今人多以昏目疑之。**多服昏目**，小便过利，而肾水虚故也。眼中有水属膀胱，过利则水涸而火生。张仲景八味丸用泽泻，寇宗奭谓其接引桂附入肾经。李时珍曰：非接引也，乃取其泻膀胱之邪气也。古人用补药，必兼泻邪，邪去则补药得力，一阖一辟，此乃玄妙，后人不知此理，专一于补，必致偏胜之患矣。王履曰：地黄、山茱、茯苓、丹皮，皆肾经药，桂附右肾命门之药，何待接引乎？钱仲阳谓肾为真水，有补无泻，或云脾虚肾旺，故泻肾扶脾，不知肾之真水不可泻，泻其伏留之邪耳。脾喜燥，肾恶燥，故兼补为难。易老曰：去胷中留垢，以其微咸能泻伏火故也。昂按：六味丸有熟地之温，丹皮之凉，山药之涩，茯苓之渗，山茱之收，泽泻之泻，补肾而兼补脾，有补而必有泻，相和相济，以成平补之功，乃平淡之神奇，所以为古今不易之良方也。即有加减，或加紫河车一具，或五味、麦冬、杜仲、牛膝之类，不过二味，极三四味而止。今人或疑泽泻之泻而减之，多拣本草补药，恣意加入，有补无泻，且客倍于主，责成不专，而六味之功，且退处于虚位，失制方配合之本旨矣，此近世庸师之误也。**盐水拌，或酒浸用，忌铁。**

【讲解】泽泻利水渗湿，泄热。为泽泻科多年生沼泽植物泽泻的块茎。切片，生用，麸炒或盐水炒用。

本品甘淡性寒。甘淡渗湿，寒能泻热。入肾与膀胱经，功能泻肾经之火，利膀胱之湿，为常用之利水渗湿泻热药。凡湿热内蕴之小便不利，水肿泄泻，淋浊痰饮等水湿证，或肾经火盛皆可应用。《备要》言：补五脏，益气力，起阴气，补虚损，止头旋，有聪耳明目之功。皆因湿热浊气既除，清气得行，所谓一除而百病与之俱除也。然小便过利，肾气损伤，又会导致眼目昏花。

泽泻切片晒干入药为生泽泻；生泽泻片加麸皮炒称炒泽泻，略缓寒性，免伤中阳之气。还有炒时用盐水喷匀，取出晒干入药者称盐炒泽

泻。此取咸以入肾，增强泻火利水作用，利湿而不伤阴。

【临证应用】泽泻之功，不外利水道，泻肾火两途。利水道，多用于小便不利、水肿、泄泻、淋浊等证，可配茯苓、猪苓等同用，常用方剂五苓散中的泽泻，即在于利尿。治阴虚火旺的遗精耳鸣等，多与地黄、山药、茯苓等同用，如六味地黄丸中本品即用于泻肾火。

此外，本品还可用于水饮上犯，清阳被蒙的眩晕，常与白术配伍，如泽泻汤以健脾渗湿。

泽泻利尿作用比茯苓强，对肾炎患者尤为适宜。临床二药常互相配伍，以增强疗效。但茯苓又能健脾宁心，益气调中，有补有泻；泽泻又能泄肾经之浊，功专于泻。

【用量用法】5—10克，煎服。一般多用盐水炒用。

薏苡仁

〔原文〕甘淡。微寒而属土，阳明胃药也。甘益胃，土胜水，淡渗湿。泻水所以益土，故健脾。治水肿湿痹，脚气疝气，泄痢热淋。益土所以生金，故补肺清热。色白入肺，微寒清热。治肺痿肺痛，咳吐脓血。以猪肺蘸苡仁米服。扶土所以抑木，故治风热筋急拘挛。厥阴风木主筋，然治筋骨之病，以阳明为本。阳明主润宗筋，宗筋主束骨而利机关者也，阳明虚则宗筋纵弛。故经曰：治痿独取阳明。又曰：肺热叶焦，发为痿躄。盖肺者相傅之官，治节出焉。阳明湿热上蒸于肺，则肺热叶焦，气无所主而失其治节，故痿躄。薏苡理脾，而兼清热补肺。筋寒则急，热则缩，湿则纵。然寒湿久留，亦变为热，又有热气熏蒸，水液不行，久而成湿者。薏苡去湿要药，因寒因热，皆可用也。《衍义》曰：因寒筋急者不可用。恐不然。但其力和缓，用之须倍于他药。杀虻堕胎，炒熟微研。

【讲解】薏苡仁具有利水渗湿，健脾止泻，化湿除痹，清热排脓之功。为禾本科多年生草本植物薏苡的成熟种仁。打下果实晒干，除去外壳及种皮。生用或炒用。

本品味甘淡，气微寒，性主降泄。入脾、胃、肺三经。脾为阴土，喜燥而恶湿。薏苡仁淡以渗湿，甘以益脾，故既能渗除脾之所恶，又能补益脾之所喜，且性寒而不伤胃，补脾而不滋腻，渗湿而不峻利，药性和缓，为清补淡渗之品。故凡脾虚湿盛所致的食少泄泻，水肿胀满，脚气浮肿，小便不利等证，皆可应用。因脾为生化之源，补脾则肺气足，故又能益肺，即培土可以生金。还兼清热排脓之功，治肺病肺痿，肠痈亦常用之。

此外，本品尚兼祛除肌肉筋骨之湿邪，又能舒筋，缓和挛急。现代研究证明，薏苡仁有缓解横纹肌挛缩的作用，故可用以治疗风湿痹痛，筋脉拘挛之证而偏热者，颇有良效。

薏苡根，也有清热利湿之功，还能驱蛔杀虫，可用于淋证带下，虫积腹痛等证。然临床很少使用。

【临证应用】薏苡仁治脾虚泄泻，可与人参、白术等同用，如参苓白术散。治湿温病初起，湿邪偏胜者，常与杏仁、蔻仁、半夏等同用，

如三仁汤，藿朴夏苓汤。用以治湿滞经络之湿痹拘挛，偏寒者配麻黄、杏仁，如麻杏薏甘汤；偏热者配络石藤、防己等；湿重者配黄柏、苍术等，如四妙散。用治肺痈，咳吐脓血，可与苇茎、冬瓜仁、桃仁等配伍，如苇茎汤；治肠痈配败酱草、丹皮、桃仁等，如薏苡附子败酱散。

【用量用法】10—30克，煎服。本品力缓，用量宜重。健脾宜炒用，其余生用。除入汤剂、丸散外，亦可作羹或与粳米煮粥，饮食用，为食疗佳品。

车前草 车前子

〔原文〕甘寒。凉血去热，止吐衄，消痼瘀，明目通淋。凡利水之剂，多损于目，惟此能解肝与小肠之热，湿热退而目清矣。雷斅曰：使叶勿使茎蕊。

子甘寒。清肺肝风热，渗膀胱湿热，利小便而不走气，与茯苓同功，强阴益精，令人有子。肾有二窍，车前子能利水窍而固精窍。精盛则有子，五子衍宗丸用之，枸杞、菟丝各八两，五味、覆盆各四两，车前二两，蜜丸。惯遗泄者，车前易莲子。时珍曰：人服食，须佐他药，如六味丸之用泽泻可也，若单用则过泻。治湿痹五淋，暑湿泻痢，欧阳文忠患暴下，国医不能愈。夫人曰：市有药，三文一贴，甚效。公不肯服，夫人杂他药进之，一服而愈。问其方，乃车前子为末，米饮下二钱。一云此药利水而不动气，水道利则清浊分，谷脏自止矣。目赤障翳，能除肝热。催生下胎。酒蒸捣饼，焙研。酒蒸捣饼，入滋补药；炒研，入利水泄泻药。

【讲解】车前草以解毒凉血为主要功效，兼利水通淋。为车前科多年生草本植物车前或平车前的全草。其成熟种子名车前子，也入药。车前草生用或鲜用。车前子生用或盐水炒用。

车前草味甘性寒。入肝、肺经。与车前子有相似的利水通淋作用，但又偏于凉血解毒。治小便不利，淋浊水肿，泄泻，目赤肿痛，咳嗽痰多以及吐血、衄血、尿血，热毒痈肿等证。

车前子味甘性寒，甘淡渗利，气寒清热，性专滑利降泄。故有通利水道，渗湿泄热之功，可导湿热从小便排出，以治湿热内蕴之证。归肺、肝、肾三经，入肺清热以化痰，入肝清肝以明目，归肾利小便以分清浊。故可治小便不利，淋漓涩痛，暑湿泄泻及目赤翳障等证。此外，肺热咳嗽痰多者亦可应用。总之，本品渗利而不走泄，故曰与茯苓同功。

《备要》曰：强阴益精，令人有子。正如《本草求真》曰：是以五子衍宗丸，用此为四子之主，金匱肾气丸，用此为诸药之助，且此肝肺既清，风热悉去，则肺不受热而化源有自，肝不被风而疏泄如常，精与溺二窍，本不相兼，水得气而通，精得火而泄，故水去而火益盛，精盛而气益固，所谓服此令人有子。

【临证应用】车前草用治血热吐血，衄血尿血，常与旱莲草或白茅根等同用；治热毒疮疡，配清热解毒药内服或用鲜草捣烂外敷。

车前子常与木通、滑石、栀子等清热利湿药同用，如八正散治湿热下注，热结膀胱，小便淋漓涩痛；配白术、茯苓等可治暑湿泄泻，尤以湿热引起的水泻为宜，本品能利水湿，分清浊，利小便以实大便。治肝火上炎的目赤肿痛，常与菊花、龙胆草等配伍。若肝肾不足之眼目昏花，需配伍地黄、枸杞子等补肝养阴药。治肺热喘咳虽有良效，但临床少用。

【用量用法】车前草10—15克，鲜品加倍，外用适量。车前子5—10克，须布包入煎剂。

滑石

〔原文〕滑利窍，淡渗湿，甘益气，补脾胃，寒泻热，降心火。白色入肺，上开腠理而发表，肺主皮毛。下走膀胱而行水，通六腑九窍津液，为足太阳经膀胱。本药。治中暑积热，呕吐烦渴，黄疸水肿，脚气淋闭，偏主石淋。水泻热痢，六一散加红麴治赤痢，加干姜治白痢。吐血衄血，诸疮肿毒，为荡热除湿之要剂。消暑散结，通乳滑胎。时珍曰：滑石利窍，不独小便也。上开腠理而发表，是除上中之湿热；下利便溺而行水，是除中下之湿热。热去则三焦宁而表面和，湿去则阌门通而阴阳利矣。阌门分别清浊，乃小肠之下口。河间益元散，通治上下表里诸病，盖是此意。益元散一名天水散，一名六一散，取天一生水，地六成之之义。滑石六钱，甘草一钱，或加辰砂。滑石治渴，非实止渴，资其利窍，渗去湿热，则脾胃中和而渴自止耳。若无湿小便利而渴者，内有燥热，宜滋润或误服此，则愈亡其津液而渴转甚矣，故王好古以为至燥之剂。白而润者良。石韦为使，宜甘草。走泄之性，宜甘草以和之。

【讲解】滑石功能利水渗湿，清热解暑。为单斜晶系硅酸盐类矿物滑石的块状体。除去杂石，打碎或用粉碎、过筛后即成滑石粉，如用水飞磨粉，称飞滑石。

本品味甘淡，性寒，质重而滑。甘淡渗湿，寒能清热，滑能利窍，重能清降，归胃、膀胱经。既能利水通淋，又善清解暑热，为夏日暑湿常用之药，内服外用皆可。内服能泻膀胱之热而通利小便，以治湿热下注的淋病，小便不利，尿血尿闭等证。寒滑通利，清解暑热而渗湿，以治暑热烦渴，湿温胸闷；治暑湿泄泻，既可渗湿，又能清解暑热，故尤为适当。本品外用，有清热收敛作用，可治湿疹、湿疮、痱子等皮肤病。

【临证应用】滑石治淋病尿闭，可与木通、海金沙、金钱草等同用，如二金排石汤，再如治淋证的常用方八正散亦配用本品；用于暑热烦渴，小便赤涩，常配以甘草，如六一散。治湿温初起，湿邪较重之三仁汤和湿热并重之黄芩滑石汤均有本品。暑湿泄泻多与清热化湿药车前子、藿香等配伍。与炉甘石、枯矾等药配伍，研末外用，可治湿疮、湿疹等皮肤病，并为成药痱子粉之主要原料。

【用量用法】10—15克，煎汤布包，或入丸、散。外用适量，研末掺或调敷。

木通

〔原文〕甘淡轻虚。上通心包，降心火，清肺热，心火降，则肺热清矣。化津液，肺为水源，肺热清，则津液化，水道通。下通大小肠膀胱，导诸湿热由小便出，故导赤散用之。凡利小便者，多不利大便，以小水愈通，大便愈燥也。木通能入大肠，兼通大便。通利九窍，血脉关节。治胸中烦热，遍身拘痛，杨仁斋曰：遍身隐热疼痛，拘急足冷，皆伏热伤血。血属于心，宜木通以通心窍，则经络流行也。大渴引饮，中焦火。淋沥不通，下焦火。心与小肠相表里，心移热于小肠，则淋秘。水肿浮大，利小便。耳聋泄肾火，通窍。目眩，口燥舌干，舌为心苗。喉痹咽痛，火炎上焦。鼻鼈（1）热壅清道，则气室不通。失音，清金。脾热好眠。脾主四肢，倦则好眠。心为脾母，心热清，脾热亦除。除烦退热，止痛排脓，破血催生，行经下乳。火不亢于内，气顺血行，故经调有准，乳汁循常。汗多者禁用。东垣曰：肺热有邪，津液气化之源绝，则寒水断流；膀胱受湿热，癃闭约束，则小便不利，宜此治之。寒水，太阳膀胱也。朱二允曰：火在上则口燥眼赤鼻干，在中则心烦呕啰浮肿，在下则淋秘足肿，必借此甘平之性，泻诸经之火，火退则小便自利，便利则诸经火邪皆从小水而下降矣。君火宜木通，相火宜泽泻，利水虽同，所用各别。藤有细孔，两头皆通。故通窍。

【讲解】（1）鼻鼈：鼈（wèng瓮），鼻塞不知香臭，发音不清。

木通以利小便，降火通乳为主要功效。木通品种繁杂，目前常用的一种是马兜铃科藤本植物木通马兜铃的藤茎，药材称关木通；另一种为毛茛科攀缘性灌木小木通及同属绣球藤的藤茎，药材称川木通。此外，木通科的白木通、木通及马兜铃科淮通马兜铃等亦可入药。切片，生用。

本品大苦而寒，性通利而清降。入心、小肠、膀胱经。故能上以清心降火，下而利水泄热，使湿热之邪下行从小便排出。借其利水降火之功，可治湿热下注的小便短赤、淋沥涩痛，或心火上炎，口舌生疮，心烦目赤，以及水肿等证。本品还能通利九窍、血脉关节，又可用于乳汁不通，血瘀经闭，关节肿痛等证。

【临证应用】木通在临床多用以行水通淋，治膀胱湿热，小便短赤，或心火上炎，心烦尿赤之证，常与生地、甘草、竹叶等配伍用，如导

赤散，以泻心火，清利湿热。也常用于乳汁不通，配王不留行、穿山甲同用，或与猪蹄同煮食。还可配防己、秦艽、牛膝等治痹证关节肿痛而偏于湿热者。

【用量用法】3—6克，煎服。以其苦寒降泄，孕妇及中虚尿频者忌用。前人有“多用则泄人之气”之戒。现代文献报导，用量过大（超过60克），可导致急性肾功能衰竭。

通草

〔原文〕色白气寒，体轻味淡。气寒则降，故入肺经，引热下行而利小便；味淡则升，故入胃经，通气上达而下乳汁。治五淋水肿、目昏耳聋、鼻塞失音，淡通窍，寒降火，利肺气。退热催生。

【讲解】通草比木通力缓，以淡渗利湿，通乳为主要功效。为五加科灌木植物通脱木的茎髓。将茎髓加工成方形薄片，称为方通草；加工时切下来的边条，称为丝通草。生用。

本品性味甘淡微寒，淡渗而清降。入肺、胃二经。入肺能通调水道，引热下行而利小便；入胃通气上达而下乳汁。有能降能升之特点。可清利湿热，用于湿温病及湿热淋证，或乳汁不通等证。

【临证应用】通草多用于小便不利，淋沥涩痛，或湿温病小便短赤，可配滑石、苡仁等清热利湿药，如三仁汤，黄芩滑石汤等。然本品药力较缓，湿热不甚者用之为宜。借其通气下乳的作用，配王不留行，穿山甲等可治乳汁不通。

通草、木通二者主要性能、功用基本相同，但木通苦寒入心，降泄力强，能泻心火，主治湿热壅闭偏于下焦之实证及心火上炎之证，又可通利血脉关节；而通草甘寒入肺，淡渗利湿，药力缓和，利水泄热之力不及木通，然通利而不伤阴，湿温初起偏于上焦的轻症以此药佐使相宜。通乳之功二者相同。

总之木通味苦性寒，以清热利湿见长；通草甘淡性凉，以淡渗利湿为主。

另外，古时木通、通草混淆。今之所用木通，古称“通草”，今之所用通草，古称“通脱木”，应予区别。

【用量用法】3—6克，煎服。孕妇慎用。

篇蓄

〔原文〕苦平。杀虫疥，利小便。治黄疸热淋，虻咬腹痛，虫蚀下部（1）。煮服。叶细如竹，弱茎蔓引，促节有粉，三月开红花。

【讲解】（1）虫蚀下部：指类似现代医学阴道滴虫的病证。妇女外阴部或阴道瘙痒，甚则疼痛，常渗出水液，如白带色黄气臭，痒痛难忍等证。

篇蓄功长利水通淋，兼能杀虫止痒。为蓼科一年生草本植物篇蓄的地上部分。茎匍匐或斜上，茎分枝甚多，具明显的节及纵沟纹；叶披针形，绿色。花粉红色。采收后除去根及杂质，晒干。生用。

《备要》言本品味苦性平，实则性偏微寒。苦降下行，专入膀胱经。长于清膀胱湿热而利水通淋，又善杀虫止痒，主治小便短赤，淋漓涩痛及黄疸等湿热之证。对虫积腹痛，皮肤湿疹，阴部瘙痒等证也有较好的疗效。

【临证应用】篇蓄能清利下焦湿热，利水通淋，用于湿热下注，小便淋漓涩痛，常与滑石、木通、瞿麦等配伍，如八正散；治血淋，可与白茅根、大小蓟、车前草等凉血利尿药配伍；治湿热黄疸，可与茵陈、栀子等配用。

本品每常用于虫积腹痛之证。如治胆道蛔虫，可用篇蓄30克，米醋90克，加水煎，分二次服；治钩虫，单用本品30克，煎服，三天为一疗程；治蛲虫，可单用水煎服，或与榧子、槟榔等配伍，如篇榧驱蛲汤。皮肤湿疹，阴道滴虫，阴部瘙痒证，可煎汤内服，也可煎汤外洗。

【用量用法】10—30克，煎服。外用适量。煎汤外洗。

石韦

〔原文〕甘苦微寒。清肺金以滋化源，凡行水之药，必皆能先清肺火。通膀胱而利水道，益精气，补五劳。利湿清热之功。高阳生对黄帝治劳伤，用石韦汁。治淋崩发背。炒末，冷调酒服。生石阴，柔韧如皮，背有黄毛，去毛微炙用。杏仁、滑石、射干为使。得菖蒲良。生古瓦上者名瓦韦，治淋。

【讲解】石韦以清热利水通淋为主要功效。为水龙骨科多年生草本植物石韦的叶片。生岩石阴凉处，叶鞣如皮，故名石韦。其叶背面有毛，刷净茸毛，切碎，生用。

本品甘苦、微寒。入肺与膀胱经。故能上清肺热而止咳，下利膀胱以通淋。肺为水之上源，肺经清则水道利，故曰清肺金以滋化源，通膀胱而利水道。主治湿热淋症。因其又能凉血止血，用于血淋，亦颇适宜。

至于益精气，补五劳，当是《本经》治劳热邪气，指劳力伤津，癃闭不通之邪热而言，非虚劳之谓。治发背，可能来自《纲目》“主崩漏、金疮”等，后世少用。

【临证应用】石韦清热、利水、通淋。可配海金砂、滑石等治热淋或石淋；配白茅根、蒲黄等治血淋。用其清肺化痰止咳之功，可治现代医学之急、慢性支气管炎。

近年来试用石韦（石韦30克、红枣15克，甘草3克，水煎服。每日一剂）治疗放射疗法和化学疗法引起的白血球下降，取得一定的疗效，供临床参考。

【用量用法】5—10克，煎服。

瞿麦

〔原文〕苦寒。降心火，利小肠，逐膀胱邪热，为治淋要药。故八正散用之。五淋大抵皆属湿热，热淋宜八正散及山梔滑石之类；血淋宜小蓟牛膝；肾虚膏淋宜补肾，不可独泻；老人气虚者，宜参术兼木通、山梔；亦有痰滞中焦作淋者，宜行痰兼通利药，最忌发汗，汗之必便血。破血利窍，决痈消肿，明目去翳，通经堕胎。性利善下，虚者慎用。寇宗奭曰：心经虽有热，而小肠虚者服之，则心热未清，而小肠别作病矣。花大如钱，红白斑烂，色甚妩媚，俗称洛阳花，用蕊壳。丹皮为使，恶蜈蚣。产后淋当去血，瞿麦蒲黄皆为要药。

【讲解】瞿麦能清热、利尿、通淋，兼破血通经。为石竹科多年生草本植物瞿麦和石竹的带花全草。茎丛生，直立无毛。节明显，叶互生，线形，花单生，如铜钱大。淡红色、白色或紫红色。又名洛阳花（《纲目》）。夏秋时节采带花的全草。晒干，生用。

本品味苦，性寒。为泄降之品。入心、小肠、膀胱经。功能降心火，利小肠，泄膀胱热邪，导热下行，为淋证的常用药。又能破血通经，堕胎。至于《备要》所言决痈消肿，明目去翳方面，后世未见应用。

【临证应用】瞿麦用治多种淋证，属热者尤宜，如治热淋，小便淋沥涩痛或尿血的八正散，即以本品配木通、车前子、滑石等；治石淋可配金钱草、海金沙；治血淋配白茅根、大小蓟等。

妇人经闭血瘀，可配伍活血药用。但性善通利下行，虚人及孕妇禁用。

萆薢、篇蓄、瞿麦均有利水通淋作用，为治淋证常用药。但萆薢利湿而分清浊，适用于湿重于热之淋证，如小便混浊似米泔水状；篇蓄主清膀胱湿热，适用于湿热并重之淋证，如小便不利，尿黄短少者；瞿麦利小肠导热下行，适用于热重于湿之淋证，如尿道疼痛有热感或兼尿血者。萆薢又长于祛风湿而止痛；篇蓄又善于杀虫止痒；瞿麦兼能行血通经。

【用量用法】10—15克，煎服。

海金沙

〔原文〕甘寒淡渗。除小肠膀胱血分湿热。治肿满五淋茎痛⁽¹⁾。得梔子、牙硝、硼砂，治伤寒热狂。大热利小便，此釜底抽薪之义也。茎细如线，引竹木上，叶纹皱处，有砂，黄赤色。忌火。

【讲解】⁽¹⁾茎痛：指排尿时尿道疼痛。

海金沙清热通淋，为治淋证要药。为海金沙科多年生攀援蕨类植物海金沙的成熟孢子。秋季孢子米脱落后采割藤叶晒干，搓下孢子，生用。

本品味甘淡，性寒。甘淡利尿，寒可清热，其性下降，善清利下焦湿热。入膀胱、小肠经。功专利水通淋，为治疗淋证所常用，对热淋茎中疼痛尤效。亦可用于水肿。

关于《备要》言及该植物形态之语，不甚贴切，不必深究。叶纹皱处有砂，此即药用的孢子囊。成熟孢子黄赤色。

【临证应用】海金沙为治淋要药，无论血淋、石淋、膏淋、热淋，凡茎中疼痛用之尤效，多配滑石、石韦、车前子等利水通淋药同用。治水肿胀满可配逐水药牵牛子、甘遂等同用，如海金沙散。

【用量用法】6—12克，布包入煎。

萆薢

〔原文〕甘苦性平。入足阳明、厥阴。胃、肝。祛风去湿，以固下焦，阳明主肉，属湿；厥阴主筋，属风。补肝虚，去风。坚筋骨，风湿去，则筋骨坚。益精明目。治风寒湿痹，腰痛久冷，关节老血，膀胱宿水，阴痿失溺，茎痛遗浊，痔痿恶疮。诸病皆阳明湿热流入下焦，萆薢能除浊分清，古方有萆薢分清饮。史国信曰：若欲兴阳，先滋筋力；若欲便清，先分肝火。《万金护命方》曰：凡人小便频数，便时痛不可忍者，此疾必因大肠秘热不通，水液只就小肠，大肠愈加干竭，甚则身热心燥，思水，即重证也。此疾本因贪酒色，或过食辛热荤膩之物，积有热毒腐物瘀血，乘虚流入小肠，故便时作痛也。此便数而痛，与淋证涩而痛不同，宜用萆薢一两，盐水炒，为末，每服二三钱，使水道转入大肠，仍以葱汤频洗谷道，令气得通，则便数及痛自减也。肾有二窍，淋证出于溺窍，浊证出于精窍。有黄白二种，黄长鞭音硬，白虚软，软者良。薏苡为使，畏大黄、柴胡、前胡，忌茗、醋。时珍曰：萆薢、菝葜、土茯苓，形不同而主治不甚相远，岂一类数种乎？萆薢根细长浅白，菝葜根作块而黄。

【讲解】萆薢长于利湿浊，祛风湿。为薯蓣科多年生蔓生草本植物粉背薯蓣，或山萆薢、艾蕊薯蓣、纤细薯蓣等的干燥根茎。粉背薯蓣或山萆薢等的干燥根茎名“粉萆薢”，外皮棕黑色，断面黄白色，质柔软。切片，生用。

本品味苦性平。入肝、胃、膀胱经。性善下行，利湿去浊，主治下焦湿热的淋浊带下，尤为治小便混浊，色白如米泔水（乳糜尿）之膏淋的要药。本品又长于祛风湿而通络止痛，用于风湿痹痛，腰痛等证。

至于《备要》云其补肝虚，坚筋骨，益精明目，治风寒湿痹，腰痛久冷等，《本草正义》释曰：《本经》主腰背痛，乃肾有湿热，浊气不去，而腰脊为之疼痛，非肾虚无湿之腰痛，所可浑同施治。强骨节者，宣通百脉，湿浊去而正气自强，非能补益以助其强固，此药理之至易辨者。

【临证应用】萆薢能利湿而分清浊，常用于膏淋，小便混浊，色白如米泔，及妇女带下等证，多与茯苓、石菖蒲、乌药等药同用，如萆薢

分清饮，近代用治乳糜尿，有较好疗效；用于风湿痹证属寒湿者，配附子、桂枝等；若关节不利，腰膝酸痛，则配防己、秦艽、桑枝等。

【用量用法】10—15克，煎服。肾虚阴亏者忌用。

茵陈

〔原文〕苦燥湿，寒胜热。入足太阳膀胱经。发汗利水，以泄太阳阳明脾、胃之湿热。为治黄疸之君药。脾胃有湿热则发黄，黄者，脾之色也。热甚者，身如橘色，汗如柏汁；亦有寒湿发黄，身熏黄而色暗。大抵治以茵陈为主，阳黄加大黄、栀子，阴黄加附子、干姜，各随寒热治之。又治伤寒时疾，狂热瘧症，头痛头旋，女人瘕疝。皆湿热为病。

【讲解】茵陈善能清利肝胆湿热，为治黄疸之要药。为菊科多年生草本植物茵陈蒿和滨蒿的幼苗。晒干，生用。

本品味苦，性微寒，苦泄下降，寒能清热，气清芬芳。入脾、胃、肝、胆经。功专清利湿热以退黄。为治黄疸专药。

《备要》所云，治伤寒时疾，狂热瘧症，头痛头旋，女人瘕疝，皆指有湿热见证者，方可配用，不是主要方面。

【临证应用】茵陈治黄疸，多用于湿热薰蒸而发黄者。可单用一味，大剂量煎汤内服，亦可配伍应用。若湿热俱盛的阳黄，身目黄色鲜明，发热，小便短赤，腹胀满，可配大黄、栀子，即茵陈蒿汤；若小便不利，湿偏盛者，可配茯苓、猪苓等利湿药，如茵陈五苓散；若属寒湿阴黄，须配附子、干姜等温中药，如茵陈四逆汤。此外，亦可用于湿疹瘙痒，流黄水者，乃取其清利湿热之功。可煎汤内服或外洗。

【用量用法】10—30克，煎服。外用适量。

地肤子

〔原文〕甘苦气寒。益精强阴，入膀胱，除虚热，利小便而通淋。时珍曰：无阴则阳无以化，亦犹东垣利小便不通，用梔柏滋肾之意。王节斋曰：小便不通或频数，古方多以为寒，而用温涩之药。殊不知属热者多，盖膀胱火邪妄动，水不得宁，故不能禁而频数也。故老人多频数，是膀胱血少，阳火偏旺也。治法当补膀胱阴血，泻火邪为主，而佐以收涩之剂，如牡蛎、山茱萸、五味之类，不可独用。病本属热，故宜泻火，因水不足，故火动而致便数，小便既多，水益虚矣。故宜补血，补血泻火，治其本也。收之涩之，治其标也。治癰疽（1），散恶疮。煎汤洗疮疥良。叶作浴汤，去皮肤风热丹肿，洗眼除雀盲（2）涩痛。叶如蒿，茎赤，子类蚕沙。恶螬蛸。

【讲解】（1）癰疽：病名。指寒湿引起的阴囊肿大。（2）雀盲：即夜盲证。以黑夜或暗处视物不清为主证的眼病。

地肤子功能清热利湿，止痒。为藜科一年生草本植物地肤的成熟果实。茎直立，多分枝，绿色，秋季变为红色；叶狭披针形，如蒿；胞果扁圆形，极小如蚕沙。秋季果实成熟时割取全草。晒干，打下果实，除尽杂质。生用。

本品苦寒降泄，入膀胱经。能清湿热，利尿通淋，使湿热从小便而出。又能止痒，风湿热引起的皮肤湿疮，周身瘙痒及小便不利等证皆可应用。其它功用临床少予重视。

至于《备要》载益精强阴，正如《本草求真》所云：非是具有补益之能，不过因其除热，而具有坚强之意耳。

地肤叶与子功效相同，叶多外用，以治皮肤风湿等证为主。

【临证应用】地肤子用于小便不利，淋漓涩痛，多入复方作为佐使，因作用平和不作主药。用治皮肤湿疮瘙痒，可与黄柏、白藓皮等同用，入汤剂内服。亦可与苦参、蛇床子、明矾等煎汤外洗。

【用量用法】10—15克，煎汤或入丸散。外用适量。

冬葵子

〔原文〕甘寒淡滑。润燥利窍，通营卫，滋气脉，行津液，利二便，消水肿，用榆皮等分煎服。通关格，下乳滑胎。秋葵复种，经冬至春作子者，名冬葵子。根叶同功，春葵子亦滑，不堪入药。

蜀葵花，赤者治赤带，白者治白带；赤者治血燥，白者治气燥。亦治血淋关格，皆取其寒润滑利之功也。

【讲解】冬葵子长于利水通淋，又能润肠下乳。为锦葵科一年生草本植物冬葵的成熟种子。春季种子成熟时采收。生用，捣碎入药。目前商品所用的冬葵子，大多为锦葵科植物苘麻的种子。

冬葵子味甘，性寒。入大肠、小肠、膀胱经。甘寒质润，为滑利通窍之品。既可利水通淋，用于小便不利，水肿，小便淋漓涩痛；又能下乳消肿，用于乳汁不行，乳房胀痛；还能润肠通便，以治大便燥枯。

冬葵根味甘、辛、性寒。可清热解毒，利窍通淋，治消渴淋病，二便不利，乳汁少，白带，虫螫伤等证。冬葵叶味甘、性寒。可清热、行水、滑肠，治肺热咳嗽，热毒下痢，黄疸，二便不通，丹毒，金疮等证。

蜀葵花为锦葵科二年生草本植物蜀葵的花朵。生用。味甘、性寒。和血润燥，通利二便，治痢疾，吐血血崩，带下，二便不通，疟疾，小儿风疹等证。

【临证应用】冬葵子用于淋证水肿，可与车前子、海金砂、茯苓配伍；用于乳汁不通，配伍穿山甲、王不留行、黄芪等；用于便秘，与桃仁、郁李仁等同用。

【用量用法】10—15克，煎服。寒润之品，脾虚肠滑者忌用，孕妇慎用。

冬瓜

〔原文〕寒泻热，甘益脾，利二便，消水肿，冬瓜任吃效。止消渴，苗叶皆治消渴。**散热毒痈肿。**切片敷之。丹溪曰：冬瓜性急而走，久病阴虚者忌之。昂按：冬瓜日食常物，于诸瓜中犹觉宜人，且味甘而不辛，何以见其性急而走乎。

子补肝明目。凡药中所用瓜子，皆冬瓜子也。

【讲解】冬瓜能利水消肿，又兼清热化痰。为葫芦科一年生攀援草本植物冬瓜的果实。果实以食用为主。果皮（冬瓜皮）、种子（冬瓜子）主供药用。均系生用。

本品味甘淡性微寒。归肺、小肠、膀胱三经。甘淡渗利，以利水消肿为主要功效。性寒入肺，又可清热化痰。适用于水肿胀满，脚气浮肿，小便不利，痰多咳喘，以及暑热烦渴，消渴泄泻等证。

【临证应用】冬瓜治水肿喘满，常与赤小豆同用，以加强利水消肿之功。如《杨氏家藏方》冬瓜丸，以冬瓜去瓢，加入赤小豆，用泥封固、火煨，去泥焙干，研末制丸，冬瓜子煎汤送服。《圣济总录》治消渴：冬瓜一个，削去皮，埋在地下，一月取出，破开，取汁饮之。

【用量用法】60—120克。煎汤，煨熟或捣汁服。

附：冬瓜皮、冬瓜子

附：冬瓜皮 即冬瓜的外层果皮。味甘性微寒，入肺、小肠经。为治水肿常用药，有通利小便，排出水湿以消除肿胀之功，但单用力薄，一般作为辅助药。常配伍茯苓、泽泻、白茅根等利水渗湿药以加强疗效。用量15—30克，煎服。

冬瓜子 即冬瓜的种子，又名冬瓜仁。性寒滑利，上可清肺之蕴热，下能除肠之热积，而有祛痰排脓作用。故常用于肺热咳嗽、肺痈、肠痈。如治肺痈的苇茎汤、治肠痈的大黄牡丹汤中均有本品。治肺热咳嗽，咳痰不利，可与贝母、瓜蒌等清热化痰药同用，功效良好。《备要》云亦能补肝明目，现临床少用。用量10—15克，煎服。

赤小豆

〔原文〕甘酸思邈：咸冷。色赤，心之穀也。性下行，通小肠，利小便，心与小肠相表里。行水散血，消肿排脓，清热解毒。治泻痢脚气，昔有患脚气者，用袋盛赤小豆，朝夕践踏之，遂愈。同鲤鱼煮食汁，能消水肿，煮粥亦佳。敷一切疮疽。鸡子白调末箍之，性极粘，干则难揭，入苈根末则不粘。宋仁宗患疥，道士赞能取赤小豆四十九粒咒之，杂他药敷之而愈。中贵任承亮亲见，后任自患恶疮，傅永投以药立愈。问之，赤小豆也。承亮始悟道士之咒伪也。后过豫章，见医治胁疽甚捷，任曰：莫非赤小豆耶？医惊拜曰：用此活三十余口，愿勿复宣。止渴解酒，通乳下胎，然渗津液，久服令人枯瘦。《十剂》曰：燥可去湿，桑白皮、赤小豆之属是也。按二药未可言燥，盖取其行水之功，然以木通、防己为通剂，通燥二义似重。故本集改热药为燥剂，而以行水为通利。

【讲解】赤小豆既能利水消肿，又善解毒排脓。为一年生半缠绕草本植物赤小豆或赤豆的成熟种子。种子呈长圆形，体瘦长，靠近一侧上端有白色突起的小点。入药皆生用。

另有藤本植物相思子的种子，和赤小豆有“红豆”之称，种脐及附近呈黑色，下半部为朱红或赤褐色，有毒，不可内服。必须区分，切不可混。

本品味甘酸，性平。入心、小肠二经。性善下行，功能通利水道，使水湿下泄而消肿。治水肿胀满，脚气浮肿，虚实均宜，而偏于湿者尤为合适。又能清血分热毒，排脓消痈，故用治热毒疮疡，亦有一定疗效。正如《备要》所载之行水散血、消肿排脓、清热解毒等，以概其功。

【临证应用】赤小豆性善利水消肿，治水肿可单用煎服，或配白茅根、桑白皮、茯苓皮等利水药，以加强消肿之功，据《食疗本草》记载，用赤小豆和鲤鱼煮食，治脚气及下腹水肿。近代医学用此法治疗肾炎水肿，肝硬化腹水及营养不良性浮肿，取得较好的疗效。本品清热解毒之功，亦颇突出，用于热毒疮痈，疥腮乳痈，丹毒等，内服外用均有效。如痈肿未脓，赤小豆为末，用鸡蛋清、蜂蜜或醋等调敷患处，干则换药，也可配伍清热解毒药内服。治疥腮、丹毒等病，可用

本品捣烂外敷。此外，借其清热利湿之功，也可用于湿热黄疸。近有报道治糖尿病，以本品（发芽）120克同猪胰脏一个煮食，经常服用，有一定的疗效。

【用量用法】15—30克，煎服。外用适量。

灯草

〔原文〕甘淡而寒。降心火，心能入心。清肺热，利小肠，心与小肠相表里，心火清则肺热小肠亦清，而热从小便出矣。通气止血。治五淋水肿，烧灰吹喉痹，涂乳止夜啼，擦癣最良。缚成把，擦摩极痒时，虫从草出，浮水可见，十余次则能断也。

【讲解】灯草善清心降火，利尿通淋。为灯心草科多年生草本植物灯心草的干燥茎髓。又名灯芯草。切段生用，或朱砂拌用。

本品味甘淡，性寒。入心与小肠二经。有利水渗湿，清心降火，及泻肺热之功。甘淡利湿泄热，能引心经之热下行从小便排出。故用治淋病水肿，小便短赤热痛及心热烦躁，小儿夜啼，肺热喉痹等证。言其可以止血，不过是热去血不妄行之意。惟药力薄弱，宜于病情轻浅者，或作其他清热利尿药之辅助剂。

【临证应用】灯草常用于心经热盛的心烦不寐，口舌生疮及小便短赤者。多配淡竹叶、栀子等同用。若由于心火亢盛，神志不安，小儿夜啼，可以本品单味煎服，或配竹叶、蝉衣等清热安神药用，亦可将其煅炭研末，涂乳房头上喂之。

治心烦惊痫，以朱砂拌用则疗效更佳。

治喉痹，可煅炭外用吹喉。疥癣，临床少用。

【用量用法】2—4克，煎服。外用煅炭存性，研末。

淡竹叶

〔原文〕微苦而凉。利小便，泻火，凉肺清心。

【讲解】淡竹叶以利尿通淋为主，并能清热除烦。为禾本科多年生草本植物淡竹叶的全草。高40—100厘米。茎丛生，叶互生、披针形；圆锥花序顶生。5—6月未开花时采收，晒干，切段，生用。

本品味甘淡，性寒。入心、肺、小肠经。功能利尿通淋，以导小肠、膀胱湿热，兼清心除烦，清上导下为利尿清热除烦之品，适用于小便短赤涩痛，烦热口渴，口舌生疮及小儿惊热夜啼等证。

【临证应用】淡竹叶用于心火上炎、口舌生疮，及移热小肠，小便短赤，淋漓涩痛等证，常与生地、木通等同用，如导赤散，清心利水以引导心火下行。治小儿惊热夜啼，常与钩藤、蝉蜕、灯心草等同用。若与生地、连翘、麦冬等同用，也可用于烦热口渴，小便不利之证。此外，风热感冒、痰热咳嗽、小便短赤者也可配用。

【用量用法】6—15克，煎服。不宜久煎。

鲤鱼

〔原文〕甘平。下水气，利小便，治咳逆上气，脚气黄疸，妊娠水肿。古方治水肿，有鲤鱼汤，鲤鱼粥。刘河间曰：鲤之治水，鸭之利水，所谓因其气相感也。

骨烧灰，疗鱼骨鲠。

【讲解】鲤鱼善能利水消肿，兼可下气通乳。为鲤科动物鲤鱼的肉或全体。生用。其分布很广，黑龙江、黄河、长江、珠江、闽江诸流域及云南、新疆等处的湖泊、江河中均有。

本品味甘，性平。入脾、肾经。有利水消肿之功。主水肿胀满、脚气、黄疸等证；能下气，可治咳嗽气逆；又可通乳，用于乳汁不通者。《本草纲目》曰：鲤，其功长于利小便，故能消肿胀黄疸，脚气喘嗽湿热之病。

此外，鲤鱼的鳞、皮合烧作屑，内服，可治鱼骨鲠喉。

【临证应用】用鲤鱼利水消肿，古有与商陆同煮治水肿胀满的方法；据报道：取约1斤重的新鲜鲤鱼一条，除去鳞及内脏，和赤小豆1两加水煮熟（先将赤小豆煮开，再加入鲤鱼），不加油盐醋及其他调味品，于早饭前或早饭同时一次服完。病重者一天可服两剂，轻症及巩固疗效阶段可只服半剂。鲤鱼用于治疗现代医学之肝硬化腹水有较好的利尿作用。此外，亦有用鲤鱼配合茶叶、食醋煎服，治慢性肾炎水肿，获显著的利尿消肿效果。

小结

利水渗湿药又叫淡渗利湿药，药物多甘淡，药性寒凉，均有利水渗湿之功，凡水湿停留之证，皆可选用。

茯苓、猪苓同为寄生菌核，均有利水渗湿的作用，所不同者，茯苓性平并能健脾宁心，猪苓偏寒，利水渗湿之力较茯苓强，对于水湿停留而有热者更为适宜。以往茯苓在临床应用时，常分三部分，菌核外皮部分称茯苓皮，功能利水消肿，专用于水肿；除去外皮后较外层部分称赤茯苓，习惯认为偏于利湿热；内层的白色部分称白茯苓，偏于健脾，实三部分都取之同一菌核，现已不作赤白之分。茯神以宁心安神为主，治心悸失眠多用。

薏苡仁既能利水渗湿，又能健脾补肺，为清补淡渗之品，药力和缓，用量宜大，健脾止泻多炒用，清热排脓多生用，除治水肿脚气，又常用于肺痈肠痈，以及湿痹拘挛等证。

泽泻、车前子、滑石功效大同小异，通利小便，清泄湿热之功则同。异者泽泻又能泻肾火，兼可去痰饮；车前子兼能清肝、肺之热，而有明目、化痰止咳之效；车前草性味功效基本相同，又兼清热解毒，用治痈肿，内服外用均可，滑石性较寒凉，善治暑热烦渴，为解暑要药。

木通、通草功效相似，均有清利湿热和通乳之效。然木通苦寒，降泄力胜，主清心火，入血分，并通利血脉关节，通经下乳；通草甘淡，泄降力缓，主清肺热，入气分，能通气上达而下乳。

瞿麦、篇蓄、萆薢、石韦、海金沙、冬葵子均有利尿通淋作用，为治湿热淋证之常用药。其中瞿麦泄降通利之力较强，多用于热重于湿的淋证，兼可破血通经；篇蓄多用于湿热并重的淋证，并善能杀虫止痒；萆薢多用于湿重于热的淋证，尤以小便混浊不清如米泔水者效佳，兼可祛风除痹；石韦兼能凉血，为治血淋热淋之要药；海金沙为通淋佳品，凡淋证尿路疼痛者，均可用之；冬葵子通利小便，并有下乳之效。

茵陈蒿功能清利湿热，为治黄疸要药，无论阳黄阴黄，随证配伍清热利湿或温化寒湿之品，皆常用之。

地肤子能清利湿热，善治皮肤湿疹瘙痒。灯芯草长于清心除烦。赤小豆不仅可利水消肿，并能解毒排脓，以治热毒疮疡。冬瓜皮主治皮肤水肿，偏于湿热者尤为适宜；冬瓜子能祛痰排脓，多用于肺痈肠痈，及痰热咳嗽等证；淡竹叶以利水通淋为主，兼能清热除烦。鲤鱼有利水消肿之功，主治水腫脚氣。

利水渗湿药功用归纳简表

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
茯苓	甘、淡、平	心、脾、肾、肺	利水渗湿，健脾，安神	①水肿、小便不利 ②痰饮 ③脾胃虚弱，食少便溏 ④心悸、失眠	10—15克	用于安神，常与朱砂拌用。茯苓皮功专利水消肿；茯神专主宁心安神。
猪苓	甘、淡、微寒	肾、膀胱	利水渗湿	水肿、小便不利、泄泻、带下等证	5—10克	
泽泻	甘、淡、	肾、膀胱	利水渗湿，	小便不利、水	5—10	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	寒		泄热	肿、泄泻、淋浊、带下、痰饮等证	克	
薏苡仁	甘、淡、微寒	脾、胃、肺	利水渗湿，健脾止泻，除痹舒挛，清热排脓	①水肿、小便不利 ②脾虚泄泻 ③痹证 ④肺痈	10—30克	健脾炒用，余皆生用。
车前子	甘、寒	肝、肺、肾	利水通淋，止泻	①小便不利、水肿、淋病 ②湿热泄泻 ③目赤肿痛、翳障	5—10克	布包入煎剂 车前草又能凉血解毒，主治热毒疮疡，及吐血衄血。
滑石	甘、淡、寒	胃、膀胱	清热利湿，清解暑热	①小便不利、淋沥涩痛 ②暑热	10—15克 外	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				烦渴、 湿热泄 泻 ③湿 疹、湿 疮	用 适 量	
木通	苦、 寒	心、 小 肠、 膀胱	利水通 淋，泄 热，通 乳	①小便 短赤， 淋漓涩 痛 ②产后 乳汁不 多 ③湿热 痹证	3— 6克	孕妇慎 用
通草	甘、 淡、 微寒	肺、 胃	清热利 水，通 乳	①小便 短赤、 淋漓涩 痛 ②产后 乳汁不 多	3— 6克	
篇蓄	苦、 微寒	膀胱	利水通 淋， 杀虫止 痒	①小便 短赤、 淋漓涩 痛 ②皮肤 湿疹	10 — 30 克 外 用	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
					适量	
石苇	苦、甘、微寒	肺、膀胱	利水通淋，止咳	①淋证 ②肺热喘咳	5—10克	
瞿麦	苦、寒	心、小肠、膀胱	利水通淋	小便短赤、淋沥涩痛	10—15克	
海金沙	甘、淡、寒	膀胱、小肠	利水通淋	淋证	6—12克	布包入煎
萆薢	苦、平	肝、胃、膀胱	利湿，祛风湿	①膏淋，小便混浊 ②风湿痹痛	10—15克	
茵陈	苦、微寒	脾、胃、肝、胆	清利湿热，黄疸	黄疸	10—30克	
地肤子	苦、寒	膀胱	清热利水，止痒	①小便不利、淋沥涩痛 ②皮肤	10—15克外	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				湿疮瘙痒	用适量	
冬葵子	甘、寒	大肠、小肠、膀胱	利水通淋，下乳，润肠	①水肿、小便不利 ②乳汁不行、便秘	10—15克	孕妇慎用
冬瓜皮	甘、微寒	肺、小肠	利水消肿	水肿	15—30克	冬瓜子能清热排脓，主治肺热咳嗽、肺痈、肠痈。
赤小豆	甘、酸、平	心、小肠	利水消肿，解表排脓	①水肿、脚气 ②热毒疮痈	15—30克外用适量	
灯心	甘、淡、	心、小肠	利水通淋，清	①小便不利、	2—4克	用朱砂拌用，

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
草	微寒		心除烦	淋漓涩痛 ②小儿夜啼		主心烦惊悸。
淡竹叶	甘、淡、寒	心、肺、小肠	利水通淋，清心除烦	①小便短赤涩痛 ②口舌生疮	6—15克	
鲤鱼	甘、平	脾、肾	利水消肿	水肿胀满 脚气、黄疸	无定量	

复习思考题

- 1、试述利水渗湿药的定义和适应证，以及注意事项。
- 2、茯苓、猪苓、泽泻、薏苡仁、车前子、滑石、木通、通草、萆薢、茵陈的功效和适应证各是什么？
- 3、以利尿通淋为主要功效的药物还有哪些？
- 4、分析比较下列药组的功效和主治的相同点和不同点：茯苓与薏苡仁，木通与通草，车前子与滑石，茵陈蒿与金钱草。
- 5、利水渗湿药、祛风湿药、芳香化湿药以及清热燥湿药均有除湿作用，在临床应用上有何差别？为什么？

第六章祛风湿药

- 第六章祛风湿药

[自学时数]6 学时

[面授时数]2 学时

[目的要求]

1. 了解祛风湿药含义、功效、主要适用症。
2. 熟悉祛风湿药与解表、活血、化湿、温里、通络、清热、祛痰、补气、养血、补益肝肾等药配伍应用的理论依据（联系中医基本理论）。
3. 掌握祛风湿药中常用药（独活、威灵仙、秦艽、木瓜、桑寄生、五加皮、白花蛇、防己）的功效、临症应用，并比较其异同。
4. 熟悉祛风湿、舒筋、通络、强筋骨等概念。
5. 了解木防己与汉防己、南五加皮与北五加皮、蕲蛇与金钱白花蛇品种差异。
6. 在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡能祛除肌肉、经络、筋骨间的风湿，以解除痹痛的药物，称祛风湿药。

祛风湿药味多辛苦，性有温凉，能祛除留着于肌表、经络的风湿，部分药物还兼有舒筋、通络、止痛及补肝肾、强筋骨等作用。适用于风湿痹痛，筋脉拘急，麻木不仁或肢体疼痛，关节不利等证。某些药物还可用于下肢萎弱，半身不遂。

痹证，根据风寒湿邪的偏胜及所表现证状可分为风胜的行痹，寒胜的痛痹，湿胜的着痹，因而使用祛风湿药时应根据痹证之类型，疾病之新久及所在部位之不同，而选择适当的药物，并作相应的配伍，才能

提高疗效。如风邪偏胜的行痹，应选用祛风为主的祛风湿药，配以祛风解表活血止痛之品；湿邪偏胜的着痹，应选用性较温燥的祛风湿药，配以化湿、利湿之品；寒邪偏胜的痛痹，当选用温性较强的祛风湿药，并配伍温通之品；郁久化热的热痹，又当选用性质寒凉的祛风湿药，并配伍清热之品。此外，病邪入里，脉道不利，气血运行受阻者，须与通络活血药配伍；挟有瘀血、痰湿的，须与活血、祛痰药同用；久病体弱者，又应与补养气血之药合用；肝肾亏损者，又宜选用强壮筋骨的祛风湿药，配伍补养肝肾之品，以扶正祛邪。

痹证多属慢性疾患，宜久服缓图，为服用方便，可作酒剂或丸散常服。

本类药大多辛燥温散，能伤阴耗血，故阴亏血虚者宜慎用，必要时可配伍养阴补血药同用。

独活

[原文] 辛苦微温。气缓善搜，入足少阴肾气分以理伏风(1)。治本经伤风头痛，头运目眩，宜与细辛同用。风热齿痛，文潞公《药准》用独活、地黄等分为末，每服三钱。痉(2) 痼湿痹，项背强直，手足反张曰痉；湿流关节，痛而烦曰湿痹。风胜湿，故二活兼能去湿。奔豚(3) 疝瘕。肾积曰奔豚，风寒湿客于肾家所致。瘕疝亦然。有风不动，无风反摇，又名独摇草。故治风。

《本经》云：独活一名羌活。古方惟用独活，后人云是一类二种，遂分用。以形虚大有白如鬼眼，节疏色黄者为独活；色紫节密，气猛烈者为羌活。并出蜀汉。又云自西羌来者名羌活。故又名胡王使者。今采诸家所分经络，主治各证，以便施用。

【讲解】(1) 伏风：指痹证，风寒湿邪偏在于里在下，病程较长者。(2) 痉：病名。以项背强急，口噤，四肢抽搐，角弓反张为主证。(3) 奔豚：古病名。为五积之一，属肾之积，由肾脏寒气上冲所致。临床特点为发作性气从下腹上冲胸脘，直达咽喉，腹部绞痛，胸闷气急，头昏目眩，心悸易惊，烦躁不安，有的夹杂寒热往来，因其发作时胸腹如有小豚奔闯，故名。

独活祛风除湿，蠲痹止痛，尤以治下部痹证适宜。为伞形科植物重齿毛当归的根。主产四川、湖北等地。以川产者根条粗壮，香气浓郁，品质最佳，誉为地道药材。切片生用。

独活全国各地所用原植物品种极不一致，除重齿毛当归外，尚有同科植物牛尾独活、毛当归以及五加科植物食用橐木的根及根茎等数种。

《备要》谓形虚大有白如鬼眼，节疏色黄者为独活。是指食用橐木的干燥根茎，呈弯曲扭转不整齐的圆柱状，上有大的圆形凹突。表面灰黄色，质轻疏松，又称九眼独活。均切片生用。

本品味辛苦，性温，气芳香。入肾、膀胱经。有祛风除湿，蠲痹止痛之效，主用于风寒湿痹。因其性善下行，主下主里，故治在下在里之“伏风”，对两足痿痹，腰腿痠软疼痛等下部痹证，尤为适宜。伏风头痛，风牙肿痛亦可应用。

【临证应用】独活是治风湿痹痛的常用药，凡风寒湿邪痹着于肌肉关节者，无问新久，均可使用，尤常用于腰背和下半身痠重疼痛，可配秦艽、细辛等同用。若风湿日久，肝肾两亏者，还可酌加桑寄生、杜仲、牛膝等补肝肾药，以标本同治，如独活寄生汤。

对于风寒表证，兼湿邪的头痛，亦可配川芎、防风、羌活等用，但其力较羌活为弱。

此外，本品止痛，还可发散郁火，用治风火牙痛，配石膏、升麻等。

羌、独二活古代不分，《本经》谓独活一名羌活，《纲目》尚沿其旧，谓“独活以羌中来者为良”。二药形态不同，虽都有祛风除湿止痛作用，但羌活气味雄烈，燥散性强，主入太阳膀胱经，兼入足少阴肾经，善能发散表邪，病在上在表者宜之；独活气味淡薄，性亦和缓，主入足少阴肾经，兼入足太阳膀胱经，长于祛除筋骨间之风湿，病邪在下在里者宜之。故前人有“独活入足少阴而治伏风；羌活入足太阳而治游风”之说，若一身尽痛，则二活可同时应用。

【用量用法】3—10 克，煎服。

威灵仙

[原文]辛泄气，咸泄水，《本草》苦，元素甘。气温属木。其性善走，能宣疏五脏，通行十二经络。治中风痛风，头风顽痹(1)，温热流于肢节之间，肿属湿，痛属热，汗多属风，麻属气虚，木属湿痰死血。十指麻木，亦是胃中有湿痰死血，脾主四肢故也。痛风当分新久，新痛属寒，宜辛温药；久痛属热，宜清凉药。河间所谓暴病非热，久病非寒是也。大法宜顺气、清痰、搜风、散湿、养血、去瘀为要。威灵仙传曰：一人手足不遂数十年，遇新罗僧曰：得一药可治，入山求之，乃威灵仙也，服之而愈。癥瘕积聚，痰水宿脓，黄疸浮肿，大小肠秘(2)，风湿痰气，一切冷痛。性极快利，积疴(3)不痊者，服之有捷效。然疏泄真气，弱者慎用。和砂仁沙糖醋煎，治诸骨鲠。根丛须数百条，长者二尺余，色深黑，俗名铁脚威灵仙。忌茗面汤。兼治痛风，用为要药。

【讲解】(1) 顽痹：指经久难愈的痹证。(2) 大小肠秘：即大小便秘结不通。(3) 积疴，即经久不愈的疾病。

威灵仙祛风湿、通经络、止痛作用较强，是风药中善行者之一。为毛茛科植物威灵仙、棉团铁线莲，或东北铁线莲的根及根茎。根茎呈不规则块状，上端残留木质茎，下侧丛生多数细根，长约8—16厘米，表皮黑褐色，质坚。以条匀、皮黑、肉白、坚实者为佳，又称铁脚威灵仙。

本品辛散温通，入膀胱经，性猛善走，故诸书皆言其通行十二经。长于走肌表，通经络。既可祛在表之风湿，又可通络止痛，为治风湿痹痛要药。对风邪偏胜，游走性肢节疼痛之行痹尤为适宜。以其辛散温通，苦泄快利之性，亦治癥瘕积聚，黄疸浮肿，大小肠秘，风湿痰气之证。本品味咸又能软坚，治鱼骨哽喉。然性燥走窜，能耗伤气血，故气血虚弱者不宜久服。正如《本草纲目》所谓：气壮者服之有捷效，其性大抵疏利，久服恐损真气，气弱者亦不可服之。

【临证应用】威灵仙善通经络，既导又利，适用于风湿痹痛，风邪偏胜的肢体麻木，筋脉拘挛，关节屈伸不利者。古方单用本品煎后加酒少许服用，治肢体疼痛，步履艰难。今多配伍羌活、防风、川芎等同

用。借其通络止痛的作用，还可用于跌打损伤瘀阻疼痛。可配伍桂心、当归等，即神应丸。

古谚曰：铁脚威灵仙，砂糖和醋煎，一口咽下去，铁剑软如棉。即指威灵仙治诸骨哽喉颇验。对小的鸡骨、鱼骨哽喉，可用威灵仙30克煎服，缓缓咽下，或用威灵仙50克，砂糖30克，醋60克煎汤含漱，慢慢咽下。

此外，《本草正义》曰：威灵仙，以走窜消克为能事，积湿停痰，血凝气滞，诸实宜之。现有用治噎隔，痞积者，供参考。

【用量用法】6—12克，煎服。

防己

〔原文〕大苦大寒。《本经》平，《别录》温。太阳膀胱。经药。能行十二经，通腠理，利九窍，泻下焦血分湿热，为疗风水(1)之要药。治肺气喘嗽，水湿。热气诸痢，降气下痰。湿疟脚气，足伤寒湿为脚气。寒湿郁而为热、湿则肿，热则痛。防己为主药，湿加苡仁、苍术、木瓜、木通，热加芩、柏、风加羌活、萆薢，痰加竹沥、南星，痛加香附、木香，活血加四物，大便秘加桃仁、红花，小便秘加牛膝、泽泻，痛连臂加桂枝、威灵仙，痛连胁加胆草。又有足跟痛者，属肾虚，不与脚气同论。水肿风肿，痈肿恶疮。或湿热流入十二经，致二阴不通(2)者，非此不可。然性险而健，阴虚及湿热在上焦气分者禁用。《十剂》曰：通可去滞，通草、防己之是也。通草即木通，是徐之才亦以行水者，为通与燥剂无以别矣。木通甘淡，泻气分湿热；防己苦寒，泻血分湿热。本集以行水为通剂，改热药为燥剂。出汉中，根大而虚通，心有花纹，色黄，名汉防己；黑点黄腥木强者，名木防己，不佳。陈藏器曰：治风用木防己，治水用汉防己。酒洗用。恶细辛，畏萆薢。

【讲解】(1) 风水：水肿病的一种。多由风邪侵袭，肺气失于宣降，不能通调水道，水湿潴留体内而急骤发生四肢浮肿，小便不利，恶风者。(2) 二阴不通：二阴即前阴和后阴的合称。本文指大小便不利。

防己有汉防己与木防己之分。二者都能利水，祛风湿，止痛。利水消肿以汉防己为优，祛风止痛以木防己为佳。为防己科多年生木质藤本植物粉防己或马兜铃科多年生缠绕草本植物广防己的根。前者药材称汉防己，后者药材称木防己。皆切片生用。汉防己根圆柱状，质坚粉性大，内面类白色有花纹；木防己切面淡黄白色，有筋，质轻如木。

本品辛苦大寒，辛以散风，苦以泄湿，大寒清热，入膀胱、肾、脾经。性善下行，降泄之力较强，有利水除湿之功，故对下半身水湿停留之证尤为适宜。又长于祛风止痛，也是治风湿热邪壅滞经络所致的关节红肿热痛的常用药。然大苦大寒之品，易伤正气，体弱阴虚及无湿热，胃纳不佳者，不宜应用。

【临证应用】防己用于风湿痹痛，以湿热者为宜，如宣痹汤，则由防己、滑石、连翘、苡仁等组成；治寒湿痹痛，则须与温经散寒药肉桂、附子等配伍。治水肿胀满，属湿热实证，配通泄逐水的葶苈、大黄等药，如己椒苈黄丸；证属虚者，当配黄芪、白术等同用，如防己黄芪汤。

【用量用法】5—10克，煎服。

秦艽

[原文] 苦燥湿，辛散风。去肠胃之热，益肝胆之气，养血荣筋。风药中润剂，散药中补剂。**治风寒湿痹**，经曰：风寒湿三气杂至，合而为痹。风胜为行痹，寒胜为痛痹，湿胜为著痹。痹在于骨则体重，在脉则血涩，在筋则拘挛，在肉则不仁，在皮则寒。**通身挛急**(1)，血不荣筋。**虚劳骨蒸**，时珍曰：手足阳明经药，兼入肝胆。阳明有湿，则手足痠痛寒热，有热则日晡潮热骨蒸。《圣惠方》治急劳烦热，秦艽、柴胡各一两，甘草五钱，为末，每三钱；治小儿骨蒸潮热，食减瘦弱，秦艽、炙甘草各一两，每一二钱，钱乙加薄荷五钱。**疸黄酒毒**，**肠风泻血**，**口噤牙痛**，齿下龈属手阳明大肠经。张洁古曰：秦艽能去下牙痛，及本经风湿。**湿胜风淫之证，利大小便**。牛乳点服，兼治黄疸烦渴便赤。形作罗纹相交，长大黄白左纹者良。菖蒲为使，畏牛乳。

【讲解】(1) 挛急：同拘急。肢体牵引不适或自觉紧缩感，以至影响活动。

秦艽为祛风湿，舒筋络常用之品，且有退虚热作用。为龙胆科多年生草本植物秦艽、麻花秦艽、粗茎秦艽、小秦艽的根。干燥根黄褐色，或淡黄色，表面有不整齐的皱缩及纵沟，多呈螺旋状扭曲，旧时谓皱纹左旋者为佳，故有左秦艽之名。

本品苦辛微寒，辛以疏风，苦以燥湿，性寒兼能清热，入肝、胆、胃经。故能散风湿，舒筋络，治痹止痛。秦艽虽为风药，但苦而不燥，性较和平，故被誉为“风药中之润剂，散药中之补剂”。本品质润不燥，且有降泄之功，能退热除蒸，又为治骨蒸潮热的常用药。

此外，本品尚可利二便，导湿热外出，亦治湿热黄疸。《备要》言治肠风泻血，口噤牙痛，皆因其除肠胃湿热之功，然未见临床应用。

【临证应用】秦艽治风湿痹证，无问新久、寒热皆可配伍应用。偏寒者，配羌活、独活、桂枝等；偏热者，配防己、忍冬藤、桑枝等，尤以热痹，发热关节红肿者尤为适宜。治骨蒸潮热，小儿疳热，常与鳖甲、青蒿、地骨皮等配伍，如秦艽鳖甲汤。治湿热黄疸，可与茵陈、栀子等同用。

【用量用法】 5—10 克，煎汤，浸酒或入丸、散服。

木瓜

[原文] 酸涩而温。入脾肺血分。敛肺和胃，理脾伐肝，化食酸能敛，敛则化，与山楂同。止渴。酸能生津。气脱能收，气滞能和，调营卫，利筋骨，去湿热，消水胀。治霍乱转筋，夏月暑湿，邪伤脾胃。阳不升，阴不降，则挥霍撩乱，上吐下泻，甚则肝木乘脾，而筋为之转也。《食疗》曰：煮汁饮良。时珍曰：肝虽主筋，而转筋则因风寒湿热，袭伤脾胃所致。转筋必起于足腓，（腓，音肥。）足肚也，腓及宗筋，皆属阳明。木瓜治转筋，取其理筋以伐肝也。土病则金衰而木盛，故用酸温以收脾肺之耗散，而借其走筋以平肝邪，乃土中泻木以助金也。陶弘景曰：凡转筋呼木瓜名，写木瓜字，皆愈。泻痢脚气，脾主四肢，或寒湿伤于足络，或胃受湿热之物，上输于脾，下流至足，则成脚气。恶寒发热，状类伤寒，第胫肿掣痛为异耳。宜利湿清热，忌用补剂及淋洗。昔有患足痹者，趁舟见舟中一袋，以足倚之，比及登岸，足已善步矣，询袋中何物，乃木瓜也。腰足无力。多食损齿骨，病痿闭。酸收太甚。郑奠一曰：木瓜乃酸涩之品，世用治水肿腹胀，误矣。有大僚舟过金陵，爱其芬馥，购数百颗置之舟中，举舟人皆病溺不得出，医以通利药罔效，迎予视之，闻四面皆木瓜香，笑谓诸人曰：彻去此物，溺即出矣，不必用药也。于是尽投江中，顷之，溺皆如旧。陈者良。香薷饮用之，取其和脾去湿，补肺生金。忌铁。

【讲解】木瓜长于舒筋活络，并能祛湿和胃。为蔷薇科落叶灌木贴梗海棠和木瓜（楸楂）的成熟果实。前者习称“皱皮木瓜”，后者习称“光皮木瓜”。主产于安徽、浙江、湖北、四川等地，安徽宣城产者称“宣木瓜”，质量较好。切片生用。

本品味酸、性温。入肝、脾经。以温香为用，化湿为功，入脾经，能化中焦之湿，而有醒脾和胃之功，脾得健运，则泄泻可止，胃得和降，则呕吐自除。且味酸入肝，能舒筋活络，除痹止痛。故为湿痹脚气，吐泻转筋之要药。

【临证应用】木瓜有较好的舒筋活络作用，且能祛湿，为治风湿痹痛所常用，尤以湿痹，筋脉拘挛效佳。常与萆薢、牛膝、防己等同用。或与虎骨浸酒服。治脚气肿痛，冲气烦闷，常与吴茱萸、槟榔等配伍，如鸡鸣散。治吐泻转筋，木瓜既能化湿浊而使中焦调和，又能

舒筋活络而缓挛急，常与蚕沙、苡仁、黄连、吴茱萸等同用，如蚕矢汤。此外，本品尚有消食作用，可用于消化不良证。

【用量用法】6—12克，煎汤或入丸、散服。

五加皮

[原文]辛顺气而化痰，苦坚骨而益精，温祛风而胜湿。逐肌肤之瘀血，疗筋骨之拘挛。肾得其养，则妄水去而骨壮；肝得其养，则邪风去而筋强。治五缓虚羸，五脏筋脉缓纵。《千金方》补曰：五月五日采茎，七月七日采叶，九月九日采根，合为末，治五劳。阴痿囊湿，女子阴痒，湿生虫。小儿脚弱，明目愈疮。酿酒尤良。王纶曰：风病饮酒，能生痰水，惟五加浸酒益人。茎青，节白，花赤，皮黄，根黑，上应五车之精。芬香五叶者佳。远志为使，恶玄参。

【讲解】五加皮既能祛风湿，又能强筋骨，兼可化湿利水。为五加科落叶灌木五加或无梗五加、刺五加、刺伞五加等的根皮。其茎直立或攀缘；叶互生，叶柄长，掌状复叶，小叶五枚，顶端一枚较大，两侧小叶渐次较小；伞形花序呈黄绿色，内表面淡黄色，质脆易断。以粗长、皮厚、气香、无木心者为佳。主产于湖南、河南、安徽等地，商品习称“南五加皮”。切片生用。

本品辛苦而温。入肝、肾经。外能散风除湿，通络止痛，内能温补肝肾，强筋健骨。风湿除则痹痛自止，肝肾壮则筋骨自健。故为祛风湿，疗痹痛，强筋骨，起痿弱之要药。所以既可用于风湿侵袭之关节疼痛，又可用于肝肾不足之筋骨痿软。对于湿邪偏胜，筋脉拘挛及风湿日久，肝肾亏损，气血瘀阻等所致之证，本品尤为适用。此外，借其温肾化湿利水之功，使水湿从小便而去，故又可用于水肿小便不利、阴囊湿痒等。

【临证应用】五加皮用于风湿痹痛，四肢拘挛者，可单用浸酒饮，如五加皮酒，或配伍木瓜、松节等祛风湿药同用，如五加皮散。若肝肾不足，腰膝痿弱，行走无力及小儿行迟者，则配伍杜仲、川牛膝共为末服。治水肿小便不利，则常与茯苓皮、大腹皮、生姜皮等同用，如五皮饮。

历代本草所载的五加皮，为五加科五加属植物的根皮，但市场上使用较广者，为萝藦科植物杠柳的根皮，有浓郁特异的香气，故商品有“香加皮”和“北五加皮”之称。其性状不同，应区别使用。一般认

为南五加补的作用较好。北五加有强心作用，对心脏病水肿者有一定疗效，且能止痛，但有毒，不可过量或长期服用，以防积蓄中毒，用量为5—10克。

【用量用法】5—15克，煎服，或浸酒、入丸散用。

桑寄生

[原文] 苦坚肾，助筋骨而固齿长髮；齿者骨之余，髮者血之余。甘益血，止崩漏而下乳安胎。三证皆由血虚。外科散疮疡，追风湿。他树多寄生，以桑上采者为真，杂树恐反有害。茎叶并用。忌火。

【讲解】桑寄生既能除风湿，又能补肝肾，强筋骨，并能安胎。为桑寄生科常绿小灌木槲寄生或桑寄生的带叶茎枝。切段生用。桑寄生又名广寄生，主产于广东、广西等地。药材槲寄生又名北寄生，主产于河北、辽宁、吉林、内蒙古等地。

本品味苦性平，入肝、肾经。能祛风湿，舒筋络，常用于风湿痹痛，而尤长于补肝肾，强筋骨。故对风湿痹痛，日久不愈，而损伤肝肾，腰膝痠软者尤为适宜。至于治疗妊娠胎漏、胎动不安者，是其补肾而固胎元，益血以养胎气之功。《备要》载本品能固齿长髮，亦为补肝肾之力。正如《本草经疏》所谓：齿者骨之余也，髮者血之余也，益血则髮华，肾气足则齿坚，而髮眉长。

【临证应用】桑寄生多用于风湿痹痛，日久不愈，肝肾两亏，腰膝痠痛者，常与独活、秦艽、杜仲、牛膝等配用，以加强祛风湿，补肝肾，强筋骨之功，如独活寄生汤，为扶正祛邪，标本兼顾之剂，治风湿着于筋骨的痹证，是常用有效的方剂。若与淫羊藿、牛膝等配伍，对小儿麻痹后遗症，也有一定的效果；与艾叶、阿胶、杜仲、川断等补肝肾，养血止血药同用，治肝肾虚损，冲任不固之胎漏、胎动不安。据研究，本品有较好的降压和利尿作用，故亦为治高血压病的有效药，尤对肝肾不足更佳，常与杜仲、牛膝、白芍等同用。

【用量用法】10—30 克，煎服。

白花蛇

[原文] 甘咸而温。蛇善行数蜕，如风之善行数变。花蛇又食石南，食石南藤花叶，石南辛苦治风。故能内走脏腑，外彻皮肤，透骨搜风，截惊定搐，治风湿瘫痪，大风疥癩。《开宝本草》曰：治中风口眼喎斜，半身不遂。《经疏》曰：前证定缘阴虚血少内热而发，与得之风湿者殊，料白花蛇非所宜也，宜辨。凡服蛇酒药，切忌见风。出蕲州，龙头虎口，黑质白花，胁有二十四方胜纹，腹有念珠斑，尾有佛指甲，虽死而眼光不枯，他产则否。头尾有毒，各去三寸，亦有单用头尾者，酒浸三日，去尽皮骨，大蛇一条，只得净肉四两。

【讲解】白花蛇功专祛风通络，兼能定惊。为腹蛇科动物五步蛇或眼镜蛇科动物银环蛇幼蛇等除去内脏的全体。五步蛇即大白花蛇，又名蕲蛇，干燥体卷成圆盘形，头在中央，盘径18—25厘米，头呈三角形而扁平，鼻尖向上，口较宽大，称之为“龙头虎口”，上颌有长毒牙。背部棕褐色，密被菱形鳞片，有纵向排列的二十四个方形灰白色花纹，习称“方胜纹”。腹部白色，鳞片较大，杂有多数黑斑，习称“念珠斑”。尾渐细，末端呈三角形、角质，习称“佛指甲”。以身干个大，头尾齐全，花纹斑点明显者为佳。主产于浙江、江西、福建等地。银环蛇幼蛇即金钱白花蛇，又名小白花蛇。干燥体甚小，亦卷成圆盘形，头在中央，尾细，纳于口内，盘径约3.5厘米。背部棕黑色，有光泽，具多数白色环纹，故有银环蛇之称。并有一条显著突起的脊棱。腹部黄白色。以身干头尾齐全，色泽光亮者为佳。主产于广东、广西等地。去头尾，切段用。

本品味甘咸，性温，有毒。主入肝经。性善走窜，外能达皮肤，内能通经络，无处不到，前人称其能“透骨搜风”。故凡人体内外风毒壅结之证，非此莫除，而为祛风通络、攻毒止惊之要药。其应用范围，正如《开宝本草》指出的：中风湿痹不仁，筋脉拘急，口眼喎斜，半身不遂，骨节疼痛，脚弱不能久立，暴风瘙痒，大风疥癬等证，皆常应用。

【临证应用】白花蛇有较强的祛风通络作用，用于风湿痹痛，筋脉拘挛，口眼喎斜，半身不遂，肢体麻木，麻风，疥癣，皮肤瘙痒等证，每恃为要药。常与羌活、防风、五加皮、秦艽等配伍，如白花蛇酒，以治上述诸证。用于破伤风，小儿惊风，配伍乌梢蛇、蜈蚣等共研细末服，如定命散。

【用量用法】 8—10 克。研末服，每次1 —1.5 克。多作丸、散、酒、膏剂用，一般不入汤剂。

乌梢蛇

〔原文〕功用同白花蛇，而性善无毒。不噬物，眼光至死不枯，以尾细能穿百钱者佳。重七钱至一两者为上，十两至一缗者中，大者力减。去头与皮骨，酒煮或酥炙用。

【讲解】乌梢蛇功同白花蛇而力较缓。为游蛇科动物乌梢蛇除去内脏的干净全体。以身干皮黑褐色，肉黄白色，脊背有棱，质坚实者佳。去头尾，切段用。

本品味甘咸，性平，无毒。功效与白花蛇相同，亦善祛风通络，但力较缓。应用于风湿痹痛，肌肤不仁，风疹疥癣，麻风，破伤风，小儿麻痹等证。

【临证应用】乌梢蛇治风痹，手足缓弱，不能伸举，常与羌活、防风、桂心、麻黄等同用，如乌蛇丸。疥癣患者，与干荷叶、枳壳研末成散，空心蜜酒调服。

【用量用法】5—15克，煎服。研末服，一次2—3克。或酒浸服。

蛇蜕

〔原文〕甘咸无毒。甄权曰：有毒。性灵而能辟恶，故治鬼魅蛊毒；性窜而善去风，故治惊痫风疟，重舌，《圣惠方》烧末敷。喉风；性毒而能杀虫，故治疥癣恶疮，疗肿痔漏；属皮而性善蜕，故治皮肤疮痒，产难目翳。用白色如银者，皂荚水洗净。或酒或醋，或蜜浸，炙黄用，或烧存性，或盐泥固煅，各随本方。

【讲解】蛇蜕专主祛风定惊，亦能止痒退翳。为游蛇科动物黑眉锦蛇、锦、乌梢蛇、赤链蛇等脱蜕的皮膜。炒用。

本品味甘咸性平。入肝经。功能祛风定惊。用于小儿惊风，喉风口疮，木舌重舌等证。正如《本草经疏》所说：蛇蜕入肝而辟恶，小儿惊痫，痙痲，癲疾寒热，蛇痫弄舌，摇头，言语僻越，皆肝经为病，蛇蜕能引诸药入肝散邪，故主以上等证。本品又能止痒退翳，用于皮肤瘙痒，目生翳障，疗疮痈肿，瘰癧疔腮等证。

【临证应用】蛇蜕用于小儿惊风，与钩藤、大黄等同用，如蛇蜕汤。治喉痹肿痛，单用蛇蜕研末，乳汁调服。治目生翳障，取蛇蜕一个，烧存性，加冰片二分，银朱一分共研细末，每日三次，每次放眼内少许。治疔腮，取蛇蜕6克，洗净切碎，加二个鸡蛋搅拌，用油炒一次服用，二日内即见腮肿消退。

【用量用法】2—3克，煎汤或研末为散服。

注：原版为“《正如本草经疏》所说”，应为“正如《本草经疏》所说”，电子版已改。

虎骨

[原文] 味辛微热。虎属金而制木，故啸则风生。追风健骨，定痛辟邪。治风痹拘挛疼痛，惊悸癫痫，犬咬骨鲠。为末水服，犬咬敷患处。以头骨胫骨良。虎虽死，犹立不仆，其气力皆在前胫。时珍曰：凡辟邪疰，治惊痫风症头风，当用头骨；治手足风，当用胫骨；治腰脊风，当用脊骨，各从其类也。

虎肚治反胃。取生者，存滓秽勿洗，新瓦固煅存性为末，入平胃散一两，每服三钱效。昂按：虎肚丸宜于食膈，若寒膈、气膈、血膈、痰膈，恐难见功。

虎睛为散，竹沥下，治小儿惊痫夜啼。

【讲解】虎骨功能祛风湿，健筋骨，止痛，镇惊。为猫科动物虎的骨骼。以头骨、四肢骨入药为优，雄虎的前胫骨更佳，处方名虎胫骨。锯成段，香油炸酥，或炒炙成黄色，乘热醋淬用。

木品味辛性温。入肝、肾二经。祛风定痛之力颇强，长于治风邪偏胜的白虎历节，走注疼痛，四肢拘挛，关节不利，风痹之证；又有良好的强筋健骨之效。故风湿痹痛，证情重或痹痛日久者，邪入筋骨，以致肝肾虚损，筋骨痿弱，足膝无力者为要药。但性热助火，血虚火盛者慎用。

至于《备要》所说虎肚治反胃，虎睛治小儿惊痫夜啼，临床很少应用。

【临证应用】虎骨用于风胜之历节疼痛，痛无定处，拘挛不利者，可单用浸酒服，或配木瓜、当归、牛膝等制成丸剂服，如虎骨木瓜丸。若用于肾虚骨痿，则多与龟板、熟地、怀牛膝、锁阳等补肾药同用，如虎潜丸。

本品药源稀少，临床常以豹骨、猴骨、熊骨等代用，功效相似，但药力不如虎骨，用量加倍。

【用量用法】3—10克，入丸剂或浸酒服。

豨薟草

[原文] 苦辛，生寒熟温。治肝肾风气，四肢麻痹，筋骨冷痛，腰膝无力，风湿疮疡。若痹痛由脾肾两虚，阴血不足，不由风湿而得者忌服。风药能燥血。江东人呼猪为豨，其草似猪豨臭，故名。唐成讷有进豨薟表，宋张咏进豨薟表云：其草金棱银线，素茎紫菱，对节而生，颇同苍耳。臣吃百服，眼目清明，即至千服，鬚髮乌黑，筋力轻健，效验多端。以五月五日，六月六日，七月七日，九月九日采者尤佳。去粗茎，留枝叶花实，酒拌蒸晒九次，蜜丸，甚益元气。豨薟辛苦气寒，故必蒸晒九次，加以酒蜜，则苦寒之阴浊尽去，而清香之美味见矣。数不至九，阴浊未尽，则不能透骨搜风而却病也，捣汁熬膏，以甘草、生地煎膏，炼蜜三味收之，酒调服尤妙。

【讲解】豨薟草祛风湿之中，寓有补肝肾，强筋骨之功。为菊科一年生草本植物豨薟、腺梗豨薟或毛根豨薟的地上部分。李时珍曰：楚人呼猪为豨，呼草之气味辛毒为薟，此草气臭如猪而味薟螫，故谓之豨薟。一般大暑时采收，去泥土杂质，切断晒干。生用或加黄酒蒸熟用。

本品生用苦辛气寒，善化湿热，除风痒，可用于痹痛偏于湿热之证及风疹湿痒等证；酒蒸后性温，于祛风湿中，寓有补肝肾、强筋骨之功，应用于四肢麻痹，腰膝痠软，及手足不遂等证。外敷治风湿疮疡肿毒。

【临证应用】豨薟草，清热解毒，祛风湿。可治痈肿疮毒，湿疹瘙痒，多生用配蒲公英、野菊花等内服，亦可煎水洗患处。酒蒸晒，单用或与臭梧桐合用，炼蜜为丸，即为豨薟丸，治风湿痹证，骨节疼痛，四肢麻木，或中风手足不遂等证。兼阴虚血燥者，本品可与生地、甘草熬膏，服用。唯作用缓慢，久服方效。

近代研究，本品还有降低血压和阻止食物中类脂质吸收的作用，故可用于高血压，冠心病。也有配栀子、金钱草等治急性黄疸型传染性肝炎的报导。

【用量用法】10—15克，煎汤或入丸散服。治痹证宜制用，疮痈湿疹宜生用。

海桐皮

[原文] 苦温，《经疏》曰：应兼辛。入血分。祛风去湿杀虫，能行经络达病所。治风蹶顽痹，腰膝疼痛，《传信方》：海桐、薏苡各二两，芎藭、羌活、地骨皮、五加皮各二两，甘草五钱，生地七两，酒二斗浸。此方不得增减，早、中、晚饮。常令醺醺。疳蠹疥癣，目赤煎洗。牙虫。煎服，或含漱。出广南，皮白坚韧，作索不烂。

【讲解】海桐皮功能祛风湿，通经络。为豆科常绿乔木植物刺桐的干燥树皮。主产广西、云南、福建等地。干皮呈半筒状，外表棕灰色；皮上有大形钉刺，刺尖有时被磨去，可以剥落；内表面黄棕色，质硬而韧，不易折断，断面黄白色，富纤维性。以皮张大，钉刺多者为佳。切成小块，生用。

本品味苦辛性平。入肝经。内服能祛风通络，以治风湿痹证，腰膝疼痛，脚气等证。外用可除湿杀虫止痒，用于疥癣湿疹。并治龋齿痛。

【临证应用】海桐皮用于风湿痹痛，手足拘挛，腰膝疼痛，常与独活、川芎、当归、牛膝等祛风止痛，活血通络药同用，如海桐皮酒。用于癣疮，多与木槿皮、蛇床子、大黄、酒等，浸泡七天，去渣取酒外涂患处。

【用量用法】6—12克，煎汤服。外用适量。

原蚕沙

〔原文〕蚕食而不饮，属火性燥，燥能去风胜湿，经曰：燥胜风，燥属金，风属木也。其沙辛甘而温。炒黄浸酒，治风湿为病，肢节不随，皮肤顽痹，腰脚冷痛，冷血瘀血。史国公药酒中用之。炒热熨患处亦良。寇宗奭曰：醇酒三升，拌蚕沙五升，蒸热铺暖室席上，令患冷风气痹人以患处就卧，厚复取汁。不愈，间日再作，须防昏闷。麻油调敷，治烂弦风眼。目上下胞属脾，脾有风湿，则虫生弦烂。又新瓦炙为末，少加雄黄，麻油调敷，治蛇串疮。有人食乌梢蛇，浑身变黑，渐生鳞甲，见者惊缩，郑奠一令日服晚蚕沙五钱，尽一二斗，久之乃退。晚蚕矢也，淘净晒干。

【讲解】蚕沙以祛风除湿为主要功效。为蚕蛾科昆虫家蚕蛾幼虫的干燥粪便。六到八月收集，以二眠到三眠时的粪便为主。收集后晒干，簸净泥土，除去轻粒及桑叶碎屑。原药生用。

本品甘辛性温。入肝、脾、胃三经。功专祛风除湿，又善化胃肠湿浊。运用于风湿痹痛、风疹瘙痒、烂弦风眼，及吐泻转筋等证，内服外用均可。

【临证应用】蚕沙用于风湿痹证，关节肿痛，可与白花蛇、钻地风、土鳖虫、全蝎等同用，如蚕蛇汤。治湿热痹证，可配伍防己、苡仁、滑石等清利湿热药同用，如宣痹汤，或用蚕沙装两袋，炒热轮换熨患处。治风疹湿疹瘙痒，可煎汤外洗。湿浊内阻，吐泻转筋者，则常与黄芩、半夏、吴茱萸、木瓜等同用，如蚕矢汤。

【用量用法】5—15 克，布包入煎，或入丸散服。外用适量。

松节

[原文]松之骨也，坚劲不凋，故取其苦温之性，以治骨节间之风湿。丹溪曰：能燥血中之湿。杵碎浸酒良。史国公药酒中用之。

松脂，苦甘性燥。祛风去湿，化毒杀虫，生肌止痛。养生家炼之服食，今熬膏多用之。鳞齿有孔，松脂纸塞，虫即从脂出。

松毛，酿酒，煮汁代水。亦治风痹脚气。

【讲解】松节苦燥温通之力较强，适用于痹证偏寒湿者。为松科常绿大乔木油松、马尾松等的枝干的结节。以水浸润，切片，晒干生用。

本品味苦性温，入肝经。功主祛风燥湿，舒筋通络，止痛，主要用于历节风痛，亦为风湿痹证常用药。脚气痿软、跌打损伤亦可配用。

【临证应用】松节一味浸酒服，可治风湿痹痛，以本品性偏温燥，故尤以寒湿痹痛为宜，亦可加入羌活、秦艽、海风藤等祛风湿复方中应用。若配刘寄奴、苏木、三七等活血通络药，可治疗跌打损伤疼痛。温燥之性，易伤阴耗血，故阴虚血亏者不宜用。正如《本草汇言》所云：松节，气温性燥，如足膝筋骨，有风有湿，作痛作痠，痿弱无力者，用此立痊。倘阴虚髓乏，血燥有火者，宜斟酌用之。

【用量用法】10—15克，煎服或浸酒服。

附：松脂 即松香。为松科植物马尾松或其同属植物树干中取得的树脂，经蒸馏除去挥发油后遗留的块状物。松脂味苦甘，性温，芳香而燥。入肝、脾二经。功能祛风燥湿，拔毒生肌，杀虫。用于风湿内淫，气血受阻之痈肿疮疥，风湿痹痛等证。既可内服，又可外用。至于养生之说，正如《本草求真》听说：至云久服轻身延年，虽出经解，未可尽信，其亦过为称誉之意也乎。

松毛 即松树叶。性味、功效同松节，亦治风湿痹证。

电子版注：𦐇，繁体字为𦐇，是「𦐇」的异体字。𦐇：指纺织；
织布帛的丝缕。

络石藤

[原文]苦温无毒。坚筋骨，利关节，治一切风。

【讲解】络石藤专于祛风通络，兼能凉血消肿。为夹竹桃科常绿攀缘木质藤本植物络石的带叶藤茎。切段生用。

本品味苦性微寒，入心、肝经。为祛风通络之品，用于痹证，尤以热痹关节肿痛之证为宜。《要药分剂》载：络石之功，专于舒筋活络。凡病人筋脉挛急，不可屈伸者，服之无不效，不可勿之也。性偏寒又有凉血消肿之功，亦可治咽喉肿痛，热毒痈肿。

【临证应用】络石藤用于风湿痹痛，筋脉拘挛，常与独活、威灵仙、防己、松节等同用。若治风湿热痹，关节红肿疼痛，常与忍冬藤、秦艽、防己、牛膝等同用。用于喉痹，可与桔梗、射干等配伍，如络石汤；用于痈疽肿痛，可与皂刺、乳香、没药等同用。

【用量用法】5—15克，煎服。

桑枝

[原文]桑乃箕星之精。其木利关节，养津液，行水《灵验方》：枝皮细剉，酿酒服良。**祛风**。桑枝一升，细剉炒香，水三升，熬至二升，一日服尽，名桑枝煎，治风气脚气口渴。**其火拔引毒气，祛风寒湿痹**。凡痈疽不起瘀肉不腐，瘰癧流注，臃顽恶疮不愈，用桑木片，扎成小把，燃火，吹息，灸患处，内服补托药良。**煎补药，熬诸膏，宜用桑柴，内亦宜桑枝搅。**

【讲解】桑枝以祛风通络为主要功效。为桑科落叶乔木桑树的嫩枝。生用，或炒微黄用。

本品味苦性平，入肝经。有祛风湿，通利关节的作用，用于风湿痹痛，四肢拘挛。还能利水而治疗水肿。

【临证应用】桑枝治疗筋骨痠痛，四肢拘挛，可以单味服用，也可与其它祛风湿药，如羌活、防风、桂枝等配伍，其治尤宜于上肢痹痛。与利水药配伍，可治疗水肿。另外，与槐枝、柳枝、桃枝等煎汤熏洗，可治遍身瘙痒。

【用量用法】10—30克，煎服。外用适量。

石南叶

[原文] 辛散风，苦坚肾。补内伤阴衰，利筋骨皮毛，为治肾虚脚弱，风痹要药。妇人不可久服，令思男。时珍曰：今人绝不知用，盖为《药性论》有令人阴痿之说也，不知此药能令肾强，人或借此纵欲，以致痿弱，归咎于药，良可慨也。昂按：石南补阴祛风则有之，然味辛不热，不助相火，亦未闻淫邪方中用石南者，《别录》思男之说，殆不可信。关中者佳，炙用。

【讲解】石南叶功专祛风通络。为蔷薇科常绿灌木或小乔木植物石南的叶。生用，切丝入药。

本品辛苦性平，入肝、肾经。具有祛风、通络、益肾之功。治风痹腰脊痠痛，肾虚脚弱，偏头痛，风疹等证。

【临证应用】石南叶与牛膝、防风、黄芪、桂枝配伍，如石南丸，祛风湿而益气活血，治疗腰膝挛痹；与川芎、白芷、天麻配伍，治偏头痛有效。

【用量用法】 5—10 克，煎汤或入丸、散服。

天仙藤

[原文]苦温。疏气活血。治风劳(1)腹痛，妊娠水肿。有天仙藤散，专治水肿。叶似葛圆而小，有白毛，根有须，四时不凋。一云即青木香藤。

【讲解】(1)风劳：指感受风邪日久不愈而成的虚劳病。

天仙藤功主行气利水，兼能活血通络。为马兜铃科植物马兜铃的茎叶。茎细长，叶呈三角状卵形，根细长呈圆柱形。与《备要》中描述的形态有所出入。其根名青木香。

本品味苦性温。苦主疏泄，温以通络，故有活血通络止痛，行气利水之功。能治风湿痹痛，腰膝肿疼及水肿等证。

【临证应用】天仙藤长以行气利水，临床多用于妊娠水肿、胸腹胀痛。《妇人良方》同以本品配陈皮、乌药、香附、木瓜、苏叶等用。治风湿痹证，肩臂痠痛，可与片姜黄、羌活同用，如天仙藤散。

【用量用法】5—10克，煎汤，或作散剂服。

小结

祛风湿药大多为辛温之品，能祛风湿而疗痹痛，充腠理而温筋肉，通经络而利关节，补肝肾而壮筋骨。是治风湿痹症的主要药物。

独活性善下行，专祛在里之伏风，多治下半身腰膝筋骨间之风湿。威灵仙性猛善走，通经络而止痛，治肢体游走性疼痛多用，并可治诸骨鲠咽。秦艽性较和平，质润不燥，是祛风湿，舒筋止痛治风湿痹痛的常用药，兼能退虚热，治疗劳热骨蒸。

桑寄生既可祛风湿，又善于补肝肾，强筋骨，养血安胎，对痹痛日久，损伤肝肾，腰膝无力之证最为相宜。现代研究还有降血压作用，临床上也用于高血压病。木瓜、五加皮偏于去湿，木瓜善祛筋络间之湿邪，舒筋活络，为治湿痹脚气，吐泻转筋的要药；五加皮强筋骨、补肝肾为强壮性祛风湿药，故多用于风湿日久，腰膝酸软的虚证。豨薟草祛风湿利关节，凡四肢麻痹，筋骨痠痛，半身不遂，风湿瘙痒等证，可单用，但作用缓慢，久服方效。

白花蛇性善走窜，祛风力大，对风湿瘫痪，半身不遂及麻风疥癣等证，均有一定疗效。乌梢蛇甘平无毒，与白花蛇功用同而作用稍逊。蛇蜕为多种蛇类自然蜕下的皮膜，功能祛风定惊，止痒退翳，用于小儿惊风，皮肤搔痒等证。

虎骨善能搜风止痛，并可健骨，对风邪偏胜的关节走注疼痛及肝肾虚弱的腰膝痿软之证，疗效颇着。络石藤以祛风通络为特长，治风湿痹痛，筋脉拘挛，关节不利常配伍应用。松节苦燥温通之力较强，痹证偏湿者尤为适宜。海桐皮祛风湿又兼泄热，风湿痹证偏湿热者及湿热下注，足膝热痛者用之有效，并可外用疗疥癣。蚕沙祛风湿，和胃化湿，除用于痹痛，还用于霍乱吐泻转筋。桑枝、石南叶、天仙藤均祛风通络为主要功效，治风湿痹痛，拘挛疼痛常配用。

祛风湿药功用归纳简表

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
独活	辛、苦、温	肾、膀胱	祛风湿，止痛	①风湿痹证 ②风寒表证兼有湿邪	3—10克	
威灵仙	辛、咸、温	膀胱	祛风湿，通经络，止痹痛，治骨鲮	①风湿痹证 ②诸骨鲮咽	6—12克 治骨鲮至50克	
防己	苦、辛、寒	肾、脾、膀胱	祛风湿，止痛，利水	①风湿痹痛 ②水肿脚气	5—10克	汉防己利水消肿力强，木防己祛风止痛功胜。
秦艽	苦、辛、微寒	胃、肝、胆	祛风湿，舒经络，清虚热	①风湿痹痛 ②骨蒸潮热	5—10克	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
木瓜	酸、温	肝、脾	舒经活络，化湿和胃	①风湿痹痛 ②吐泻转筋	6—12克	
五加皮	辛、苦、温	肝、肾	祛风湿，强筋骨	①风湿痹痛 ②水肿	5—15克	
桑寄生	苦、平	肝、肾	祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎	①风湿痹痛 ②胎动不安	10—30克	
白花蛇	甘、咸、温，有毒	肝	祛风，通络，定惊	①风湿痹痛 ②口眼喎斜、半身不遂③破伤风、小儿惊风	3—10克 研末服用 1—1.5克	
乌梢	甘、咸、	肝	祛风通络	风湿痹痛	5—15克	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
蛇	平					
蛇蜕	甘、咸、平	肝	祛风定惊，止痒退翳	①惊风 ②皮肤瘙痒③目生翳障	2—3克	
虎骨	辛、温	肝、肾	祛风定痛，强筋健骨	风湿痹痛、筋骨痿弱	3—10克	入丸剂或浸酒服
豨薟草	苦、辛、寒	肝、肾	祛风湿，通经络，清热解毒	①风湿痹痛 ②痈肿疮毒	10—15克	现亦用于高血压
海桐皮	苦、辛、平	肝	祛风湿，通经络，杀虫止痒	①风湿痹痛 ②疥癣、湿疹	6—12克 外用适量	
蚕沙	甘、辛、温	肝、脾、胃	祛风除湿，	①风湿痹痛	5—15克	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			和胃化湿	②吐泻转筋	外用适量	
松节	苦、温	肝	祛风燥湿，止痛	风湿痹痛	10—15克	
络石藤	苦、微寒	心、肝	祛风通络，凉血消肿	①风湿热痹 ②痈肿	5—15克	
桑枝	苦、平	肝	祛风通络	风湿痹痛、四肢拘挛	10—30克	
石南叶	苦、辛、平	肝、肾	祛风通络	风湿痹痛、腰膝酸痛	5—10克	
天仙藤	苦、温		通络止痛，行气利水	①风湿痹痛 ②水肿胀满	5—10克	

复习思考题

1. 试述祛风湿药的定义及其适应证。

2. 祛风湿药中哪些药物以祛风除湿为主，哪些药物以祛风通络为主，哪些药物还兼有补肝肾、强筋骨的作用？

3. 试述独活、威灵仙、防己、秦艽、木瓜、白花蛇、虎骨、五加皮、桑寄生、豨莶草的功效及适应证。

4. 分析比较下列药组的相同点和不同点：

羌活与独活，防己与木瓜，五加皮与桑寄生，白花蛇与虎骨，威灵仙与秦艽。

5. 独活、威灵仙、秦艽、木瓜、桑寄生、白花蛇、虎骨在治疗风湿痹痛方面各有什么特点？

第七章 温里药

• 第七章 温里药

〔自学时数〕8学时

〔面授时数〕2学时

〔目的要求〕

1. 了解温里药的含义、功效、主要适用症。
2. 熟悉温里药与解表、补气、化湿、健脾、补肾、补气等药配伍应用的理论依据（联系中医基本理论）。
3. 掌握温里药中常用药（附子 干姜 肉桂 吴茱萸 细辛 高良姜）的功效、临症应用，并比较其异同。
4. 熟悉温中、温经散寒止痛、温阳（温心阳、温脾阳、温肾阳）、回阳、引火归源、温肺化饮等概念之不同点。
5. 在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡以温里祛寒，治疗里寒证为主要作用的药物，称为温里药，或称祛寒药。

本类药性味多属辛热，具有温里祛寒，回阳救逆，温经止痛等作用。故适用于里寒证。所谓里寒，主要包括两个方面。一为寒邪内侵，中阳受困，而见脘腹冷痛，呕吐泻痢；一为心肾阳虚，阴寒内生，而见汗出畏寒，口鼻气冷，下利清谷，肢厥脉微的亡阳证。以上证候，均可选用温里药以消阴翳。

温里药的使用，应根据不同的证候，作适当的配伍。如外寒内侵，兼表证者，配解表药；寒凝气滞者，配行气药；寒湿内蕴者，配健脾化湿药；脾肾阳虚者，配伍补脾肾药；气虚欲脱者，配大补元气药等。

本类药性多辛温燥烈，易于耗伤阴血，凡阴虚血虚者及孕妇，应忌用或慎用。

附子

（原文）辛甘有毒，大热纯阳。其性浮而不沉，其用走而不守，通行十二经，无所不至。能引补气药以复散失之元阳（1），引补血药以滋不足之真阴（2），引发散药开腠理，以逐在表之风寒，同干姜、桂枝温经散寒发汗。引温暖药达下焦，以祛在里之寒湿。能引火下行。亦有津调贴足心者。入八味丸内，亦从地黄等补阴。治三阴伤寒（3），吴绶曰：附子阴证要药。凡伤寒传变三阴，中寒夹阴，身虽大热，而脉沉细者；或厥阴腹痛，甚则唇青囊缩者，急待用之。若待阴极阳竭而用之，已迟矣。东垣治阴盛格阳，伤寒面赤目赤，烦渴引饮，脉七八至，但按之则散，用姜附汤加人参，投半斤，得汗而愈，此神圣之妙也。中寒中风，卒中曰中，渐伤曰伤。轻为感冒，重则为伤，又重则为中。气厥痰厥，虚寒而厥者宜之。如伤寒阳盛格阴，身冷脉伏，热厥似寒者，误投立毙，宜承气、白虎等汤。咳逆风寒。呕哕，胃寒。膈噎，膈噎，多由气血虚，胃冷、胃槁而成。饮可下而食不可下，槁在吸门，喉间之厌会也；食下胃脘痛，须臾吐出，槁在贲门，胃之上口也，此上焦，名噎；食下良久吐出，槁在幽门，胃之下口也，此中焦，名膈；朝食暮吐，槁在阑门，大小肠下口也，此下焦，名反胃。又有痰厥、食积、瘀血壅塞胃口者，如寒痰胃冷，则宜姜附参术；胃槁者当滋润，宜四物、牛羊乳，血瘀者加韭汁。当与韭汁牛乳二条，参看论治。脾泄，命火不足，冷痢寒泻，霍乱转筋，脾虚寒客中焦为霍乱，寒客下焦肝肾为转筋。热霍乱者禁用。拘挛风痹，癥瘕积聚，督脉为病，脊强而厥，小儿慢惊（4），痘疮灰白，痈疽不敛，一切沉寒痼冷（5）之证。经曰：阴盛生内寒，阳虚生外寒。助阳退阴，杀邪辟鬼，本草未载。通经堕胎。凡阴证用姜附药，宜冷服，热因寒用也。盖阴寒在下，虚阳上浮；治之以寒，则阴益盛；治之以热，则拒格不纳。用热药冷饮，下咽之后，冷体既消，热性便发，情且不违，而致大益，此反治之妙也。又有寒药热饮治热证者，此寒因热用，义亦相同也。经曰：正者正治，反者反治。如用寒治热，用热治寒，此正治也；或以寒治寒，以热治热，此反治也。经所谓必伏其所主，而先其所因，盖借寒药热药为反佐，以作向导也，亦曰从治。王好古曰：用附子以补火，必防涸水。如阴虚之人，久服补阳之药，则虚阳益炽，真阴愈耗，精血日枯，而气无所附丽，遂成不救者多矣。

母为乌头，附生者为附子，连生者为侧子，细长者为天雄，两歧者为乌喙，五物同出异名。

附子以西川彰明、赤水产者为最，皮黑体圆，底平八角，重一两以上者良。或云二两者更胜，然难得。生用发散，熟用峻补。赵嗣真曰：仲景麻黄附子细辛汤，熟附配麻黄，发中有补；四逆汤生附配干姜，补中有发，其旨微矣。丹溪曰：乌附行经，仲景八味丸用为少阳向导，后世因以为补药，误矣。附子走而不守，取其健悍走下，以行地黄之滞耳。相习用为风药及补药，杀人多矣。昂按：附子味甘气热，峻补元阳，阳微欲绝者，回生起死，非此不为功，故仲景四逆、真武、白通诸汤多用之。其有功于生民甚大，况古人日用常方，用之最多，本非禁剂，丹溪乃仅以为行经之药，而云用作补药，多致杀人，言亦过矣。盖丹溪法重滋阴，故每訾阳药，亦其偏也。王节斋曰：气虚用四君子汤，血虚用四物汤，虚甚者俱宜加熟附。盖四君四物，皆平和宽缓之剂，须得附子健悍之性行之，方能成功。附子热药，本不可轻用，但当病，则虽暑热时月亦可用也。水浸面裹煨，令发坼，乘热切片炒黄，去火毒用。又法，甘草二钱，盐水、姜汁、童便各半盏煮熟用。今时人用黑豆者亦佳。畏人参、黄芪、甘草、防风、犀角、绿豆、童便，反贝母、半夏、栝蒌、白及、白蔹。中其毒者，黄连、犀角、甘草煎汤解之，黄土水亦可解。

乌头功同附子而稍缓。附子性重峻，温脾逐寒；乌头性轻疏，温脾逐风。寒疾宜附子，风疾宜乌头。

乌附尖吐风痰，治癫痫，取其锋锐，直达病所。丹溪治许白云，屡用瓜蒂、栀子、苦参、藜芦等剂，吐之不透，后用附子尖和浆水与之，始得大吐胶痰数碗。

天雄补下焦命门阳虚，寇宗奭、张元素皆曰补上焦。丹溪曰：可为下部之佐。时珍曰：其尖皆向下生，故下行。然补下乃所以益上也。若上焦阳虚，则属心肺之分，当用参、芪，不当用雄、附矣。治风寒湿痹，为风家主药，发汗又能止阴汗。

侧子散侧旁生，宜于发散四肢，充达皮毛，治手足风湿诸痹。

【讲解】（1）元阳：即肾阳。与元阴相对而言，为生命的本原，故称。（2）真阴：即肾阴。与元阳相对而言。肾为元真所在，藏先天之精，为人体生长发育所赖最根本的物质。（3）三阴伤寒：即太阴、少阴、厥阴感受寒邪而致病的合称。（4）慢惊：即慢惊风，为儿科常见病证。大多由气血不足，肝盛脾虚所致，多发生于严重的慢性疾病后期。慢惊的抽搐，表现为缓慢无力，时发时止。一般体温不高，面色淡黄或青白相间。（5）沉寒痼冷：即长久而难愈的寒冷性疾病。

附子温里祛寒，补阳助火，为回阳救逆要药。为毛茛科多年生草本植物乌头的子根加工品。有盐附子、黑顺片、白附子之分。主产于四川，湖北、湖南等省亦有栽培。

本品辛甘而热，有毒。入心、肾、脾三经。走而不守，具纯阳之性，能上助心阳以通脉，中温脾阳以健运，下补肾阳以益火，外固卫阳以祛寒，所谓“开辟群阴，迎阳归舍；果有真寒，无所不治”。即是此意。故亡阳欲脱，脉微欲绝者用之，可以回阳复脉；肾阳不足，阳痿滑精，腰膝冷弱者用之，可以补火助阳；脾阳不振，脘腹冷痛，水肿尿少者用之，可以温阳化气；风寒湿痹，疼痛麻木者用之，可以祛寒止痛。总之，附子既能追复散失之亡阳，又能资助亏损之元阳，并可逐表里之寒湿。故《本草求真》曰：其入补气药中，则追散失之元阳；入发散药中，则能开腠理以逐在表之风寒；入温暖药中，则能祛在里之寒湿。故一切沉寒痼冷之证，均可用之。

【临证应用】附子配干姜，可增强回阳救逆之功，以治亡阳证，四肢厥逆，脉微欲绝者，如四逆汤；配人参，可加强扶阳益气之效，以治阳衰气脱，大汗淋漓，气短喘息者，如参附汤；配肉桂，可补阳益火，以治肾阳不足，命门火衰，阳痿尿频，畏寒肢冷，腰痠脚弱等证，如桂附八味丸；配白术，可温脾燥湿，以治脾阳不振，寒湿内阻，脘腹冷痛，大便溏泄，如附子理中丸；配桂枝，能温经止痛，以治痹痛，周身关节疼痛之证，如桂枝附子汤；配熟地，可补阳滋阴，以治阴阳两亏之证；配茯苓，可助阳化气，以治脾肾阳虚，水湿内停，小便不利，肢体浮肿者，如真武汤；配黄芪，可温阳固表，以治阳衰而表不固，冷汗不止者，如芪附汤；配麻黄可助阳发表，以治素体阳虚，外感风寒之证，如麻黄附子细辛汤。若逢寒热错杂之证，亦可与寒凉药同用，如配黄连，可扶阳泻热，以治心下痞而恶寒汗出者，如附子泻心汤；配大黄，可温阳通便，用治阴寒积聚，腹痛便秘，如大黄附子汤。

【用量用法】3—15克。入汤剂须先煎30—60分钟，以减其毒性。附子性燥烈有毒，故非阴盛阳衰者不宜服用。阴虚内热患者及孕妇忌用。反半夏、瓜蒌、白蔹、白芨、贝母。畏犀角。

附：乌头 又名川乌，系毛茛科植物乌头的块根，均为栽培品。味辛苦，性温，大毒。入心、肝、脾经。功能祛风湿，散寒止痛，主用于风寒湿痹，脘腹冷痛，头风痛及跌打损伤疼痛等证。本品可散在表之风邪，逐在里之寒湿，但补阳之功不及附子，而祛风通痹止痛之力较附子为胜，所以古有“附子逐寒，乌头祛风”之说。

川乌治风寒湿痹，痠痛麻木，常与桂枝、威灵仙等同用；与蜜同煎内服，可治脘腹冷痛，寒疝腹痛。用量3—9克，制过用，反畏与附子相同。

乌附尖，即乌头附子尖，或称川乌尖、附子尖。为川乌头或附子上的尖角。功能吐风痰，祛寒止痛，用治癫痫痰厥，寒疝腹痛等证。

天雄 为附子或草乌头之形长而细者。味辛性热，有毒。功主祛风散寒燥湿，益火助阳。主要用于风寒湿痹，历节风痛，四肢拘挛等证。

中毒与处理：近代研究，附子和乌头均含乌头碱，毒性甚大。中毒量：附子15—60克；乌头10—60克；乌头碱0.2毫克，致死量为2.5毫克。中毒时间：短者在服药后30分钟以内，长者1~2小时左右。中毒症状：一般开始觉口唇、舌及肢体发麻，继之恶心呕吐，烦躁不安，进而昏迷，四肢及颈部肌肉痉挛，呼吸急迫，肢冷脉弱，体检血压及体温下降，心律不齐，心电图示多发性室性早期收缩等，可致突然死亡。如能及时抢救，可获恢复。

处理：高锰酸钾洗胃，保暖，注射大剂量阿托品；麻痹重者予兴奋剂，吸氧，输液；休克可用正肾上腺素、利多卡因、普鲁卡因等，亦可解毒，降低死亡率。中药方面以生姜120克、甘草15克，或绿豆120克、甘草60克煎服；或用金银花、黄连、犀角，煎服解毒。

草乌头

〔原文〕辛苦大热。搜风胜湿，开顽痰。治顽疮，以毒攻毒，颇胜川乌。然至毒，无所酿制，不可轻投。野生，状类川乌，亦名乌喙。姜汁炒，或豆腐煮用。熬膏名射罔，敷箭射兽，见血立死。

【讲解】草乌性同川乌，但毒性尤强。为毛茛科多年生草本植物乌头（野生种）、北乌头或其他多种同属植物的块根。又名乌喙（《本经》）、草乌（《圣济总录》）等。制用（同甘草、黑豆加水共煎）。

草乌性味、功效、用法及注意事项与川乌相似，然毒性更强。《本草求真》云：草乌头……非若川乌头、附子之比，自非风顽急痰，不可轻投。此药只能搜风胜湿，开顽痰，治顽疮，以毒攻毒而已。《本经》治恶风洗洗汗出，但能去恶风，而不能回阳散寒可知。

【临证应用】乌附五种，应用分述如下：附子大壮元阳，虽偏下焦，而周身内外无所不至；天雄峻温不减于附，而无顷刻回阳之功；川乌专搜风湿痹痛，却少温经之力；侧子善行四末，不入脏腑；草乌悍烈，仅堪外治。此乌附之同类异性者。至于乌喙，禀气不纯，服食远之可也。

【用量用法】 1.5—4.5克，煎汤，或入丸、散用。反、畏见附子条。

肉桂 桂心

（原文）辛甘大热，气厚纯阳。入肝肾血分，平肝、补肾。补命门相火之不足。两肾中间，先天气，乃真火也。人非此火，不能有生，无此真阳之火，则无以蒸糟粕而化精微，脾胃衰败，气尽而亡矣。益阳消阴，治痼冷沉寒。能发汗，疏通血脉，宣导百药。辛则善散，热则通行。去营卫风寒，表虚自汗，阳虚。腹中冷痛，咳逆结气。咳逆亦由气不归元，桂能引火归宿丹田。木得桂而枯，削桂钉木根，其木即死，又能抑肝风而扶脾土。肝木盛则克土，辛散肝风，甘益脾土。从治^{（1）}目赤肿痛，以热攻热，名曰从治。及脾虚恶食，命火不足。湿盛泄泻，土为木克，不能防水。古行水方中，亦多用桂，如五苓散，滋肾丸之类。补劳明目，通经坠胎。辛热能动血故也。出岭南桂州者良。州因桂名。色紫肉厚，味辛甘者，为肉桂。入肝肾命门。去粗皮用，其毒在皮。去里外皮，当中心者，为桂心。入心。枝上嫩皮，为桂枝。入肺、膀胱及手足。得人参、甘草、麦冬良，忌生葱、石脂。本草有菌桂、筒桂、牡桂、版桂之殊。今用者亦罕分别，惟以肉厚气香者良。

（桂心）苦入心，辛走血。能引血化汗化脓，内托痈疽疮，同丁香，治豆疮灰塌，益精明目，消瘀生肌，补劳伤，暖腰膝，续筋骨。治风痹癰疽，噎膈腹满，腹内冷痛，九种心痛。一虫、二疰、三风、四悸、五食、六饮、七冷、八热、九来去痛，皆邪乘于手少阴之络，邪正相激，故令心痛。

【讲解】（1）从治：即反治，指和常规相反的治疗法。因治法与疾病的假象相从，故亦称反治。“从者反治”。热因热用、寒因寒用、塞因塞用、通因通用，均属反治法。

肉桂善能补火助阳，益阳消阴，为治下焦虚冷之要药，又能温经散寒，引火归元。桂心又称肉桂心，功用相同。肉桂为樟科常绿乔木植物肉桂的干皮或粗枝皮。干皮去表皮者称桂心，采自粗枝条或幼树干皮者称官桂。主产于广东、广西、云南等地。切片或研末，生用。

肉桂味辛甘，性大热。入肾、脾、心、肝经。本品辛热纯阳，能温补命门之火，益阳消阴。适用于命门火衰、下焦虚寒之证。故《备要》云：治痼冷沉寒。由肾阳不足导致脾阳不振，脾肾阳虚者亦宜使用，

故对腹中冷痛，结气，脾虚恶食等证皆宜。肉桂味辛，善行血中之滞以通血脉，而有温经散寒止痛之效。其性下行，又能引火归元，以治疗虚阳上浮，上热下寒之证。故《备要》又载能治目赤肿痛。然阴虚火旺，热病伤津等证，均不宜用。

桂心为肉桂之干皮去表皮者，又称肉桂心。性味功效与肉桂相同。

《本草经疏》云：桂枝气薄轻扬，上浮达表，治邪客表分之为病；肉桂、桂心，味厚甘辛大热，下行走里。治命门真火不足，阳虚寒动于中，及一切里虚阴寒，寒邪客里之为病。由此可见桂心与肉桂的应用也是相类似的。

【临证应用】肉桂与附子、熟地、山萸肉等温补肝肾药同用，治疗肾阳不足，命门火衰，证见畏寒肢冷，腰膝软弱，阳痿尿频等，如桂附八味丸。肉桂配附子、干姜、白术等，如桂附理中丸，以温补脾肾，治疗脾肾阳衰，脘腹冷痛，食少便溏等证。本品不仅与附、姜等祛寒药同用能益火消阴，而且还可与寒凉药黄柏、知母同用，如通关丸，治下焦湿热，小便不通，以助膀胱气化之功。肉桂既能散沉寒，又能通血脉，无论寒凝气滞，或寒凝血瘀所致的痛证均可应用，如脘腹冷痛，寒湿痹痛，腰痛等，可单味研末冲服，或配伍其他散寒止痛药；若血分有寒，血行不畅，瘀滞经闭，痛经等证，可配伍当归、川芎、吴茱萸等活血通经的药物，如温经汤。对寒疝腹痛，单味研末服，亦有相当疗效。若阴寒盛者，亦可与温阳散寒药附子、吴茱萸等同用。

肉桂能散寒温阳，通畅气血，配熟地、鹿角胶、麻黄等，治疗阴疽，如阳和汤。若配黄芪、当归等补益气血药，可治疗气血虚寒，痈肿脓成不溃，或溃后久不收敛等外科疾患。

此外，气虚血少之证，常以少量肉桂配入补气养血药中，有温运阳气，鼓舞气血生长的功效。如十全大补汤中应用本品，即是此义。

肉桂与附子的温补阳气、散寒止痛之功相似，并常同用，如桂附八味丸、右归丸等。但附子性烈，能回阳救逆；肉桂性缓，能助汗外泄，所以，治阳气将绝之大汗亡阳虚脱诸证，用附子而不用肉桂；理血调经诸方，用肉桂而不用附子。由此可知，附子作用偏于气分，肉桂作用偏于血分，这是两者的主要差别。

肉桂与桂枝，同出于桂树，一为树皮，一为树嫩枝。都有温营血，助气化，散寒凝的作用。但肉桂长于温里止痛，入下焦而补肾阳；桂枝长于发表散寒，主上行而通经脉。

【用量用法】2—6克，入汤剂应后下。研末冲服，每次1—2克。官桂作用较弱，用量可适当增加。

阴虚火旺，热病伤津，血热妄行及孕妇均当忌用。

干姜

（原文）生用辛温，逐寒邪而发表；炮则辛苦大热，除胃冷而守中。辛则散，炮则稍苦，故止而不移，非若附子走而不守。温经止血，炮黑止吐衄诸血，红见黑则止也。定呕消痰，去脏腑沉寒痼冷。能去恶生新，使阳生阴长，故吐衄下血有阴无阳者宜之。亦能引血药入气分而生血，故血虚发热，产后大热者宜之。此非有余之热，乃阴虚生内热也。忌用表药寒药。干姜能入肺利气，能入肝引血药生血，故与补阴药同用。乃热因热用，从治之法，故亦治目睛久赤。引以黑附，能入肾而祛寒湿，能回脉绝无阳。仲景四逆、白通、姜附汤，皆用之。同五味，利肺气而治寒嗽。肺恶寒。燥脾湿而补脾，脾恶湿。通心助阳而补心气。苦入心。开五脏六腑，通四肢关节，宣诸脉络，治冷痹寒痞，反胃下利。多用损阴耗气，孕妇忌之。辛热能动血。王好古曰：服干姜以治中者必僭上，宜大枣辅之。东垣曰：宜甘草以缓之。母姜晒干者为干姜，炮黑为黑姜。

【讲解】干姜善祛里寒以温脾胃之阳，并能回阳救逆，温肺化饮。为姜科多年生草本植物姜的干燥根茎。原药切片用。切方块炮焦用称为“炮姜”。

本品味辛性热。入脾、胃、心、肺四经。辛热性燥，既能祛脾胃寒邪，又能助脾胃之阳气。故凡脾胃之寒证，无论外寒内侵之实证，或阳气不足之虚证均常应用。干姜除祛里寒外，又能通心气以助阳，而有回阳救逆之功，治阳气衰微，亡阳之证。本品既能温补脾阳以燥湿，又能温散肺寒以化饮，而治寒饮咳喘。

【临证应用】干姜用于脾胃寒证，脘腹冷痛，呕吐泄泻等证，可单用，研末调服。或与高良姜等分为丸，每次3—6克，温水送服，如二姜丸。若胃寒气逆呕吐，可与降逆止呕的半夏相配伍，如半夏干姜散。若脾胃虚寒者，应与补脾益气药人参、白术、甘草配伍，如理中丸。用于亡阳证，四肢厥冷，脉微欲绝者，常与附子同用，助附子以增回阳救逆之功，如四逆汤。用于寒饮咳嗽气喘，形寒背冷，痰多清稀者，常与麻黄、细辛、五味子等同用，如小青龙汤。

【用量用法】3—10克，煎服。

附：黑姜 又名炮姜、炮姜炭。为干姜炒至表面微黑，内成棕黄色而成。性味苦温。归脾、肝经。功效与干姜相似，但辛散作用已减，而长于温经止血，并能温脾止泻。主治虚寒性出血，如吐血、便血、崩漏等血色黯淡，手足欠温，舌淡脉沉者。亦常用于脾胃虚寒之腹痛泻痢。但阴虚血热的出血证忌服。用量3—6克。

姜有生姜、干姜、炮姜之分。生姜辛温，长于发散，又能温中止呕，为外感风寒及胃寒呕吐之常用药物；干姜辛热，辛散之力减弱，长于温中回阳；又兼能温肺化饮，偏治里寒之证，为脾胃衰微，吐泻腹痛，虚痞之要药；炮姜是干姜炒黑而成，性变苦温，辛散作用大减，而温经止血及温中止泻尤长，为治中焦虚寒，脾不统血之要药。故前人有“生姜走而不守，干姜能走能守，炮姜守而不走”之说，这是三者的主要区别。

干姜与附子，均为辛热之品，同为祛寒药，有温里散寒、回阳救逆的作用，临床常配合使用。但附子长于温肾阳，回阳救逆力强，专主下焦而兼温中；干姜主要温脾阳，温脾暖胃力强，专主中焦兼能温肺，故肾阳衰微多用附子，肺寒咳喘多用干姜，而中焦虚寒，阳气不运，则姜、附常同用，以加强温中回阳之功。如四逆汤、附子理中汤等。温补下焦则每用附子而不用干姜，如右归丸、肾气丸等；温肺化饮则每用干姜而不用附子，如苓甘五味姜辛汤、小青龙汤等。可知二药的主要区别，附子偏于中下二焦，干姜偏于中上二焦。

吴茱萸

（原文）辛苦大热，有小毒。入足太阴脾。血分，少阴、厥阴肾、肝。气分。其气燥，故专入肝而旁及脾肾。润肝燥脾，温中下气，除湿解郁，去痰杀虫，开腠理，逐风寒。治厥阴头痛，仲景有吴茱萸汤。阴毒腹痛，痛在小腹。呕逆吞酸，俗名醋心。亦有吐酸者，宜降火清痰，用吴茱萸作向导。蔡中丞苦寒饮，率十日一发，头痛背寒，呕酸不食。得一方，茯苓、吴茱萸汤泡七次，等分，蜜丸，名吴仙丹，前后痰方无及此者。痞满噎膈，胃冷。食积泻痢，血痹阴疝（1），痔疾肠风，脚气水肿，口舌生疮，为末，醋调贴足心，过夜便愈，能引热下行。冲脉为病，气逆里急。宜此主之。性虽热，而能引热下行，段成式言：椒性善下，吴萸性上，似不尽然。寇宗奭曰：此物下气甚速。东垣曰：浊阴不降，厥气上逆，膈塞胀满，非吴萸不可治也。昂按：吴萸辛热，故性上；气味俱厚，故善降。利大肠壅气，故治肠风痔痢。下产后余血。故产后必用之。然走气动火，昏目发疮，血虚有火者禁用。陈者良。泡去苦烈汁用，须泡数次。止呕黄连水炒 治疝盐水炒，治血醋炒。恶丹参、硝石。

【讲解】（1）阴疝：病名，又名寒疝。因寒邪侵袭肝经而致睾丸、阴器急痛肿胀。

吴茱萸功能疏肝下气，散寒止痛。为芸香科落叶灌木或小乔木植物吴茱萸、石虎，或疏毛吴茱萸的将近成熟果实。用甘草汤制过应用。

本品味辛苦，性热，有小毒。入肝、脾、胃经。辛散苦降，性热而燥，既能温中散寒，降逆止呕，又善解肝经之郁滞，有良好的行气止痛作用，且能燥湿。故凡肝胃虚寒，浊阴上逆之头痛，呕吐涎沫，或肝胃不和之胁痛呕吐，吞酸以及寒疝腹痛，虚寒泻痢，寒湿脚气等证均作为要药。本品为厥阴肝经之主药，性虽大热，但在肝经郁火，胃气上逆的情况下，亦可与苦寒泄火之药配伍。起降逆止呕和引经、反佐的作用。但辛热燥烈之品，能损气动火，故血虚有火者不宜用。

【临证应用】吴茱萸用于中焦虚寒，肝气上逆所致的头痛经常发作，日久不愈兼呕吐涎沫者，常与人参、生姜等同用，如吴茱萸汤；用于寒疝腹痛，常与小茴香、川楝子、木香等配伍，如导气汤；治寒湿脚气，上冲胸腹，闷乱神昏，可配木瓜、槟榔、生姜等如吴萸木瓜汤；

胃中虚寒脘腹冷痛，可与干姜、木香配伍。若肝火犯胃之胁痛，呕吐吞酸者，常以黄连为主药与少量吴茱萸相配，如左金丸，共奏辛开苦降之效。至于脾胃虚寒的久泻或五更泄，则与补骨脂、五味子、肉豆蔻温补脾肾的药物同用，如四神丸。

此外，本品研末醋调敷足心，可引火下行，治疗口舌生疮。

吴茱萸、黄连、生姜均有止呕之功，然吴茱萸治肝寒犯胃之呕酸；黄连治胃中湿热之呕苦；生姜治胃寒上逆之呕水，三者各有不同。

本品温中散寒的功效与干姜相似，故寒郁中焦，脘腹冷痛，二药每常同用。但干姜尚能温中焦，可温肺化饮止咳，吴茱萸还能温下焦，暖厥阴以治寒疝，助肾阳以治寒泻，温营血以治经闭，这是与干姜的主要区别。

【用量用法】1.5—5克，煎服。外用适量。

高良姜

〔原文〕辛热。暖胃散寒，消食醒酒。治胃脘冷痛，凡心口一点痛，俗言心气痛，非也，乃胃脘有滞或有虫，及因怒因寒而起。以良姜酒洗七次，香附醋洗七次，焙研。因寒者，姜二钱，附一钱；因怒者，附二钱，姜一钱；寒怒兼者，每钱半，米饮加姜汁一匙，盐少许服。初梁纰患心脾痛，梦神授此方，二味等分服，后入各炒方用。霍乱泻痢，吐恶噎膈，瘴疟冷癖。肺胃热者忌之。出岭南高州。

良姜子名红豆蔻，温肺散寒，醒脾燥湿，消食解酒。东垣脾胃药中常用之。并东壁土炒用。

【讲解】高良姜功专温中止痛。为姜科多年生草本植物高良姜的根茎。又称良姜。主产于广东、广西及台湾等地。切片，生用。

本品味辛、性热。入脾、胃经。善于温散脾胃之寒邪，而有温中止痛，止呕之功，用治胃脘冷痛，疗效颇佳。因其温胃散寒作用较好，故对胃寒气逆之呕吐清水，噎气，腹痛泄泻之证，也有疗效。正如《本草汇言》谓：高良姜，祛寒湿温脾胃之药也。若老人脾肾虚寒，泄泻自利，妇人心胃暴痛，因气怒、因寒痰者，此药辛热纯阳，除一切沉寒痼冷，功与桂、附同等。然辛热燥散，易伤阴助火，故肝胃火郁之胃痛呕吐等忌用。

【临证应用】高良姜用于脘腹冷痛，呕吐泄泻等。可单用，但大都配伍温中行气药同用，如二姜丸，以本品配伍干姜同用。若寒凝气滞者，可配香附同用，如良附丸；治胃寒呕吐者，可与半夏、生姜相配；胃气虚者，再配益气和胃药以治胃气虚寒之呕吐。

高良姜与干姜均为辛热之品，为温散中焦寒邪之要药。但高良姜偏治胃寒，干姜偏治脾寒。

高良姜与生姜也不同，高良姜辛热，热重于辛，偏于走里，散胃寒而止痛；生姜辛温，辛重于温，偏于走表，散风寒而解表，和胃气而止呕。

【用量用法】 3—10克，煎服。

附：红豆蔻

本品为高良姜的成熟果实。捣碎生用。性味辛温，入脾胃经。功能温胃散寒，醒脾燥湿，消食止呕。主治脘腹冷痛，呕吐泄泻，噎膈反胃，疟疾痢疾等证。用量0.5—2克，煎服。

川椒

〔原文〕辛热纯阳。入肺发汗散寒，治风寒咳嗽；入脾暖胃燥湿，消食除胀，治心腹冷痛，吐泻痢，痰饮水肿；《千金方》有人冷气入阴囊肿满，生椒择净，帛裹著丸囊，厚半寸，须臾热气大通，日再易，肿消瘥。梅师用桂末涂亦良。入右肾命门补火，治肾气上逆，能下行导火归元。每日吞三十粒，大能温补下焦。阳衰洩数，阴汗泄精。下焦虚寒。坚齿明目，破血通经，除癥安蚘，虫见椒则伏，仲景蚘厥乌梅丸用之。凡虫啮腹痛者，面白唇红，时发时止。杀鬼疰虫鱼。最杀劳虫。危氏神授丸，川椒炒出汗为末，米饮下三钱。有人病传尸劳，遇异人传此方，服至二斤，吐出虫如蛇而安。肺胃素热者忌服。丹溪曰：食椒既久，则火自水中生，多被其毒也。秦产名秦椒，俗名花椒，实稍大；蜀产肉厚皮皱为川椒。闭口者杀人，微炒去汗捣，去里面黄壳，取红用。名椒红。得盐良。入肾。使杏仁，畏款冬、防风、附子、雄黄、麻仁、凉水。椒乃玉衡星之精，辟疫伏邪，故岁旦饮椒柏酒。

川椒子名椒目，苦辛。专行水道，不行穀道。能治水蛊，除胀定喘，及肾虚耳鸣。

【讲解】川椒善能温中止痛，又可燥湿杀虫。为芸香科灌木或小乔木植物花椒或青椒的干燥成熟果皮。即花椒，又名蜀椒、秦椒（《本经》）。我国大部分地区都有分布，但以四川产者为佳，故称川椒。生用。

本品味辛性热，有小毒。入脾、胃、肾经。善能散阴寒之邪，能温中止痛，暖脾止泻，故常用于脾胃虚寒，脘腹冷痛，呕吐泄泻等证。借其辛辣之性，而有驱杀蛔虫之功，常用于蛔虫引起的腹痛吐蛔。煎汤外洗，可治湿疹瘙痒，而有燥湿止痒之功。至于《备要》载尚能止咳明目，通经等，是指与其他药物配伍而言，并非川椒本身具有如此广泛的作用。辛辣之品，阴虚火旺者忌用。

【临证应用】花椒用于脾胃虚寒，脘腹疼痛或呕吐，配人参、干姜、饴糖，即大建中汤。也可用于寒湿泻痢，腹痛且泻下多泡沫者，与附子、干姜等同用，如椒附汤。本品炒热布包温熨痛处，可以止痛。用于蛔虫引起的腹痛呕吐或吐蛔，可单用。但临床多入复方使用，常与

乌梅、黄连、干姜等配伍，如乌梅丸。花椒与苦参、蛇床子、枯矾等煎汤外洗，治湿疹阴部瘙痒。

【用量用法】2—6克，煎汤，或入丸、散服。外用适量，研末调敷或煎汤薰洗。

附：椒目

即花椒之种子。味苦性寒。入脾、膀胱经。长于行水消肿，还能平喘。用于水肿胀满，痰饮喘咳等，常与大黄、葶苈子、防己同用，如己椒苈黄丸。用量2—5克。

丁香

【原文】辛温纯阳。泄肺温胃，大能疗肾，壮阳事，暖阴户。治胃冷壅胀，呕哕呃逆，丹溪曰：人之阴气，以胃为养，土伤则木挟相火，直冲清道而上作咳逆。古人以为胃寒，用丁香柿蒂，不能清痰利气，惟助火而已。按：呃逆有痰阻气滞食塞，不能升降者，有火郁下焦者，有伤寒汗吐下后，中气大虚者，有阳明内热失下者，有痢疾下大，胃虚而阴火上冲者。时珍曰：当视虚实阴阳，或泄热，或降气，或温或补，或吐或下可也。古方单用柿蒂，取其苦温降气。《济生》加丁香、生姜，取其开郁散痰。盖从治之法，亦尝有收效者矣。朱氏但执以寒治热，矫枉之过矣。**痲痹奔豚，腹痛口臭**，丹溪曰：脾有郁火，溢入肺中，浊气上行，发为口气，治以丁香，是扬汤止沸耳，唯香薷甚捷。**脑疳齿齲，痘疮胃虚灰白不发。热证忌用。有雌雄二种**，雌即鸡舌香，力大。若用雄，去丁盖乳子。**畏郁金、火。**

【讲解】丁香长于温中降逆，兼能温肾助阳。为桃金娘科常绿乔木植物丁香的花蕾，称公丁香。主产于坦桑尼亚、马来西亚、印度尼西亚等地，我国广东亦有栽培。干燥生品入药。

本品味辛、性温。入脾、胃、肾经。脾胃之气喜温而恶寒，寒则中气不运，上逆则呕吐作呃。丁香温中焦而善于降胃气，故为治胃寒呃逆、呕吐之要药。入肾经温下焦而助肾阳，故又治男子阳痿，女子阴冷等证。至于《备要》载治脑疳齿齲之说，《本草经疏》谓疳齲者，亦阳明湿热上攻也，散阳明湿热之邪，则疳齲自除。

【临证应用】丁香温中散寒，善于降逆止呃，用于虚寒呃逆，常与人参、柿蒂、生姜等同用，如丁香柿蒂汤；治胃寒呕吐，可与半夏同用；脾胃虚寒，吐泻食少则与砂仁、白术等配伍，如丁香散；肾阳不足所致的阳痿阴冷，可与温肾助阳药同用。

【用量用法】2—6克，煎服。畏郁金。

附：母丁香

本品为丁香的成熟果实，形如鸡舌，故又名鸡舌香。气味较淡，功效与公丁香相似，但力较弱，临床应用以公丁香为主。

茴香

（原文）大茴辛热。入肾、膀胱。暖丹田（1），补命门，开胃下食，调中止呕。疗小肠冷气，癰疽阴肿（2），疽有七种，气、血、寒、水、筋、狐、癰也。肝经病，不属肾经，以厥阴肝脉络阴器也。多因寒湿所致，亦有挟虚者，当加参、术于温散药中。干湿脚气。多食损目发疮。

小茴辛平，理气开胃，亦治寒疽。食料宜之。

大如麦粒，轻而有细棱者名大茴，出宁夏，他处小者名小茴。自番舶来，实八瓣者，名八角茴香。炒黄用。得酒良。得盐则入肾，发肾邪，故治阴疽。受病于肝，见证于肾。大小茴各一两为末，猪胞一个，连尿入药，酒煮烂，为丸服。

【讲解】（1）丹田：道家称人身脐下三寸为丹田，是男子精室，女子胞宫所在之处。（2）阴肿：即阴囊肿大。

小茴香疏肝理气，暖肾散寒，且能止痛。八角茴香（又名大茴香）作用与小茴香相似，而药力较逊，并多作食物调味品使用。小茴香为伞形科多年生草本植物茴香的成熟果实。《药性论》称蘘香，《宋氏集验医方》称大茴香。至于《备要》称大如麦粒，轻而有棱者名大茴，出宁夏，他处小者名小茴。此两者为一植物，即今之小茴香。我国各地均有栽培。而今之大茴香，即八角茴香，系木兰科常绿小乔木八角茴香树的果实，产于亚热带地区，古时大多进口，现我国广东、广西、云南等地亦有种植。临床少用，大多作调味品，古俗称“大料”。小茴以药用为主，生用，或盐水炒用。

同属植物莽草的果实，形状与八角茴香非常相似，极易混淆。莽草果实有毒，不可误用。其主要区别点为：莽草果实较小，蓇葖一般长约7—10毫米，其尖端呈向上弯曲之鸟喙状，带树脂样气味，味苦。

小茴香味辛，性温，气芳香。归肝、肾、脾、胃经。功能疏肝理气，暖肾祛寒，温脾开胃，又能止痛。尤长于温散下焦寒邪，故常用于阴寒内盛，肝郁气滞之寒疽，睾丸偏坠，少腹冷痛，以及寒邪伤中，气

机运行不畅之脘腹胀痛，呕吐食少等证。但辛温助火，故凡一切热证及阴虚火旺者均忌。

【临证应用】小茴香用于寒疝腹痛，睾丸偏坠。常与肉桂、乌药、沉香等暖肝温肾，行气止痛药同用，如暖肝煎，治寒疝少腹疼痛。若睾丸偏坠，肿大胀痛，可与川楝子、荔枝核等同用，如荔枝散。若阴囊水肿，睾丸胀痛，可用小茴香30克、车前子30克、食盐6克共为细末，每次6克，温黄酒下，日服三次，有效。用于胃寒脘腹胀痛，呕吐食少，可与木香、干姜等配伍。此外，本品炒热，布包温熨下腹部，有良好的止痛效果。

【用量用法】3-6克，煎汤，或入丸，散服。外用适量。炒热温熨或研末调敷。

胡椒

〔原文〕辛热纯阳。暖胃快膈，下气消痰。治寒痰食积，肠滑冷痢，阴毒腹痛，胃寒吐水，牙齿浮热作痛。合萆拔散之。杀一切鱼肉鳖蕈音寻，上声。毒。食料宜之，嗜之者众。多食损肺，走气动火，发疮痔脏毒（1），齿痛目昏。

毕澄茄一类二种，主治略同。

【讲解】（1）脏毒：病名。指脏中积毒所致的便血，血色黯，多见于便后。

胡椒辛热，温中止痛。为胡椒科常绿藤本植物胡椒的干燥果实。10月至次年4月，当果穗基部的果实开始变红时，剪下果穗，晒干或烘干后，即成黑褐色，取下果实，通称黑胡椒。如在全部果实均变红时采收，用水浸渍数天，擦去外果皮，晒干，表面呈灰白色，通称白胡椒。多研末生用。

本品味辛，性热。入胃、大肠经。能温暖肠胃，散冷积，止冷痛，又能除寒饮。适用于肠胃有寒，脘腹疼痛、呕吐泄泻及痰饮等证。《本草求真》云：比之蜀椒，其热更甚，凡因火衰寒入，痰食内滞，肠滑冷痢，及阴毒腹痛，胃寒吐水，牙齿浮热作痛者，治皆有效，以其寒气既除而病自可愈也。但此只有除寒散邪之力，非同桂附终有补火益元之妙。惟性热，多食动火耗气伤阴，发疮损目，故阴虚火旺者忌服。

【临证应用】胡椒可用于肠胃有寒，脘腹疼痛，呕吐泄泻。与高良姜、萆芡等温中药同用，以温暖肠胃，散寒止痛。也可单用胡椒粉置膏药中贴脐部，治受寒腹泻。胡椒是常用的调味品，少量使用，能增进食欲。

【用量用法】2—4克，煎服。研粉吞服每次0.5—1克。外用适量。

附：荜澄茄

荜澄茄为胡椒科常绿攀援性藤本植物荜澄茄及樟科落叶小乔木或灌木山鸡椒（山苍子）的果实。研碎生用。

本品亦为温中散寒之品，与胡椒功用相似。用于胃寒腹痛，呕吐呃逆等证，可单用，但大多入复方中应用，常与温中行气药配伍。

荜茇

〔原文〕辛热。除胃冷，温中下气，消食祛痰。治水泻气痢，生乳点服。虚冷肠鸣，亦入大肠经。冷淡恶心，呕吐酸水，痃癖阴疝。辛散阳明之浮热，治头痛，偏头痛者，口含温水，随左右以末吹一字入鼻效。牙痛，寒痛宜干姜、荜茇、细辛；热痛宜石膏、牙硝；风痛宜皂角、僵蚕、蜂房、二乌；虫痛宜石灰、雄黄。鼻渊。多服泄真气，动脾肺之火，损目。出南番，岭南亦有。类榧子而长，青色，去挺用头，醋浸，刮净皮粟，免伤人肺。

【讲解】荜茇亦以温中止痛为功。为胡椒科藤本植物荜茇的未成熟果穗。果穗圆柱状，稍弯曲，长2—4.5厘米，表面黑褐色，多由数细小的瘦果聚集而成。主产于广东、云南等地。九月间采集未成熟的果穗。晒干，生用。

本品味辛，性热。入胃、大肠经。善走肠胃，既能温胃腑沉冷，又能解大肠寒邪，而有温中散寒之功。故对肠胃寒冷所致之证，如呕吐呃逆，腹痛及泄泻等，均有疗效。至于外治牙痛，是“火郁发之”之意。

【临证应用】荜茇治胃寒呕吐，呃逆及脘腹冷痛，泄泻等证，可单用，或与其他温中药同用以增强疗效；治龋齿疼痛以荜茇粉涂于痛处，可以止痛，或再与等量胡椒粉，化蜡制成麻子大丸药，塞入龋齿孔中。

【用量用法】2—5克，煎服。外用适量。

小结

温里药药性均属温热，具有温里散寒的作用，适用于里寒证。其中有些药物还兼有补火回阳之效，可用于肾阳衰微，脾阳不振及亡阳欲脱之证。

附子、干姜、肉桂、吴茱萸、花椒、高良姜等均为辛热之品。其中附子、干姜以回阳救逆见长，常相须为用于亡阳欲脱之证，但附子回阳之力较干姜强，并能补火助阳，治肾阳不足之证，还具散寒止痛之效，也用治风湿痹痛；乌头亦是辛热大毒之品，功偏祛风湿，散寒止痛，故寒湿痹痛，心腹疼痛，寒疝及跌扑损伤疼痛宜用。干姜长于温中祛寒，善治脾胃虚寒证，并能温肺化饮，治肺寒咳喘，炮制后的炮姜，辛散作用变弱，而温经止血效佳，多用于虚寒失血诸证。肉桂作用较附子为缓，常同用于补火壮阳，治肾阳不足，命门火衰证，且能温经散寒，治血寒痛经，经闭及阴疽等证。肉桂还有引火归元，治肾不纳气及虚阳上越诸证。

吴茱萸主入肝经，有疏肝理气，散寒止痛作用，兼入脾肾，故能温中止呕，暖肾止泻，为治肝气犯胃，胃失和降之呕吐吞酸及厥阴头痛、寒疝腹疼的良药。

荜茇与高良姜功效相似，专温胃散寒，治胃寒疼痛。花椒、胡椒温散性较大，主治脘腹冷痛，花椒又可燥湿杀虫。椒目，为花椒的种子，功效与花椒迥异，是行水平喘，治水肿胀满，痰饮喘咳的药物。小茴香主散下焦寒邪，功能疏肝暖肾，善治寒疝、少腹疼痛，睾丸偏坠。丁香则以温胃降逆见长，是治虚寒呃逆的要药。

温里药功用归纳简介

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
附子	辛、甘、	心、肾、	回阳救	① 亡阳厥逆证	3—15克	入汤剂先

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	热有毒	脾	逆，补火助阳，散寒止痛	② 脾肾阳虚证 ③ 寒湿痹痛		煎30—60分钟 孕妇慎用
草乌头	辛、苦、温有大毒	心、肝、脾	祛风湿，散寒止痛	①寒湿痹痛 ②心腹冷痛 ③跌打损伤疼痛	1.5—4.5克，若入散剂或酒剂，则减为1—2克	入汤剂先煎30—60分钟 孕妇慎用
肉桂	辛、甘、热	肾、脾、心、肝	补火助阳，散寒止痛，温通经脉	①肾阳不足、命门火衰的畏寒肢冷、阳痿等证 ②寒淤痛经、经闭 ③脘腹冷痛 ④寒	2—6克研末冲服每次1—2克	不宜久煎

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				湿痹证 ⑤阴疽漫肿或痈疽久溃不敛		
干姜	辛、热	脾、胃、心、肺	温中回阳，温肺化饮	①脘腹冷痛、呕吐泄泻 ②亡阳厥逆证 ③寒饮喘咳	3—10克	
炮姜	苦、涩、温	脾、肝	温经止血，温中	①虚寒性出血 ②脘腹寒痛、泻痢	3—6克	
吴茱萸	辛、苦、热有小毒	肝、脾、胃	散寒止痛，疏肝下气，燥湿	①阴寒胃痛、腹痛头痛 ②寒湿脚气 ③呕吐吞酸	1.5—5克外用适量	
高良姜	辛、热	脾、胃	温中止痛	脘腹冷痛、吐泻	3—10克	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
川椒	辛、热	脾、胃、肾	温中止痛，驱蛔	①脘腹冷痛、吐泻 ②虫积腹痛	2—8克	椒目功能行水平喘，用于水肿胀满。
丁香	辛、温	脾、胃、肾	温中降逆，温肾助阳	①胃寒呃逆 ②肾虚阳痿等证	2—6克	畏郁金
小茴香	辛、温	肝、脾、胃、肾	散寒止痛，疏肝理气	①寒疝疼痛 ②脘腹疼痛	3—6克	大茴香功用与小茴香相似
胡椒	辛、热	胃、大肠	温中止痛	脘腹冷痛、呕吐、泄泻	2—4克研末用 每次0.5—1克	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
荜茇	辛、热	胃、大肠	温中止痛	脘腹冷痛、呕吐、泄泻	2—5克	

复习思考题

- 1、试述温里药的定义和适应证以及应用时的注意点。
- 2、附子、肉桂、干姜、吴茱萸、高良姜、胡椒、小茴香、丁香的功效和适应证各怎样？
- 3、分析比较附子与肉桂、干姜与高良姜、小茴香与吴茱萸的功效，临床如何区别应用？

第八章开窍药

- 第八章开窍药

〔自学时数〕4学时 〔面授时数〕1学时 〔目的要求〕

1. 了解开窍药的作用和适用证、禁忌证。
2. 熟悉开窍药与祛寒、清热药配伍应用的理论依据（联系中医基本理论）。
3. 掌握开窍药中常用药的功效、临证应用，并比较其异同。
4. 联系牛黄、皂荚、郁金、远志等具有开窍作用的药物，了解本章以外的开窍药，扩大知识面。
5. 在自学本章全部内容的基础，重点掌握小结内容。

凡具辛香走窜之性，以开窍、醒神为主要功效的药物，称开窍药，或称为芳香开窍药。

开窍药气味芳香，性善走窜，多归心经，具有通关开窍、启闭醒神的作用，适用于邪陷窍闭之神昏，以及惊痫、中风等病出现的卒然昏厥之证。

神昏有虚、实之分，实证即闭证，以口噤、握拳、脉来有力为辨证依据。闭证又分寒闭、热闭。寒闭多见面青、身凉、苔白、脉迟；热闭多见面赤身热、苔黄脉数。二者均可应用开窍药。唯前者宜用温开，或配祛寒药同用；后者宜用凉开，或配清热药同用。虚证即脱证，多见神昏冷汗、肢凉、脉微欲绝等证，当用回阳救脱之法，不可用开窍药，以免进一步耗伤元气。

本类药物为急救、治标之品，只可暂用，不宜久服，久服泄人元气。又因本类药物以辛香为主，易于挥发，内服只做丸散，一般不入煎剂。

麝香

〔原文〕辛温香窜。开经络，通诸窍，透肌骨，暖水脏。治卒中，诸风诸气，诸血诸痛，痰厥惊痫，严用和曰：中风不醒者，以麝香清油灌之，先通其关。李东垣曰：风病在骨髓者宜之。若在肌肉用之，反引风入骨，如油入面。李时珍曰：严氏言风病必先用，东垣谓必不可用，皆非通论。若经络壅闭，孔窍不利者，安得不用为引导以开通之耶！但不可过耳。昂按：据李氏之言，似乃严说为长。《广利方》中恶客忤垂死，麝香一钱，醋和灌之。癰疽瘰疬，鼻窒耳聋，目翳阴冷，辟邪解毒，杀虫堕胎，坏果败酒，故治果积酒积。李东垣曰：麝香入脾治肉，牛黄入肝治筋，冰片入肾治骨。研用。凡使麝香，用当门子尤妙。忌蒜。不可近鼻，防虫入脑。麝见人捕之，则自剔出其香，为生香尤难得。其香聚处，草木皆黄。市人或搀荔枝核伪之。

【讲解】麝香具较强的开窍醒神作用，又长于活血散结，消肿止痛。为鹿科动物麝的雄体香囊中的分泌物。猎取后将香囊割下，称为毛壳麝香；刨开香囊，除去囊壳，称麝香仁。其中呈颗粒状者，习称当门子，质最佳。

本品味辛性温，气芳香。辛散温通，芳香走窜，入心、脾二经。善能开窍醒神，而力颇猛。为治邪蒙窍闭，神志昏迷之要药。凡属开窍作用的成方中多有本品。其性虽温，但配伍清热药，即为凉开之剂；配伍祛寒药，则成温开之方。常作为急救之品，以治各种急性热病及中风、痰厥等引起的窍闭神昏之证。本品能开通经络之壅滞以止痛，能透肌骨，暖水脏而利水消肿，又能活血散结以消肿，对于疮疡肿毒，或跌打损伤、瘀血肿痛等证，内服外用均有良效。并可用于瘀血阻滞的癰疽、经闭及难产、胞衣不下等证；故孕妇忌用。

前人有“风病必先用麝香”和“风病血病必不可用”两种相反的说法。惟李时珍论述最为妥当：“盖麝香走窜，能通诸窍之不利，开经络之壅遏。若诸风、诸气、诸血、诸痛、惊痫、癰疽诸病，经络壅闭，孔窍不利者，安得不用为引导以开之通之耶！非不可用也，但不可过耳。”因其走窜开散，能耗伤元气，故不得用于脱证之神昏。

【临证应用】麝香有较强的开窍醒神作用，用于温热病热入心包，神昏痉厥，以及中风痰厥、气厥等卒然昏迷之闭证。常与犀角、牛黄等清热药配伍，即为凉开之剂，以治热闭之证，如至宝丹；若与苏合香、丁香等祛寒药配伍，则为温开之剂，以治寒闭之证，如苏合香丸。用于疮疡肿毒或跌打损伤，前者常与雄黄、乳香、没药同用，如醒消丸；后者与血竭、红花、乳香、没药等配伍，如七厘散；与牛黄、珍珠、蟾酥、雄黄、冰片等配伍，名六神丸，用治咽喉肿痛及疗疮肿毒等症，内服外用，均有较好疗效。用于癥瘕、经闭以及血瘀气滞之心腹疼痛等，多与当归、丹参、三棱、莪术等活血祛瘀药配伍，以增强疗效。用于胎死腹中或胞衣不下等症，可与肉桂配伍，如香桂散。尚可用以催生。

【用量用法】0.1-0.15克，多入丸、散，不入汤剂。外用适量。

牛黄

〔原文〕甘凉。牛有病，在心肝胆之间，凝结成黄，故还以治心、肝、胆之病。《经疏》曰：牛食百草，其精华凝结成黄，犹人之有内丹。故能散火消痰解毒，为世神物。或云牛病乃生黄者非也。清心解热，利痰止惊，通窍辟邪。治中风入脏，惊痫口噤，心热则火自生焰，肝热则木自生风，风火相搏，胶痰上壅，遂致中风不语。李东垣曰：中脏宜之。若中腑及血脉者用之，反能引风入骨，如油入面。按中风，中脏者重，多滞九窍；中腑稍轻，多著四肢。若外无六经形证，内无便溺阻隔，为中经络，为又轻。初宜顺气开痰，次宜养血活血，不宜专用风药。大抵五脏皆有风，而犯肝者为多。肝属风木而主筋，肝病不能营筋，故有舌强口噤、喎斜、瘫痪不遂不仁等证。若口开为心绝；手撒为脾绝；眼合为肝绝；遗尿为肾绝；吐沫鼻鼾为肺绝，发直头摇、面赤如妆、汗涖如珠者，皆不治，若只见一二证，犹有可治者。小儿百病。皆胎毒痰热所生。儿初生时未食乳，用三五厘，合黄连甘草末蜜调，令呕之良。发痘堕胎。善通窍。牛有黄，必多吼唤，以盆水承之，伺其吐出，迫喝即堕水，名生黄，如鸡子黄大，重叠可揭，轻虚气香者良，观此则非病乃生黄矣。杀死角中得者名角黄，心中者名心黄，肝胆中者名肝胆黄，成块成粒，总不及生者。但磨指甲上，黄透指甲者真。骆驼黄极易得，能乱真。得牡丹，菖蒲良。聪耳明目。人参为使。恶龙骨、龙胆、地黄、常山。

【讲解】牛黄善能开窍豁痰，息风定惊，又能清热解毒。为牛科动物牛的胆囊、胆管，或肝管中的结石，称天然牛黄，又名西黄、犀黄。由牛胆汁或猪胆汁提取加工制成的称人工牛黄。天然牛黄完整者呈卵形或三角形，表面金黄色或棕黄色，深浅不一，有排列整齐的环状层纹，重重相叠。气清香、味先微苦、后微甘。以少许粉末和以清水，涂于指甲上，能染为黄色，经久不褪，习称“透甲”或“挂甲”。人工牛黄，大多呈粉末状，或不规则球形，表面浅棕色或金黄色，涂于指甲亦能染成黄色。研末用。

本品苦凉气香，主入心、肝经。故能清心化痰开窍、凉肝息风止痉。用于温热病热入心包，神昏谵语，惊风抽搐，中风痰迷及癫痫等证，均有良效。但开窍之力不如麝香，而以解毒之功较胜，故又为清热解毒祛腐之要药，用于咽喉肿烂、牙疳口疮，及各种疮疡肿毒等证，不

论内服或外用，均为要品。本品治中风，必须邪已入脏入腑，而见痰涎壅盛，神识昏迷，方可投服。又系苦寒之品，非实热证者不宜用。孕妇慎用。

【临证应用】 牛黄用于温热病热甚风动的痉挛抽搐，常与麝香、钩藤、全蝎等同用，以增强清热息风之功，如牛黄散；用于温热病热入心包，烦躁不安，神昏谵语，以及小儿急惊风，或痰热蒙闭心窍，中风不语等证，常与黄连、栀子、朱砂等配伍，如牛黄清心丸；若上方再加麝香、犀角等药，治窍闭神昏、惊厥等证，其效尤著，如安宫牛黄丸。用于热毒壅结所致的咽喉肿痛、溃烂、口舌生疮，痈疽疔毒等证，可配雄黄、黄芩、大黄、冰片等药，如牛黄解毒片。治疗毒、乳岩、瘰癧等证，与麝香、乳香、没药合用，可清热解毒、活血散结、消肿止痛，如犀黄丸。治咽喉、口舌肿烂，亦可与珍珠为末，外用吹撒，如珠黄散。

牛黄与麝香虽均为开窍之要药，但牛黄性凉，主清心化痰；麝香性温，善通经散结。两药又为外科疮疡常用之品，然牛黄偏于清热解毒，防腐祛腐，多用于疮疡破溃腐烂之证；麝香则长于活血消肿，适用于初起未溃之时。因此穿溃腐烂者用牛黄不用麝香；瘀血凝滞、肿痛者用麝香不用牛黄。至于中风痰迷痉厥，或热病神昏抽搐，两药又常相配伍，但开窍醒神之功，有赖于麝香；而化痰定惊之能，则恃于牛黄，此为两药同中有异。

【用量用法】 0.2—0.5克，入丸散剂，不入煎剂，外用适量。

冰片

〔原文〕辛温香窜。善走能散，先入肺，传于心脾而透骨，通诸窍，散郁火。治惊痫痰迷，李东垣曰：风病在骨髓者宜之。若在血脉肌肉，反能引风入骨，如油入面。目赤肤翳（1），乳调日点数次。王节斋曰：冰片大辛热，用之点眼，取其拔出火邪，盖火郁发之，从治法也。世人误以为寒，而常用之，遂致积热害目，故云眼不点不瞎者此也。耳聋鼻瘕，鼻中瘕肉，点之自入，皆通窍之功。喉痹舌出，散火，骨痛齿痛，治骨。痘陷，猪心血作引，酒服或紫草汤服，引入心经能发之。产难，三虫五痔。王纶曰：世人误以为寒，不知辛散性甚，似乎凉耳。诸香皆属阳，岂有香之至者，而反寒乎？昂幼时曾问家叔建侯公曰：姜性何如？叔曰：体热而用凉。盖味辛者多热，然风热必借风以散之，风热散则凉矣。此即本草所云冰片性寒之义，向未有发明之者，附记于此。出南番，云是老杉脂。以白如冰，作梅花片者良。以杉木炭养之则不耗，今人多以樟脑升打乱之。

【讲解】（1）肤翳：凡眼内外所生遮蔽视线的目障，称之为肤翳。

冰片功能开窍醒神，善散郁火。为龙脑香科常绿乔木龙脑香的树干经蒸馏冷却而得的结晶，称“龙脑冰片”，亦称“龙脑香”或“梅片”。现主要以松节油、樟脑等为原料，经化学方法制成的合成品，称“机制冰片”；或由菊科多年生草本植物艾纳香（大艾）叶提取的结晶，称“艾片”。龙脑香主产东南亚地区，我国台湾曾有引种；艾纳香主产我国广东、广西、云南等地；机片生产于上海、天津、南京等地。

本品辛苦微寒，入心、脾、肺经。辛散苦泄，芳香走窜，善通诸窍，有开窍醒神之效，用治窍闭神昏之证。本品兼散郁火，外用有消肿止痛之功。并有防腐、止痒之效，故为外治喉证、口疮、目疾，以及疮疡的要药。

【临证应用】冰片开窍醒神之功与麝香相似，但力较逊。二药常配伍使用，如至宝丹、安宫牛黄丸，以治窍闭神昏之证。冰片单用点眼，可治目赤肿痛。配硼砂、朱砂、玄明粉，研极细，吹于患处，如常用成药冰硼散，治咽喉肿痛及口疮。

此外，许多外用的防腐、生肌、止痒等复方中，多配用本品以治疮疡疥癣等证。

【用量用法】 0.03~0.1克。多入丸、散剂，不入煎剂。外用适量。

苏合香

〔原文〕甘温走窜。通窍开郁，辟一切不正之气，杀精鬼。出诸番，合众香之汁煎成。以箸挑起，悬丝不断者真。

【讲解】苏合香功专开窍辟秽止痛。为金缕梅科乔木植物苏合香树的树脂。主产于非洲、印度及土耳其等地。原药生用入丸剂。

本品味辛性温，入心、脾经。其气香烈，开窍辟秽之功与麝香相似。而力稍逊。凡中风、痰厥、气厥等卒然昏倒的寒闭危急之证，皆可以此开之。本品开窍辟秽、开郁祛浊之功较好，故可间接地达到良好的止痛效果，以治心腹疼痛。

【临证应用】苏合香用于中风、中气，卒然昏倒、牙闭紧闭、不省人事，及痰壅气闭，突然昏迷，或心腹疼痛等证，可与安息香、麝香、冰片、丁香、檀香等同用，如苏合香丸。近年以本品配伍檀香、冰片、乳香等，用于冠心病心绞痛，能较快地缓解疼痛，如冠心苏合丸。

【用量用法】 0.3-1克。多入丸剂，不入煎剂。

石菖蒲

〔原文〕辛苦而温，芳香而散。补肝益心，开心孔，利九窍，明耳目，发音声。去湿逐风，除痰消积，开胃宽中，疗噤口毒痢

(1)，杨士瀛曰，噤口虽属脾虚，亦热闭胸膈所致。用木香失之温，山药失之闭，唯参苓白术散加菖蒲米饮下，胸次一开，自然思食。菖蒲黍米酸酒，治一切风。风痹惊痫，崩带胎漏(2)。消肿止痛，解毒杀虫。李士材曰：《仙经》称万水草之精英，神仙之灵药，用泔浸饭上蒸之，借谷气而臻于中和，真有殊常之效。又曰：芳香利窍，心脾良药，能佐地黄、天冬之属，资其宣导，若多用、独用，亦耗气血而为殃。李士材著《药性解》、《本草通玄》。根瘦节密，一寸九节者良。去皮微炒用。秦艽为使。恶麻黄。忌饴糖、羊肉、铁器。

【讲解】(1) 噤口毒痢：病名。指痢疾患者不进饮食或呕不能食，为痢疾比较严重的证候。(2) 胎漏：指妊娠前半期阴道不时少量出血，或点滴不尽，或时有时无。

石菖蒲善化湿浊之邪，而具开窍豁痰之功。为天南星科多年生草本植物石菖蒲的根茎。早春采挖，去叶，洗净晒干，生用。鲜品亦入药，现多以植物细叶菖蒲的带叶根茎鲜品入药，称鲜菖蒲，或钱菖蒲。每多盆中栽培，既供观赏，又可供四时收用。鲜者气味皆足，芳香开窍之力较强，但常用者仍多为干品。

本品味辛性温，疏散开达，气味芳香，其性走窜，具有化湿豁痰、辟秽开窍之功。入心、胃经，入胃宣化湿浊、醒脾开胃；入胸膈则疏利痰浊，振奋清阳之气，开通心窍，聪耳明目而醒神健脑。故凡痰浊蒙闭、清阳不升而引起的神志昏迷、耳聋失聪、头目不清、癫狂痴呆，以及湿浊中阻，脘腹疼痛、噤口下痢等证，均为常用之品。惟性燥散，阴虚血亏及滑精多汗者不宜用。

石菖蒲传统以生于山间石隙中者质佳。且根瘦节密、一寸九节者良。故历代医家处方往往写九节菖蒲。然今所用之九节菖蒲系毛茛科植物阿尔泰银莲花的根茎，与正品石菖蒲不同，不应混用。

【临证应用】石菖蒲用于湿浊蒙蔽清窍之神志昏乱，常与郁金、半夏同用，如菖蒲郁金汤；治健忘、耳鸣，常与远志、龙齿等同用，如安神定志丸；治癫狂、痴呆等症，也可配用安神、平肝药。治湿滞气塞，胸腹胀满，古方有单用，或配吴茱萸、香附等同用。又用于噤口痢，同茯苓、石莲子、人参等配伍，如开噤散，有开胃进食的功效。

此外，本品尚兼消痈肿而治疮痈，祛寒湿以愈痹痛之功，也偶有用之。

【用量用法】5—8克，鲜品可加倍，煎服。鲜品亦可捣汁冲服。

安息香

〔原文〕辛香苦平，入心经。行血下气，安神辟秽，安息诸邪，故名。或云出安息国，一种水安息，最难得，功倍胜。

【讲解】安息香功能开窍回苏，兼有祛痰、活血行气之效。为安息科植物安息香树、越南安息香树树干渗出的香树脂。主要分布在印度尼西亚、苏门答腊、越南、老挝及泰国。我国已发现青山安息香、白叶安息香等植物的香树脂也可作安息香用，主产于广西、云南等地。在夏秋季选生长5—10年的树株，割数个倒三角口，流出汁液，收取白色香树脂。置阴干处保存，原药生用。

本品味辛苦，性平，归心、脾经。功能开窍、祛痰、行气活血。主用于热病神昏、痰涎壅盛的闭证，或中风痰厥等证，也可用于心腹疼痛。

【临证应用】安息香治热病神志昏迷、痰涎壅盛的闭证及中风痰厥之证，多与苏合香、麝香等同用，如苏合香丸。

因本品有行气活血之功，也用治气滞之心腹疼痛，可配沉香、木香、丁香等为丸，如安息香丸。

【用量用法】内服0.3~1克，宜入丸散剂。

小结

本类药物芳香走窜，均能开窍醒神，凡窍闭神昏之证，均可适用。其中麝香辛温香窜，开窍之力最大，为治窍闭神昏的良药。并能活血消肿止痛，又为外、伤科要药，不论内服、外用均有显效。兼能催生、下胎，难产、死胎及胞衣不下亦可用。牛黄功能开窍豁痰，息风止痉，为治热病神昏，中风痰迷、癫痫发狂、惊风抽搐等证之要药；并有清热解毒之功，用治痈肿疔毒、咽喉肿烂、牙疳口疮、小儿胎毒等证，内服外敷疗效颇佳。冰片开窍之力次于麝香，常辅助麝香以治窍闭神昏之证；其性微寒，外用有清热止痛、防腐生肌之功，多用于口疮、目赤、咽喉诸疾，是眼、喉科的常用药。石菖蒲亦能开窍，又有和中化湿之功，故用治痰湿蒙闭清窍之神昏、癫狂及湿阻中焦之脘痞不饥、噤口下痢等证。苏合香芳香开窍、辟秽之功与麝香相似，而性偏辛温，寒邪、痰浊内闭者用之相宜。安息香功同苏合香，兼能行气。

此外，本类药物均属辛香耗散之品，不可久服，虚证、脱证及孕妇不宜用。

开窍药功用归纳简表

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
麝香	辛、温	心、脾	开窍醒神，活血散结，止痛、催产	①窍闭神昏 ②疮肿疼痛 ③跌打损伤及痹证肿痛	0.1-0.15克入丸散剂，不入汤剂，外用适量	孕妇忌用

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
牛黄	苦、凉	心、肝	开窍豁痰，息风止痉，清热解毒	①痰迷心窍，神昏谵语 ②肝热生风，惊风抽搐 ③热毒疮疡、咽喉肿烂、牙疳口疮	0.2-0.5克 多入丸、散，不入煎剂	
冰片	辛、苦、微寒	心、脾、肺	开窍醒神，清热止痛，防腐止痒	①神昏惊厥 ②各种疮疡、咽喉肿痛、口疮、目疾	0.03-0.1克 入丸、散，不入煎剂。外用适量	孕妇慎用
苏合香	辛、温	心、脾	开窍辟秽，宁神，开郁化浊	①中风痰厥等寒闭证 ②冠心病心绞痛	0.3-1克 入丸剂，不宜入煎剂	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
石菖蒲	辛、温	心、胃	开窍宁神，化湿豁痰，醒脾开胃	①痰湿蒙闭清窍的神昏、癫痫、健忘、耳鸣 ②脘腹胀闷疼痛	0.3-1克	
安息香	辛、苦、平	心、脾	开窍祛痰，行气活血	中风痰厥	5-8克	

复习思考题

- 1、开窍药主要有什么作用？适用于何种病证？
- 2、试述麝香、牛黄、冰片、石菖蒲的功效和适应证，并加以比较。

第九章 安神药

- 第九章 安神药

〔自学时数〕4学时

〔面授时数〕1学时

〔目的要求〕

1. 了解安神药含义、功效、主要适用证。
2. 熟悉重镇安神药、养心安神药二者在功效、临证应用上的不同点。
3. 掌握重镇安神药中常用药（朱砂 龙骨 磁石 牡蛎）的功效、临证应用，并比较其异同。
4. 掌握养心安神药中常用药（酸枣仁 柏子仁 远志）的功效、临证应用，并比较其异同。
5. 了解重镇安神药的用量、用法特点及注意事项。
6. 在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡具有安神定志功效的药物，称为安神药。

安神药主要适用于心神不安的病证，如心悸怔忡，烦躁失眠，健忘头晕，以及癫痫、惊风等证。

心神不宁之证，每多虚实夹杂。心火亢盛或邪热内扰，及肝阳上亢者，多偏于实；心血或肝阴不足者，多偏于虚，因此在治疗上，根据安神药的性能，又可分为重镇安神药和养心安神药两类。其临床应用须根据病因、病机选用适当的药物并加相应的配伍，如心火亢盛者，配清心药；心血不足者，配滋阴养血药等等。

第一节重镇安神药

本类药物多属于质重的矿石药及介类药，取其重则能镇，重可去怯的作用，以安神定志。其中某些药物还能潜纳浮阳，适用于心、肝火盛，阳气躁动所致的心神不宁，烦躁不安，惊悸失眠以及癫狂惊风等证。当然，临床应用也须作相应的配伍。

朱砂

〔原文〕体阳性阴。内含阴汞。，味甘而凉，色赤属火。性反凉者，离中虚有阴也；味不苦而甘者，火中有土也。**泻心经邪热。**心经血分主药。**镇心清肝，明目发汗，**汗为心液。**定惊祛风，辟邪**胡王少卿多噩梦，遇推官胡用之，胡曰：昔常患此，有道士戴灵砂而验。遂解髻中降囊授之，即夕无梦。**解毒，**胎毒痘毒宜之。**止渴安胎。**《博救方》，水煮一两，研末酒服，能下死胎。李时珍曰：同远志、龙骨之类养心气；同丹参、当归之类养心血；同地黄、枸杞之类养肾；同厚朴、川椒之类养脾；同南星、川乌之类祛风。多服反令人痴呆。辰产，明如箭簇者良。名：箭簇砂。细研，水飞三次用。生用无毒，火炼则有毒，服饵常杀人。恶磁石。畏盐水。忌一切血。郑康成注《周礼》，以丹砂、雄黄、石胆、矾石、磁石为五毒，古人用以攻疡。

【讲解】朱砂能清心经之火，为镇心、安神、定惊要药。为六方晶系天然辰砂矿石。又名丹砂（《本经》）、辰砂（《图经本草》）。主产于湖南、贵州、四川等地。随时可采，去净杂质，劈成片、块状。其片状者称为“镜面砂”，块状者称“豆瓣砂”，碎末者称“朱宝砂”。以色红鲜艳，有光泽，微透光，无杂质者佳。不溶于水，研成细粉，或用水飞法制成极细粉末入药。

本品味甘、性寒、质重。寒能清热，重可镇怯，入心经。善镇降心经之邪热，邪热消除，则心安神定，而为镇心，安神、定惊之主药。故凡心火亢盛的心神不安、惊悸失眠及癫狂等证，均恃为要药。并能清热解毒，又为外科热毒疮疡痈肿常用之品。除内服外，又能外用，并可防腐。

【临证应用】朱砂用于心火亢盛所致的心神不安、烦躁、惊悸失眠，常与清心火药黄连配伍，以增强清心安神之功；若兼有心血虚者，则再加补血养心的当归、地黄等药，共奏养血清心安神之效，如朱砂安神丸。并可与猪心炖服，治心虚惊恐怔忡之证。若与磁石、六曲配伍，如磁朱丸，可治癫痫。用于疮疡肿毒及咽喉肿痛、口舌生疮等，前者与雄黄配伍，如紫金锭；后者可配冰片、硼砂等外用。此外，作丸剂外衣，有防腐作用。

【用量用法】0.3—1克，研末冲服。只入丸散剂，不入煎剂。外用适量。内服不可过量或持续服用，以防汞中毒。忌用火煅，见火则析出水银，更易中毒。

磁石

〔原文〕 辛咸寒，色黑属水，能引肺金之气入肾。补肾益精，除烦祛热，聪耳明目。耳为肾窍，肾水足，则耳聪明目。治羸弱周痹，骨节痠痛，肾主骨。惊痫重镇怯。肿核，咸软坚。误吞针铁，末服。止金疮血。《十剂》曰：重可去怯，磁石铁粉之属是也。《经疏》曰：石药皆有毒，独磁石中和，无悍猛之气，又能补肾益精，然体重渍酒，优于丸散。李时珍曰：一士病目渐生翳，珍以羌活胜湿汤加減，而以磁硃丸佐之，两月而愈。盖磁石入肾，镇养真阴，使神水不外移；朱砂入心，镇养心血，使邪火不上侵；佐以神曲，消化滞气，温养脾胃生发之气，乃道家黄婆媒合婴姁之理，方见孙真人《千金方》，但云明目，而未发出用药微义也。黄婆，脾也；姁女，心也；婴儿，肾也。色黑能吸铁者真，火煅醋淬，碾末，水飞，或醋煮三日夜用。柴胡为使。杀铁消金。恶牡丹。

【讲解】 磁石为潜阳安神之品，并能纳气平喘。为天然的等轴晶系磁铁矿的矿石。能吸铁的习称“灵磁石”或“活磁石”，日久失去磁性不能吸铁者，习称“呆磁石”或“死磁石”。习以能吸铁者为佳。砸碎生用，或火煅醋淬研细用。

本品味辛咸、性寒、质重。入心、肝、肾三经。为镇潜浮阳，摄纳肾气，重镇安神之品。主用于阴虚阳亢之证。肾开窍于耳，肾虚则耳鸣、耳聋；肝开窍于目，肝虚则目暗不明。肝肾阴虚，则肝阳上亢而为头晕、头痛；内扰神明则烦躁不宁，心悸失眠；肾虚不能纳气而致喘逆。本品既能重镇安神，又能潜降浮阳，并能摄纳肾气，故对上述诸证，皆有较好的疗效。前人说本品能“坠炎上之火以定志，引肺肾之气以入骨”。概括说明它有镇降、潜纳、安神的功效。惟金石之品，不宜多用久服。

【临证应用】 磁石用于阴虚阳亢引起的头晕、头痛、耳鸣、耳聋，常与地黄、山萸肉、山药等配伍，如耳聋左慈丸。治烦躁不宁、心悸失眠、癫痫以及视力模糊等症，可与朱砂配伍，如磁朱丸，或磁朱丸再配合滋补肝肾、宁心安神药同用，近年临床报道，用磁朱丸治疗老年性白内障，可使部分病例增进视力。肾虚气喘，宜与五味子、胡桃肉、代赭石等补肾敛肺、降气药同用，以增强降气纳肾之功。

【用量用法】15~30克，打碎先煎。入丸散，不可多服，因不易消化。

龙骨

〔原文〕甘涩微寒。入手足少阴、心肾。手阳明、大肠。足厥阴肝经。能收敛浮越之正气，涩肠益肾，安魂镇惊、辟邪解毒。治多梦纷纭，惊痫疟痢，吐衄崩带，遗精脱肛。利大小肠，固精，止汗，定喘，气不归元则喘。敛疮，皆涩以止脱之义。《十剂》曰：涩可去脱，牡蛎龙骨之属是也。白地锦纹。舐之粘舌者良。人或以古矿灰伪之。酒浸一宿，水飞三度用，或酒煮、酥炙、火煅，亦有生用者。又云水飞、晒干，黑豆蒸过用。否则着人肠胃，晚年作热。忌鱼及铁。畏石膏、川椒。得人参、牛黄良。许洪曰：牛黄恶龙骨，而龙骨得牛黄更良，有以制伏也。

【讲解】龙骨生用以镇惊潜阳为主要功效，煅用又能收敛固涩。为古代哺乳动物，如三趾马、犀类、鹿类、牛类、象类等的骨骼化石。商品有五花龙骨和白龙骨二种，前者全体淡黄白色，夹有兰灰色及红棕色的花纹；后者白色、灰白色或黄白色，无花纹。两者吸湿力均强，以舌舐之有吸力。习以五花龙骨为优。生用或煅用。

龙骨味甘、涩、性微寒，质重。主入心、肝、肾三经。重可镇惊潜阳，涩可收敛固脱。用于心悸、失眠、多梦、健忘、癫狂等证，有重镇安神之功；用于阴虚阳亢之头晕目眩、烦躁易怒等证，有平肝潜阳之效；用于遗精滑精，自汗盗汗，崩漏带下之证，有收敛固脱之能；外用还有生肌敛疮作用，可用于疮疡溃后久不愈合及湿疮流水，金疮出血等证。

【临证应用】龙骨用于神志不安、心悸健忘、失眠多梦及惊痫癫狂等病证，常配龟板、远志、石菖蒲等，如枕中丹；用于阴虚阳亢、虚阳上越所致的烦躁易怒、头晕目眩之证，多与牡蛎、白芍、代赭石等配伍，如镇肝熄风汤；用于肾虚遗精滑精，常与牡蛎、沙苑蒺藜、莲须等同用；用于自汗盗汗，配牡蛎、海螵蛸、山药等；用于妇女崩漏，赤白带下，多与牡蛎、五味子等配伍；若大汗亡阳，则应与附子、人参等同用以回阳救逆，补气固脱。与枯矾研末外用可治疮溃久不愈合，湿疮湿疹流水不止及外伤出血等。

【用量用法】15—30克，入汤剂宜先煎。外用适量。镇惊潜阳宜生用，收敛固涩宜煅用。因具收敛之性，故湿热之证不宜服用。

龙齿

〔原文〕涩凉，镇心安魂，治大人痉癫狂热，小儿五惊十二痫。

《卫生宝鉴》曰：“龙齿安魂，虎睛定魄，龙属木，主肝，肝藏魂，虎属金，主肺，肺藏魄也。治同龙骨。

【讲解】龙齿功似龙骨，而以镇惊安神为主。龙齿与龙骨来源相同，为古代多种大型哺乳动物的牙齿骨骼化石。

龙齿味甘、涩，性凉。入心、肝经。亦为重镇安神之品。适用于癫狂惊痫、心悸心烦、失眠多梦等证。功用与龙骨相似，但龙骨兼能收敛固脱，龙齿无此功。

【用量用法】3-15克，入汤剂宜先煎。

牡蛎

〔原文〕咸以软坚化痰，消瘰癧结核，老血癥瘕；涩以收脱，治遗精崩带，止嗽敛汗，或同麻黄根糖米为粉，扑身，或加入煎剂。固大小肠。微寒以清热补水，治虚劳烦热，温疟赤痢。利湿止渴，为肝肾血分之药。王好古曰：以柴胡引之，去肋下硬，茶引之，消颈核，大黄引之，消股间肿；以地黄为使，益精收涩，止小便利；以贝母为使，消积结。盐水煮一伏时，煅粉用。亦有生用者。贝母为使。恶麻黄、辛夷、吴茱萸。得甘草、牛膝、远志、蛇床子良。海水化成，纯雄无雌，故名牡。

【讲解】牡蛎亦以潜阳镇惊为主要功效，但又能软坚散结，煅用又有同龙骨相似的收敛固涩作用。为牡蛎科动物长牡蛎、近江牡蛎或大连湾牡蛎等的贝壳。采集后去肉取壳，洗净捣碎生用或煅用。

本品味咸，性微寒，质重。入肝、肾二经。性寒质重，而有重镇安神之功，并能益阴补水，平肝潜阳，以治阴虚阳亢，心神不安之证；味咸而涩，又有软坚散结，收敛固涩之效，以治痰火郁结之瘰癧、痰核、肝脾肿大以及体虚滑脱等证。并可用于胃酸过多，胃溃疡的反复作痛，有制酸止痛作用。至于《备要》载治温疟赤痢，有利湿止渴作用，临床罕见使用。

【临证应用】牡蛎用于心神不安之胆怯惊恐、心悸怔忡、失眠多梦等证，常与龙骨、代赭石、龟板、白芍等同用，如镇肝熄风汤；若热病伤阴，肝风内动，四肢抽搐等亦可与龟板、鳖甲、阿胶、白芍等同用，以养阴息风止痉，如三甲复脉汤；用于痰火郁结的瘰癧、痰核，常与降火消痰散郁结的玄参、浙贝母配伍，如消瘰丸。若与柴胡、青皮、丹参、郁金、鳖甲、穿山甲等疏肝理气、活血软坚药同用，可治肝脾肿大，肋下疼痛。本品煅用，又长于收敛固涩，用于虚汗遗精，带下崩漏等证。治自汗盗汗可单用煎服；或与黄芪、浮小麦、麻黄根等配伍，如牡蛎散；治肾虚、精关不固之遗精、滑精，常与沙苑蒺藜、莲须、芡实等同用，如金锁固精丸；治崩漏带下、肾虚冲任不固者，可与阿胶、乌贼骨、川断、山药等同用。用于胃痛反酸可单用冲服，亦可加入和胃止痛药中应用。

【用量用法】 15—30克，入汤剂宜先煎。潜阳、软坚宜生用； 收敛、制酸宜煅用。

紫石英

〔原文〕甘平，性温而补。重以去怯，湿以去枯。入心肝血分，故心神不安、肝血不足、女子血海虚寒不孕者宜之。冲为血海，任主胞胎。《经疏》曰：女子系胞于肾及心包络，虚则风寒乘之，故不孕。紫石英辛温走二经，散风寒，镇下焦，为暖子宫之要药。色深紫莹彻，五棱。火煅醋淬七次，研末水飞用。二英俱畏附子、恶黄连。石英五色，各入五脏。

【讲解】紫石英有镇心定惊、温肺、暖宫的作用。为一种含氟化钙的矿石。打碎生用或煅用。

本品味甘性温，入心、肝经。功能重镇安神而定惊，兼有温肺、暖宫之效。常用于心悸怔忡、惊痫瘕疝及肺虚寒嗽、宫寒不孕等证。

【临证应用】用紫石英镇心安神，治心悸怔忡、惊痫瘕疝时，多配龙齿、牡蛎等同用。用紫石英还可治肺虚寒嗽、痰多喘咳及女子宫寒不孕之症。

【用量用法】10—15克，宜打碎先煎。

金

〔原文〕**辛平有毒**。生金屑，服之杀人。昂按：金性至刚重坠，与血肉之体不相宜，故服之致死，非其性有毒也。人被金银灼者，并不溃烂，无毒可知矣。精金粹玉，世之宝器，岂有毒气哉！**金制木，重镇怯，故镇心肝，安魂魄**，虽云重坠，亦藉其宝气也。古方有红雪、紫雪，皆并金银煮汁，亦假其气耳。治惊痫风热，肝胆之病。肝经风热，则为惊痫失志、魂飞魄扬。肝属木而畏金，与心为子母之脏，故其病同源一治。丸散用箔为衣；**煎剂加入药煮。畏锡、水银**。遇铅则碎，五金皆畏水银。

银功用略同。

【讲解】**金功能镇心安神**。为等轴晶系自然金矿的矿石。多呈颗粒状或树枝状的集合体。颜色金黄，具极强的金属光泽，不透明。入药多锤成纸状薄片，称金箔。

本品气味辛平，入心、肝经。功能镇心安神、解毒，治惊痫、癫狂、心悸及疮毒。

【临证应用】金箔临床上多入丸剂，治心悸、癫痫、发狂等证，如《沈氏尊生书》金箔镇心丸，用天竺黄、朱砂、胆星、雄黄、珍珠等，金箔为衣，治癫痫惊悸、怔忡气郁，一切痰火之疾。《圣惠方》金箔丸，以金箔、甘遂制丸，治小儿食？。耳科用其治聾耳脓水，与白矾等研细掺耳内有效，如《补要袖珍小儿方论》金箔散。

【用量用法】内服入丸、散。一般多作丸药挂衣。外用适量，研末撒。

铁

〔原文〕辛平重坠，镇心平肝，定惊疗狂，消痈解毒。诸药多忌之。 李时珍曰：补肾药尤忌之。畏磁石、皂莢。皂莢木作薪，则釜裂。

煅时砧上打落者名铁落； 《素问》用治怒狂。如尘飞起者名铁精； 器物生衣者名铁镑； 盐醋浸出者名铁华。 李时珍曰：大抵借金气以平木坠下解毒，无他义也。

【讲解】铁能镇心平肝、消痈解毒。为一种灰黑色金属。主要由赤铁矿、褐铁矿、磁铁矿等炼出。打碎生用或烧赤淬用。

本品味辛性凉，入心、肝、肾经。功能镇心平肝、消痈解毒，主治惊痫癫狂、痈毒等证。

【临证应用】铁质重而下沉，多用以镇心平肝，如《方脉正宗》用生铁煮汁饮，治大人小儿惊痫频发。也可取其消痈解毒之功，治小儿丹毒，如《本草拾遗》用淬铁水，饮以治之。

【用量用法】内服，煎汤或烧赤淬酒、水饮。外用，煎水或烧赤淬水洗。

珍珠

〔原文〕甘咸性寒，感月而胎。谚语云：上巳有凤梨有蠹，中秋无月蚌无胎。水精所孕，水能制火，入心、肝二经，镇心安魂。肝藏魂。昂按：虽云泻热，亦藉其实气也。大抵宝物多能镇心安魂，如金泊、琥珀、真珠之类。龙齿安魂，亦假其神气也。坠痰拔毒，收口生肌。治惊热痘疔，下死胎胞衣。珠末一两，苦酒服。涂面好颜色，点目去翳膜，棉裹塞耳治聋。取新洁未经钻缀者，乳浸三日，研粉极细用。不细伤人脏腑。陆佃曰：蛤蚌无阴阳牝牡，须雀化成，故能生珠，专一于阴精也。

【讲解】珍珠具有镇心定惊作用，外用又长于除翳生肌之功。为珍珠贝科动物珍珠贝与蚌科动物三角帆蚌、褶纹冠蚌等双壳类动物受刺激所形成的珍珠。海产的天然珍珠主产于广东、台湾；淡水养殖的珍珠主产于黑龙江、安徽、江苏等地。研末水飞用，或以豆腐同煮二小时，取出捣碎，研成极细粉末用。

本品味甘咸，性寒。入心、肝二经。能清心肝之热，而有镇心定惊，明目去翳之功。外用并能生肌敛疮。用于心神不宁的惊悸、癫痫、惊风，肝热的目赤翳障，以及疮疡久不愈合、咽喉腐烂、牙疳、口疮等证，内服外用，皆有疗效。

【临证应用】珍珠用于惊悸、癫痫，《时后方》与蜂蜜同用，以治心神不安并惊恐之症；用于惊悸、癫痫和高热惊风等证，常与朱砂、琥珀、金箔等重镇安神药同用，能加强镇心定惊之功，如金箔镇心丸；与琥珀、朱砂、天麻等同用，以息风镇惊，如镇惊丸；用于目赤肿痛、翳障胬肉等眼病，主配入眼药中外用，常与冰片、炉甘石等相配，点眼效果很好，如八宝眼药；治溃疡久不愈合，多与血竭、象皮、炉甘石等配合，如《疡医大全》生肌散；若与牛黄同用，名珠黄散，用于咽喉、口腔、肿痛腐烂之证，有较好的疗效。

作膏外涂脸面，能使皮肤光泽，悦颜色。

【用量用法】0.3~1克，主入丸散，不入汤剂。外用适量。

附：珍珠母为产珍珠的蚌或贝类动物贝壳的珍珠层。性味与珍珠相似，专能平肝潜阳，主治肝阴不足、肝阳上亢的头痛眩晕、烦躁失眠等证。目赤目翳也可配用。用量15-30克，宜先煎。外用适量。

琥珀

〔原文〕甘平。以脂入土而成实，故能通塞以宁心，定魂魄，疗癰邪。从镇坠药则安心神。色赤入手少阴、足厥阴心、肝。血分，故能消疲血，破癰瘕，生肌肉，合金疮。从辛温药，则破血生肌。其味甘淡上行，能使肺气下降而通膀胱。经曰：饮食入胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱。凡渗药皆上行而后下降。故能治五淋、利小便、燥脾土。从淡渗药，则利窍行水。然石药终燥，若血少而小便不利者，反致燥急之苦。又能明目磨翳。松脂入土，年久结成，或云枫脂结成，以摩热拾芥者真。市人多煮鸡子及青鱼枕伪之，摩呵亦能拾芥，宜辨。用柏子仁末，入瓦锅同煮半日，捣末用。

【讲解】琥珀以镇惊安神为主要功效，并能活血散瘀，利尿通淋。为古代松科松属植物的树脂，埋藏地层中经久转化而成。从地层或煤层中挖出后，除去砂土等杂质，捣碎研成细粉入药。

本品味甘淡，性平。入心、肝、膀胱经。功专镇惊安神、常用于惊风癰病，心悸不安，失眠多梦等证。故《备要》云能“定魂魄，疗癰邪”。入心肝血分，又善于活血化瘀，用治血滞经闭，癰瘕疼痛，外伤瘀肿以及阴囊或妇女阴唇血肿等证。味甘淡，入膀胱兼能利尿通淋，用于小便不利，癰闭，以及湿热下注所致的热淋、石淋、血淋等证，因其既能利水通淋，又能活血散瘀，并能止血，故尤宜于血淋。

【临证应用】琥珀用于惊风癰病，常与朱砂、全蝎等息风镇痉药同用，以加强疗效。治心神不安、惊悸健忘、失眠多梦，常与朱砂、远志、菖蒲等配伍，如琥珀定志丸。用于瘀血阻滞之证，常与其它活血祛瘀药同用，如治瘀阻经闭、外伤瘀肿疼痛，常与当归、莪术等同用，如琥珀散。用于阴囊及妇女阴唇血肿或子宫瘀血，可单用研末冲服，效很好。若与三七为末服，对于现代医学之“冠心病”，有通行血脉、止痛之效。用于淋病、小便不利，单用有效。如《直指方》治小便尿血，单用为散，灯芯汤下；若用葱白煎汤冲服，可治沙、石诸淋，亦可与金钱草、海金沙、木通等利尿通淋药配伍，以治热淋、血淋等有显效。

琥珀与茯苓，均有安神利尿之功，但琥珀入心肝血分而化瘀，茯苓入脾肺气分而化湿。琥珀多用于心失涵养之心悸不宁，茯苓多用于水气凌心之心悸不宁。

【用量用法】1—3克，研末为散冲服，不入煎剂。

第二节养心安神药

本类药多属植物类药，具有养心滋肝，益阴补血之效。适用于阴血不足，心肝失养所致的心神不安、失眠多梦、心悸怔忡等虚证，故多与养血滋阴之品配伍使用。

酸枣仁

〔原文〕甘酸而润。凡仁皆润。专补肝胆，炒熟酸温而香，亦能醒脾。故归脾汤用之。助阴气，坚筋骨，除烦止渴。敛阴生津。敛汗《经疏》曰：凡服固表药而汗不止者，用枣仁炒研，同生地、白芍、五味、麦冬、竹叶、龙眼肉煎服多效。汗为心液故也，宁心。心君易动，皆由胆怯所致，经曰：凡十一官皆取决于胆也。疗胆虚不眠。温胆汤中或加用之，肝虚则胆亦虚，肝不藏魂，故不寐；血不归脾，卧亦不安。《金匱》治虚劳虚烦不眠，用酸枣仁汤。枣仁二升，甘草一两炙，知母、茯苓、芎藭各二两，深师加生姜二两。此补肝之剂。经曰：卧则血归于肝。苏颂曰：一方加桂一两，二方枣仁并生用，治不得眠，岂得以煮过便为熟乎？痠痹（1）久泻。酸收涩、香舒脾。生用酸平，疗胆热好眠。李时珍曰：今人专以为心家药，殊昧此理。昂按：胆热必有心烦口苦之证。何以反能好乎？温胆汤治不眠，用二陈加竹茹、枳实，二味皆凉药，乃以凉肺胃之热，非以温胆经之寒也，其以温胆名汤者，以胆欲不寒不燥，当温为候耳，胆热好眠四字，不能无疑也。炒研用，恶防己。

【讲解】（1）痠痹：即痹证以肌肉关节痠痛为主要证候者。

酸枣仁具有养心阴、益肝血、而有宁心安神之功，为滋养性安神药。为鼠李科落叶灌木或乔木酸枣的成熟种子。生用或炒用、入汤剂应捣碎。

本品甘酸性平。入心、肝、胆经。既能补营血以安神，又能敛营阴以止汗。故为养心阴、益肝血、安神敛汗之良药，凡阴血不足，心肝失养，虚火妄动，阴液外泄所致的虚烦失眠、心悸怔忡、自汗盗汗、心烦口渴等证，均为常用。至于《备要》载“生用酸平，疗胆热好眠”，据临床实践，不论生用或炒熟用，都有良好的镇静安神作用。还记载本品为坚筋药，可治痹痛和久泻等，现不见用。

【临证应用】酸枣仁为安神之要药，可随配伍应用于多种失眠之证。如心肝血虚引起的失眠多梦、惊悸怔忡，常与当归、白芍、夜交藤等同用；若肝胆血虚而有热之虚烦失眠，心悸汗多者，可配知母、茯苓、川芎等同用，以养血安神，清热除烦，如酸枣仁汤；若肝肾不足，阴虚阳亢之烦躁失眠、梦遗，咽燥便干，或兼虚热盗汗者，配生地、麦冬、丹参、柏子仁等滋养心肾药同用，如天王补心丹；若失眠

健忘、多梦易醒、饮食减少、疲倦无力等，属于心脾气虚者，亦可与黄芪、人参、白术、龙眼肉等同用，如归脾汤。治体虚自汗、盗汗者，常与黄芪、五味子、山茱萸等同用。但失眠系由湿痰邪热所致者。当以化痰清热为主，本品不宜应用。

【用量用法】10—15克，煎服。亦可研末，睡前吞服，每服1.5—3克。

柏子仁

〔原文〕辛甘而润。其气清香，能透心肾而悦脾，昂按，凡补脾药多燥，此润药而香能舒脾，燥脾药中兼用最良。养心气，润肾燥，助脾滋肝。王好古曰：肝经气分药。益智宁神，养心。聪耳明目，甘益血，香通窍。益血止汗。心生血，汗为心液。除风湿，愈惊痫，泽皮肤，辟鬼魅(1)。炒研去油，油透者勿用。畏菊花。

【讲解】(1) 辟鬼魅：魅即鬼怪。辟鬼魅是指能辟除一切致病的邪恶之气。

柏子仁以养心安神为主，兼能润肠通便。为柏科常绿乔木植物侧柏的种仁。冬初种子成熟时采收、晒干。压碎种皮，簸净，生用，或去油用霜。

柏子仁味甘，性平。入心、肝、肾、大肠经。能滋阴养血，而有养心安神止汗之功，对于心血不足之虚烦不眠、惊悸怔忡等证均有效。

《本草求真》谓：“盖香虽能补脾，而实可以通窍而入心；润虽可以补肝而益肾，而实可以宁神而定智。甘虽足以和胃而固中。而实足以益血而神守。”

柏子仁质润多油，又有润肠通便之效，可用治阴虚血少的肠燥便秘。

【临证应用】《备要》言“除风温”、“辟鬼魅”之作用，临床较少应用。柏子仁养心安神，主用于心血不足、神志不宁、虚烦不眠、惊悸怔忡、记忆衰退等证，常与枣仁、当归、茯苓、五味子等同用，如养心汤。柏子仁的养心安神功效与酸枣仁相类似，但酸枣仁长于养肝胆而安神，多用于肝胆虚之失眠；柏子仁长于养心血而安神，多用于心血虚之失眠。然心肝均与血有关，如肝血不足，每易影响及心，而心血不足，也能影响及肝。因此，心肝两虚的惊悸失眠，二药常相须为用。若治盗汗，又可与人参、牡蛎、五味子等同用，如柏子仁丸。

柏子仁质润多脂，常与其它种子类药桃仁、杏仁、郁李仁等同用，以加强其润下通便之功，如五仁丸。

【用量用法】10 —15克，煎服，或入丸剂。因本品质润多脂，故便溏及多痰者慎用。

远志

〔原文〕苦泄热，温壮气，辛散郁。主手少阴。心。能通肾气上达于心。强志益智，补精壮阳，聪耳明目，利九窍(1)，长肌肉，助筋骨，治迷惑善忘，惊悸梦泄(2)，能交心肾。李时珍曰：远志入足少阴肾经，非心经药也。强志益精，故治健忘，盖精与志，皆藏于肾，肾精不足，则志气衰，不能上通于心，故健忘梦泄也。肾积奔豚(3)，一切痈疽。酒煎服。《经疏》曰：痈疽皆属七情忧郁惟怒而得。远志辛能散郁。昂按：辛能散郁者多矣，何独远志。《三因方》曰：盖亦补肾之力耳。缪沃雍著《本草经疏》。去心，甘草水浸一宿用。畏真珠、藜芦。得茯苓、龙骨良。

【讲解】(1)九窍：即头部之口、眼、耳、鼻七窍及前、后阴。(2)梦泄：即梦遗，指梦中交媾而精液遗泄的病证。(3)奔豚：指病人自觉有气从少腹向上攻冲，乍作乍止。因其气上冲胸咽如豚之奔突，故称奔豚。多由肾阳虚，寒水之气上冲而成。

远志以宁心安神为主要功效，又兼能祛痰开窍。为远志科多年生草本植物远志或宽叶远志的根。采根后去泥土、残茎，洗净晒干，抽去木质心(远志筒)，生用或炙用。用抽出木质心的远志与甘草同制为炙远志。历代本草还都记载本品去心入药，以免发烦。

本品辛苦、微温。归心、肾、肺经。有苦泄辛散温通之效，能助心阳，益心气，使肾气上交于心，而有交通心肾之能。并可祛痰湿。痰湿去，心肾交，则神清智慧，而有安神益智之功，且有化痰止咳之效。故凡痰湿内阻之神昏、惊悸、健忘、失眠以及肺寒痰饮咳嗽等证，皆可用之。痈疽疮毒，内服外用也均有效。

【临证应用】远志用于心神不安、惊悸、失眠、健忘等证，尤以挟痰者多用，常配朱砂、酸枣仁、龙齿等同用，如远志丸；若与菖蒲、茯苓、人参等同用，如不忘散，治迷惑善忘；对痰阻心窍所致的精神错乱、神志恍惚；惊痫等证多与菖蒲、郁金、白矾等同用。此外，以其利气血，化痰浊，疏通壅滞之功，治痈疽疮毒，属寒凝气滞、痰湿阻络者尤为有效。可单用为末酒调服，或外用敷患处。本品又可用治咳嗽痰多，难以咯出者，常与杏仁、桔梗、甘草等同用。

【用量用法】 3—10克，煎汤或入丸散服。外用适量。现在研究，远志主含远志皂甙。可刺激胃粘膜而反射性地引起轻度恶心，故素有胃炎、溃疡病者应慎用。

合欢皮

〔原文〕甘平。安五脏，和心脾，令人欢乐忘忧。和血止痛，明目消肿，续筋骨、长肌肉。得酒良。

【讲解】合欢皮功以解郁安神为主，兼能活血消肿止痛。为豆科落叶植物合欢或山合欢的树皮。切段生用。花亦供药用。本品味甘性平，入心、脾经。功能调和心脾，解郁安神。盖心为一身之主，脾为生化之源，二脏调和，则五脏自安，精神自畅，故有“合欢蠲忿”之说。适用于情志所伤，忿怒忧郁，烦躁不安，健忘，失眠等证。《备要》谓“令人欢乐忘忧”，“合欢”之名由此而得。此外，本品文能活血消肿，续筋接骨，无论外疡内痈，跌打骨折以及痈肿等证，用之有效。其花能解郁安神，在安神剂中，常作为辅助药用。

【临证应用】合欢皮用于忧郁忿怒、烦躁、失眠、健忘等证，可单用，亦常与酸枣仁、柏子仁、龙骨等同用。用于肺痈，多配白蔹，如合欢饮；治痈肿疮疡，常与金银花、蒲公英、野菊花等同用；治筋骨折伤、瘀血肿痛，可与桃仁、红花、乳香、没药等同用。

【用量用法】10~15克，煎服。

附：合欢花功用与皮相同，长于安神解郁，主用于虚烦不安，抑郁不舒，健忘失眠等证。用量5—10克。

小结

安神药可分为重镇安神药和养心安神药两种。

重镇安神药多为金石和介类质重性降之品，能镇惊潜阳，多用于心神不宁、阳气躁动之证。其中朱砂、琥珀主要作用于心经，镇心安神之力量较强，常用于惊悸、癫狂、烦躁失眠等证。朱砂兼能解毒疗疮，琥珀兼能活血通淋，血淋癃闭用之有效。

磁石、龙骨、牡蛎三药主要作用于肝，不仅可镇惊安神，又能潜敛浮阳。烦躁易怒、失眠多梦、头痛眩晕、耳鸣耳聋等肝阳上亢、心神不安之证，皆可配伍应用。其中，磁石兼入肾经，具有聪耳明目、纳气归肾之效，为眼、耳疾病常用之品；龙骨、牡蛎生用偏于重镇安神，而治阴虚阳浮之证，煅用偏于收敛固涩，以治遗精带下，自汗盗汗等证，二者相比，龙骨镇惊安神之功较强，牡蛎养阴潜阳之力较胜，并能软坚散结。龙齿功近龙骨，而长于镇心安神。紫石英主镇心定惊。

珍珠母亦入心、肝二经，具有平肝潜阳、镇心安神之功，造用于肝阳上亢的头痛头晕及心神不宁，烦躁失眠等证，兼能明目消翳，治目昏翳障。珍珠亦能明目除翳，还有较强的解毒敛疮作用，为眼科、外科常用药。金、铁以镇心为用，治心悸癫痫。

养心安神药，有滋养宁神作用，以治阴虚血亏所致的心悸、眩晕、失眠多梦、虚烦健忘之证。其中酸枣仁养肝胆以安神，益阴以止汗，为治虚烦不眠、惊悸健忘之良药。柏子仁养心以安神，润肠以通便，治血不养心的心悸失眠和阴虚血少的肠燥便秘。远志祛痰利窍，能交通心肾，以治痰阻心窍、心神不安、惊悸健忘以及痰多咳嗽等证为宜；合欢花善于解郁安神，用于忿怒忧郁之失眠、虚烦不安者。合欢皮则以活血止痛，治骨折痈肿为主。

安神药功用归纳简表

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
重镇安神药	朱砂	甘、寒	心	镇心安神，清热解毒	①心神不安、心悸不眠 ②疮疡肿毒、咽喉肿痛	0.3-1克 研末冲服或入丸散。外用适量	不宜过服用，也不可持续服用。忌用火煅

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	磁石	辛、咸、寒	肝、心、肾	潜阳安神，聪明耳目，纳气平喘	①心神不安，心悸失眠 ②肝阳上亢，头痛、眩晕、耳鸣 ③肾不纳气的虚喘	15—30克	打碎先煎
	龙骨	甘、涩、微寒	心、肝、肾	平肝潜阳，镇惊安神，收敛固涩	①心神不安、惊悸、失眠、癫狂 ②肝阳上亢，头晕	15—30克打碎先煎外用适量	平肝安神生用，敛疮煅用。龙齿有镇惊安神作用，

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
					耳鸣 ③遗精带下、虚汗崩漏 ④湿疮、疮溃不敛		适用于心悸、失眠、惊痫等证。用量与龙骨同，
	牡蛎	咸、微寒	肝、肾	重镇安神，平肝潜阳，软坚散结，收敛固涩	①肝阳上亢，头晕目眩 ②心悸失眠 ③虚汗、遗精、带下、崩漏 ④瘰	15-30克	入汤剂先煎平肝散结生用，收涩煅用。

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
					疔、痰核		
	珍珠母	咸、寒	肝、心	平肝潜阳，镇心安神，明目消翳	①肝阳上亢，头晕目眩②心悸失眠③肝虚目虚或肝热目赤	15—30克 外用适量	宜先煎

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
重镇安神药	珍珠	甘、咸、寒	心、肝	镇心定惊，清肝除翳，收敛生肌	①惊悸、癫痫、惊风 ②目赤肿痛、翳障、胬肉 ③疮疡、咽喉肿痛	0.3—1克多入丸散外用适量	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	琥珀	甘、淡、平	心、肝、膀胱	镇惊安神，利尿通淋，活血散瘀	①惊风、癫痫、心悸、失眠 ②小便不利、淋沥涩痛 ③经闭癥瘕	1—3克研粉冲服	
	紫石英	甘、温	心、肝、肺	重镇安神，温肺暖宫	①心悸怔忡②宫寒不孕 ③肺虚寒嗽	10—15克	打碎先煎
	金	辛、平	心、肝	镇心安神	惊痫癫狂	作丸药衣	先煎
	铁	辛、凉	心、肝、	镇心平肝	惊痫癫狂		

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			肾				

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
养心安神药	酸枣仁	甘、酸、平	心、肝、胆	养心安神，益阴、汗	①心悸怔忡、虚烦不眠 ②阴虚盗汗③心烦口渴	10-15克 研末冲服 每次1.5-3克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	柏子仁	甘、平	心、肝、肾、大肠	养心安神，润肠通便	①心悸怔忡、虚烦不眠 ②肠燥便秘	10-15克	
	远志	辛、苦、微温	心、肾、肺	宁心安神，祛痰开窍，消痈肿	①惊悸、失眠健忘 ②痰蒙心窍、神昏、惊痫 ③痈肿疮毒 ④痰多咳嗽	3-10克	溃疡病及胃炎患者慎用
	合欢皮	甘、平	心、脾	安神解郁，活血消肿	①虚烦不安、健忘失眠	10-15克	合欢花只用于安

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
					②跌打损伤、 痈肿		神、 解郁

复习思考题

1. 安神药主要作用是什么？适用于哪些证候？
2. 试述朱砂、磁石、龙骨、牡蛎、琥珀、酸枣仁、柏子仁、远志的功效及临床应用。

第十章平肝息风药

- 第十章平肝息风药

〔自学时数〕6学时

〔面授时数〕2学时

〔目的要求〕

1. 了解平肝息风药含义、功效、主要适用证。
2. 熟悉平肝息风药与清热泻火、化痰、养血、滋阴、滋补肝肾等药配伍应用的理论依据（联系中医基本理论）
3. 掌握平肝息风药中常用药（羚羊角 石决明 代赭石 钩藤 天麻 全蝎）
4. 联系蝉蜕、牛黄、白花蛇、天南星、白附子等具有止痉作用的药物，了解本章以外的止痉药，扩大知识面。
5. 在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡是具有平降肝阳、息风止痉作用的药物，称为平肝息风药。

本类药物主入肝经，以平息内风为主要功效，分别具有平肝、潜阳、息风、止痉等作用，适用于肝阳上亢的眩晕，头痛及肝风内动的惊痫、抽搐等证。临床运用时，应根据辨证施治的原则予以不同的配伍，如高热引起者，配清热泻火药；因风痰引起者，配以化痰药；由阴虚血少引起者，则应与滋补肝肾药配伍。

本类药物性能各有不同，应区别使用。如其中有些药物偏寒凉，脾虚慢惊者，则非所宜；而又有一些药物性偏燥，血虚阴伤者又宜慎用。

羚羊角

〔原文〕苦咸微寒。羊属火，而羚羊属木。入足厥阴、肝。手太阴、少阴肺、心经。目为肝窍，此能清肝，故明目去障；肝主风，其合在筋，此能祛风舒筋，故治惊痫搐搦，骨痛筋挛；肝藏魂，心主神明，此能泻心肝邪热，故治狂越僻谬，梦魇惊骇；肝主血，此能散血，故治瘀滞恶血，血痢肿毒；相火寄于肝胆，在志为怒，经曰：大怒则形气绝，而血菀于上，此能下气降火，故治伤寒伏热，烦懣气逆，食噎不通；羚羊之性灵，而精在角，故又辟邪而解诸毒。昂按：痘科多用以清肝火，而本草不言治痘。出西地，似羊而大，角有节、最坚劲，能碎金刚石与獬骨(1)。獬音麦，能食铁。夜宿防患，以角挂树而栖。角有挂纹者真。一边有节而疏，乃山驴、山羊，非羚羊也。多两角，一角者胜。锉研极细，或磨用。

【讲解】(1)摸：[mo模]哺乳动物，产于热带地区，肉可以吃。亦名印度獬。

羚羊角善清肝火，为息风止痉、明目之佳品。为洞角科动物赛加羚羊的角。角呈长圆锥形，略有弓形弯曲，白色或黄白色。除尖端部分外，有10—20个隆起的轮脊，角尖部光圆，光润如玉。基部圆形，有骨塞名“羚羊塞”，将骨塞除去后，角之下半段为筒形、中空，有细孔直通尖端，习称“通天眼”，近光可透视，为羚羊角的主要鉴别特征。质坚硬。产于新疆。镑为薄片，或锉末入药，或磨汁冲服。

本品味苦咸性寒，主入肝经，兼入心、肺二经。肝主风，开窍于目而藏血，其合为筋。羚羊角善泻肝火，而有息风止痉、明目之功。用治热盛风动之惊风、癫痫，手足抽搐，及肝火亢盛之目赤翳障、头痛眩晕等证。对温热病高热神昏、谵语狂躁，或热毒发斑等，也有效验。然究为咸寒泄降之品，无火热者不宜用。

【临证应用】羚羊角用于壮热不退、热极动风之证，常与钩藤、白芍、菊花等同用，如羚羊钩藤汤；用于肝火炽盛的头痛目赤，常与龙胆草、决明子、黄芩同用，如羚羊角散；若阴虚、肝阳上亢而致头晕目眩，可与石决明、菊花等配伍，以加强平肝潜阳之功。用于温热病

高热烦躁、神昏谵语、痉厥抽搐，以及热毒发斑等症，则每与犀角、石膏等同用，如羚羊白虎汤。

羚羊角与犀角皆为咸寒之品，在温热病中，二药常同用。然羚羊角以入肝为主，清肝火而善于息风止痉；犀角以入心经为主，泻心火而善于凉血解毒。故见神昏者，多用犀角，而神昏兼痉厥者，则需犀、羚合用。故前人云：“在肝之病，必用羚羊，亦犹在心之病，必用犀角也。”

【用量用法】1—3克。入汤剂宜另煎冲服；锉末或磨汁服，每次0.3—0.6克。

本品价格昂贵，现有山羊角代用者，功效与羚羊角大致相似，但作用较弱，剂量须加大，常用至10—30克。

石决明

〔原文〕咸平。除肺肝风热，青盲内障，水飞点目外障。亦治骨蒸劳热，通五淋，能清肺肝故也，古方多用治疮疽。解酒酸。为末，投热酒中即解。如蚌而扁，唯一片无对，七孔九孔者良。盐水煮一伏时，或面裹煨熟，研粉极细水飞用。恶旋覆花。

【讲解】石决明以平肝潜阳为主要功效，并能清肝明目。为鲍科动物杂色鲍（光底海决）或盘大鲍（毛底海决）的贝壳。系单一坚厚的贝壳，呈椭圆形。体螺层中部开始至体螺层边沿，有30多个突起小孔，前端突起小而不明显，末端7—9个特大，且开孔和内部相通，故有“九孔石决”之名。打碎生用或煨用。

本品味咸性微寒，质重。主入肝经。善清肝火，且可养阴，而为镇肝潜阳、平肝息风之要药。肝开窍于目，肝经有热、风火上炎所致目赤肿痛、青盲翳障、头痛眩晕，以及肝肾阴虚、浮阳上扰等证，石决明均为常用之品。兼能清虚热，故可用治骨蒸劳热之证。

【临证应用】石决明用于肝肾阴虚、肝阳上亢之头晕目眩，常与养阴平肝药生地、白芍、牡蛎等同用，若阳亢而有热象者，则宜与清热平肝药钩藤、菊花、夏枯草等同用。用于目赤肿痛、青盲翳障、视物模糊等证，如系肝火上炎而目赤肿痛，可配龙胆草、决明子、菊花等清肝明目药同用；若为风热目疾，翳膜遮睛，可与穀精草、桑叶、蝉蜕等疏散风热明目药同用；肝肾阴虚，视物模糊者，可与地黄、枸杞子、菟丝子等滋养肝肾药同用。若与茺蔚子、车前子、苍术、密蒙花等配伍，治青盲内障有良效。至于《备要》云通五淋、解酒酸之说，今少见应用。

【用量用法】10—30克，入煎剂宜先煎。清肝平肝生用内服，眼疾外用则宜煨、研末水飞用。

贝子

〔原文〕咸平。利水道，散结热，点目翳。

【讲解】贝子为平肝潜阳药，兼能镇惊安神。贝子，又名贝齿，《雷公炮炙论》名贝齿。系宝贝科动物阿拉伯绶贝的贝壳。除去贝肉，打碎生用或煅用。

本品味咸性平，质重，入肝经。为介类平肝潜阳药，并能镇惊安神，又有清肝明目作用。可用于小儿惊风抽搐以及惊悸失眠等症，亦可用于肝热目疾。内服外用均可。《备要》言“利水道”的功用，临床较少应用。

【临证应用】贝子用于惊风抽搐及心悸失眠之证，前者常与钩藤、僵蚕、全蝎等用；后者多与珍珠母、朱砂等同用。治目赤肿痛、目翳遮睛，以及眩晕头痛等证，可与菊花、夏枯草、决明子等同用，或与珍珠、冰片研成细末点眼，如贝齿散。

【用量用法】10—15克，入汤剂宜先煎。煅后研成极细末；可外用点眼。

代赭石

〔原文〕苦寒。养血气，平血热。入肝与心包，专治二经血分之病，吐衄崩带，胎动难产，小儿慢惊，赭石半钱，冬瓜仁汤调服，金疮长肉。张仲景治伤寒，汗吐下后，心下痞硬噎气，用旋覆代赭汤(1)。取其重以镇虚逆，赤以养阴血也。今用治膈噎甚效。煅红醋淬，水飞用。干姜为使。畏雄、附。

【讲解】(1)旋覆代赭汤：原作“代赭旋覆汤”，据《伤寒论》辨太阳病脉证并治法下乙转。

代赭石功专平肝潜阳、降逆、止血。为三方晶系赤铁矿的矿石。打碎生用，或火煅醋淬用。

本品味苦性寒质重，寒能泄热、重主镇降。入肝、心血分。故有平肝潜阳、清热泄火、重镇降逆、凉血止血之功。对肝阳上亢的头痛、眩晕，气逆不降的噎气、呃逆、呕吐及气喘，血热妄行之吐、衄血及崩漏、带下等证；都有较好的疗效。《备要》云本品可治“胎动难产”，既能安胎，又能下胎治产难、胞衣不下。但据其功效，毕竟是苦寒重降之品，故虚寒证及孕妇均不宜用。小儿慢惊也少应用。

【临证应用】代赭用于头痛眩晕，常与龙骨、牡蛎、白芍、牛膝等同用，以治肝阳上亢之证，如镇肝息风汤；用于噎气、呃逆、呕吐等证，常与旋覆花、半夏、生姜等配伍，如旋覆代赭汤；若肺肾虚的气逆喘息，可与党参、山茱萸、山药、苏子等补肺纳气药同用，如参赭镇气汤；用于吐血衄血，可与生地、白芍、茜草根、侧柏叶等同用；治崩漏带下，可单用煅赭石为末服。本品亦可煅研外敷，以治创伤出血。

【用量用法】10—30克，煎服。外用适量。

钩藤钩

〔原文〕甘微苦寒。除心热，平肝风。治大人头旋目眩，小儿惊啼瘈瘲（1），音炽纵。筋急而缩为瘈，筋缓而弛为瘲，伸缩不已为瘈瘲，俗谓之搐搦是也。客忤（2）胎风（3），发斑疹，主肝风相火之病，风静火息，则诸证自除。相火散行于胆、三焦、心包。有刺，类钩钩。藤细多钩者良。纯用钩其功加倍。久煎则无力。

【讲解】（1）瘈瘲：指筋肉抽搐，俗称抽风。（2）客忤：多指小儿骤见生人或闻异声，突见异物而引起惊吓啼哭，状似惊痫之证。（3）胎风：婴儿触冒风邪或因断脐感染而引起的壮热呕吐、精神不宁、睡易惊醒、手足抽掣等证。

钩藤有清肝息风、平肝止痉之效。为茜草科常绿木质藤本植物钩藤及其同属多种植物的带钩茎枝。故又称钩藤钩。有单钩和双钩两种，习以为双钩者佳。原药生用。

本品味甘而性微寒，为肝、心包二经之药。肝主风，心包主火，凡肝风内动、心火上炎，风火相煽而病惊风抽搐、头巨眩晕者，可以此清心泄火、平肝息风，故有清热、息风、止痉、平肝之功，为热极生风之抽搐及肝阳上亢之眩晕头痛、目赤等证所常用。对小儿惊风初起尤为相宜。

【临证应用】钩藤用于惊痫抽搐，多与天麻、石决明、全蝎等配伍；热重者，可加羚羊角、龙胆草、菊花等。对肝阳上亢的头晕、目眩等证，可与天麻、石决明等伍用，如天麻钩藤饮。现代研究本品具有降压作用，可用于高血压病而属肝热阳亢者疗效颇佳。

【用量用法】10—15克。入煎剂宜后下；不宜久煎，以免药效降低。

天麻

〔原文〕辛温，入肝经气分。益气强阴，通血脉，强筋力，疏痰气。治诸风眩掉（1），头旋眼黑，语言不遂，风湿？音顽。痹（2）小儿惊痫。诸风掉眩，皆属肝木。肝病不能荣筋，故见前证，天麻入厥阴而治诸疾，肝气和平，诸疾自疗。血液衰少及类中风（3）者忌用。风药能燥血故也。昂按：风药中须兼养血药，制其燥也，养血药或兼搜风药，宣其滞也。古云：治风先治血，血行风自灭。根类黄瓜，茎名赤箭。有风不动，无风反摇，一名定风草。明亮坚实者佳。湿纸包煨熟，切片，酒浸一宿焙用。【讲解】（1）眩掉：即掉眩。指肝风所致的眩晕、头摇或肢体震颤。（2）？痹：？（wan顽）痹也。即手足麻痹。（3）类中风：指风自内而生，而非中风邪的中风病证。

天麻为息风止痉要药。为兰科多年生寄生草本植物天麻的块茎。原名赤箭，因其茎如箭杆、色赤。以其功用而言，古又称定风草。春季植株出芽时挖出者名“春麻”，质量较差；冬季茎枯时挖出者为“冬麻”，质量较好。挖出的天麻，要擦去外皮，洗净煮透，压平、烤干，用时润透切片。以半透明、质坚实者为优。晒干生用。

本品味甘性平，质润。专入肝经。有平肝、息风、止痉的功效。凡眩晕，抽搐，以及肢体麻木、手足不遂等一切肝风内动之证，皆可平息。此外，又能祛湿、止痹痛，治风湿痹痛。

《备要》言本品辛温乏性，验之临床，其性甘平，故辛温之说可不从。

【临证应用】天麻性平，治肝风内动、惊痫抽搐，不论寒证、热证皆可配用。治小儿热极生风之急惊风，可配钩藤、羚羊角、全蝎等，如钩藤饮；治小儿慢惊，则以本品配人参、白术、僵蚕等同用，如醒脾散。治破伤风，痉挛抽搐，常配南星、白附子等药，如玉真散。对于肝阳上亢所致眩晕、头痛，最为常用，多与川芎同用，如天麻丸。至于风痰上扰的眩晕，亦可配伍半夏、茯苓、白术等同用，如半夏白术天麻汤。总之，本品甘润性平力缓，单用效力不强，惟据虚实寒热适

当配伍，疗效才佳。风湿痹痛、主配祛风湿的羌活、秦艽、桑寄生等用。

【用量用法】 3—10克，煎服。研末吞服每次1-1.5克。

蚯蚓

〔原文〕蚓土德而星应轸水。味性咸寒，故能清热；下行故能利水。治温病大热狂言，大腹黄疸，肾风脚气。苏颂曰：脚气必须用之为使。白颈者乃老蚯蚓。治大热，捣汁井水调下。入药或晒干为末，或盐化为水，或微炙，或烧灰、各随本方。中其毒者，盐水解之。张将军病蚯蚓咬毒，每夕蚓鸣于体，浓煎盐水浸身，数过而愈。

蚯蚓泥即蚯蚓屎甘寒，泻热解毒。治赤白久痢，敷小儿阴囊热肿，肿腮丹毒。

【讲解】地龙善清肝热，功专息风止痉，并能通络、平喘、利尿。蚯蚓即地龙，为巨蚓科环节动物参环毛蚓和缟蚯蚓的干燥全体。前者主产广东、广西、福建等地，商品称广地龙；后者全国各地均有分布，商品称土地龙。广地龙全体较大，由多数环节组成。自第二节起每节有刚毛，成环状排列，背部紫灰色，腹部较淡，前端有一环节（刚毛圈）色稍白，习称“白颈”，体壁较厚，均已剖腹，洗净体内泥土。土地龙环节多不明显，多不剖腹，腹内充满泥土。晒干，生用或鲜用。

本品味咸性寒，入肝、肺、肾三经。咸寒降泄，下行走窜，善清肝热，有息风止痉之功，以治热盛动风之证，又长于通络，治痹证肢体屈伸不利及半身不遂；且能平喘利水，对肺热喘咳，热结尿闭等症，亦有良效。至于治黄疸腹水以及脚气等属于热性者，配相应药物也可应用。此外，对于高血压、痲腮、丹毒、下肢痲疽，以及风疹瘙痒等，均有一定疗效。然性寒之品，脾胃虚寒者慎用。

【临证应用】地龙用于壮热狂躁、惊风抽搐，可单用或入复方应用。如《本草拾遗》治热狂癫痫，即以本品盐化为水饮服；《摄生众妙方》治小儿惊风，即本品去泥焙干为末，加朱砂粉，糊为丸服。现多与石膏、大青叶、钩藤、全蝎等清热息风药同用。亦有用鲜蚯蚓洗净加白糖化水饮服，治疗癫狂。用于痹证，尤以热痹之关节红肿热痛、屈伸不利者最为适宜，因其性寒通络，常与秦艽、防己、忍冬藤、桑枝等配伍。但与川乌、草乌、南星等热性祛风止痛药配伍，亦可治寒

湿痹证，肢体屈伸不利等证，如小活络丹。又能用治气虚血瘀，经络不利所致的半身不遂，常与黄芪、当归、川芎、红花等配伍，如补阳还五汤。用于痰鸣喘息，现代科学研究，本品有扩张支气管而平喘的作用，可单用研末服或与麻黄、杏仁等同用。又可治百日咳，用鲜地龙水煎后去渣，加冰糖熬膏冲服。治热结膀胱，小便不利及热淋、石淋等证，多与车前子、金钱草、海金沙、川牛膝等配伍。用于高血压以肝阳上亢型为宜，常与夏枯草、黄芩、决明子、菊花等配伍。本品与白糖捣烂，涂敷疮腮、丹毒、下肢溃疡烫伤等，亦有良效。

【用量用法】 5—10克，煎服。鲜品可加大至20—40克。干粉吞服。每次1—3克。外用适量。

僵蚕

〔原文〕辛咸微温。僵而不腐，得清化之气，故能治风化痰，散结行经。蚕病则僵，故因以治风，能散相火逆结之痰。其气味俱薄，轻浮而升，入肺肝胃三经，治中风失音，头风齿痛，喉痹咽肿，炒为末，姜汤调下一钱，当吐出顽痰，丹毒瘙痒，皆风热为病，瘰癧结核，痰疟血病，崩中带下，风热乘肝，小儿惊疳（1），肤如鳞甲，由气血不足，亦名胎垢，煎汤浴之。下乳汁，灭瘢痕。若诸证由于血虚而无风寒客邪者勿用。以蚕头色白条直者良，糯米泔浸一日，待桑涎浮出，漉起焙干，拭净肉毛口甲捣用。恶桑螵蛸、茯苓、茯神、桔梗、萆薢。

蚕茧甘温。能泻膀胱相火，引清气上朝于口，止消渴。蚕与马，并属午，为离，主心。作茧退藏之际，故缲丝汤饮之，能抑心火而治消渴。痈疽无头者，烧灰酒服。服一枚出一头，二枚出二头。

雄蚕蛾气热性淫，主固精强阳，交接不倦。蚕退纸烧存性，入麝少许，蜜和，敷走马牙疳，加白矾尤妙。《百一方》蚕纸烧灰，酒水饮下，能治邪祟发狂悲泣。

【讲解】（1）惊疳：又名心疳。为五疳之一。证因心经郁热，出现面黄额赤，壮热烦躁，口舌生疮，小便赤涩，盗汗或虚惊。以清心泻热为治。

白僵蚕功专祛风化痰，既能息内风以止痉，又能散外风以泄热，并能化痰散结。为蚕蛾科昆虫家蚕的幼虫在未吐丝前，因感染白僵菌而发病致死的僵化虫体。晒干生用，或铁皮炒用。

本品味辛咸，性平。主入肝经，兼入肺、胃。辛能发散，咸省旨软坚，为祛风化痰之品。既能平息内风以止痉，又能祛除外风以泄热，且善化痰以散结。其所主治病证，可概括为风与痰两个方面，故肝风内动或痰热壅盛的惊痫抽搐；风热头痛，咽喉肿痛，风火牙痛；风疹瘙痒，中风口喎，以及瘰癧痰核等证，均有一定的疗效。本功主消散而无补益之功，故血虚而无风者忌服。

僵蚕祛风止痉之功，颇与蝉蜕相似，治肝肺风热之证，二者常相须配用，以加强疗效。但蝉蜕体轻，功偏透疹退翳；僵蚕质重，功偏化痰

散结。此为两者之异。

【临证应用】白僵蚕用于小儿急惊，痉孪抽搐，常与全蝎、天麻、胆南星等同用，如千金散；若属脾虚久泻，慢惊抽搐，又当配党参、白术、天麻等同用，如醒脾散；治中风口眼喎斜，面部肌肉抽动，可与全蝎、白附子等同用，如牵正散。用于风热头痛，迎风流泪，可配荆芥、桑叶、木贼等同用。如白僵蚕散；治风热喉痛，则与桔梗、甘草等同用，如六味汤。用于瘰癧痰核、疔腮、丹毒等证，《外台秘要》单味研末服，若配浙贝母、夏枯草、连翘等则效更佳若与蝉蜕、薄荷、浮萍等同用，可治风疹瘙痒，共奏祛风止痒之功。

【用量用法】 5—15克，煎服。散剂每次1-3克。散风热宜生用，一般多炙用。

附：蚕茧 即家蚕蛾的茧壳。味甘性温，功能止血疗疮，治便血、尿血、血崩及疮痈等证。

雄蚕蛾 即家蚕蛾的雄性全虫。味咸性温，入肝、肾经。功能补肝益肾、壮阳涩精，主治阳痿、滑精。

全蝎

〔原文〕辛甘有毒。色青属木，故治诸风眩掉，皆属肝木。惊痫抽搐，口眼喎斜，白附、僵蚕、全蝎等分为末，名牵正散。酒服二钱甚效。疟疾风疮，耳聋带疵，厥阴风木之病。李东垣曰：凡疝气带下，皆属于风。蝎乃治风要药，俱宜加而用之。汪机曰：破伤风，宜以全蝎、防风为主。类中风、慢脾惊属虚者忌用。全用去足焙，或用尾，尾力尤紧。形紧小者良。人被螫者，涂蝎牛即解。

【讲解】全蝎功专息风止痉，并能攻毒散结，通络止痛。为钳蝎科动物东亚钳蝎的干燥全体。如单用尾（后腹部），称为“蝎尾”，又名“蝎梢”。晒干或微火焙干用。

本品辛平有毒，主入肝经。具良好的息风止痉功效，为治痉挛抽搐之要药。因属性平，故急慢惊风，不论热证、寒证均可随证配伍，颇有良效。又能攻毒散结、通络止痛，用治偏正头痛、关节痹痛以及瘰癧疮毒等证，功效亦佳。惟辛散有毒，血虚生风者慎用。以研末吞服效强。习认为蝎尾力大，现大多全用，而效力并无显著不同。

【临证应用】全蝎用于急慢惊风，口眼喎斜，破伤风等痉挛抽搐之证，常与蜈蚣相须为用，以加强息风止痉之功，如止痉散。用于急惊风，可与羚羊角、钩藤、天麻等同用，如钩藤饮；脾虚慢惊，则与补脾益气之党参、白术、天麻等同用，如醒脾散；用于中风口眼喎斜，常与僵蚕、白附子同用，即牵正散；治破伤风，多与天南星、蝉蜕、僵蚕等配伍，如五虎追风散。用于偏正头痛、风湿关节挛痛，可单用研末温酒调服，即能见效，亦可与蜈蚣、僵蚕、制川乌等制成散剂冲服，则效更佳。用于疮疡肿毒、瘰癧结核以及疔腮等证，可与山栀、蜂蜡等制膏外敷，如全蝎膏。

【用量用法】2—5克，煎服。研末吞服，每次0.6—1克，以散剂效良，外用适量，研末或油涂敷患处。

蜈蚣

〔原文〕辛温有毒。入厥阴肝经。善走能散，治脐风撮口（1）灸末，猪乳调服，惊痫瘰癧，蛇瘕（2）能制蛇。疮甲（3）。趾甲内恶肉突出，俗名鸡眼睛，蜈蚣焙研敷之，以南星末醋调敷四围。杀虫堕胎。取赤足黑头者，火炙，去头足尾甲，将荷叶火煨用，或酒炙。畏蜘蛛、蜒蚰、不敢过所行之路，触著即死。鸡屎、桑皮、盐，中其毒者，以桑汁、盐、蒜涂之。被咬者，捕蜘蛛置咬处，自吸其毒，蜘蛛死，置水中，吐而活之。

【讲解】（1）脐风撮口：脐风即新生儿破伤风，由断脐不洁，感染外邪所致。其症以痉挛抽搐、牙关紧闭、面呈苦笑状为特征。撮口，又名撮风，临床以唇口收紧，撮如鱼口为特征。（2）蛇瘕：蛇咬后发生的複腔内痞块。（3）疮甲：即甲沟炎。赴甲沟溃烂，肌肉突出。

蜈蚣功专息风止痉，并能攻毒散结。为蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣的干燥全虫。呈扁平长条形，头部红褐色，背部黑绿色，腹部棕黄色，足红褐色，以条长、头红、足红棕色、身黑绿、头足完整者为佳。生用或烘炙研末用。

本品辛温有毒，入肝经。辛散温通，性善走窜，截风定搐作用猛烈，故为息风止痉之要药。正如《直指方》所云：“蜈蚣有毒，惟风气暴烈者可以当之。风气暴烈，非蜈蚣能截能擒，亦不易止，但贵药病相当耳。”故凡惊风破伤风等痉挛抽搐、角弓反张、牙关紧闭之属于实证者，以及中风口眼喎斜等症，均有较好的疗效。蜈蚣不独疗风，且能攻毒散结、通络止痛，以治疗癰结核、疮疡肿毒、蛇虫咬伤，以及头部抽掣疼痛、风湿痹痛等证，内服外用，功效亦佳。书载去头足尾甲用，但据临床经验，以全用者力大，并无不良反应。惟毒烈之品，能伤正堕胎，故非重证不宜用，血虚发痉及孕妇均当忌用。

【临证应用】蜈蚣息风止痉之功与全蝎相似，治痉挛抽搐、口噤不开、角弓反张之重证，两药常相须为用，以加强疗效，如止痉散，再加钩藤、僵蚕等，息风镇痉之力更强如撮风散。用治疮疡肿毒或癰疽结核穿破溃烂等证，前者与雄黄配伍，共为细末，猪胆汁调敷；后者

可与茶叶共研末外敷患处。此外亦可用于治疗蛇虫咬伤。若与全蝎、川芎、白芷、细辛等配伍，治头痛、痹证亦有较好疗效。

【用量用法】 2—6克，或1 — 3条，煎服。研末吞服，每次16—1克。外用适量。

小结

平肝息风药均具有平肝潜阳、息风止痉的作用，主用于肝阳上亢所致的眩晕头痛，高热引起的小儿惊风，以及癫痫、破伤风等痉挛抽搐，肝风内动之证。但药性有寒温之异，药力有强弱之别。其中，石决明，紫贝齿，代赭石，平肝潜阳作用较强，主用于肝阳上亢之眩晕、头痛、烦躁等证。石决明、代赭石质重潜降，性偏寒凉，故为镇肝凉肝之要药。石决明又能明目，对肝火或肝虚目疾常用；代赭石又能镇逆止呕，善治气逆不降的呕吐、噎气、呃逆、喘息等证。紫贝齿功似石决明，且有安神之功。

羚羊角、天麻、钩藤、僵蚕、地龙、全蝎、蜈蚣均以息风止痉为长，用于痉挛抽搐，肝风内动之证。按其药性之寒温可区分为：羚羊角、钩藤、地龙性偏寒凉，宜于热盛风动之证；天麻、僵蚕、全蝎性平，热盛动风及脾虚慢惊均可配合使用；蜈蚣辛温性燥，对热极生风之证应慎用。

从息风止痉的效力方面比较，全蝎、蜈蚣、地龙、羚羊角作用较强，故多用于重证。而天麻、钩藤、僵蚕作用较缓，故多用于轻证。此外羚羊角又能清肝明目，对肝火亢盛之目疾头痛，颇有疗效。钩藤、天麻对肝热的眩晕、头痛效果较好；地龙还有通络、平喘、利尿之功；僵蚕尚有祛风、化痰、散结之效。

平肝息风药功用归纳简表

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
羚羊角	咸、寒	肝、心、肺	平肝息风，止痉，	①惊风、癫痫 ②肝阳上亢所致的头晕、	1—3克入煎剂宜另取汁冲服。磨汁或粉	山羊角可平肝镇惊，作用

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			清肝明目	目眩 ③肝火炽盛，头痛、目赤 ④热病神昏、躁狂	末，每次用0.3—0.6克	与羚羊角相同，然力略弱。
石决明	咸、微寒	肝	平肝潜阳，清肝明目、清虚热	①头晕、目眩 ②目赤肿痛、青盲翳障 ③骨蒸劳热	10—30克	入煎剂宜先煎
紫贝子	咸、平	肝	镇惊安神、清肝明目	①惊悸心烦、不眠多梦、惊风抽搐 ②目赤肿痛	10—15克	打碎先煎
代赭石	苦、寒	肝、心	平肝潜阳，重镇降	①肝阳上亢之头痛、眩晕②暖气、	10—30克	孕妇慎用

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			逆，凉血止血	呃逆、呕吐 ③吐血、衄血及崩漏		
天麻	甘、平	肝	息风止痉，平肝潜阳、通络祛风	①肝风内动，惊痫抽搐 ②肝阳上亢之眩晕、头痛③风湿痹痛	3—10克研末吞服1—1.5克	
钩藤	甘、微寒	肝、心包	息风止痉，清热平肝	①惊痫抽搐 ②肝热头痛③肝阳上亢之眩晕	10—15克	不宜久煎
蚯蚓	咸、寒	肝、肺、肾	清热息风，平喘，通	①惊痫、抽搐 ②哮喘 ③热痹 ④小便不利	5—15克研末吞服，每次1—3克外用适量	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			络，利尿			
白僵蚕	辛、咸、平	肝、肺、胃	息风止痉，祛风止痛，化痰散结	①惊痫抽搐 ②头痛目赤、咽喉肿痛 ③瘰癧痰核	5—15克，散剂每次1—3克	
全蝎	辛、平、有毒	肝	息风止痉，解毒散结，通络止痛	①急慢惊风，中风面瘫、破伤风 ②疮疡肿毒 ③顽固性偏头痛、风湿痹痛	2—5克研末吞服，每次0.6—1克外用适量	血虚生风者慎用
蜈蚣	辛、温、有毒	肝	息风止痉，解毒散结，	①惊风、破伤风 ②瘰癧疮疡 ③顽固性头	1—3条研末吞服，每次0.6—1克外用适量	孕妇忌用

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			通络 止痛	痛、风 湿痹痛		

复习思考题

1. 什么叫平肝息风药？适用于哪些病证？
2. 试述羚羊角、石决明、天麻、钩藤、白蒺藜、代赭石、白僵蚕、地龙、全蝎的功效和适应症。
3. 分析比较下列药组的效用：羚羊角与石决明 钩藤与天麻 白僵蚕与地龙 全蝎与蜈蚣

第十一章理气药

- 第十一章理气药

〔自学时数〕 8学时

〔自学时数〕 2学时

〔目的要求〕

1. 了解理气药的含义、功效、主要适用证。
2. 熟悉理气药与芳香化湿、清热燥湿、消食导滞、益气健脾、疏肝揉肝、宣肺止咳、和胃止呕、清热化痰、通络活血等药配伍应用的理论依据（联系中医基本理论）。
3. 掌握理气药中常用药（陈皮 枳实 香附 沉香 川楝子 薤白 木香 乌药）的功效、临证应用，并比较其异同。
4. 了解行气、破气、降气、疏肝概念上的不同点。
5. 联系柴胡、紫苏叶、厚朴、白豆蔻、砂仁等具有行气作用的药物，了解本章以外的理气药，扩大知识面。
6. 在自学本章全部内容的基础上、重点掌握小结内容。

凡用以调理气分，舒畅气机，使气行通顺，而治疗气机不畅诸病的药物，称为理气药。

气分疾病主要包括气虚与气滞两类。气虚病证应使用补气药来治疗。本章所介绍的理气药，主要是用于气滞病证的一类药物。

所谓“气滞”，就是指气机运行不畅、气行发生阻滞的情况。揆其原因，不外乎饮食不慎、饥饱失常、寒暖失调、瘀血、外伤等，都能影响人体气机的运行，形成气滞之证。

气滞的病变，主要与肝、脾（胃）、肺三脏有关。因肝主疏泄，脾主运化，胃主受纳，肺主气，皆与气相关。气滞的症状，常因其病情轻

重及发病部位的不同而异。一般地说，气滞轻者为满，稍重为胀，再重为痛。如肝失疏泄，肝气郁滞，则见胁肋胀痛，疝气疼痛，妇女月经不调，以及乳房胀痛或结块等。如脾胃气滞，升降失司，则见脘腹胀满疼痛，食欲不振，或暖气泛酸，恶心呕吐，大便失常等证；肺失宣降，痰气壅滞，则见呼吸不畅，咳嗽气喘，胸闷气塞等证。又因脏腑之间有着密切的关系，如肝失疏泄，每易导致脾胃气滞；脾失健运，聚湿生痰，也会影响肺气的宣降。

本类药物大多气香性温，其味辛苦，故善行散或泄降，分别具有消胀满、止疼痛、疏肝气、调脾（胃）气、理肺气等功效，故适用于前述诸证。

使用本类药物时，必须针对病情选择相应的药物，并采用适宜的配伍。如湿浊中阻而引起脾胃气滞之证者，宜配芳香化湿药；兼有湿热者，可视其证情，酌加清热燥湿药或清利湿热药；寒湿困脾者，须配温中燥湿药；如饮食不慎而食积不化者，则配消食导滞之品；兼脾胃虚弱者，又当与益气健脾药合用。肝气郁滞者，兼证较多，可视具体证情，酌配养阴柔肝、活血和营、止痛、健脾等药。至于肺气壅滞由外邪侵袭而致者，当配合宣肺化痰止咳药；如痰热郁肺，咳喘痰稠者，当配合清热化痰之品。

理气药大都辛温香燥，易于耗气伤阴，故气虚及阴亏者宜慎用。

陈皮

〔原文〕辛能散，苦能燥能泻，温能补能和。同补药则补，泻药则泻，升药则升，降药则降。为脾肺气分之药。脾为气母，肺为气俞。凡补药涩药，必佐陈皮以利气。调中快膈，导滞消痰，大法治痰，以健脾顺气为主。张洁古曰：陈皮、枳壳利其气，而痰自下。利水破癥，宣通五脏，统治百病，皆取其理气燥湿之功。人身以气为主，气顺湿除，则百病散。《金匱》曰：能解鱼毒食毒。多服久服，损人元气。入补养药则留白，入下气消痰药则去白。《圣济》曰：不去白，反生痰。

去白名橘红，兼能除寒发表。皮能发散皮肤。核治疝痛，叶散乳痈。皆能入厥阴，行肝气，消肿散毒。腰肾冷痛，橘核炒酒服良。《十剂》曰：宣可去壅，生姜橘皮之属是也。《泊宅篇》曰，莫强中，食已辄胸满不下，百治不效。偶家人合橘皮汤，尝之似有味，连日饮之。一日坐厅事，觉胸中有物坠下，目瞪汗濡，大惊扶归，腹疼痛下数块如铁弹，臭不可闻，自此胸次廓然。盖脾之冷积也，半年服药不知，功乃在橘皮。方用橘红一斤，甘草、盐各四两，煮干点服，名二贤散，蒸饼名润下丸，治痰特有验。世医惟知半夏、南星、枳壳、茯苓之属，何足语此哉！朱丹溪曰：治痰，利药过多则脾虚，痰易生而反多。又曰：胃气亦赖痰以养，不可攻尽，攻尽则虚而愈剧。广中陈久者良，故名陈皮。陈则烈气消，无燥散之患。半夏亦然，故同用名二陈汤。治痰咳童便浸晒，治痰积姜汁炒，治下焦盐水炒。去核皮炒用。橘络入络化痰理气止嗽，为嗽血虚劳要药。

化州橘红，辛微温。理气化痰，功力十倍。出化州。

【讲解】陈皮为理气调中、燥湿化痰之要药。为芸香科常绿小乔木植物橘及其同属多种植物的成熟果实之果皮。药用橘皮的原植物品种甚多，大多以广东新会所产的柑橘皮最佳，奉为道地药材，故有广陈皮、新会皮之名。新鲜者味较辛辣，气燥而烈，一般认为入药以放置陈久、辛辣之味缓和者为佳，故又称陈皮。生用或麸炒用。

本品味辛苦，性温，气芳香。入脾、肺经。辛则散而行气滞；苦温则燥湿祛寒。滞气行则脾胃自健，寒湿去则痰涎自消，故为理气健脾、燥湿化痰之要药。凡寒湿内阻，脾胃气滞所致的脘腹胀满、恶心、呕吐、嗝气等症；或湿浊中阻所致的胸闷腹胀、纳呆倦怠、大便溏薄、

舌苔厚腻，以及痰湿壅滞，肺失宣降而咳嗽痰多气逆等证，均可应用。

《备要》言“去白名橘红”，是指前述多种橘类植物果皮外层的红色部分，入药称橘红。其性味近似橘皮，然较橘皮香燥，下气消痰之力较强，善于燥湿祛痰，又能散寒发表，常用于肺寒咳嗽痰多等证。《备要》又云“入补养药则留白”，“白”指橘皮内层的白色部分，因性较和缓，故于和胃、化湿、补脾胃方中常用，无燥散之弊。橘核，为上述各种橘的种子。味苦性温，入肝经。功能理气散结止痛，多用于小肠疝气及睾丸肿痛等证。

橘叶，为橘树之叶。味辛苦，性平，入肝经。功能疏肝行气、消肿散结，用于胁肋作痛、乳痈、乳房结块及癥瘕等证。

此外，橘络为橘的中层果皮与内层果皮之间的维管束群（俗称筋膜）。性味甘苦平，入肝、肺经。功能通络化痰、顺气活血，适用于痰滞经络，咳嗽、胸胁作痛等证。

【临证应用】陈皮为临床常用的行气之品，多与它药配伍应用，故《备要》言“同补药则补，泻药则泻，升药则升，降药则降。”如用于脾胃气滞，脘腹胀痛，消化不良等证，配白术、木香等以行气；胃失和降之恶心呕吐可配生姜等同用，如橘皮汤，可资和胃降逆；若痰湿阻滞，肺失宣降，气逆咳喘者，又可配半夏、茯苓等降气化痰，如二陈汤；若肝气乘脾，腹痛泄泻，可配白术、防风、白芍等伍用，如痛泻要方；若脾胃气虚而气滞腹胀者，配党参、白术等，如异功散，以健脾行气。此外，在补益方中常配伍陈皮，也是取其行气健脾，以免补益药滋腻碍脾。

化州橘红为芸香科植物柚或其变种化州柚的外层果皮。处方名化橘红。性味、功效与橘皮相同，而燥散性大，对外感风寒咳嗽，痰多粘稠者更适用，故《备要》言其功力十倍。用量3~6克。

【用量用法】 3—10克，煎服。惟性偏温燥，故实热津亏之证不宜使用。橘红，3—10克；橘核，6—15克；橘叶，6—15克；橘络，3—5克，煎服。

本品多生用。《备要》指出，治痰咳童便浸晒，治痰积姜汁炒，治下焦盐水炒，去核皮炒用，无非取不同辅料的性能，以增强药物某方面的作用，现少遵此法。

青皮

〔原文〕辛苦而温，色青气烈。入肝胆气分。疏肝泻肺，柴胡疏上焦肝气，青皮平下焦肝气。凡泻气药，皆云泻肺。破滞削坚，除痰消痞。治肝气郁积，胁痛多怒，久疟结癖，入肝散邪，入脾除痰，疟家必用之品，故清脾饮以之为君痛乳肿。疝痛乳肿。朱丹溪曰：乳房属阳明，乳头属厥阴。乳母或因忿怒郁闷，厚味酿积，致厥阴之气不行，故窍不得出；阳明之血腾沸，故热甚而化脓。亦因其子有滞痰膈热，含乳而睡，嘘气致生结核者。初起便须忍痛揉软，吮令汁透，自可消散。治法以青皮疏肝滞，石膏清胃热，甘草节行浊血，枯萎消肿导毒，或加没药、橘叶、金银花、蒲公英、皂角刺、当归，佐以少酒，若干肿处灸三五壮尤捷。久则凹陷名乳癌，不可治矣。最能发汗，皮能达皮，辛善发散。有汗及气虚人禁用。陈皮升浮，入脾肺治高，青皮沉降，入肝胆治低。炒之以醋，所谓肝欲散；急食辛以散之，以酸泄之，以苦降之也。橘之青而未黄者，醋炒用。古方无用者，宋以后始与陈皮分用。

【讲解】青皮偏疏肝胆之气，药力较强。为芸香科常绿小乔木植物橘及其同属多种植物的幼果或未成熟果实的果皮。生用或醋拌炒用。

本品苦辛而温，入肝、胆、胃经，功能疏肝破气、消积化滞，多用于肝气郁结之胸胁和乳房胀痛、疝气痛，以及食积气滞之脘腹胀痛等证。本品有破气散结之功，尚可用于气滞血瘀所致的癥瘕积聚，及久疟癖块等证。

【临证应用】青皮治胁肋胀痛，可配柴胡、郁金等；治乳房肿痛或结块，常配柴胡、香附、青橘叶等；治乳痈肿痛则多与瓜蒌、金银花、蒲公英、甘草配伍；用治寒疝腹痛，配乌药、小茴香、木香等以散寒理气止痛，如天台乌药散；治食积气滞，胃脘痞闷胀痛则可配山楂、麦芽、神曲等消导之品，如青皮丸；治癥瘕积聚、久疟癖块，可与三棱、莪术、郁金等活血消癥药同用。

青皮、陈皮同出一物，前者为未成熟果实，后者为成熟果实。陈皮善理脾肺之气而燥湿化痰，凡脾胃气滞、痰湿内阻之征均可使用；青皮药力较强，偏疏肝胆之气，长于疏肝破气、消积化滞，凡肝气郁滞，食积不化之证，皆常应用。

【用量用法】 3 —10克，煎服。本品生用破气散积力胜，易损人正气，故不易久服或过量，气虚者尤当慎用。醋炒者擅入肝经，可增强疏肝破气之功，故常醋炒以入药。

枳实、枳壳

〔原文〕苦酸微寒。其功皆能破气。气行则痰行喘止，痞胀消，脾无积血，心下不痞；浊气在上，则生腹胀。李东垣曰：枳实治下而主血，枳壳治上而主气。痛刺息，后重除。治胸痹结胸，食积五膈（1），痰癖癥结（2），呕逆咳嗽，水肿胁胀，肝郁。泻痢淋闭，痔肿肠风，除风去痹，辛散风。开胃健脾，所主略同。但枳实利胸膈，枳壳宽脾胃；枳实力猛，大、小承气汤皆用之。朱丹溪曰：根实泻痰，能冲墙倒壁。枳壳力缓为少异。孕妇及气虚人忌用。按本草壳、实皆云明目。思之不得其解，然目疾方中多用之，岂以其破浊气，即能升清气乎？《本经》又言枳实益气，想亦同此理也。故厚朴调中，亦有益气明目之文，王好古曰：枳实佐以参、术、干姜则益气，佐以硝、黄、牵牛则破气，此《本经》所以言益气，而复言消痞也。张元素曰：枳壳泄肺走大肠，多用损胸中至高之气。昔湖阳公主难产，方士进瘦胎饮，用枳壳四两、甘草三两，五月后日服一钱。张洁古改以枳术名束胎丸。寇宗奭明某不然，盖孕妇全赖血气以养胎，血气充实，胎乃易生。彼公主奉养太过，气实有余，故可服之，若概施则误矣。李时珍曰：八九月胎，气盛壅滞，用枳壳、苏梗以顺气。胎前无滞，则产后无虚也，气弱者大非所宜矣。皮厚而小为枳实；壳薄虚大为枳壳。陈者良。麸炒用。李时珍曰：壳、实上世未分，魏晋始分用。洁古、东垣。始分壳治上，实治下。海藏始分壳主气，实主血。然仲景治上焦胸痹、痞满用枳实，诸方治下血痢痔肠秘后重用枳壳，则实不独治下，而壳不独治高也。盖自飞门至魄门，皆肺主之，三焦相通，一气而已。飞门，口也。魄门，即肛门。

【讲解】（1）五膈：为忧膈、息膈、怒膈、恐膈、喜膈的总称。

（2）癥结：指气血瘀滞成块。

枳实、枳壳均能行气化痰，为痰凝气滞、食积不消常用之品。为芸香科小乔木植物酸橙或香橼和枸橘（枳）的未成熟果实。成熟果实为枳壳。枳实形小而圆，以皮厚色青黑者为佳，枳壳作半圆形，较枳实个大，以皮厚质坚、气香味苦者为佳。习惯认为入药多以陈久者良。生用，或麸炒用。

枳实味苦辛、性寒。入脾、胃、大肠经，苦泄力大，行气力强，故有破气行痰，通痞散结之功。凡气滞痰阻，而见痞满胀痛、便秘，以及

泻痢不畅、里急后重之证，不论气血痰食，皆可配用，然其作用峻烈快速，有冲墙倒壁之势，非正盛邪实、气滞痞结之重证不可轻用。

附：枳壳 性味功效与枳实相类似，但枳实破气作用较强，枳壳作用较为缓和，而以行气宽中为主，故消积除痞、导滞通便多用枳实；理气宽中、消除胀满多用枳壳。

【临证应用】枳实用于食积不化、脘腹胀满、噎腐气臭者，常与山楂、麦芽、神曲等同用，以消食散积；治疗热结便秘，腹痛胀满者，配厚朴、大黄等，如小承气汤以行气破结，泻热通便。若与白术配伍，即枳术丸可消补兼施，以健脾消痞，治疗脾胃虚弱、运化无力、食后脘腹痞满作胀者。若配大黄、黄连、黄芩等药，即枳实导滞丸，以泻热除湿、消积导滞，治疗湿热积滞、泻痢后重者。

枳实治胸阳不振、寒痰内阻的胸痹，心中痞满气逆者，常配薤白、桂枝、瓜蒌等药，如枳实薤白桂枝汤。治疗心下痞满、食欲不振、神疲体倦者，可配半夏曲、厚朴、白术等品，如枳实消痞丸。

经药理研究证实，枳实、枳壳对胃肠道平滑肌有一定兴奋作用，临床用于胃下垂、胃扩张、子宫脱垂、脱肛等证，常配黄芪、党参、升麻、柴胡等补气升阳药。也可在补中益气汤中加枳实或枳壳，常获得满意疗效。

枳实与厚朴均为常用的行气消积药，二者常配合使用。若相比较，两者仍有不同之处，厚朴苦辛性温，长于温中、燥湿、散满，主治寒湿积滞、胸腹胀满之证，枳实味苦性寒，功能消痞除热，宜于湿热积滞、胸脘痞满之证。由此可见，厚朴、枳实，一温一寒，各有所宜，然经不同配伍，枳实亦可用于寒证，厚朴也能用于热证。

【用量用法】3—10克。大剂量可用15克。煎服。生用作用猛烈，麸炒作用较缓。

香附

〔原文〕性平气香，味辛能散，微苦能降，微甘能和，乃血中气药，通行十二经、八脉气分，主一切气。人身以气为主，气盛则强，虚则衰，顺则平，逆则病，绝则死矣。经曰：怒则气上，恐则气下，喜则气缓，悲则气消，惊则气乱，思则气结，劳则气耗，此七情之气也。以香附为君，随证而加升降消补之药。《素问》中仍有寒则气收，热则气泄。名九气。利三焦，解六郁，痰郁、火郁、气郁、血郁、湿郁、食郁。止诸痛。通则不痛。治多怒多忧，痰饮痞满，胸肿腹胀，饮食积聚，霍乱吐泻，肾气脚气，痈疽疮疡，血凝气滞所致。香附一味末服，名独胜丸，治痈疽由郁怒得者。如疮初作，以此代茶，溃后亦服之。大凡疮疽喜服香药，行气通血，最忌臭秽不洁触之。故古人治疡，多用五香连翘饮。康祖左乳病痈，又臆间生核，痛楚半载，祷张王梦授以方：姜汁制香附为末，每服二钱，米饮下，遂愈。吐血便血，崩中带下，月经不调，气为血配，血因气行，经成块者，气之凝；将行而痛，气之滞；行后作痛，气血俱虚也；色淡亦虚也；色紫，气之热；色黑则热之甚也；错经者，气之乱；肥人痰多而经阻，气不运也。香附阴中快气之药，气顺则血和畅，然须辅以凉血补气之药。朱丹溪曰：能引血药至气分而生血。此正阳生阴长之义。胎产百病。能推陈致新，故诸书皆云益气。行中有补，朱丹溪曰：天行健运不怠，所以生生无穷，即此理耳。李时珍曰：凡人病则气滞而馁，香附为气分君药，臣以参芪，佐以甘草，治虚怯甚速也。去毛用。生则上行胸膈，外达皮肤；熟则下走肝肾，旁彻腰膝。童便浸炒，则入血分而补虚；盐水浸炒，则入血分而润燥；或蜜水炒。青盐炒，则补肾气；酒浸炒，则行经络；醋浸炒，则消积聚；且敛其散。姜汁炒，则化痰饮；炒黑又能止血。忌铁。李时珍曰：得参术则补气，得归、地则补血，得木香则散滞和中，得檀香则理气醒脾，得沉香则升降诸气，得芎藭、苍术，则总解诸郁，得梔子、黄连则清降火热，得茯神则交济心肾，得茴香、破故纸则引气归元，得厚朴、半夏，则决壅消胀，得紫苏、葱白，则发汗散邪，得三棱、莪术，则消积磨块，得艾叶则治血气、暖子宫。乃气病之总司，女科之仙药也。大抵妇人多郁，气行则郁解，故服之尤效，非宜于妇人，不宜于男子也。李士材曰：乃治标之剂，惟气实血未大虚者宜之，不然恐损气而燥血，愈致其疾矣。世俗泥于女科仙药之一语，惜未有发明及此者。

【讲解】香附为疏肝理气，解郁调经之佳品。为莎草科多年生草本植物莎草的根茎。茎节上生褐色硬毛，挖出后晒干，烧去毛及细根。

生用，或醋炒用。

本品味辛甘微苦，芳香性平，入肝、三焦经。其辛味甚烈，香气颇浓。辛香能散肝气之郁，苦能降肝气之逆，甘能缓肝气之急，性平而无寒热之偏，故为疏肝解郁、理气止痛之要药。适用于肝气郁滞所致的胁肋作痛、脘腹胀痛及疝痛等证。如《本草正义》所云：“香附辛味甚烈，香气颇浓，皆以气用事，故专治气结为病”。

肝为藏血之脏，气为血之帅，肝气调和则血行通畅，而无郁滞之患，故香附又为调经止痛之主药，对肝气郁滞所致的乳房胀痛、月经不调、痛经，及胎前后诸疾，均用为要药，故前人谓之“气病之总司，妇科之主帅。”《本草求真》曰：“大抵妇人多郁，气行则郁解，故服之尤效，非云宜于妇人，不宜于男子也。按此专属开郁散气，与木香行气貌同实异，木香气味苦劣，故通气甚捷；此则苦而不甚，故解郁居多，且性和于木香，故可加减出入以为行气通剂。”

【临证应用】香附以疏肝解郁见长，适用于因精神不快、情志抑郁而产生的胸膈痞闷、消化不良、胁痛等证，常与苍术、川芎等配伍，如越鞠丸；若胁痛者，多配柴胡、枳壳等疏肝理气之品，如柴胡疏肝散；寒凝气滞而胃痛者，常配高良姜同用，如良附丸；寒疝腹痛，则多配乌药、吴茱萸等。对肝气郁结，月经不调、经来乳胀胁痛、少腹作痛等证，常配柴胡、当归、川芎等以疏肝理气调经。或将香附经不同炮制制成丸剂，称四制香附丸，为调经常用之品。

【用量用法】6—10克，煎服。临床最常用者为生用或醋炒，古今还有以姜汁、酒、盐等浸炒用者，经炒制后辛味略减，随辅料之不同，其功效亦各有偏：通行经络宜用酒香附；消积聚、止疼痛，则宜用醋香附；理气化痰则宜用姜香附等。

木香

〔原文〕辛苦而温。三焦气分之药，能升降诸气，泄肺气，疏肝气，和脾气。怒则肝气上，肺气调，则金能制木而肝平，木不克土而脾和。治一切气痛，九种心痛（1）皆属胃脘，曰：寒痛、热痛、气痛、血痛，湿痛、痰痛、食痛、蛔痛、悸痛。盖君主不易受邪，真心痛者，手足冷过腕节，朝发夕死。呕逆反胃，霍乱泻痢后重，同槟榔用。刘河间曰：痢疾行血则脓血自愈，调气则后重自除。癃闭（2），痰壅气结，痃癖癥块，肿毒蛊毒，冲脉为病，气逆里急，杀鬼物，御瘴雾，去腋臭，实大肠，消食，安胎。气逆则胎不安。过服损真气。丹溪曰：味辛气升，若阴火冲上者，反助火邪，当用黄柏、知母，少以木香佐之。王好古曰：《本草》主气少气不足补也，通壅导气破也；安胎健脾胃补也；除痰癖癥块破也，不同如此。汪机曰：与补药为佐则补，与泻药为君则泻。时珍曰：诸气膈郁，皆属之肺，上焦气滞用之者，金郁泄之也。中气不运，皆属于脾，中焦气滞用之者，脾胃喜芳香也。大肠气滞则后重，膀胱气不化则癃闭，肝气郁则为痛，下焦气滞用之者，塞者通之也。番舶上来，形如枯骨，味苦粘舌者良，名青木香。今所用者皆产木香、土木香。磨汗用。东垣用黄连制，亦有蒸用、面麦裹煨（3）用者。煨用实肠止泻。畏火。

【讲解】（1）心痛：指胃脘部近心窝处疼痛。古代文献称之心痛，大多指胃痛而言。心脏疾患引起的心痛症叫真心痛。《内经》云：“真心痛，手足青至节，心痛甚，旦发夕死，夕发旦死。”在临床上应与胃痛区别。（2）癃闭：癃；指小便不畅，点滴而出；闭；指小便不通，点滴不出。癃闭：指排尿困难，点滴而下，甚则闭塞不通的病证。（3）煨：是中药炮制方法之一，把药物用湿纸或面糊包裹，放热灰中煨，至湿纸或面糊外皮焦黄为度；或层层隔纸加热，以除去部分油质。

木香辛温香燥，主行肠胃气滞。为菊科多年生草本植物云木香或川木香的根。生用或煨用，切片入药。云木香主产云南丽江地区，川木香产四川阿坝藏族自治州等地。木香产于国外印度、缅甸等地，从广州进口者，商品称为广木香，有浓郁香气，后引种于云南即今之云木香，与进口之广木香质地相同。

本品气芳香，味辛苦，性温。入脾、胃、大肠、胆经。辛散、苦降、温通，芳香性燥，长于调中宣滞，行气止痛，兼能运脾消食，疏肝利胆。故凡肠胃气滞，脘腹胀痛，食少呕吐，泻痢后重，以及肝失疏泄，胆气不和，胁肋胀痛，黄疸等证，均为常用之品。

至《备要》所云，木香为三焦气分之药，能升降诸气，泄肺气，疏肝气，和脾气。正如黄宫绣所说：木香下气宽中，为三焦气分要药。然三焦则又以中为要。故凡脾胃虚寒凝滞而见吐泻停食；肝虚寒入而见气郁气逆，服此辛香味苦，则能下气而宽中矣。中宽则上下皆通，是以号为三焦宣滞要剂。其言能升能降，升非类升、柴，降非同沉香，不过因其气郁不升，得此气克上达，况苦多辛少、自当能降。

《备要》云能治癥闭、痰壅气结，痃癖癥块，肿毒蛊毒，冲脉为病，气逆里急，杀鬼物，御瘴雾，去腋臭等，皆取木香芳香辟秽，辛燥行气之功。但临床极少用于此。

又《备要》所言青木香，即今之广木香、云木香。今之青木香，是马兜铃科植物马兜铃之根，又称土青木香。味辛苦、性寒，有小毒。功能消肿解毒，主用于热毒痛。名称相似，作用不同，应加区别，不可混淆。

【临证应用】木香以治肠胃气滞为主，常与砂仁相配，益增行气消胀之功。与黄连同用，以治湿热泻痢，腹痛后重，如香连丸；若再加大黄、槟榔等导湿热积滞之品，则效更佳，如香槟榔丸。如脾虚不运，食少泄泻，当与党参、白术、砂仁等伍用，以健脾行气，如香砂六君子汤。至于脾运失常，肝失疏泄，湿热郁蒸所致的胁肋胀痛、口苦、小便短赤、黄疸等证，常与茵陈、山栀、柴胡、郁金、枳壳等清利湿热，疏肝理气药同用，效果显著。由于胎气上逆所致胎动不安者，也可配用。

另外，借其芳香悦脾，行气宣滞之功，常在滋补剂中加入少许，具有防止滋补腻滞，以及胸闷食减作用。与寒药伍用，使寒不伤胃，诚临床常用之药。然总是以气为用，辛香而散，苦温而燥，于寒冷结痛尤为适宜，阴虚之人最宜斟酌，以免耗液伤阴，过用能损人正气。

【用量用法】3—6克。行气多生用，止泻宜煨用，煨后减少油质，增强实肠止泻作用。入汤剂不宜久煎，久煎则药力降低。

古有磨汁或用黄连制过用者，今多以生、煨两种入药。畏火是防止药效散失。

乌药

〔原文〕辛温香窜。上入脾肺，下通肾经。能疏胸腹邪逆之气，一切病之属气者皆可治。气顺利则风散，故用以治中气中风，厥逆痰壅口噤脉伏，身温为中风，身冷为中气；又有痰为中风，无痰为中气。《局方》治此，亦用乌药顺气散。许学士曰：暴怒伤阴，暴喜伤阳。忧愁不已，气多厥逆，往往得中气之证，不可作中风治。及膀胱冷气，小便频数，反胃吐食，宿食不消，泻痢霍乱，女人血凝气滞，小儿蛭蛔，外如疮疖疥疔，皆成于血逆，理气亦可治之。疗猫犬百病。气虚、气热者忌用。李时珍曰：四磨汤，治七情郁结。上气喘急者，降中兼收，泻中兼补也。方用人参、乌药、沉香、槟榔，各浓磨汁七分合煎。缩泉丸，用同益智等分为丸，治虚寒便数者，取其通阳明少阴也。根有车毂纹，形如连珠者良。酒浸一宿用。亦有煨研用者。

【讲解】乌药有行气散寒止痛之功，尤善行下焦之气。为樟科灌木或小乔木植物乌药（天台乌药）的根。其根外皮呈紫褐色，以连珠状者为上品。产于浙江、安徽、江西等地，传统以浙江天台所产者为道地药材，称天台乌药，简称台乌药、台乌。质量佳。生用，或麸炒用，切薄片入药。

本品味辛性温。入肺、脾、肾、膀胱经。功能顺气降逆、散寒止痛，上入脾肺，能舒畅胸腹之气滞，下达肾与膀胱，能温肾散寒以除膀胱之冷气。故凡一切疾病之属于气逆寒郁者，如胸腹胀痛、反胃吐食、寒疝、痛经、尿频、遗尿等证，均为常用之品。

【临证应用】乌药治寒郁气滞的脘腹胀痛等证，可与香附、木香等配伍，以加强行气止痛作用；若治寒疝腹痛，常与小茴香、青皮、川楝子等配伍，如天台乌药散。妇女经期腹痛，由于气滞寒凝者，可配延胡索、木香、香附等，如加味乌药汤。用本品温肾散寒除膀胱冷气，治小便频数、遗尿时，常配益智仁、山药，如缩泉丸，以温肾缩尿。

乌药与木香、香附，均有理气止痛之功，为一般气滞证所常用。但三药各有专长：乌药善行下焦之气，温肾散寒，而治膀胱冷气、小便频数等证；木香善调肠胃气滞，且能消食，对肠胃寒食气滞之脘腹胀

痛、泻痢后重等证功效显著；香附长于疏肝解郁、调经止痛，多用于肝气郁滞之胁痛、月经不调、痛经等证。

【用量用法】 3—10克，煎服。

佛手

〔原文〕辛苦微温。入肺、脾二经，兼入肝经。理上焦之气而止呕，进中州之食而健脾，除心头痰水，平肝胃气痛。陈者良。花功用同，性缓。

【讲解】佛手功专疏肝理气、和中止呕。为芸香科常绿小乔木或灌木植物佛手的果实。切片晒干生用。

本品辛苦性温。入肝、脾、胃、肺经。气清香而不烈，性温和而不峻，上走于肺，理气化痰；中行于脾，和中止呕，其气芳香，疏理肝气，又善止痛。故凡肝郁气滞之两胁胀痛和脾胃气滞之脘腹胀满、暖气呕吐，以及肺郁痰聚之咳嗽痰多等证，均常应用。其疏肝理气之作用比陈皮强，但健脾化痰作用则不及陈皮。

【临证应用】佛手用于肝郁气滞的胁肋胀痛，常与香附、郁金同用；脾胃气滞，食少脘胀，暖气呕吐，多与木香，枳壳、白豆蔻等同用。用于咳嗽痰多之证，可与理肺燥湿化痰之陈皮、半夏、茯苓等同用。

【用量用法】6—10克，煎服。

附：佛手花为佛手的花蕾，性味功用与佛手相同，惟作用较佛手和缓。

香橼

〔原文〕苦甘辛酸而平。下气消食，快膈化痰，解酒毒。治饮酒人口气，去肠胃中恶气，泻胸满之气，疗痰气咳嗽，能去浊恶之气。无滞而虚者忌用。下气消食，快膈化痰。

【讲解】香橼以舒肝理气行滞为其主要功效。为芸香科绿小乔木植物枸橼或香橼的果实。切片晒干生用。

本品味辛、微苦、酸，性温。辛能行，苦能降，其气清香。入肝、肺、脾三经。有疏肝理气、调中行滞之效，其止痛作用与佛手相似。故凡肝气不舒、脾气壅滞所致的胸闷胁痛、脘腹胀痛、恶心呕吐、食欲不振等证，均常用之。此外，其气清香，又有燥湿化痰之功，可用于痰多气逆咳嗽之证。

【临证应用】 香橼用于胸闷胁痛，可配瓜蒌、郁金、枳壳等疏肝理气、宽胸止痛药同用；治脘腹胀痛，可配木香、香附、吴茱萸；若兼见口苦吞酸呕吐者，可再佐以黄芩连以苦降泄热。用于痰湿壅滞、咳嗽痰多者，常与半夏、陈皮、茯苓等配伍，共奏健脾消痰止咳之功。

【用量用法】 3—10克，煎服。

沉香

〔原文〕辛苦性温。诸木皆浮，而沉香独沉，故能下气而坠痰涎。怒则气上，能平则下气。能降亦能升，气香入脾，故能理诸气而调中。李东垣曰：上至天，下至泉，用为使，最相宜。其色黑体阳，故入右肾命门，暖精助阳。行气不伤气，温中不助火。治心腹疼痛，噤口毒痢，癰瘕邪恶，冷风麻痹，气痢气淋。色黑沉水者良。香甜者性平，辛辣者热。入汤剂，磨汁用；入丸散，纸裹置怀中，待燥碾之。忌火。鸕鹚斑者名黄沉；如牛角黑者名黑沉；咀之软，削之卷者名黄蜡沉，甚难得。浮者名栈香，半沉者名煎香。鸡骨香虽沉而心空，并不堪用。

【讲解】沉香体重性温，善降逆气，且可温中暖肾。为瑞香科常绿乔木植物沉香及白木香含有黑色树脂的木材。外表深褐色或黑褐色。因其木质中有黑色芳香性脂膏凝结，比重较一般木材大，有入水下沉的特性，故曰“色黑沉水者良。”

本品苦辛性温，入脾、胃、肾经。气香行气以止痛，性温温中以散寒，故克治脾胃寒郁气滞胀痛之证。又因味苦质重，沉降下行，无论胃寒呕吐、呃逆，或肾不纳气之虚喘，以及痰饮咳喘之证皆可使用。但性偏沉降，故气虚下陷、阴虚火旺者均应忌用。

【临证应用】沉香用于胸气滞，胀闷作痛而属寒证者，常与乌药、木香、槟榔等同用，如四磨汤。对中焦虚寒之呕吐、呃逆，可配白豆蔻、紫苏等药，如吴球方治胃冷久呃，将沉香与上述两药配伍研末，以柿蒂煎汤调服。本品降逆气、纳肾气，故气逆喘急之证，无论虚实皆可应用。其实者，可与莱菔子、厚朴、葶苈子等同用，以降气平喘；肾虚喘促，则与附子、五味子、熟地等伍用，以温肾纳气。

【用量用法】1—1.5克，多研末冲服，亦可用原药磨汁服。

檀香

〔原文〕辛温。调脾肺，利胸膈，去邪恶。能引胃气上升，进饮食，为理气要药。《内典》曰：旃檀涂身，能除热恼。昂按：内兴欲念，亦称热恼，盖诸香多助淫火，惟檀香不然，故释氏焚之，道书又以檀为俗香，不可以供上真。

【讲解】檀香具有理气调中，散寒止痛的作用。为檀香科常绿小乔木檀香的干燥木质心材。别名白檀香。生用，水洗后镑成片，或劈碎后入药。

本品辛温气香，入脾、胃、肺经。性温祛寒，辛能行散，善于利膈宽胸，行气止痛。其气芳香醒脾，故兼有调中和胃之功，适于寒凝气滞所致的胸腹疼痛及胃寒作痛、呕吐清水等证。

【临证应用】檀香辛温，治气滞所致的脘腹疼痛，尤以兼寒者更宜，可配砂仁、丁香等以增强行气止痛之效。心腹诸痛属气滞血瘀者，多与砂仁、丹参等同用。近年来临床运用本品治气滞血瘀所致的心胸疼痛，配丹参、菖蒲、延胡索等，有一定疗效。

【用量用法】1—3克，煎服，或入散服。

紫檀

〔原文〕咸寒。血分之药，和营气，消肿毒，敷金疮，止血定痛。

【讲解】紫檀消肿止血定痛。为豆科乔木紫檀的心材。主产于广东、云南等地。镑片或劈碎入药。本品性味咸平，入肝经。主消肿、止血、定痛之功，主治肿毒、金疮出血。

【临证应用】紫檀为末外敷，可止痛止血生肌，而治金疮。以醋磨外绞，治卒毒肿起、急痛。

【用量用法】1—3克。外用适量。

川楝子

〔原文〕苦寒有小毒。能入肝舒筋，能导小肠膀胱之热，因引心包相火下行，通利小便，为疝气要药。亦治伤寒热狂热厥，腹痛心痛，杀三虫（1）疗疥疥。《夷坚志》：消渴证有虫耗其津液者，取根皮浓煎，加少麝服，下其虫而渴自止。脾胃虚寒忌之。川产良。酒蒸，寒因热用，去皮取肉去核用，用核则槌碎，浆水煮一伏时去肉用，茴香为使。

【讲解】（1）三虫：即长虫、赤虫、蛲虫的合称。

川楝子以泄火行气止痛为主要功效，兼能杀虫。为楝科落叶乔木川楝的成熟果实，又名金铃子。捣破入药，生用，或麸炒用。南方各地均产，以四川产者为佳，故名川楝子。

本品苦寒，有小毒。主入肝经。具有疏泄肝热、解郁止痛之功。肝气郁滞，则横逆胸胁，气郁而化火，若肝气得疏，则不致横逆、化火，气行而痛止。故本品对肝胃气滞所致的胸脘胁腹疼痛、疝气痛、睾丸痛等证，均为常用之品。以性偏寒凉，故其治上症见热象者尤为适宜。本品有杀虫之能，虫积腹痛者也可配用。外用还可治疗头癣。

此外，楝科乔木植物楝树和川楝树的根皮或树皮亦可入药，称苦楝皮。其性苦寒，功专杀虫疗疥癣。

【临证应用】川楝子用治肝胃气滞，胸胁及腹部疼痛，尤以偏热者为宜，常配延胡索同用，以增强止痛之功，如金铃子散；用于疝痛则常配小茴香、吴茱萸、木香等药，以散寒理气止痛，如导气汤。

本品杀虫之功可用于虫积腹痛，如蛔虫腹痛，多与使君子、槟榔等配伍应用。治疗头癣时，可先用食盐温开水泡，将患处洗净，然后取川楝子适量，焙黄研末，用熟猪油或麻油调成油膏，涂于患处。

苦楝皮驱虫作用较川楝子为优，主要用于蛔虫病，也可治疗蛲虫、钩虫及阴道滴虫，单用或配槟榔、茺莢等同用。近年来用其配茵陈、郁金、木香治疗胆道蛔虫有一定疗效。治阴道滴虫可配蛇床子煎汤外

洗，或做成栓剂外用。此外，尚可治头癣、疥癣，常以本品研末，用醋或油调外敷，或煎汤外洗。

【用量用法】3—10克，煎服。外用适量。以其味苦性寒，凡脾胃虚寒者不宜用。

苦楝皮常用量为6—15克，鲜品单用可达15—30克。本品无论干用或鲜用，毒性作用都较大，过量服用会引起头晕、头痛、恶心、腹痛等反应，重者会发生内脏出血，乃至死亡，应予注意。

临床见有服用过量苦楝皮引起肝损害、肝脏肿大的报导，故肝病患者不宜使用，或慎用。

荔枝核

〔原文〕甘涩而温。入肝肾，散滞气，辟寒邪。治胃脘痛，妇人血气痛。煨存性五钱，香附一两，为末，名蠲痛散。每服二钱，盐汤或米饮下，单服醋汤下亦有效。其实双结，核似睾丸。睾丸音皋，肾子也。故治癰疽卵肿，有述类象形之义。煨存性，酒调服，加茴香、青皮，各炒为末，酒服亦良。壳发痘疮，烧存性用。蒸枝连壳煨研，止呃逆。生荔枝多食则醉，以壳浸水解之。此即食物不消，还以本物解之之义。

【讲解】荔枝核功专行气散寒，为治疝常用药。为无患子科常绿乔木植物荔枝树的种子。其形卵圆，稍侧扁，故曰核似睾丸。捣碎入药，或盐水炒用。

本品味辛性温，入肝、胃经。具有行气散寒止痛之功，常用于肝经寒凝气滞的疝气、睾丸肿痛等证。对胃脘疼痛及妇人气滞血瘀的腹痛亦可应用。《备要》言荔枝壳能发痘疮，然临床未见应用。

【临证应用】荔枝核治寒凝气滞的疝痛，常配小茴香、吴茱萸、橘核等；若配龙胆草、山栀、大黄、川楝子，可治肝经实火，湿热下注的睾丸肿痛、阴囊红肿。胃脘痛及妇人气滞血瘀的少腹疼痛等证，可配木香、香附等药，也可与香附共炒，研末冲服，如蠲痛散。

【用量用法】10—15克，煎服，或作散剂。

薤白

〔原文〕辛苦温滑。调中助阳，散血生肌，泄下焦大肠气滞。治泄痢下重，王好古曰：下重者，气滞也，四逆散加此以泄滞。按，后重亦有气虚、血虚、火热、风燥之不同。胸痹刺痛，张仲景用栝蒌薤白白酒汤。肺气喘急。安胎利产，涂汤火伤。和蜜捣用。《肘后方》，中恶卒死者，用薤汁灌鼻中，韭汁亦可。叶似韭而中空，根如蒜。取白用，忌牛肉。其叶光滑，露亦难贮，故云薤露。

【讲解】薤白善能通阳散结、行气导滞，为治胸痹要药。为百合科多年生草本植物小根蒜和薤的地下鳞茎。洗净晒干，生用。

本品辛苦而温，入肺、胃、大肠三经。辛温以散寒邪，苦温以燥痰湿。能宣通胸中之阳，以散阴寒之结，上开胸痹，下泄气滞。对寒痰湿浊凝滞于胸中，阳气不得宣通的胸痹，及痰饮胁痛等证，效验皆良。并兼行气导滞，故亦可用于肠胃气滞，泻痢后重之证。但气虚无滞者不宜服。《备要》言可“安胎利产”，临床较少应用。

【临证应用】薤白用于胸闷作痛、喘息咳唾的胸痹证，常与宽胸散结、理气化痰的瓜蒌、半夏、厚朴、枳实等同用，如瓜蒌薤白白酒汤、瓜蒌薤白半夏汤、枳实薤白桂枝汤，皆为《金匮要略》治疗胸痹的著名方剂。若兼见瘀血阻滞者，可再加丹参、川芎、赤芍、红花、元胡等活血化瘀止痛药，共奏通阳散结、宽胸理气、祛瘀止痛之功。用于痢疾后重，可与白芍、枳实、木香等同用；若兼湿热者，也可与黄连、白头翁等清热燥湿药同用。

【用量用法】5—15克，煎服。

大腹皮

〔原文〕辛泄肺，温和脾。下气行水，通大小肠。治水肿脚气，痞胀痰膈，瘴疟霍乱。气虚者忌用

大腹子，似槟榔，腹大形扁。故与槟榔同功。取皮，酒洗，黑豆汤再洗。煨用。鸕鸟多栖其树，故宜洗净。

【讲解】大腹皮功专下气宽中，利水消肿。为棕榈科常绿乔木植物槟榔的果皮。生用。

本品味辛，性微温，入脾、胃、大肠。小肠经。能行气而兼利水，故对水气外溢为肿，湿邪内停作胀者，皆具良效。常用于气滞湿阻，脘腹胀满及水肿脚气等证。

《备要》中所云大腹子，即槟榔的别名。旧时以槟榔中形圆而扁者称大腹子，现统指槟榔。

【临证应用】大腹皮治食滞气阻所致的脘腹饱胀、噎腐泛酸、大便秘结等证，可配厚朴、山楂、麦芽等同用；尤对内伤湿滞，气机受阻之证更为适宜，可配藿香、陈皮、茯苓等同用；用于水湿内停所致的水肿胀满及脚气，常配茯苓皮、五加皮等同用，如五皮饮。

【用量用法】3—10克，煎服。

甘松香

〔原文〕甘温芳香，理诸气，开脾郁。治腹卒然满痛，风疳齿齕，脚气膝浮。煎汤淋洗。出凉州及黔蜀。叶如茅。用根。根极繁密。

【讲解】甘松芳香，功能行气止痛，开郁醒脾。甘松香又名甘松，为败酱科多年生矮小草本植物甘松香或宽叶甘松的根茎及根。晒干，生用。

本品辛甘而温，入脾、胃经。温而不热，甘而不滞，辛香而不燥，可舒畅气机，而有开郁醒脾、行气止痛之功，多用于思虑伤脾，或寒郁气滞引起的胸闷腹胀、不思饮食及胃脘疼痛等证。《本草求真》也载：风疳齿齕者，可同白芷、附子并用，若脚气膝肿，煎汤淋洗。

【临证应用】甘松善治脾胃受寒，气郁不舒的心腹痛满、饮食不思之证，多与香附、藿香、陈皮、乌药、丁香等理气散寒健胃药同用，疗效更佳。本品味虽属甘，但芳香耗气，故气虚者不宜用。

【用量用法】3—6克，煎服。

山柰

〔原文〕辛温。暖中辟恶。治心腹冷痛，寒湿霍乱，风虫牙痛。生广中。根叶皆如生姜，入合诸香用。

【讲解】山柰功能温中消食止痛。为姜科多年生宿根草本植物山柰的根茎。块状根茎，单生或数枝连接，淡绿色或绿白色。洗净晒干，生用。

本品味辛性温，入胃经。具有温中、消食、止痛之功，主治心腹冷痛、停食不化、跌打损伤、牙痛等证。

《本草正义》曰：“盖味辛温而气芳香，辟寒行气，因亦与砂仁、蔻仁诸物相近，故治疗亦约略似之。又谓治风虫牙痛，则亦专行阳明，可作引经药，用与甘松同，必非辛温之物，可以独治阳明风火。”此即《备要》中所谓能“暖中辟恶”，“入合诸香用”之意。

【临证应用】山柰临床不甚常用。若治心腹冷痛，可与丁香、当归、甘草配伍。《海上方》用治牙痛，以山柰二钱，面裹煨熟，麝香半钱，为细末，每用三字，口噙温水，随牙痛处一边鼻内嚙之，漱水吐去即可。供参考。

【用量用法】 3—6克，煎服。外用适量。

刀豆

〔原文〕甘平。温中止呃，煨存性服。 胜于 柿蒂。

【讲解】刀豆长于温中降气，为止呃之品。为豆科一年生缠绕草质藤本植物刀豆的种子。晒干，捣碎生用。

本品味甘性温，入胃、肾经。功专温中降气，而为止呃常用之品。适用于虚寒呃逆、暖气呕吐等证。此外，兼能温肾助阳，以治肾虚腰痛。

【临证应用】刀豆主要用于虚寒呃逆，可配丁香、柿蒂、生姜等温中降逆药同用，以加强降逆止呃之功。治肾虚腰痛，用刀豆二粒，包于猪腰子内，烧熟食之。

【用量用法】10—15克，煎服。

柿干

〔原文〕甘平性涩，生柿性寒。脾肺血分之药。健脾涩肠，润肺宁嗽，而消宿血。治肺痿热咳，咯血反胃，有人三世病反胃，得一方，柿干同干饭日日食，不饮水，遂愈。肠风痔漏。肺与大肠相表里，脏清则腑热亦除。《泊宅篇》柿干烧灰饮，服二钱，治下血。忌蟹。

柿霜及其精液，生津化痰，清上焦心肺之热为尤佳。治咽喉口舌疮痛。

柿蒂止呃逆。古方单用，取其苦温降气。《济生》加丁香、生姜，取其开郁散痰，亦从治之法。《产宝》曰：产后呃逆烦乱，柿饼一个，煮汁热饮。

【讲解】柿干甘涩寒，清热润肺止渴。为柿科落叶乔木植物柿的果实经加工而成的饼状食品。生用，或烧存性用。

本品味甘涩，性寒，入心、肺、大肠经。具有润肺涩肠止血之功，可治吐血、燥咳咯血、血淋、肠风、痔漏、痢疾等证。

柿霜，系柿的果实制成柿饼时外表所生白色粉霜，再经加工制成块状饼，故处方名为柿霜饼。味甘性凉，入肺、胃经。功能清热润燥止咳，多用于咽干喉痛、口舌生疮，以及肺热燥咳、吐血、咯血等证。

柿蒂，为柿科植物柿的宿存花萼。生用。味苦性平，入胃经。善能降逆气，为治呃逆要药，多用于胃寒气逆之呃逆，若配伍清热镇降之品，亦可治胃热呃逆。

【临证应用】柿干用于咳嗽带血，可与青黛同用，以薄荷汤送服；若配伍侧柏叶、槐米等，能治肠风下血；治血淋涩痛。可烧灰存性，为末，米饮调服。

柿霜治咽喉疼痛，可配伍硼砂、天冬、麦冬、元参、乌梅等蜜丸含化。

柿蒂性平苦降，不寒不燥，治胃寒气逆之呃逆，常与丁香、生姜等温中降逆止呃药同用，如柿蒂汤；若胃热呃逆，则多与芦根、竹茹等清胃药配伍。

【用量用法】 柿蒂用量6—10克，煎服。柿霜随配合成药定量。

梅花

〔原文〕酸涩平。清香开胃散郁，止渴生津，解热除烦。得先天气，助清阳上升，清肺气，去痰壅，解胎毒痘毒要药。梗通上下膈气。

【讲解】梅花为理气药，功能疏肝和胃、调畅气机。为蔷薇科植物梅的花蕾。晒干或烘干，生用。

本品味酸涩，气清香，性平。入肝、胃二经。长于疏肝解郁、和中开胃，以治肝胃气机郁滞所致的胸胁脘腹胀痛、食少噯气之证。本品兼能利肺气、去痰壅，对痰气交阻，咽中似有物阻的梅核气，亦常配用。至于解胎毒、痘毒之功，效不明显，故临床少用。

其梗亦能理气，治气滞中阻的胸院胀痛。

【临证应用】梅花用于胁肋胀痛、胃脘疼痛、胸闷噯气、纳食不香等证，常与柴胡、香附、木香、枳壳等配伍；治梅核气可与半夏、厚朴、苏梗、陈皮等同用，以疏肝解郁、理气化痰。

【用量用法】 3—6克，煎服。

小结

理气药能调理气分，舒畅气机，凡气滞之证均可选用。本类药大多为辛温香散之品，易耗气伤阴，故气弱阴虚者慎用。

理气药随其作用侧重的不同，可分为行脾胃气滞、疏肝解郁、降气三类。

一、行脾胃气滞：这类药包括陈皮、枳实、枳壳、木香、乌药、檀香、薤白、大腹皮、甘松、山柰等，均能行脾胃气滞，以治脘腹胀痛之证。其中陈皮长于理脾肺之气而有健脾燥湿化痰之功，凡气滞不行、痰湿不化之证皆常应用；枳实苦泄力大，行气功强，偏于破气，善消痞积；枳壳力缓，偏于理气而善宽胸消胀；木香善调肠胃之气滞，以治痢疾后重之证；乌药并能下达肾经，而温肾散寒；檀香散寒止痛，用于寒凝气滞或气滞血瘀之证；薤白最善通阳散结，为治胸痹要药，并能下气泄滞，兼治下痢后重；大腹皮功擅下气宽中除湿，又有利水消肿之功；甘松、山柰用于气滞脘腹冷痛。

二、疏肝解郁：这类药有青皮、香附、佛手、香橼、川楝子、荔枝核等，都能疏解肝气郁结，以治胁肋胀痛之证。其中青皮破气力强，能消痞积；香附又善调经止痛；佛手、香橼功效相近，二者并能和胃止呕，然佛手作用较为缓和；川楝子性寒，用于肝郁气滞之偏于热者；荔枝核善治疝气、睾丸肿痛。

三、降气：包括有沉香、刀豆、柿蒂等，均有降逆平喘，或降气止呃作用。沉香长于降肺气以纳肾平喘，并能温中止痛；刀豆、柿蒂以降胃气为主，为治呃逆要药。梅花善能疏肝和胃，常用于肝胃气痛。

理气药功用归纳简表

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
陈皮	辛、苦、	脾、肺	理气调中，燥	①胸腹胀痛、	3—10	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	温		湿化痰	呕吐 ②咳嗽痰多	克	
青皮	苦、辛、温	肝、胆、胃	疏肝破气、消积化滞	①胁肋胀痛、疝气痛 ②癥瘕积聚	3—10克	
枳实 枳壳	苦、辛、微寒	脾、胃、大肠	破气消积、化痰除痞	①食积痰滞、胸腹痞满胀痛、便秘 ②泻痢后重 ③胸痹、结胸	3—10克 大剂量至15克	
香附	辛、甘、微苦、平	肝、三焦	疏肝理气解郁，调经止痛	①肝气郁滞，胁肋胀痛 ②月经不调、痛经	6—10克	醋制加强入肝止痛之功

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
木香	辛、苦、温	脾、胃、大肠、胆	行气，调中，止痛	①胸腹胀痛 ②湿热泻痢 ③黄疸	3—6克	行气滞者生用，止泻者煨熟用
乌药	辛、温	肺、脾、肾、膀胱	行气，散寒，止痛	①寒郁气滞，胸腹胀痛 ②膀胱冷气、尿频遗尿	3—10克	
佛手	辛、苦、温	肝、脾、胃、肺	疏肝理气，止痛，和胃化痰	①脘腹胁肋胀痛 ②咳嗽痰多 ③噎气呕吐	6—10克	
香橼	辛、微苦、酸、温	肝、脾、肺	与上相似，然作用略强	同上	3—10克	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
沉香	苦、辛、温	脾、胃、肾	行气止痛，温中散寒，降气纳肾	①胸腹胀痛、呕吐呃逆 ②气喘	1—1.5克	研末冲服或磨汁服
檀香	辛、温	脾、胃、肺	理气调中，散寒止痛	胸腹气滞胀痛	1—3克	紫檀功用与之相似
川楝子	苦、寒、有小毒	肝	疏泄肝热，行气止痛，杀虫疗癣	①脘腹胁肋疼痛、疝痛 ②虫积腹痛 ③头癣	3—10克外用适量	苦楝皮：功专杀虫
荔枝核	辛、温	肝、胃	行气，散寒，止痛	疝气、睾丸肿痛	10—15克	
薤白	辛、苦、温	肺、胃、大肠	通阳散结，行气导滞	①胸痹 ②泻痢后重	5—15克	
大腹	辛、微温	脾、胃、	下气宽中，利	①脘腹胀满	3—10	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
皮		大肠、小肠	水消肿	②水肿、脚气	克	
甘松	辛、甘、温	脾、胃	行气止痛，开郁醒脾	胸腹胀	3—6克	
山柰	辛、温	胃	温中行气，止痛	同上	3—6克	
刀豆	甘、温	胃、肾	降气止呃	呃逆呕吐	10—15克	
柿蒂	苦、平	胃	降气止呃	呃逆	6—10克	
梅花	酸、平	肝、胃	疏肝解郁和中开胃	胸胁脘腹胀痛，梅核气	3—6克	

复习思考题

- 1、试述理气药的定义及其适应证。
- 2、橘红、枳实、木香、乌药、香附、川楝子、薤白、沉香的功效和适应证各怎样？

- 3、比较橘红与枳实、木香与香附、乌药与沉香的功效和主治。
- 4、青皮、川楝子、大腹皮、薤白、降香功效特点是什么？

第十二章活血祛瘀药

- 第十二章活血祛瘀药

[自学时数] 8小时

[面授时数] 2小时

[目的要求]

1. 了解活血祛瘀药含义、功效、主要适用证。
2. 熟悉活血祛瘀药与温里、祛寒、清热凉血、祛风湿、清热解毒、行气和营、补益气血、软坚散结等药配伍应用的理论依据(联系中医基本理论)。
3. 掌握活血祛瘀药中常用药(川芎 延胡索 郁金 莪术 丹参 益母草 红花 牛膝)的功效、临证应用, 并比较其异同。
4. 掌握使用活血祛瘀药的注意事项。
5. 联系桂枝、丹皮、赤芍、大黄、山楂、三七、茜草、蒲黄等具有活血祛瘀作用的药物, 了解本章以外的活血祛瘀药, 扩大知识面。
6. 在自学本章全部内容的基础上, 重点掌握小结内容。

凡以通行血脉、促进血液运行、消散瘀血为主要作用的药物, 称为活血祛瘀药或活血化瘀药, 简称活血药。其中活血祛瘀作用较强者, 又称破血逐瘀药。

本类药物多属辛温之品。辛能散瘀化滞, 温可通行血脉, 善于走散, 具有行血、散瘀、通经、利痹、消肿及定痛等功效, 故适用于血行阻滞不畅、血瘀凝结不散的各种证候, 如血滞经闭, 痛经, 产后瘀阻腹痛, 胸痹, 肋肋疼痛, 肢体不遂, 风湿痹痛, 癥瘕痞块, 痈疡疮肿及跌打损伤, 骨折, 瘀肿疼痛等病证。瘀血证常见于临床各科, 其主要症状是:①疼痛(痛处固定不移)或麻木。②身体外部或内部出现肿块, 或外伤引起的血肿。③内出血, 在出血时夹有紫黯色血块。④皮肤、粘

膜或舌质出现瘀斑。瘀血内阻为多种病证的主要致病因素，又有不少疾患是在发病过程中逐渐出现血滞瘀阻证候的。

气之与血，相互关联。气行则血行，气滞则致血瘀，血凝亦可引起气滞。故在使用活血祛瘀药时常与行气药同用，以增强行血散瘀的作用。

形成瘀血的原因很多，诸如外受风寒，或热灼营血，或痰湿阻滞，以及跌打损伤等，皆可形成血行障碍，导致血滞瘀阻。故在运用活血祛瘀药时，应辨证审因，根据不同的证候和不同的药物性质，作适当的选择和配伍。如寒凝气滞血瘀者，宜配温里祛寒药，以温通经脉，消除寒证；如热灼营血，瘀血内阻者，应配合清热凉血药同用；对于剧烈疼痛，应选用具有活血行气及止痛双重作用的药物；至于痹证、肿痛，则应与祛风湿或清热解毒药合用；若跌打损伤，宜与行气和营之品配伍。对于出血而有瘀血者，应恰当处理祛瘀与止血的关系，不宜单纯使用活血祛瘀药。此外，使用活血祛瘀药，还要注意正气的强弱，若兼见正气不足者，应酌情配入补益气血的药物。对癥瘕积聚之证，应与软坚散结药配用，且此证往往发病已久，难于速去，故在使用破血逐瘀药时，宜与补气益血之品同用，并作丸、散剂服，攻补兼施，缓缓奏效。

本类药物多数能活血通经，故月经过多而无瘀滞，或血虚经闭者不宜用。其中能催生下胎或作用强烈的药物，则孕妇忌用。

芎藭

〔原文〕辛温升浮。为少阳胆引经，入手足厥阴心包、肝。气分。乃血中气药，助清阳而开诸郁，朱丹溪曰：气升则郁自降，为通阴阳血气之使。润肝燥而补肝虚。肝以泻为补，所谓辛以散之，辛以补之。上行头目，下行血海，冲脉。搜风⁽¹⁾散瘀，止痛调经。治风湿在头，血虚头痛，能引血下行，头痛必用之，加各引经药：太阳羌活，阳明白芷，少阳柴胡，太阴苍术，少阴细辛，厥阴吴茱萸。朱丹溪曰：诸经气郁，亦能头痛。腹痛胁痛，气郁血郁，湿泻血痢，寒痹筋挛，目泪多涕，肝热。风木为病，诸风眩掉，皆属肝木。及痈疽疮疡，痈从六腑生，疽从五脏生，皆阴阳相滞而成。气为阳，血为阴，血行脉中，气行脉外，相并周流，寒湿搏之，则凝滞而行迟，为不及；火热搏之，则沸腾而行速，为太过。气郁邪入血中，为阴滞于阳；血郁邪入气中，为阳滞于阴，致生恶毒，然百病皆由此起也。芎藭能和血行气而通阴阳。男女一切血证。然香窜辛散，能走泄真气，单服久服，令人暴亡。单服则脏有偏胜，久服则过剂生邪，故有此失。若有配合节制，则不至此矣。昂按：芎、地酸寒为阴，芎、归辛温为阳，故四物取其相济以行血药之滞耳。川芎辛散，岂能生血者乎？治法曰：验胎法，妇人过经三月，用川芎末，空心热汤调服匙，腹中微动者是胎，不动者是经闭。蜀产为川芎，秦产为西芎，江南为抚芎，以川产大，里白不油，辛甘者胜。白芷为使。畏黄连、硝石、滑石。恶黄芪、山茱萸。

【讲解】 (1)搜风：祛风法之一。

川芎功能活血行气、祛风止痛，为血中气药。为伞形科多年生草本植物川芎的根茎。《本经》原称芎藭，产于四川者称川芎藭，简称川芎，后因历代医家均以道地药材而习用川芎，以取代芎藭原名。本品除四川产外，他地也有，但品质略有差异，如江西产者称西抚芎，甘肃、陕西产者称西芎等。生用，或酒炒、麸炒。

本品味辛性温。入肝、胆、心包经。辛散气滞，温通血脉，故有活血行气、祛风止痛之功。其特点，香窜善行，走而不守，能上行头巅，下达血海，外彻皮毛，旁通四肢，为血中气药。其发散力微，止痛效强，尤为治头痛之要药，不论风寒，风热、气虚、血虚，以及瘀血头痛，均可配伍应用。妇女月经不调，经闭腹痛及癥瘕等证，也为常用

之品。此外，其行气开郁之功，对胸胁胀痛和气血瘀阻的疮疡肿痛，风湿痹痛，也有疗效。

总之本品作用“以通为用”，凡气血瘀滞而“不通则痛”诸证，用之均有较好疗效。惟辛温香燥之品，对于阴虚火旺，肝阳上亢之头痛，和月经过多者及孕妇须忌用。《药品化义》有“单服及久服，反走散胆中真气，故丹溪云久服能致暴亡”之说。

【临证应用】 川芎活血行气，凡血瘀气滞所致诸证，皆可配伍应用。如月经不调、经闭、痛经、产后腹痛等，常配当归、赤芍、香附等药，以调经止痛；治胁肋疼痛，常配柴胡、郁金等药，以疏肝活血；癥痕积块、跌打损伤，及疮疡肿痛，又可与赤芍、红花等配用。

川芎祛风止痛之功颇佳，又善升散，治头痛尤有良效。风寒头痛配白芷、羌活、细辛等，如川芎茶调散；风热头痛则配菊花、僵蚕、石膏等以疏散风热，如川芎散；风湿头痛配羌活、藁本、防风等，如羌活胜湿汤；治血瘀头痛，又可与丹参、赤芍、红花、白芷等伍用；血虚头痛则多配当归、白芍等同用。若治风湿痹痛，可与独活、桂枝、桑枝等祛风通络药配用。

近年来，临床上配伍红花、丹参、赤芍等药物，治疗冠心病心绞痛，取得了一定疗效。

【用量用法】 3-10克， 煎服。生用辛温香窜，恐有耗气伤血之虞，炒后可略缓其性，而为血虚气弱者所宜。在补血剂中多用炒者，既可通达气血，使补而不滞，又不致辛散不守，走散真气。若用酒炒，可借酒之辛通，而增活血行气止痛之功。

延胡索

〔原文〕 辛苦而温。入手足太阴肺、脾厥阴心包、肝经。能行血中气滞，气中血滞，通小便，除风痹。治气凝血结，上下内外诸痛，通则不痛。癥瘕崩淋，月候不调，气血不和，因而凝滞，不以时至。产后血运，暴血上冲，折伤积血，疝气危急，为活血利气第一药。然辛温走而不守，独用力迅，宜兼补气血药。通经坠胎，血热气虚者禁用。根如半夏，肉黄小而坚者良。酒炒行血，醋炒止血，生用破血，炒用调血。

【讲解】 延胡索为活血、利气、止痛良药。为罂粟科多年生草本植物延胡索的块茎。形状有类半夏而色黄。又名玄胡索、元胡索。捣碎生用，或醋制用。

本品味苦且辛，性温。辛散，苦泄，温通，归肝、心、肺、脾经。既入血分，又入气分，既能行血中之气，又能行气中之血，为活血行气要药。盖气郁则痛，血滞亦痛，气行血活，通则不痛，故又为止痛之良药。因此，不论是气是血，凡瘀而不散，滞而不行所致一身上下内外诸痛，均可应用，对腕腹疼痛其效尤捷。此外，尚有利小便，通风痹之功。

【临证应用】 延胡索可用于气血阻滞所引起的多种疼痛之证。如腕腹疼痛，偏热者，常配川楝子，如金铃子散；偏寒者，配高良姜、肉桂。疝痛，多配小茴香、橘核。痛经，常配川芎、当归、白芍。胸胁痛，配川芎、瓜蒌、薤白、郁金等。跌打损伤之瘀血肿痛，则可配乳香、没药等。现代临床上还用其与活血行气药配伍治疗冠心病心绞痛等。

【用量用法】 3~10克，煎服。研末服每次1.5~3克。延胡索可生用，亦可炒用，且每多用醋炒。前人认为醋炒可加强其入肝止痛之效，现代研究证实，延胡索醋炒可使其中有效成分溶解度大大提高，而止痛之功加强，且能止血。若用酒炒，借酒辛散通达之性，可增强其行血祛瘀之力，多与活血祛瘀药配伍而治疗跌打损伤等瘀血疼痛。

郁金

〔原文〕辛苦气寒，纯阳之品。其性轻扬上行，入心及包络，兼入肺经。凉心热，散肝郁，下气破血。行滞气，亦不损正气；破瘀血，亦能生新血。治吐衄尿血，妇人经脉逆行，经不下行，上为吐衄诸证，用郁金末，加韭汁、姜汁、童便服，其血自清，痰中带血者，加竹沥。**血气诸痛，产后败血攻心**（1），**颠狂失心**（2），颠多喜笑，尚知畏惧，证属不足，狂多忿怒，人莫能制，证属有余。此病多因惊忧，瘀血塞于心窍所致。郁金七两，白矾三两，米糊丸服，名白金丸，郁金入心散恶血，明矾化顽痰故也。**痘毒入心**，郁金一两，甘草二钱半，煮干焙研末，冰片五分，每用一钱，加猪血五七滴，新汲水下，治斑痘始有白泡，忽搐入腹，紫黑无脓。**下蛊毒**。同升麻服，不吐则下。出川、广，体锐圆如蝉肚，外黄内赤，色鲜微香，味苦带甘者真。

【讲解】（1）败血攻心：指分娩后由于恶露，瘀血不下，或下而不畅所产生的以神志错乱为主要特征的病证。（2）颠狂失心：癫狂并称，是指精神错乱的一类疾病。癫证古时又称失心风。

郁金为血中气药，以凉血清心，行气解郁，活血止痛为主要功用。为姜科多年生宿根草本植物郁金、莪术或姜黄，及广西莪术的块根。处方常写川郁金、广郁金。广郁金为植物姜黄的块根，药材呈卵圆形或长卵圆形，个大肥满，断面澄黄色，主产四川。川郁金为植物郁金的块根，断面呈暗灰色，主产浙江。切片生用。本品辛散苦泄，性寒清热，主入心、心包、肝三经血分，兼入肺经气分。其入气分则主疏肝行气以解郁；入血分则主活血消瘀以止痛，为血中气药。故凡气血郁滞所致诸病，以及血热瘀滞所致的吐衄等各种出血证，皆为常用之品。此外，本品芳香宣达，又能清心、解郁，对于神昏、癫狂属于痰热蒙蔽心窍者，亦常用之。

【临证应用】郁金常用于肝气郁滞、瘀血内阻所致的病证。如治胸胁胀痛，可配丹参、柴胡、香附等同用，治痛经、月经不调由于气血郁滞，且偏于热者，常与柴胡、白芍、丹皮、香附等伍用，如宣郁通经汤；治癥瘕痞块，又可与丹参、鳖甲、青皮等同用。若治肝郁化热，迫血妄行的吐血、衄血，及妇女倒经等兼有瘀滞现象者，可配生

地、山梔、牛膝等同用。借郁金清心凉血、行气开郁之功，常与芳香开窍的菖蒲，及豁痰清心的竹沥、山梔等配伍，治湿温病浊邪蒙蔽清窍的神志不清，如菖蒲郁金汤；还可以配明矾等涤痰药治痰气闭阻的癫痫或癫狂等证，如白金丸。

此外，现代临床上郁金又常用于黄疸、胆石症等，多与茵陈、山梔配伍，以增强利胆退黄之功。

【用量用法】 6~12克，煎服。气滞者多用广郁金，气滞兼血瘀者多用川郁金。畏丁香。

姜黄

〔原文〕 苦辛，本草大寒，藏器《大明》曰热。色黄，入脾兼入肝经。理血中之气，下气破血，除风消肿，功力烈于郁金。治气胀血积，产后败血攻心，通月经，疗扑损。片子者，能入手臂，治风寒湿痹。血虚臂痛者勿用。李时珍曰：人臂治痛，其兼理血中之气可知。出川、广。陈藏器曰：郁金苦寒色赤，姜黄辛温色黄，莪术味苦色青。三物不同，所用各别。《经疏》曰：姜黄主治，介乎三棱、郁金之间。李时珍曰：姜黄、郁金、莪术，形状功用大略相近，但郁金入心，专治血，姜黄入脾，兼治血中之气 莪术入肝，治气中之血，稍为不同，今时以扁如干姜者，为片子姜黄，圆入蝉腹者，为蝉肚郁金，并可染色。术形虽似郁金，而色不黄也。

【讲解】 姜黄以活血祛瘀、行气止痛为主要功效。为姜科多年生宿根草本植物姜黄的根茎。外表深黄色，质坚不易折断，断面亦为黄色，切片生用。

本品辛苦而温。 入肝、脾经。辛温相合，能外散风寒，内行气血；苦温相合，能外胜寒湿，内破瘀血。故有祛痰、行气、止痛、疗痹之效，凡气滞血瘀诸痛均可应用，风湿痹痛，肩臂酸痛无常用之。但活血行气之力较强，疼痛非邪实血瘀者不宜用之。

【临证应用】 姜黄用于气滞血瘀所致的胸胁疼痛，常与柴胡、白芥子等合用，如胁痛方。用于经闭腹痛，常与当归、白芍、红花、元胡等伍用，如姜黄散。治风湿肩臂痛，常与羌活、芍药、当归等同用，如舒筋汤。

此外，姜黄与大黄、白芷等配伍，研末外敷，可治一切痈疡疮疖，初起红肿热痛者。

《备要》言“片子”者，指植物郁金的根茎，药材称片姜黄，或片子姜黄，治痹证臂痛效佳。

【用量用法】 5—10克，煎服。外用适量。

蓬莪术

【原文】 辛苦气温。入肝经血分，破气中之血，能通肝经聚血。消瘀通经，开胃化食，解毒止痛。治心腹诸痛，冷气吐酸，奔豚瘀癖。酒醋磨服。瘀，音贤，小腹积。瘀癖多见于男子，癥瘕多见于妇人，莪术香烈，行气通窍，与三棱同用，治积聚诸气良。按五积：心积曰伏梁，起脐上，至心下；肝积曰肥气，在左肋；肺积曰息贲，在右肋；脾积曰痞气，在胃脘右侧；肾积曰奔豚，在小腹上至心下。治之不宜专用下药，恐损真气，宜于破血行气药中，加补脾胃药。气旺方能磨积，正旺则邪自消也。经曰：大积大聚，其可犯也。衰其大半而止，过者死。东垣五积方，用三棱、莪术，皆兼人参赞助成功。按治积诸药，神曲、麦芽化穀食，莱菔化面食，硃砂、阿魏、山楂化肉食，紫苏化鱼蟹毒，葛花、枳椇消酒积，麝香消酒积、果积，芫花、牵牛、大戟行水饮，三棱、莪术、鳖甲消癥瘕，木香、槟榔行气滞，礞石、蛤粉攻痰积，巴豆攻冷积，大黄、芒硝攻热积，雄黄、膩粉攻涎积，虻虫、水蛭攻血积。虽为泄剂，亦能益气。王好古曰：故治气短不能接续，大小七香丸、积香丸，诸汤散中多用之。根如生姜，莪生根下，似卵不齐，坚硬难捣。灰火煨透，乘热捣之，入气分。或醋磨酒磨，或煮熟用。入血分。

【讲解】 莪术功能破血祛瘀、行气止痛。为姜科多年生草本植物莪术、郁金，或广西莪术的根茎。原名蓬莪术，现通称莪术。其根茎呈卵圆形，质坚实，故《备要》言坚硬难捣。

本品辛苦性温，入肝、脾二经。功效与三棱相同，亦为破瘀瘕积聚之要药。凡气血阻滞，有形坚积之证，两药常相须为用，以增强攻坚破积之力。两者相较，活血之力三棱优于莪术，而行气之功莪术胜于三棱。但系克伐之剂，用之必须注意顾护正气。其他使用注意事项与三棱同。本品尚有开胃化食，解毒止痛之功。《备要》言“虽为泄剂，亦能益气”，并非治气虚短气，用此能补，而是行气散滞，治气郁胸闷气短。

【临证应用】 莪术传统应用与三棱相同。近年来，还用于肝脾肿大、癌肿等，如莪术注射液，对子宫颈癌有一定疗效。

【用量用法】 3—10克，亦多醋制后用，煎服。月经过多及孕妇忌用。

荆三棱

【原文】 苦平。色白属金，皮黑肉白。入肺金血分。破血中之气，亦通肝经聚血。兼入脾经。散一切血瘀气结，疮硬食停，老块坚积。乃坚者削之，从血药则治血，从气药则治气，须辅以健脾补气药良。昔有人患癥瘕死，遗言开腹取之，得病块如石，文理五色，削成刀柄，因砍三棱，柄消成水，乃知此药，可疗癥瘕。消肿止痛，通乳堕胎。功近香附而力峻，虚者慎用。色黄体重，若鲫鱼而小者。醋浸炒，或面裹煨。

【讲解】 三棱既能破血祛瘀，又可行气止痛。为黑三棱科多年生草本植物黑三棱的块茎。另有沙草科植物荆三棱的块茎也作药用。然在药材上植物黑三棱的块茎称荆三棱，而植物荆三棱的块茎则称黑三棱。虽植物名与药材名因误称而相反，但已沿用成习。切片晒干，生用或醋炒用。

本品苦平泄降，入肝、脾血分能破血祛瘀，入气分能行散气滞，破血、行血、止痛作用都较强，为破癥瘕积聚之品，凡血瘀气滞诸症皆可应用。对食积气滞，胸腹胀痛，用之又有行气消积之效。《纲目》云“其功可近于香附而力峻，故难久服。”此品攻坚破积，易伤正气，故体虚无瘀、月经过多者及孕妇都不宜用。若体虚邪实而必用者，当配扶正药同用。

【临证应用】 三棱用于气血瘀滞、癥瘕积块，有“坚者削之”之力，常与莪术同用，如三棱煎。对妇女血滞经闭、痛经、产后瘀血腹痛等也有良效，常与莪术、川芎、丹皮、牛膝等伍用，如三棱丸。治食积腹痛，可与莪术、青皮、麦芽等配伍，如莪术丸。

【用量用法】 3—10克，煎服。用醋制后可缓和药性，增强止痛之功。月经过多及孕妇忌用。

丹参

【原文】 气平而降，《本经》 微寒。 弘景曰：性应热。味苦色赤。入心与包络。破宿血，生新血，瘀去然后新生。安生胎，养血。堕死胎，去瘀。调经脉， 风寒湿热， 袭伤营血， 则经水不调。先期属热，后期属寒，又有血虚、血瘀、气滞、痰阻之不同。大抵妇人之病，首重调经，经调则百病散。除烦热，功兼四物，一味丹参散，功同四物汤。为女科要药。治冷热劳，骨节痛，风痹(1)不随，手足缓散，不随人用。经曰：足受血而能步，掌受血而能握。肠鸣腹痛，崩带癥瘕，音征加。癥者有块可征；瘕者假也，移动聚散无常。皆血病。血虚血瘀之候，又治目赤疔痛，疮疥肿毒，排脓生肌。郑奠一曰：丹参养神定志，通利血脉，实有神验。畏硷水。忌醋。反藜芦。

【讲解】 (1) 风痹：痹即闭阻不通之意。人体肌表、经络受风寒湿邪侵袭而引起的肢体关节痛重麻木等证称痹证。风痹为痹证中风邪较甚的一种。

丹参活血祛瘀，适用于血热血瘀诸证。为唇形科多年生草本植物丹参的根。因根色紫红，故又名“紫丹参”。生用或酒炒用。

本品味苦性微寒，苦能降泄，寒能清热，入心、心包、肝经血分。功能活血祛瘀、凉血消痈、清心除烦，主治一切血瘀血热之证。《备要》言可以安生胎、堕死胎、调经血，治冷热劳、骨节风痛、风痹不遂、肠鸣腹痛、崩带癥瘕、目赤疔痛、疮疥肿毒，排脓生肌，皆取其祛瘀之功，无瘀则不宜用。

古有“一味丹参，功同四物”之说，妇女病颇多用之。实则四物汤补血调血，为补血常用之方，然丹参只有祛瘀之能，而无补血之功，云其“补血”，不过是祛瘀生新之义。故若证属纯虚无瘀，或虚而挟寒者，皆非所宜。

【临证应用】丹参在临床上应用甚广，多种瘀血为患的病证，用之皆可获效。因其性偏寒凉，对血热、瘀滞者尤为相宜。如用于妇女月经不调，血滞经闭，产后瘀滞腹痛等妇科病证，常与活血祛瘀药红花、桃仁、益母草等配伍；用于气滞血瘀的心腹、胃脘疼痛，可与檀香、

砂仁等行气活血药同用，如丹参饮；治癥瘕积聚，可与三棱、莪术、鳖甲等配伍。现用治肝脾肿大，常配当归、郁金、香附等，有软坚消积的作用。对于瘀带留阻的肢体疼痛、跌打损伤，常和当归、乳香、没药等伍用，如活络效灵丹。

用于疮痈肿痛，借其凉血散瘀之功，可收消肿止痛之效，常与银花、连翘、蒲公英、赤芍等伍用，如治乳痈的消乳汤。

此外，温热病热入营血，心烦不寐，可配生地、元参、连翘、竹叶等，如清营汤，即用本品以清心除烦。

近年来，对丹参的药理研究和临床使用都有很大发展，配降香、川芎等，治疗冠心病心绞痛，有明显效果。且制成多种剂型使用，如丹参舒心片、丹参注射液等，已广泛使用。

【用量用法】 5-15克，煎服。酒炒可增强活血之功。反藜芦。

益母草

【原文】 辛微苦寒，入手足厥阴。心包、肝。消水行血，去瘀生新，调经解毒。淤血去则经调。治血风血运，血痛血淋，胎痛难产，崩中带下，带脉横于腰间，病生于此，故名为带。赤属血，白属气。气虚者，补中益气而兼升降；血虚者，养血滋阴而兼调气。为经产良药。消疗肿乳痈，亦取其散瘀解毒。通大小便。然辛散之药，瞳子大者忌服。

益母子，主治略同。调经益精，明目。血滞病目者则宜之。活血，顺气逐风。气行则血行，血活则风散。行中有补，治心烦头痛，血虚血热之候。胎产带崩，令人有子。有补阴之功。李时珍曰：益母根、茎、花、叶、实，皆可同用。若治疮肿胎产，消水行血，则宜并用；若治血分风热，明目调经，用子为良。盖根、茎、花、叶专于行，子则行中有补也。《产宝》 济阴返魂丹，小暑端午，或六月六日，采益母茎叶花实，为末蜜丸，治胎产百病。近效方，捣汁熬膏亦良。忌铁。子微炒用。

【讲解】 益母草善能活血通经，为妇科经产要药。为唇形科一年生或二年生草本植物益母草的全草。《本经》又名茺蔚。生用或熬膏用。

本品辛苦微寒，入心包、肝血分。辛开苦泄，寒凉清热，故能活血调经、利尿消肿，主治妇女血脉瘀滞之月经不调，经闭，产后瘀滞腹痛等。《备要》言治血风、血晕、血痛、血淋，诸证皆由血脉瘀带，益母草功可活血，则上证可治。至于治崩中、带下，也是取其祛瘀生新之效。所谓祛瘀生新，乃指瘀血祛、新血得生，并血得以归经之义。本只并无止血、解毒作用。

此外， 借其活血祛瘀的作用，能治疮痈。

茺蔚子，即益母草种子，活血调经之功与益母草相似，又善清肝明目，多用于肝热头痛、目赤肿痛， 或目生翳膜等证。至于《备要》中所云能顺气逐风，行中有补等语，皆非其主要功用。

【临证应用】 益母草善能活血调经，为妇科经产要药，故有益母之名。主治妇人血瘀经闭腹痛、月经不调等证，多与当归、赤芍等伍用，如益母丸，也可单味熬成益母草膏应用。然必是有血热、血滞及

胎产艰涩者才为其所宜，若血气素虚，滑泄不固者，不可用之，慎勿固执益母之名。

本品兼治水肿、小便不利。近代用其与利尿药配伍治急、慢性肾炎，效果明显。可单味煎服，也可与白茅根等合用，以增强利尿消肿之效。此外，近代研究认为益母草还有降压作用，可用于高血压病。

益母草子在妇人诸疾少用，主要用其治目疾。如肝热头痛、目赤肿痛，可与青葙子、决明子等同用；目昏或目生翳膜者，可配枸杞子、生地等滋补肝肾之品伍用。

【用量用法】 益母草用10-30克，单用时剂量可至30-60克，煎服。茺蔚子一般用5-15克，然本品辛散通达，凡瞳孔散大、血虚无瘀者慎用。

泽兰

【原文】 苦泄热，甘和血，辛散郁，香舒脾。入足太阴厥阴。

脾、肝。 通九窍，利关节，养血气，长肌肉，破宿血，调月经，消癥瘕，散水肿。防己为使。治产后血沥腰痛，瘀行未尽。吐血鼻血，目痛头风，痈毒扑损。补而不滞，行而不峻，为女科要药，古方泽兰丸甚多。李时珍曰：兰草、泽兰，一类二种，俱生下湿。紫茎素枝，赤节绿叶，叶对节生，有细齿。但以茎圆节长，叶光有岐者为兰草；茎微方节短，叶有毛者为泽兰。嫩时并可掬^{音那}。而佩之。

《楚辞》所谓“纽秋兰以为佩”是也。朱文公《离骚辨证》曰：必花叶俱香，燥湿不变，方可刈佩。今之兰蕙，花虽香而叶无气，质弱易萎，不可刈佩。吴人呼为香草，俗名孩儿菊。夏日采置发中，则发不堕，浸油涂发，去垢香泽，故名泽兰。兰草走气分，故能利水道，除痰癖（1），杀蛊辟恶，而为消渴良药；经曰：数食肥甘，传为消渴，治之以兰，除陈气也。泽兰走血分，故能消水肿，涂痈毒，破瘀除癥，而为妇人要药。以为今之山兰者，误矣。防己为使。寇宗奭、朱丹溪，并以兰草为山兰之叶，李时珍考众说以讥之。按《别录》曰：兰叶甘寒，清肺开胃，消痰利水，解郁调经，闽产者力胜。闽产为胜，则是建兰矣。李士材曰：兰叶禀金水之气，故入肺脏。东垣方中尝用之。《内经》所谓治之以兰，除陈气者是也，余屡验之。李时珍又谓东垣所用乃兰草也。其集诸家之言曰：陈迥斋闲览云楚骚之兰，或以为都梁香，或以为泽兰，或以为猗兰，当以泽兰为正。今之所种如麦门冬者，名幽兰，非真兰也。故陈止斋著《盗兰说》以讥之。既名幽兰，正合骚经矣。方虚谷《订兰说》，言古之兰草，即今之千金草，俗名孩儿菊者。今之所谓兰，其叶如茅者，根名土续断，因花馥郁，故得兰名。杨升庵曰：世以如蒲萱者为兰，《九畹》之受诬也久矣。又吴草庐《有兰说》曰：兰为医经上品，有根有茎，草之植者也。今所谓兰无枝无茎，因黄山谷称之，世遂谬指为《离骚》之兰。寇氏本草溺于流俗，反疑旧说为非。夫医经为实用，岂可诬哉？今之兰果可以利水杀虫而除痰癖乎？其种盛于闽，朱子闽人，岂不识其土产而辨析若此？世俗至今，犹以非兰为兰，何其惑之甚也！昂按：朱子辨兰，援《离骚》纫佩以为证，窥谓纫佩亦骚人风致之词耳。如所云“饮木兰之坠露，餐秋菊之落英”，岂真露可饮而英可餐乎？又云“制芰荷以为衣，集芙蓉以为裳”，岂真芰荷可衣，芙蓉可裳乎？宋儒释经执泥，恐未可为定论也。第《骚经》既言秋兰，则非春兰明矣；《本经》既言泽兰，则非山兰明矣。是《离骚》之秋兰，当属《本经》之泽兰无疑也。然《离骚》不尝曰“春兰兮秋菊”乎？不又曰“结幽兰而延佇”乎？不又曰“疏石兰以为芳”乎？若秋兰既属之泽兰，将所谓春兰、幽兰、石兰者，又不得为山兰，当是

何等之兰乎？且山兰为花中最上之品，古今评者，列之梅菊之前，今反屈于孩儿菊之，以为盗袭其名。世间至贱之草，皆收入本草，独山兰清芬佳品，摈弃不录，何其不幸若斯之甚也！本草杀虫之药良多，皆未必有验，至于行水消痰，固山兰些之叶力所优为者也。盖李时珍、陈、方、吴、杨辈，皆泥定陈藏器以泽兰、兰草为一类二种，遂并《骚经》而疑之，崇泽兰而黜山兰，遂令兰草无复有用之者。不思若以为一类，则《本经》兰草一条，已属重出，何以《本经》兰草反列之上品，而泽兰止为中品乎？况一入气分，一入血分，回然不同也。又《骚经》言兰者凡五，除木兰人所共识，其余春兰、秋兰、幽兰、石兰，若皆以为孩儿菊，是不特一类二种，且四种一类矣。而以为《九畹》之受诬，岂理也哉？盖《本经》言泽兰，所以别乎山也，言兰草，明用叶而不用其花也；《骚经》言秋兰，所以别乎春也；言石兰，所以别乎泽也。愚谓秋兰当属泽兰，而春兰、石兰，定是山兰。其曰幽兰，则山兰之别名，以其生于深山穷谷故也。寇氏、朱氏之论，又安可全非也。姑附愚说，以谫多识之士。

【讲解】（1）痰癖：古病名。指水饮久停化痰，流移胁，肋之间，以致时有肋痛的病证。

泽兰功善活血调经、祛瘀散结，为妇科常用之药。为唇形科多年生草本植物地瓜儿苗或毛叶地瓜儿苗的全草。其茎方形，节明显，叶对生，边缘有粗锯齿，上面略光泽无毛，下面有白柔毛。书言兰草者，是指药材佩兰的原植物，李时珍谓是“一类二种”，其实，佩兰为菊科植物兰草的全草，其茎圆柱形，叶亦对生，形似泽兰，而揉之浓郁芳香。《本草求真》曰：“二物并于嫩时皆可刈佩，以其花叶皆香，置于发中能辟垢省头，故虽呼为香草，俗则呼孩儿菊。”此即兰草。

本品苦辛气香，微温通达，入肝、脾经。能舒肝脾而通经脉，具有祛瘀而不伤正之特点，为妇科常用药。故凡血脉瘀滞，经行不利，产后腰痛以及痈肿、跌打伤痛等，均可配伍应用。尚兼利水消肿之效，偶亦用于水肿。

【临证应用】泽兰性较温和，不寒不燥，行而不峻，妇科诸证尤常用之。如血滞经闭、经行腹痛、月经不调、腹中包块、产后瘀滞腹痛等证，皆可与当归、丹参、芍药等配伍应用，如泽兰汤。本品行水消肿之功虽较弱，但亦可配防己、茯苓等用于产后小便不利、身面浮肿。

此外，取其散瘀之功，又能用于痈肿、跌打伤痛，配桃仁、红花、当归等。

【用量用法】 10- 15克， 煎服。

附：佩兰 佩兰为菊科植物兰草的地上部分。味辛性平，入脾、胃经。清香辛散，善能化湿解暑，兼能发散表邪。为治湿浊困脾，口中甜腻、苔垢多涎之“脾瘴”要药，又为夏伤暑湿或湿温初起，寒热头胀、身重胸闷等证的常用药。前者常与苍术、厚朴、白豆蔻等同用；后者多与藿香、青蒿、薏苡仁等配用。

泽兰与佩兰实为二种植物，功效亦不相同，泽兰苦温，行血之功为优，佩兰辛平，化湿之功为胜。前者偏于走下，后者偏于走上，一主血分，一主气分，不可不辨。用量5 ~10克。

桃仁

【原文】 苦平微甘。孙思邈，辛；孟诜，温。孙思邈著《千金方》，孟诜著《食疗本草》。厥阴心包、肝。血分药。苦以泄血滞，甘以缓肝气而生新血，成无己曰：肝者，血之源，血聚则肝气燥，肝苦急，宜急食甘以缓之。通大肠血秘。治热入血室，冲脉，血燥血痞，损伤积血，血痢经闭，咳逆上气，血和则气降。皮肤血热燥痒，蓄血发热如狂。仲景治膀胱蓄血，有桃仁承气汤，，即调胃承气汤加桃仁、桂枝，又抵当汤，用桃仁、大黄、虻虫、水蛭。水蛭，即马螯。蛭食血之虫，能通肝经聚血，性最难死，虽炙为末，得水即活，若入腹中，生子为患。田泥和水饮下之。虻虫，即蚊虫，因其食血，故用以治血。血不足者禁用。行血连皮尖生用，润燥去皮尖炒用。俱研碎，或烧存性用。双仁者有毒，不可食。香附为使。

桃花，苦平。下宿水，除痰饮，消积聚，利二便，疗风狂病。范纯佑女，丧夫发狂，夜断窗棂，登桃树食花几尽，自是遂愈，以能泻痰饮滞血也。

桃叶，能发汗。凡伤寒风痹发汗不出，以火煨地，用水洒之，铺干桃叶厚二三寸于上，卧上，温覆取大汗，敷粉极燥，即瘥。麦麸、蚕沙，皆可如此法用。桃为五木之精，其枝、叶、花、仁，并能辟邪。《食医心镜》：桃仁煮粥，治鬼证咳嗽。生桃食多生痈疔。

【讲解】桃仁长于行血破瘀，兼能滑肠通便。为蔷薇科落叶小乔木植物桃或山桃的种仁。烫去种皮，生用。多捣碎入药。

本品味苦性平，入心、肝、肺、大肠经。功专活血祛瘀，对痛经、血滞经闭、产后瘀滞腹痛、癥瘕、跌打损伤、瘀阻疼痛等瘀血阻滞之证，皆可应用。还有活血消痈之功，以治肺痈、肠痈等证。桃仁质润，兼有润燥滑肠之功，可用于肠燥便秘。此品苦泄降气，尚能止咳，故有止“咳逆上气”之说，用治咳嗽气喘，可作为辅助之品。

桃花为桃或山桃的花。味苦性平，入心、肝、胃经。有利水、活血、通便之功，治疗水肿、脚气、痰饮、积滞、二便不利、经闭等证。

桃叶为桃或山桃的叶。味苦性平，入脾、胃经。具有祛风湿、清热、杀虫之功，治头风、头痛、风痹、疟疾、湿疹、疮疡、癣疮等证。桃叶、桃花临床均少使用。

【临证应用】桃仁祛瘀之力较强，常与红花、当归、川芎、赤芍等同用，如桃红四物汤，治疗瘀血阻滞之妇科病证及癥瘕痞块；若配伍当归、酒大黄、穿山甲等，如复元活血汤，治疗损伤瘀痛。桃仁配伍鲜芦根、冬瓜子、薏苡仁，如苇茎汤，治疗热郁瘀滞之肺痈初起；配伍大黄、牡丹皮、冬瓜子、芒硝，如大黄牡丹汤，治疗肠痈初起。桃仁配火麻仁、瓜蒌仁等，如润肠丸，可用于肠燥便秘。据临床观察，桃仁确有较好的镇咳作用，可代替杏仁使用，但终属祛瘀之品，止咳之功并不常用。

【用量用法】 6-10克，煎服。本品破血祛瘀，可堕胎，故孕妇忌用。

红花

〔原文〕辛苦甘温。入肺经而破瘀血，活血瘀行则血活。有热结于中，暴吐紫黑血者，吐出为好，味未尽，加桃仁、红花行之。大抵鲜血宜止，瘀血宜行。润燥，消肿止痛。凡血热、血瘀则作肿作痛。治经闭便难，血运口噤，胎死腹中，非活血行血不能下。痘疮血热，本草不言治痘。喉痹不通。又能入心经，生新血。须兼补益药为佐使。俗用染红，并作胭脂。胭脂活血解毒。痘疗挑破，以油胭脂敷之良。少用养血，多则行血，过用能使血行不止而毙。血生于心包，藏于肝，属于冲任，红花汁与相类，故治血病。有产妇血闷而死，名医陆氏以红花数十斤煮汤，寝妇于上而薰之，汤冷再加，半日而苏。《金匱》有红蓝花酒，云治妇人六十二种风。

【讲解】红花少用活血通经，多则破血逐瘀。为菊科二年生草本植物红花的筒状花冠。古称红蓝花。《本草图经》云：“红蓝花，即红花也……，叶颇似蓝，故有蓝名。”今多称草红花，生用。

本品辛散温通，入心、肝、肺三经，功能活血通经，祛瘀止痛，适用于瘀血阻滞的经闭，腹痛，癥瘕，产后血晕及跌打损伤等多种病证，为内、外、妇、儿、伤科活血方剂中常用之品。小剂量能活血通经，大剂量则破血逐瘀，催生下胎。《备要》言少用养血。并非指红花有养血作用：而是少量能和血，以祛瘀生新。在补血方剂中配伍少量红花，可以通畅血行，防止补而呆滞。此外，古人告诫，过用能使血行不止而毙。

【临证应用】红花可用于多种瘀血阻滞之疾，如痛经、经闭、产后瘀血腹痛，可配桃仁、当归、川芎等，如桃红四物汤。《保命集》红花汤即以本品配丹皮、当归、蒲黄等研末酒调服，治产后血瘀，用于癥瘕则常合三棱、莪术、桃仁、赤芍等同用。

由于热郁血滞、斑疹颜色不红活，也可借其活血化滞之功与紫草、大青叶等伍用，如当归红花饮。

近年来，红花应用更加广泛，如治疗冠心病，常与丹参、川芎同用；治疗血栓闭塞性脉管炎，配桃仁、赤芍、乳香、没药等合用，均有较

好疗效。

【用量用法】 3-10克，煎服。本品活血通经之力较强，凡无瘀滞者，及月经过多，孕妇均忌用。

附：番红花 为鸢尾科多年生草本植物番红花的干燥柱头及花柱上部。原产法国、荷兰、印度等国，早年从印度经西藏传入我国，故又称藏红花、西红花。本品气香味甘性寒，功效与草红花相似，而药力较强，兼有养血、凉血、解毒之功。可用于温病热入营血、发斑发疹，尤宜于斑疹色不红活之证。但本品货少价昂，临床极少应用。用量1.5-3克。

鸡血藤

【原文】活血舒筋。治男妇干血劳，一切虚损劳伤，吐血、咯血、咳血、嗽血，诸病要药。

【讲解】鸡血藤功能行血补血，更有舒筋活络之功。为豆科攀援灌木密花豆和香花崖豆藤等的藤茎。切片生用，或熬制鸡血藤膏用。

本品味苦、微甘，性温。主入肝经。苦泄温通，味又兼甘，既能行血，又能补血，但行血之力较强，有行血而不伤血，补血而不滞血之优点。对妇女月经不调，经行不畅，痛经，经闭诸证，无论虚实，皆可应用，虚而兼滞者最为相宜。更能舒筋活络，对风寒湿邪、痹阻经络，或因血虚、血不养筋之肢体麻木、筋脉拘挛、关节痠痛等证，尤为适用。此外，对于因放射治疗而引起的白细胞下降，也有一定的疗效。

鸡血藤膏是由本品加工制成，功用相同，而补血作用较佳，更能止血，可治各种出血之证。

【临证应用】鸡血藤用于月经不调，经行腹痛及血虚经闭之证，常与四物汤（地黄、当归、芍药、川芎）同用，以增强活血补血调经的疗效，治血虚或风湿所致痹证、肢体瘫痪等，可与桑寄生、牛膝、独活、秦艽、木瓜等强筋骨、祛风湿、活血通络药同用。若与黄芪、大枣配伍，治白细胞减少，收效迅速而持久。鸡血藤膏用于血虚之证，可单用或随证配合相应的药物同用。

【用量用法】 10-30克，煎服，或浸酒服。鸡血藤膏用量5-15克，烊化冲服。

乳香

【原文】 香窜入心，苦温补肾，辛温通十二经。能去风伸筋，筋不伸者，敷药加用。活血调气，托里护心，香彻疮孔，能使毒气外出，不致内攻。生肌止痛。治心腹诸痛，口噤耳聋，痈疽疮肿，产难折伤，皆取其活血止痛。亦治癫狂。以能去风散瘀。灵苑辰妙散，辰砂一两，乳香、枣仁各五钱，酒下，恣饮沉醉，听睡一二日勿动，惊醒则不可治。《本事方》加人参一两、名宁志膏。出诸番，如乳头明透者良。市人多以枫香伪之。性粘难研，水飞过，用钵坐热水中研之，或用灯心同研则易细。

【讲解】乳香功能活血止痛、消肿生肌，为外、伤科常用之要药。为橄榄科小乔木卡氏乳香树及其同属植物皮部渗出的树脂。又名熏陆香。干燥品多成块状或卵圆形，小滴状固体，以色淡黄、半透明者为佳品。产于非洲的索马里、埃塞俄比亚及阿拉伯半岛南部，土耳其、利比亚、苏丹、埃及亦产。入药多炒用。

本品味辛苦，性温。入心、肝、脾经。辛散，苦泄，温通，香窜，具有活血消肿，宣通经络之功。瘀消血活则疼痛止，筋挛伸，肿疡消，肌肉长，故又有止痛、伸筋、消肿、生肌之效，并兼能行气。凡瘀血阻滞，心腹诸痛，痛经，跌打损伤，瘀血肿痛，痈疽疮肿，痹痛筋挛，以及疮溃久不收敛等，内、妇、外、伤各科病证，皆可用之。

《本草求真》谓：“非如没药气味苦平，功专破血散瘀，只有推陈之力，而无致新之妙”。

【临证应用】乳香有较好的活血行气止痛之功，用于瘀滞疼痛之证，疗效颇佳。治跌打损伤，瘀血肿痛，或筋脉拘挛，常与没药、血竭、红花、麝香等同用，如七厘散；治痈疽肿毒，坚硬疼痛者，可与没药、雄黄、麝香配伍，如醒消丸，以消肿破坚。亦可外用，与没药共研细末，以膏贴之，如海浮散。若与红藤、金银花、连翘、紫花地丁等同用，如红藤煎，为治肠痈之有效方剂。用于痹症之筋脉拘挛，亦可与羌活、地龙、当归等祛风湿药同用，加强活血祛风，通络止痛之效。对于痛经、经闭瘀血阻滞者，可配当归、川芎、香附等药用。用于胃痛，可与延胡索、川楝子等伍用。

此外，还可用于疮疡破溃、久不收口者，配合收敛生肌药同用，外敷患处，又有去腐生肌之功。

【用量用法】 3-10克，煎服或入丸剂。外用适量。本品味苦，生用含较多的油脂，入煎剂汤液混浊，对胃有刺激，易致恶心呕吐，故多炒去油用。然生用或炒用量均不宜过多，对胃弱者尤应慎用，孕妇亦不宜用。

没药

【原文】苦平。《经疏》曰：应兼辛。入十二经。散结气，通滞血，消肿定痛生肌，寇宗奭曰：血滞则气壅，气壅则经络满急、故肿且痛。补心胆虚，肝血不足。推陈致新，能生好血。治金疮杖疮，血肉受伤，故瘀而发热作痛。恶疮痔漏，翳晕目赤，肝经血热。产后血气痛。破瘀堕胎。乳香活血，没药散血，皆能消肿止痛生肌，故每兼用。疮疽已溃者忌用，脓多者勿敷。出诸南番，赤色类于琥珀者良。治同乳香。

【讲解】没药功用与乳香类同，亦善活血消肿生肌，并常与乳香相须为用。为橄榄科植物没药树或其他同属植物茎干皮部渗出的油胶树脂。干燥品呈不规则圆形或凝集成圆块，呈红棕色；质坚。一般以纯净无杂质，类琥珀而透明者为佳。打碎后，炒至焦黑色应用。主产于非洲索马里、埃塞俄比亚以及印度等地。

没药味苦、性平。入心、肝、脾经。功用与乳香相似。二药辛香气浓，均能活血行气、消肿生肌，为血中气药。然乳香辛温，长于行气活血，兼能舒筋活络；没药苦泄力强，行瘀散血独擅其长，然无舒筋之功。因此，前者偏于调气，后者偏于行瘀。故两者常相须为用：治血瘀气滞诸证，止痛效果较佳。

至于“补心胆虚，肝血不足”之说，并非本品真有补益之功，如《本草求真》所述“诸书亦载能补心胆与肝，盖谓瘀血不除，则新血安生？”之意。

【临证应用】 没药用于血瘀气滞的经闭，痛经，胸腹疼痛，跌打损伤，风湿痹痛及痈肿疮疡等证，常与乳香相须为用。但也有单用者，如《医林集要》单用入水酒煎服，治血气心痛；也可配其他药物同用，如手拈散，治腕腹疼痛，以本品配延胡索、五灵脂、香附为末，热酒调服。

【用量用法】 3-10克，外用适量。用法与乳香同。如与乳香同用，两药用量皆须相应减少。

穿山甲

【原文】咸寒善窜，喜穿山。专能行散，通经络，达病所。某处病，用某处之甲，更良。入厥阴、阳明。肝、胃。治风湿冷痹，通经下乳，消肿溃痈，止痛排脓，和伤发痘，元气虚者慎用。风疔疮科，须为要药。以其穴山寓水，故能出入阴阳，贯穿经络，达于营分，以破邪结，故用为使。以其食蚁，又治蚁痿。漏也。音闾，亦音漏。有妇人项下忽肿一块，渐延至颈，偶刺破，出水一碗，疮久不合。有道人曰：此蚁漏也，缘饭中偶食蚁得之。用穿山甲烧存性为末，敷之立愈。刘伯温《多能鄙事》曰：油笼渗漏，刮甲里肉麝投入，自至漏处补住。《永州记》曰：不可于堤岸杀之，恐血入土，则岸堤渗漏。观此二说，则其性之善窜可知也。痈疡已溃者忌服。如鼃而短，似鲤有足，尾甲力更胜。或生或烧，酥炙醋炙，童便油煎土炒，随方用。

【讲解】穿山甲功能活血散结，通经下乳，消肿排脓。为脊椎动物鲛鲤科的穿山甲（食蚁鲛鲤）的鳞片。未经炮制而入药者，称生甲片，临床较少采用，多用砂拌炒至胖大鼓起而呈黄色，外形如圆珠而入药，故有炮山甲、山甲珠等名。或炒后再加入醋略浸，晒干备用，可增强散瘀通络止痛之效。

本品味咸，性微寒。入肝、胃经。咸能软坚，性善走窜，功专行散，能透经络而直达病所。具活血通经、攻坚散结之效。凡瘀血阻滞、络脉不通之证，如经闭、癥瘕痞块以及痹痛等证，均可使用。

本品消肿排脓之功甚著，痈肿初起或脓成不溃敷者用之，脓未成者可消，脓已成者可溃，尤以脓成将溃的痈肿最为适宜，取其托毒排脓，促其穿溃，以利于毒邪外出。

妇人乳脉不通，乳汁不下用之，取其走窜之性，以疏通经络而使乳汁自下。风湿痹痛、筋骨拘挛用之，亦取其通经透络之效。

盐山张锡纯《医学衷中参西录》中说：穿山甲……气腥而窜，其走窜之性，无微不至，故能宣通脏腑，贯彻经络，透达关窍，凡血凝血聚为病，皆能开之。以治疗痈，放胆用之，立见功效。并能治癥瘕积

聚，周身麻痹，二便秘塞，心腹疼痛。若但知其长于治疮，而忘其他长，犹浅之乎视山甲也。

【临证应用】 穿山甲用于血滞经闭腹痛之证，可与当归、川芎、红花等同用以活血通经，如《妇科大全》穿山甲散；治癥瘕痞块，可配三棱、莪术等用，以破瘀消癥；用于风湿痹痛，肢体拘挛或强直等证。可配当归、川芎、羌活等，以通络搜风止痛。

用穿山甲通乳，可单用，如古方涌泉散以本品单用为末酒服；亦可配伍应用，《本草纲目》谚曰：“穿山甲、王不留，妇人食了乳长流。”故穿山甲常与王不留行配伍，以增强通乳作用，用于乳汁不通；若产后气血两虚而乳汁稀少者，可合益气补血的黄芪、当归等品同用。

穿山甲用于痈肿初起未成脓者，常与皂角刺、金银花、天花粉、赤芍等配伍，用以消除痈肿，如仙方活命饮；若痈肿脓已成而未溃者，可配皂角刺、当归、黄芪等，用以托毒排脓，如透脓散。用于瘰癧痰核，常与夏枯草、牡蛎、贝母、玄参等同用，如加减消瘰丸。

【用量用法】 3—10克，煎服。亦可研末吞服，每次1—1.5克，以研末吞服效果较好。

本品行散之力颇强，故不宜过量使用。痈疽已溃，脓汁清稀以及孕妇均应忌用。

e

王不留行

【原文】甘苦而平。其性行而不住，能走血分，通经脉，乃阳明冲任之药。阳明多气多血。除风去痹，止血定痛，通经利便，下乳，俗云：穿山甲、王不留，妇人服之乳长流。催生。治金疮止血。痈疮，散血。出竹木刺。孕妇忌之。花如铃铎，实如灯笼，子壳五棱。取苗子蒸，浆水浸用。

【讲解】王不留行为活血化瘀，通经下乳之品。为石竹科一年生或越年生草本植物麦蓝菜的成熟种子。别名留行子，王不留。其植物形态，如《纲目》所描述的：苗高者1—2尺。3—4月开小花如铃铃状，红白色。结实如灯笼草子，壳有五棱，壳内包一实：大如豆，实内细子，大如菰子，生白熟黑，正圆如细珠。生用或炒用。

本品味苦，性平。入肝、胃经。味苦主泄，专走血分，通利血脉，其特点是行而不住，走而不守，以治经行不畅而腹痛，及血滞经闭等瘀血阻滞之证。今多作为下乳之要品，故俗有“穿山甲、王不留，妇人服了乳长流。”之说。又因其能活血消肿，苦泄宣通，所以亦可用治痈肿疮毒，对乳痈之证，尤为常用。此外，本品尚有利尿作用。

【临证应用】王不留行治疗痛经、经闭可配当归、川芎、红花、香附等；治乳汁不通，常配穿山甲、通草等；若于产后气血两虚而致乳汁稀少者，本品只作辅助药，则应与黄芪、当归益气补血药同用，能使乳汁增多；治乳痈乳房肿痛，可配蒲公英、夏枯草、瓜蒌等用，可收活血解毒，消肿止痛之效。临床取其利尿而又能活血之力，配伍利水通淋，活血消肿的金钱草、海金沙等，如驱尿石汤，用以治疗泌尿系结石，或前列腺炎。

【用量用法】6—10克，煎服。孕妇慎用。

皂角刺

【原文】 辛温。搜风杀虫，功同皂荚。但其锋锐，能直达患处，溃散痈疽。治痈毒妬乳，风疔恶疮，疔，同癰。疔乃营气热附，风寒客于脉而不去。经曰：脉风成为疔。脉与营皆血也。蒸晒为末，大黄汤调下。胎衣不下。痈疽已溃者禁用。孕妇忌之。

【讲解】 皂角刺功能活血消肿，托毒排脓，为外科常用之品。皂角刺来源同皂荚，系用其棘刺。生用，切片入药。

本品味辛，性温。入肝、胃经。其性锐利，能直达疮所，性能颇与穿山甲类似，有托毒排脓、活血消痈之功。主治痈疽肿毒初起或脓成不溃者，而为外科常用之品。痰核瘰癧，或癰疽结块，亦可酌情配用。因又有祛风杀虫之功，麻风、疥癣，亦可应用。

【临证应用】 皂角刺与银花、甘草等配伍，可治疮疡肿毒；《本事方》治发背将溃而不溃者，同黄芪、乳香、甘草同酒煎服，以内托疮毒，促其早溃；《外科正宗》透脓散，与穿山甲、当归、川芎等为散，水煎服，治痈脓已成而不穿溃者。治麻风，可与大黄、郁金、大风子油等配用，如《医宗金鉴》追风散。古以米醋熬嫩刺作煎，涂疮癣有效。

【用量用法】 6—15克，煎服。外用适量。痈疽已溃及孕妇均当忌用。

苏木

【原文】 甘咸辛凉。入三阴血分。行血去瘀，发散表里风气。宜与防风同用。治产后血晕，《肘后方》：煮汁服。《海藏方》：加乳香酒服。胀满欲死，血痛血瘀，经闭气壅，痈肿扑伤，排脓止痛。多破血，少和血。出苏方国，交爱亦有。忌铁。

【讲解】苏木善于行血祛瘀，消肿止痛。为伤科之要药。为豆科灌木或小乔木苏木的心材。生用，入药时刨成薄片，或砍为小块，或经蒸软切片。主要产于中南半岛及印度。我国广东、广西亦有分布。

本品味甘咸微辛，性平。入心、肝、脾经。具有活血祛瘀、消肿止痛的作用，用于跌打损伤及妇女血滞经闭、产后瘀阻腹痛等证。若与祛风湿、止痒药同用，还可治疗风疹瘙痒。《本草求真》谓：“功用有类红花，少用则能和血，多用则能破血，但红花性味温和，此则寒凉也。”

【临证应用】苏木治疗妇女血滞瘀阻的经闭、产后腹痛等可与红花、赤芍、当归等配伍，如张璧凌霄花散，治疗经闭癥瘕。若与乳香、没药、血竭、自然铜等同用，治疗伤科跌打损伤、瘀肿疼痛。

【用量用法】 3-10克，煎服。本品性走散动血，故月经过多及孕妇和血虚无瘀者不宜用。

刘寄奴

【原文】 苦温。破血通经，除癥下胀，止金疮血。多服令人吐利。一茎直上，叶尖长糙涩，花白蕊黄，如小菊花，有白絮如苦荬絮，子细长亦似苦荬子。茎叶花子皆可用。刘裕，小字寄奴。微时曾射一蛇，王何不杀之？童曰：寄奴王者，不可杀也。叱之不见，乃收药回，每遇金疮，敷之立愈。

【讲解】 刘寄奴功能破血通经，散瘀止痛。为菊科多年生草本植物奇蒿的全草。茎直立，叶长椭圆形或披针形，先端渐尖，基部狭窄成短柄，边缘具尖锐锯齿，头状花序，钟状，淡黄色，瘦果矩圆形。全草生用。

刘寄奴味苦，性温。入心、脾经。苦能降泄，温能通行，善于破血通经，散瘀止痛，用治瘀血阻滞之证，颇有疗效。妇女血滞经闭，产后瘀阻腹痛每多用之；治跌打损伤，瘀血肿痛者，其效更捷。外用又能止金疮出血，亦能疗烫火烧伤。然本品性专攻破：《新修本草》曰：破血下胀，多服令人下痢。故气血虚弱者当慎用。

【临证应用】 刘寄奴配当归、红花，治经闭及产后瘀阻，如紫葳散，有行瘀通经之功；与骨碎补、延胡索等同用，治折伤瘀血肿痛；本品研末外敷，治创伤出血疼痛，如刘寄奴散。

【用量用法】 3-10克，煎服。外用适量。孕妇忌服。

自然铜

【原文】 辛平。主折伤，续筋骨，散瘀止痛。折伤必有死血瘀滞经络，然须审虚实，佐以养血补气温经之药。铜非煅不可用。火毒金毒相煽，复挟香药，热毒内攻，虽有接骨之功，必多燥散之祸，用者慎之。产铜坑中。火煅醋淬七次，细研，甘草水飞用。昔有铜折翅雁者，雁飞去，故治折伤。

【讲解】 自然铜功专散瘀止痛、接骨疗伤，为伤科要药。自然铜为天然黄铁矿的含硫化铁矿石。煅透醋淬，研末水飞用。

本品味辛性平，入肝经血分。有散瘀止痛之功，能接骨以疗折伤，为伤科专用药。亦有用治妇女血瘀之证，以及风疹瘙痒者：但应用不多。

【临证应用】 自然铜用于跌扑骨折、瘀阻疼痛，常与活血化瘀止痛药，如乳香、没药、麝虫等同用，以消肿止痛、接骨疗伤。

【用量用法】 10-15克，多入散剂用，每次0.3-0.6克。亦可外用。

牛膝

【原文】 苦酸而平，足厥阴少阴经药。肝、肾。能引诸药下行。酒蒸则甘酸而温，益肝肾，强筋骨。肝主筋，肾主骨。治腰膝骨痛，足痿

（1）筋挛，下行故理足，补肝则筋舒，血行则痛止。阴痿失溺，筋衰则阴痿，肾虚则失溺，久疝下痢，伤中少气。以上皆补肝肾之功。生用则散恶血，破癥结。血行则结散。治心腹诸痛，淋痛尿血，热蓄膀胱，便涩而痛曰淋。气淋便涩余沥；劳淋房劳即发；冷淋寒战后溲；膏淋便出如膏；石淋精结成石。尿血即血淋也，鲜色者，心与小肠实热；色瘀者，肾与膀胱虚冷。张子和曰：石淋乃肝经移热于胞中，日久熬煎成石，非肾与小肠病也。大法治淋，宜通气清心，平火利湿，不宜用补，恐湿热得补增剧也。牛膝淋证要药，血淋尤宜用之，杜牛膝亦可。又有中气不足，致小便不利者，宜补中益气，经所谓气化则能出是也，忌用淋药通之。经闭产难，下行之效，误用堕胎。喉痹，齿痛，引火下行。痈肿恶疮，金疮伤折，以上皆散恶血之功。出竹木刺。捣烂罨之即出，纵疮口合，刺犹自出。然性下行而滑窍，梦遗失精及脾虚下陷，因而腿膝肿痛者禁用。出西川及怀庆府。长大肥润者良。下行生用，入滋补药酒浸蒸。恶龟甲。畏白前。忌羊肉。

【讲解】 （1）足痿：指肢体筋脉弛缓，软弱无力，肌肉痿缩而不能随意运动的一种病证。

牛膝生用破血通经，引血下行，降火凉血；熟用则补肝肾而强筋骨。常用的牛膝有怀牛膝、川牛膝两种。怀牛膝为苋科多年生草本植物牛膝的根；川牛膝包括苋科多年生草本植物头序杯苋（麻牛膝）及川牛膝（甜牛膝）的根。前者主产于河南新乡等地（新乡明时称怀庆府），故名怀牛膝；后者主产于四川，故有川牛膝之名。生用或炒用。

本品苦、酸，性平，入肝、肾二经。生用能活血祛瘀，引血下行，而使月经通畅，故为妇科血瘀经闭、癥瘕、难产等常用之药。活血通利关节，又治跌打损伤，瘀肿疼痛及风湿痹痛。对于咽喉肿痛，口舌生疮，齿龈肿痛及吐血、衄血等血热炎上之证以及淋病尿血，尿道涩痛者，皆能以其引血下行，以降上炎之火或止上溢之血和利尿通淋之效而治之；熟用则补肝肾、强筋骨，主治腰膝酸软、筋骨无力。

本品以宣导下行为主，凡肾阳亏虚的梦遗失精及脾虚下陷、腰膝肿痛等证均不宜用。

【临证应用】 牛膝用于月经不调、闭经、产后瘀阻腹痛等妇科血瘀证，常配红花、桃仁、当归等以通经活血，如牛膝散；用于跌打伤痛，可配当归、川芎、续断等药。

牛膝性善下走，治下半身腰膝酸痛、下肢无力尤为专长。如属肝肾不足者、配杜仲、续断、桑寄生等；痿软无力甚者可配龟板、虎骨、熟地等，如虎潜丸；如属风湿痹痛，常配独活、木瓜、防己等；如系湿热下注，足膝肿痛者，多配苍术、黄柏、苡仁用，如四妙丸。

牛膝用于上部血热证，如血热妄行而致吐血、衄血常配白茅根、山栀等引血下行、凉血止血；胃火上炎的口舌生疮、齿龈肿痛，常配石膏、知母、生地等以清热降火，如玉女煎；肝阳上亢的头晕、头痛常配代赭石、生牡蛎、白芍等以平肝潜阳，镇肝息风，如镇肝息风汤；用于热淋、血淋、小便不利，可配滑石、瞿麦等同用，如牛膝汤。

【用量用法】 6—15克，水煎服。怀牛膝偏于补肝肾、强筋骨；川牛膝偏于活血祛瘀。孕妇及月经过多者均忌用。

此外，尚有土牛膝，为苋科多年生草本植物牛膝的野生品种。亦用其根入药，性味、功效与牛膝相似，但长于清热利咽，多用于白喉、扁桃腺炎等咽喉肿痛之证。

五灵脂

【原文】甘温纯阴，气味俱厚。入肝经血分。通利血脉，散血和血，血闭能通，生用，经多能止。炒用。治血痹血积，血眼血痢，肠风崩中，一切血病，《图经》曰：血晕者，半炒半生，末服一钱。心腹血气，一切诸痛。又能除风化痰，杀虫消积。诸痛皆属于木，诸虫皆生于风。治惊疳疔，蛇蝎蜈蚣伤。血虚无瘀者忌用。五灵脂一两，雄黄五钱，酒调服，渣敷患处，治毒蛇咬伤。李仲南曰：五灵脂治崩中，非正治之药，乃去风之剂。冲任经虚，被风袭伤营血，以致崩中暴下。与荆芥、防风治崩义同，方悟古人识见深远如此。李时珍曰：此亦一说，但未及肝虚血滞，亦自生风之意。按冲为血海，任主胞胎，任脉通，冲脉盛，则月事以时下，无崩漏之患，且易有子。北地鸟名，寒号虫矢也。即曷旦鸟，夜鸣求旦，夏月毛采五色，鸣曰凤凰不如我。冬月毛落忍寒而号曰，得过且过。高士奇曰：月令仲冬之月，鸛鷀不鸣，以与寒号之名未协。黑色气甚臊恶，糖心润泽者真。研末酒飞，去砂石用。行血宜生，止血宜炒。恶人参。

【讲解】五灵脂功专活血散瘀止痛，为治一切血滞诸痛的要药。为鼯鼠科橙足鼯鼠和飞鼠的干燥粪便。又名寒号虫（《开宝本草》）。拣尽杂质，晒干。生用，醋炒或炒炭用。

本品味苦、甘，性温。归肝经。苦泄温通，专入肝经血分，能通利血脉而有活血散瘀之功，且具有良好的止痛作用。其止痛之力与乳香、没药相似。故凡一切血滞诸痛，用之皆有良效。炒炭又有化瘀止血之效，可治妇女血崩、月经过多而有瘀血者。现代临床用于治疗冠心病心绞痛、胃和十二指肠溃疡出血疼痛等证，均有较好的止痛疗效。至于用于其他诸证，如《纲目》所说的“止惊痫，止疟痢，消积化痰，疔瘡杀虫，治血痹、血眼诸证，皆属肝经也。”但非本品的主治重点。血虚而无瘀滞者亦不宜使用。

【临证应用】五灵脂用于瘀血阻滞的痛经、闭经、产后腹痛及胸痛等证，常与蒲黄配伍，如失笑散；治心腹胸胁刺痛，可与延胡索、香附、没药等同用，如手拈散；用于出血而内有瘀滞之妇女崩漏经多、色紫多块、少腹刺痛者，可与参三七、赤芍、丹参等同用。此外本品外用，可治蛇、蝎、蜈蚣咬伤，与雄黄共研细末，油调涂患处。

【用量用法】5—15克，包煎，或入丸、散服。外用适量。活血生用或醋炒用，止血宜炒炭用。孕妇慎用。“十九畏”中有人参畏五灵脂，不宜同用，可供使用时参考。

降真香

【原文】 辛温。辟恶气怪异，疗伤折金疮。止血定痛，消肿生肌。周崇逐寇被伤，血出不止，敷花蕊石散不效。军士李高，用紫金藤散敷之，血止痛定，明日结痂无瘢。曾救万人。紫金藤，即降真香之最佳者也。

【讲解】降真香专主活血、止血、定痛。为豆科常绿小乔木降香檀的根部心材，简称为降香。生用。

降香味辛，性温。入心、肝经。气香辛散，温通行滞，有散瘀止血定痛辟秽化浊之功。用于气滞血瘀所致的胸胁作痛，呕吐腹痛，以及跌打损伤、创伤出血等证。

【临证应用】 降真香多用于跌打损伤所致的体内外出血，瘀滞疼痛之证。可单用，亦可配伍使用。如紫金散，即用本品为末外敷，治刀伤出血不止，瘀血作痛；又如大紫荆皮散，治金疮出血，则与五倍子、铜绿为末敷患处，其止血作用较单用为强。也可配乳香、没药等同用。治胸胁痛，常与郁金、桃仁、丝瓜络等配伍。此外，降真香配伍藿香、木香，有辟秽化浊，和中止呕之功，治疗秽浊内阻，呕吐腹痛。近年临床常用本品配伍丹参等活血行瘀止痛之品，治疗现代医学之冠心病心绞痛有一定疗效。

【用量用法】 3—6克，煎服。研末吞服，每次1—2克。外用适量。凡阴虚火盛、血热妄行而无瘀滞者不宜用。

凌霄花

【原文】 甘酸而寒。入厥阴心包、肝。血分，能去血中伏火，破血去瘀。主产乳余疾，崩带癥瘕，肠结，不大便。血闭，淋閼（1）风痒，血热生风之证。女科多用。孕妇忌之。《本经》曰养胎。《经疏》云：破血之药，非所宜也。肺病有用之为君药者。凌霄花为末，和密陀僧唾调，敷酒皸甚验。藤生。花开五瓣，黄赤有点，不可近鼻，嗅之伤脑。

【讲解】（1）淋閼：閼（bi必）同闭。病证名。指小便淋漓不爽，艰涩难通。

凌霄花功能活血凉血，兼可祛风。是紫葳科多年生落叶藤本植物凌霄的花。又名紫葳。

本品味辛，性微寒。入肝、心包血分。功能活血祛瘀、凉血祛风。主治妇人产乳之疾，如血滞经闭，崩带癥瘕等证。此外，血热生风的周身发痒、皮肤癣疮也可应用。

凌霄花花开五瓣，黄赤色有点，花虽美但不宜久闻及多用；因其辛窜破气，故曰伤脑。

【临证应用】 凌霄花可配当归、红花、赤芍等治经闭，如紫葳散；配鳖甲、虻虫、丹皮等治癥瘕，如鳖甲煎丸。若配生地、丹皮、白蒺藜可治周身瘙痒；配黄连、白矾等外涂，治皮肤湿癣。但近代临床极少使用。

【用量用法】 3—10克，煎服。外用适量。孕妇忌服

枫脂香

【原文】 苦平。活血解毒，止痛生肌。治吐衄咯血，齿痛风疹，痈疽金疮，外科要药。色白微黄，能乱乳香，功颇相近。

【讲解】 枫脂香有活血、止痛、生肌的作用，为外科常用之品。为金缕梅科植物枫香树的树脂，又名白胶香。表面淡黄色；半透明。生用。

枫脂香味苦，性平。入脾、肺、肝经。有活血、解毒、止痛、生肌之功。治痈疽疮疥、瘾疹、瘰疬、金疮、齿痛、吐血衄血等证。《本草衍义补遗》曰：“白胶香，为外科要药。”《本草纲目》谓：“枫香，其功虽次于乳香，而亦仿佛不远。”

【临证应用】 枫脂香为末，入轻粉、麝香少许，用油调敷：可治下疳。枫脂香、黄柏、轻粉，共为细末，羊骨髓调涂，治小儿癣疮。本品研末外擦，还可止牙痛。

【用量用法】 3—6克，煎服。外用适量。

马鞭草

【原文】 味苦微寒。破血通经，杀虫消胀。治气血癥瘕，痈疮阴肿。捣汁涂敷。墟陌甚多。方茎，叶似益母对生，夏秋开细紫花，穗如车前草，类蓬蒿而细，根白而小。用苗叶。

【讲解】 马鞭草是清热活血利水之品。为马鞭草科多年生草本植物马鞭草的全草。茎直立，四棱形，叶对生，7~10月开花，花小，紫蓝色，顶端具花穗，根茎圆柱形，表面土黄色。生用，切段入药。

马鞭草味苦、性凉。入肝、脾经。具有清热解毒、活血通经、利水消肿之功。主用于湿热黄疸，痢疾，喉痹，痈肿疮毒及经闭。癥瘕，跌打损伤和水肿、小便不利等证。

《备要》言本品有“杀虫”作用。

【临证应用】 马鞭草治跌打损伤，肢节疼痛可配红花、落得打等药同用；治妇女瘀阻经闭、痛经，可配益母草、香附等药同用；治癥瘕积聚则与三棱、莪术等配用。治水肿、小便不利，可单用，较大剂量，加酒煎服。近年来用以治疗现代医学之血吸虫病腹水，与刘寄奴、半边莲等配伍，有一定的消水退肿作用。

此外，有用其一味，每次30克，治疟疾，于发作前二至四小时煎服，有效。也可配茶叶或马齿苋等合用治痢疾、泄泻。若用鲜品洗净，捣烂取汁含咽，可治咽喉肿痛。

【用量用法】 10—30克，煎服。外用适量。

干漆

【原文】 辛温有毒。功专行血杀虫，削年深坚结之积滞，朱丹溪曰：漆性急而飞补，用之中节，积滞去后，补性内行，人不知也。破日久凝结之瘀血，能化瘀血为水，续筋骨绝伤。损伤必有瘀血停滞。治传尸劳瘵，瘕疝蚘虫，炒令烟尽入药，或烧存性用。半夏为使，畏川椒、紫苏，鸡子、蟹。漆得蟹而成水。

【讲解】干漆功能破血攻坚，逐瘀通经。为漆树科落叶乔木漆树树脂干燥品。用时捣碎，炒至烟尽或烧至烟尽存性用。

本品辛、苦，温，有毒。入肝、胃经。辛散、苦泄，温通善行，性下降而破血攻坚，功能破血消瘀，通经杀虫。适用于癥瘕积聚，瘀阻经闭及虫积等证。然久服能伤新血，故虚人、孕妇忌用。

【临证应用】 干漆用于瘀血阻滞的经闭，癥瘕，常与大黄、廑虫、桃仁、水蛭等配伍，如大黄廑虫丸。与驱虫药配伍，可治虫积腹痛。然临床较少应用。

【用量用法】 主入丸散剂，每次0.1—0.3。不宜入煎。畏蟹。

小结

活血祛瘀药主要用于经闭、痛经、经行不畅、产后腹痛、癥瘕、痞疮、跌打损伤以及胸痹心痛等一切瘀血阻滞之证。但血虚无瘀，或妇女月经过多者不宜服，孕妇当禁用或慎用。

川芎、丹参、益母草、泽兰、桃仁、红花、鸡血藤、王不留行、牛膝、凌霄花等均有活血通经之功，用于血瘀所致的经行不畅、经闭及产后血瘀腹痛等证。但川芎辛温气香，走窜力大，活血之中还能行气，为血中气药，除治寒凝气滞、血行不畅之妇科疾病外，并能祛风止痛，为治头痛之良药。用治肝气郁滞之胸胁痛，以及现代医学之冠心病心绞痛等均有良效。丹参则以活血祛瘀为用，性偏寒凉，故凡血热瘀滞之月经不调、痛经、经闭等妇科疾病，以及胸胁胀痛、癥瘕腹痛，以及现代医学之冠心病心绞痛、肝炎、早期肝硬变、肝脾肿大者，皆可应用。并能清心除烦，对心烦、心悸、失眠之证，亦有疗效。益母草尤长于活血调经，为妇产科要药，专用于经产诸证，并能利水消肿，对现代医学之急慢性肾炎水肿，有一定的退肿作用。泽兰功能活血祛瘀，多用于血瘀经闭、月经不调等妇科疾病，兼能行水消肿。桃仁、红花每多合用：以治血瘀经闭、痛经、癥瘕或跌打损伤、疮疡肿毒等证。但桃仁质润，能润肠通便；红花善于活血通经，祛瘀之力较大。鸡血藤活血之中兼能补血，对于血虚而有瘀滞之证，最为适宜。并能舒筋活络，故风湿痹痛每常用之。王不留行又善于通经下乳，用治乳汁不通或乳痈初起及瘀血经闭不通之证。牛膝性善引血下行，以治火热炎上之证，生用活血通经，善治血瘀经闭、难产，胞衣不下等，兼有利尿通淋之效；制用补肝肾，强筋骨，以治肝肾不足、腰膝酸软无力之证。又有川产、怀产之别，破瘀通经当用川牛膝，补肝肾当用怀牛膝。凌霄花除辛散行血以破瘀之外，且性寒泻热，有凉血祛风之功，用于血热生风，周身瘙痒者。

延胡索、乳香、没药、五灵脂、降香等均有良好的止痛作用。疼痛的产生主要是血瘀气滞所致，即“不通则痛”。延胡索既能活血，又能利气，故善止痛，凡气滞血瘀疼痛之证，用之甚捷。乳香、没药活血之中又长于消肿止痛，为外伤科常用要药，妇科瘀滞腹痛，及现代医

学之冠心病心绞痛、胃痛等亦常应用，内服、外敷均有良效。二药相比，乳香辛香，行气之功优于没药；没药苦泄，祛瘀之力大于乳香，乳、没同用，能加强疗效。五灵脂活血祛瘀止痛，用于治疗一切血瘀疼痛。降香气香温通而行滞，除有良好的散瘀止血定痛之功外，又有降气和中、辟秽化浊之作用。

郁金、姜黄、莪术、三棱等除用于血瘀经闭、痛经等证外，并能破瘀消癥，兼可行气，为血中气药，以治气血阻滞，有形坚积之证。但郁金性寒，又有清心解郁之功，用治癫狂、热病神昏，对于胸胁刺痛、黄疸等证，效亦显著。姜黄性温，又有祛风散寒疗痹之效，为治风湿痹痛、肩臂关节酸痛之常用药。莪术、三棱祛瘀之力较大，为破血削坚之要药，常可用于经闭、癥瘕、产后瘀阻腹痛等证，现临床用治肝脾肿大、腹中肿瘤等，疗效亦佳。二者比较，行气之功，莪术强于三棱；破血之力，三棱大于莪术。

穿山甲、皂角刺行瘀之力较强，善于通行经络，直达病所，为攻坚散结之品，而以消痈溃脓见长，常同用于痈肿疮疡之证，脓未成能消，已成能溃，尤以已成未溃之际用之最宜。穿山甲又能通经下乳，皂角刺并可祛风杀虫。

刘寄奴、苏木、自然铜均有活血散瘀、消肿止痛之功，长于治疗跌打损伤，骨折瘀肿之证，为伤科常用之药。刘寄奴外用亦能止血敛疮，可治创伤出血、疮口不敛。苏木还有活血通经之效，可治血瘀经闭腹痛、痛经等证。自然铜能续筋接骨，为骨折要药，内服、外敷均有效。马鞭草除具有活血之功外，尚能清热利水，水肿、小便不利及湿热泄痢、疮肿也可应用。干漆破血消癥力强，临床较少应用。

活血祛瘀药功用归纳简表

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
川芎	辛、温	肝、胆、心包	活血行气，祛风止痛	①月经不调、痛经、经闭、产后瘀阻腹痛 ②胸胁疼痛 ③头痛、风湿痹	3—10克	
延胡索	辛、苦、温	心、肝、肺、脾	活血，行气，止痛	气滞血瘀的胸胁脘腹疼痛，及痛经等诸痛证	3—10克 研末服每次1.5—3克	醋制可加强止痛之功
郁金	辛、苦、寒	心、心包、肝、肺	活血止痛，行气解郁，凉血	①胸胁脘腹疼痛 ②月经不调、痛经 ③癫痫或癰	6—12克	畏丁香

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			清心，利胆退黄	狂及神志不清 ④湿热黄疸、胆石症 ⑤吐血、衄血、逆经		
姜黄	辛、苦、温	肝、脾	破血行气，通经止痛	①胸胁疼痛、经闭腹痛 ②风湿臂痛 ③痈疡疮疖	5-10克外用适量	
莪术	辛、苦、温	肝、脾	破血祛瘀，行气止痛，消积散癥，开胃化食，		3-10克	醋制可加强止痛之功，孕妇禁用

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			解毒 止痛			
三棱	苦、平	肝、脾	破血 祛瘀， 行气 止痛， 消癥	同 上	3-10 克	同 上
丹参	苦、微寒	心、心包、肝	活血 祛瘀， 凉血 消痈， 清心 除烦	①月经 不调、 经闭、 产后腹 痛 ②疮 疡肿 痛、关 节肿 痛、跌 打损伤 ③温热 病热入 营血及 心悸失 眠 ④胸 胁脘腹 疼痛	5-15 克	酒炒增 强活血 之功
益母	辛、苦、	心包、	活血 祛	①月经 不调、	10- 30克	茺蔚子 活血调

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
草	微寒	肝	瘀， 利尿 消肿	经闭、 产后腹痛 ②水 肿、小 便不利		经与益 母草相 似，又 可凉血 明目， 以治头 痛目 疾。用 量5～ 15克
泽 兰	辛、 苦、 微寒	肝、 脾	活血 祛 瘀， 行水 消肿	①月经 不调、 经行腹 痛、产 后瘀阻 腹痛 ② 小便不 利、浮 肿	10- 15克	佩兰即 兰草， 味辛性 平。善 能化湿 解暑、 发散表 邪，治 湿浊困 脾、夏 伤暑湿 之证。 用量5- 10 克
桃 仁	苦、 平	心、 肝、 肺、 大肠	活血 祛 瘀，	①痛 经、经 闭、产 后瘀阻	6-10 克	孕妇忌 用打碎 煎服

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			润肠通便	腹痛、癥瘕 ② 跌打损伤、肺 痛、肠 痛 ③肠 燥便秘		

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
红花	辛、温	心、肝、肺	活血通经，祛瘀止痛	①痛经、经闭、产后瘀阻腹痛、癥瘕 ② 跌打损伤、关节疼痛 ③胸痛	3-10克	孕妇忌用、番红花功效相同，而药力较强。用量1.5~3克
鸡血藤	苦、微甘、温	肝	行气补血，舒筋活络	①月经不调、痛经、血虚经	10-30克	鸡血藤膏功用与鸡血藤

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				闭 ②风湿痹痛		相似，而补血作用较佳。用量5-15克
乳香	辛、苦、温	心、肝、脾	活血止痛，消肿生肌	①跌打损伤，疮痈肿痛、疮溃不敛 ②痛经、胃脘疼痛、风湿痹痛	3-10克外用适量	枫脂香功用主治与乳香相同。用量2~6克。
没药	苦、平	心、肝、脾	活血止痛，消肿生肌	同上	3-10克外用适量	
穿山甲	咸、微寒	肝、胃	活血通经，下	①血滞经闭、癥瘕痞块 ②乳	3-10克研末服	孕妇忌用

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			乳， 消肿 排脓	乳汁不下 ③痈 肿、瘰 疔	1-1.5 克	
王不留行	苦、 平	肝、 胃	活血 通 经， 下 乳， 消 痛， 利尿	①痛 经、经 闭 ②乳 汁不行 ③淋病	6-10 克	
皂角刺	辛、 温	肝、 胃	活血 消 痛， 托毒 排脓	痈疽肿 毒、瘰 疔痰核	6-15 克	
苏木	甘、 咸、 微辛、 平	心、 肝、 脾	活血 散 瘀， 消肿 止痛	①跌打 损伤， 瘀血肿 痛 ②血 滞经 闭、产 后瘀阻 腹痛	3-10 克	
刘寄	苦、 温	心、 脾	破血 通	①跌打 损伤，	3-10 克	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
奴			经，散瘀止痛，外用止血	创伤出血 ②血滞经闭、产后瘀阻腹痛		
自然铜	辛、平	肝	散瘀止痛，接骨疗伤	跌打骨折、瘀阻肿痛	10-15克煅研细末入散剂每次0.3-0.6克	
牛膝	苦、酸、平	肝、肾	活血祛瘀，补肝肾，强筋骨，引血下行，利尿通淋	①痛经、经闭，产后腹痛 ②腰膝酸痛、下肢无力 ③尿血、小便不利、尿道涩痛 ④吐	6-15克	川牛膝活血祛瘀；怀牛膝强筋壮骨

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				血、衄血		
五灵脂	苦、甘、温	肝	活血止痛，化瘀止血	①痛经、经闭、产后腹痛 ②胸痛、脘腹疼痛 ③崩漏	5-15克外用适量	包煎，或入丸、散剂
降香	辛、温	心、肝	活血散瘀，止血定痛，辟秽气	①胸胁疼痛 ②跌打损伤、创伤出血	3—6克 研末服 每次1—2克外用适量	
凌霄花	辛、微寒	肝、心包	活血祛瘀，凉血祛风	①血滞经闭、癥瘕 ②皮肤风湿，周身瘙痒	3-10克外用适量	
枫脂香	苦、平	肺、脾、肝	活血，解	①痈疽疮疥、瘾疹 ②	3-6克	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			毒， 生肌	金疮、 齿痛 ③ 吐血、 衄血		

复习思考题

- 1、活血祛瘀药的定义及其适应证。
- 2、活血祛瘀药时，为什么要与行气药配伍？
- 3、试比较桃仁与红花、郁金与延胡索、丹参与益母草、乳香与没药四组药物在功效、应用上的异同。
- 4、阐明川芎、牛膝、鸡血藤、穿山甲、五灵脂、莪术的效用，各有什么特点？
- 5、分别说明并归纳哪些药物除活血外还兼能行气？哪些药物有较好的活血止痛作用？哪些药物为外科、伤科的常用要药？
- 6、使用活血祛瘀药时须注意哪些方面？

第十三章 止血药

〔自学时数〕 8小时

〔面授时数〕 2小时

【目的要求】

1. 了解止血药的含义、特点、分类及其常用药（大蓟 小蓟 地榆 白芨 三七 茜草 蒲黄 艾叶 白茅根 伏龙肝）。
2. 熟悉止血药与清热凉血、滋阴潜阳、补气、健脾、温阳等药配伍应用的理论依据（联系中医基本理论）。
3. 掌握凉血止血药、收敛止血药、化瘀止血药、温经止血药适用证的不同点。
4. 掌握凉血止血药 常用药的功效、临证应用，并比较其异同。
5. 掌握收敛止血药 常用药的功效、临证应用，并比较其异同。
6. 掌握化瘀止血药 常用药的功效、临证应用，并比较其异同。
7. 掌握温经止血药 常用药的功效、临证应用，并比较其异同。
8. 联系荆芥炭、栀子、黄芩、大黄、青黛、犀角、生地、丹皮、贯仲等具有止血作用的药物，了解本章以外的止血药，扩大知识面。
9. 在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡能制止人体内部或外部出血的药物，称为止血药。

本类药物适用于各种出血证候，如吐血、咯血、衄血、便血尿血、崩漏、紫癜及创伤出血等，可防止血液耗损，或因出血过多而引起的机体衰弱。但出血只是某些疾病的一种现象，引起出血的原因很多，而止血药为治标之品。因此，在使用止血药时，不能只是见血止血，要根据出血的原因和证候的不同，选择适当的药物配伍以治其根本。如血热妄行者，应与清热凉血药同用；如属阴虚阳亢者，宜与滋阴潜阳

药同用；如因气虚而不能摄血者，应与补气药同用；瘀血阻滞而出血不止者，应配伍行气活血药；虚寒性出血，应根据证情配合温阳、益气、健脾等药同用；若出血过多而致气虚欲脱者，如单用止血药，则缓不济急，应急予大补元气之药，以益气固脱，此即所谓：“有形之血不能速生，无形之气所当急固。”

此外，除一时大出血应急救止血外，还须注意有无瘀血的证候，若瘀血未尽，不可单纯止血，宜酌加活血祛瘀药，以免留瘀之弊。

大小蓟

【原文】 甘温。《大明》曰凉。皆能破血下气，行而带补。治吐衄肠痛，女子赤白浊（1），安胎。凉血之功。小蓟力微，能破瘀生新，保精养血，退热补虚，不能如大蓟之消痈毒。朱丹溪曰：小蓟治下焦结热血淋。《本事方》：一人冷气入阴囊，肿满疼痛，大蓟汁服，立瘥。两蓟相似，花如髻，大蓟茎高而叶微皱，小蓟茎低而叶不皱。皆用根。

【讲解】（1）赤白浊：即赤白带。为妇女阴道中排出的一种赤白相杂的粘液，或时而排出赤色粘液，时而又排出白色粘液也称赤白带。

大、小蓟均能凉血、止血、解毒，然大蓟解毒消痈之功优于小蓟。大蓟为菊科多年生宿根草本植物大蓟的根及全草；小蓟为同科植物刺儿菜或刻叶刺儿菜的全草及地下茎。均以生用为主。

大、小蓟味甘性凉，归心、肝二经。能清热凉血，而为凉血止血常用之品。凡血热妄行的吐血、衄血、尿血、血淋等都可应用。二蓟性凉苦泄，兼有破血散瘀、消肿解毒之功，治疮痈肿毒皆有效。

二者比较，大蓟解毒疗痈之功比小蓟稍强。《备要》言能保精养血、退热补虚，实为瘀血去，新血自生而热退血安之意，非真可补养。

【临证应用】 大、小蓟皆用于血热妄行所致的多种出血，可单味应用，或配伍侧柏叶、藕节等止血药同用。小蓟兼可利尿，故擅治尿血：常配木通、滑石、生地、蒲黄等同用，如小蓟饮子。

用于热毒疮痈，可单用内服，亦可取鲜品捣烂外敷。

【用量用法】 10-15克，鲜品可用30-60克。外用适量。

侧柏叶

【原文】 苦涩做寒。本草微温。养阴滋肺而燥土，最清血分，为补阴要药。止吐衄崩淋，肠风尿血痢，血。一切血证，去冷风湿痹，历节风痛，肢节大痛，昼静夜剧，名白虎历节风，亦风寒湿所致。涂汤火伤。捣烂水调涂。生肌杀虫，灸罨冻疮。汁乌髭发。取侧者。朱丹溪曰：多得月令之气，随月建方取。或炒或生用。桂、牡蛎为使。恶菊花，宜酒。万木皆向阳，柏独西指，受金之正气，坚劲不凋，多寿之木，故元旦饮椒柏酒以辟邪。

【讲解】 侧柏叶为凉血止血的常用之品。为柏科常绿乔木植物侧柏的嫩枝及叶。生用或炒炭用。

本品苦涩微寒，入肺、肝、大肠经。苦能燥湿，寒可清热凉血，涩能收敛，为治热证出血之要药。用于一切血热妄行之出血证，如咯血、吐血、鼻衄、尿血、崩漏等证，皆可获效。对于血热血虚，病后脱发或髮色早白等证，确有生发乌髭之效。

至于《备要》载为补阴要药，去冷风湿痹、历节风痛等，乃指本品功专止血，血止而阴复。但祛风湿，止历节风湿痛之功，未见其用。

【临证应用】侧柏叶适用于各种内外出血证。如治血热妄行的吐血、衄血、尿血、崩漏等，常与大蓟、小蓟、茅根等伍用；又如《圣惠方》治吐血不止，单用为末，米饮调服；《普济方》以其同槐花研末吹鼻，治衄血不止。若与艾叶、炮姜等温经止血药同用，止血而无寒凉之弊，可用治疗虚寒性出血。本品研末外用，还可止外伤出血。

现代研究发现本品有清热宣肺，止咳祛痰作用，以治老年慢性气管炎。外用可治脂溢性皮炎，可以鲜品60克，加60%酒精（或白酒）适量，浸泡七天，取药液涂擦头皮，有止痒、减少脱髮之功。

【用量用法】10-15克，煎服，鲜品可捣汁服。外用适量。生用止血之力强于炒炭用，鲜品更佳。

槐实

【原文】 苦寒纯阴。入肝经气分。疏风热，润肝燥，凉大肠。治烦闷风眩，痔血肠风，粪前有血名外痔，粪后有血名内痔，谷道赘肉名举痔，头上有孔名痔瘻，疮内有虫名虫痔。大法用槐角、地榆、生地以凉血，芩、连、梔、柏以清热，防风、秦艽以祛风湿，芎、归、人参和血生血，枳壳宽肠，升麻升提。治肠风略同。不宜专用寒凉，须兼补剂收功。阴疮湿痒。明目止泪，清肝，泪为肝热。固齿乌髭，十月上已采，渍牛胆中，阴干百日，食后吞一枚，明目补脑，发白还黑，肠风痔血尤宜服之。杀虫根皮皆能洗痔。堕胎。去单子及五子者，铜槌槌碎，牛乳拌蒸。槐乃虚星之精。

槐花苦凉。入肝、大肠血分而凉血。血凉则阴自足。治风热目赤，赤白泄痢，五痔肠风，吐崩诸血。舌上无故出血如线者，名血衄，炒研掺之。陈者良。

【讲解】 槐实以清降泄热止血为主要功效，且能润肠。槐实又名槐角，为豆科落叶乔木槐树的成熟果实。生用，或炒用。

本品味苦性微寒。入肝、大肠经。以其苦寒沉降，故清降泄热之力较强，能清大肠之热，而有凉血止血之功，且可滑肠润便。故多用于大肠热盛、湿热瘀结而引起的便血、血痢、痔疮出血等证。此外，兼能泻肝经实火，对肝火上炎之头昏头痛、目赤肿痛等证，颇具疗效。

《本草求原》云：“槐角润肝养血”，而有润肠滋燥之功。《本经逢源》云：“其角中核子，专主明目，久服须髮不白，益肾之功可知。”皆可供后学者参考。

【临证应用】 槐实治便血、痔血，常与地榆、当归、防风等配伍，如槐角丸；治肝热引起的头昏目赤，常与黄连伍用，如《圣惠方》明目槐子丸，即以上二药炼蜜为丸。

【用量用法】 10~15克，煎服。孕妇忌用。

附：槐花 即为槐树的花蕾，又名槐米。生用，或炒用。

本品性能、功用与槐实相似，但其止血作用强于槐实，而泄热降下之力稍逊。主用于大便下血，其他出血，如崩漏、吐血、衄血，亦可用之。此外，近年研究证实，本品具有降低血压、改善毛细血管脆性之作用，可用治高血压病，并能防止脑血管破裂。用量10-15克。

地榆

【原文】 苦酸微寒，性沉而涩。本草未尝言涩，然能收汗止血，皆酸敛之功也。入下焦，除血热。治吐衄崩中，血虚禁用。肠风、血鲜者为肠风，随感而见也；血瘀者为脏毒，积久而发也。粪前为近血，出肠胃，粪后为远血，出肺肝。血痢。苏颂曰：古方断下多用之。寇宗奭曰：虚寒泻痢，及初起者忌用。苏颂，著《本草图经》。似柳根，外黑里红。取上截，炒黑用。梢皮行血。得发良。恶麦冬。

【讲解】 地榆凉血止血，尤善清下焦血分之热。为蔷薇科多年生草本植物地榆的根。干燥根呈圆柱形或纺锤形，外表深褐色或紫棕色。生用或炒用。

本品苦酸性寒。寒能清热，酸涩收敛，故有凉血泄热、收敛止血之功，用于诸种血热出血证。以其味苦性降而走下，善清下焦血热，故尤适宜于下焦血热所致的便血、痔疮出血、血痢及崩漏等证。本品兼可泻火解毒，外用治水火烫伤，效果显著。

【临证应用】 地榆凉血止血，凡血热出血，如咯血、衄血、吐血，皆可配凉血止血药应用。但其性沉寒入下焦，故下部出血更为常用，如便血、痔疮出血，常与槐角合用；如地榆丸，即以本品配当归、黄连、阿胶等治泻痢或血痢；地榆甘草汤，即本品与甘草二味研末，砂仁煎服，以治便血。治血热崩漏，可与生地，黄芩、炒蒲黄等配伍。

借其清火解毒、收敛的作用，又可治烫伤、湿疹、皮肤溃烂等。治烫伤可单味研细末，麻油调敷，亦可与大黄粉等同用；治湿疹、皮肤溃烂，以生地榆煎液，纱布浸湿外敷，或地榆粉加枯矾、煅石膏粉等撒于患处。

【用量用法】 10-15克，煎服。证属虚寒者不宜用。外用适量。对于大面积烧伤，不宜用本品制剂外涂，以防地榆所含水解型鞣质，被身体大量吸收而引起中毒。

白茅根

【原文】甘寒。入手少阴，心。足太阴阳明。胃、脾。补中益气，除伏热，消瘀血，利小便，解酒毒。治吐衄诸血，心肝火旺，逼血上行，则吐血；肺火盛，则衄血。茅根甘和血，寒凉血，引火下降，故治之。扑损瘀血捣汁服，名茅花汤，亦治鼻衄产淋。血闭寒热，血瘀则闭，闭则寒热作矣。淋沥崩中，血热则崩。伤寒哕逆，即呃逆。《说文》曰：哕，气梧也。东垣作干呕之甚者未是。肺热喘急，内热烦渴，黄疸水肿。消水行水。李时珍曰：良药也。世人以微而忽之，惟事苦寒之剂，伤冲和之气。乌足知此哉！

茅针，溃痈疔。酒煮服，一针溃一孔，二针溃二孔。

【讲解】白茅根功主凉血止血，并善清热利尿。为禾本科多年生草本植物白茅的根茎。洗净鲜用，或晒干切段生用。

本品味甘性寒，入心、肺、胃、膀胱经。既能清心、胃之热而凉血生津，治血热妄行所致吐、衄、咯血；又能入膀胱而利尿，导热下行，治热淋、小便不利、水肿、黄疸等证。

茅针，即白茅初生未放的花穗。性味甘凉，亦能凉血止血，主要用于血热所致吐、衄血等出血证。其用途不及茅根广泛，临床不常用。

至于《备要》言其补中益气，如黄宫绣所言：“……然亦不过因其胃热既除而中气自复，岂真补益之谓哉。”

【临证应用】白茅根治血热之衄血、咯血、吐血，常单味应用，或配藕节、生地、侧柏叶等同用，如《医学衷中参西录》治虚劳痰中带血，以茅根配鲜小蓟、鲜藕同用，称三鲜饮。本品又能利尿，治尿血，可兼收两者之效，常配小蓟、蒲黄等合用。若用于热淋、小便不利、水肿、黄疸等湿热证，可单用，或配车前子、泽泻等利水渗湿药同用。

白茅根清泄肺胃之功，与芦根相似，均可用于胃热呕哕、肺热咳嗽。然芦根偏主气分，以清热生津为主；白茅根偏主血分，以凉血止血为主，二者应予区别。

总之，白茅根味甘而不腻膈，性寒而不碍胃，利尿而不伤阴，热证而津液不足者皆可应用。然作用平和，用量须大。

【用量用法】15—30克，鲜品30—60克，煎服。以鲜者为佳。

苎麻根

【原文】甘寒而滑。补阴破瘀，解热润燥。治天行（1）热疾，大渴大狂，胎动下血，诸淋血淋，捣贴赤游丹毒（2），痈疽发背，金疮折伤，止血易瘀。鸡鱼骨鳃。捣如龙眼，鸡骨鸡汤下，鱼骨鱼汤下。汁能化血为水。

苎麻皮与产妇作枕，止血运；安腹上，止产后腹痛；散瘀之功。沤苎汁，疗消渴。

【讲解】（1）天行：又称“时气”、“时行”，指流行病。（2）赤游丹毒：即丹毒。因患部皮肤红如涂丹，热如火灼，发无定处故名。

苎麻根功主凉血、止血、安胎。为荨麻科多年生草本或亚灌木植物苎麻的根。多切片生用。

本品性味甘寒，入心、肝经。功能凉血止血、清热安胎：利水解毒。主治吐血、尿血、崩漏等血热出血证，及怀胎蕴热而致的胎动不安或妊娠下血。还有治小便淋沥、赤游丹毒、痈疽发背等热毒疮痈的功用。其皮临床极少用。

【临证应用】本品凉血泄热，可单味或配伍他药治血热的各种出血，而在妇科方面更为常用。对胎动不安有热者，可配黄芩、竹茹等以清热安胎；妊娠下血可配地黄、当归、阿胶等同用，如苎根汤。

【用量用法】 10-30克；煎服。

藕

【原文】 涩平。解热毒，消瘀血，止吐衄淋痢，一切血证。和生地汁、童便服良。藕生甘寒，凉血散瘀，宋太官作血衄，误落藕皮，血遂涣散不凝。一人病血淋，痛胀欲死，李时珍以发灰二钱，藕汁调服，三日而愈。《梅师方》：产后余血上冲，煮汁服。止渴除烦，《圣惠方》：藕汁蜜和服，治时气烦渴。解酒毒、蟹毒。捣烂热酒调服。煮熟甘温，益胃补心，多孔象心。止泻能实大肠。止怒，久服令人欢。益心之效。生捣罨金疮伤折，熟捣涂坼裂冻疮。《肘后方》：卒中毒箭者，藕汁饮多多益善。孟诜曰：产后忌生冷，独藕不忌，为能散瘀血也。澄粉(1)亦佳，安神益胃。藕节功用相同。

【讲解】(1)澄粉：即藕粉。

藕功能凉血止血，并有散瘀血作用。为睡莲科植物莲的肥大根茎。根茎节部即药用之藕节。藕入药大多生用或捣汁服，也可煮食；藕节多炒炭用。

本品味甘性寒，入心、脾、胃经。具有清热凉血之功，并能化瘀，为化瘀止血之品，有止血不留瘀血之特点。主用于血热之各种出血证，也可用于热病烦渴。煮熟用，则性温，能健脾开胃、益血止泻，外用还可生肌敛疮。

藕节味涩，功专收敛止血，兼能化瘀。然药力平和，常作为多种内出血证之辅助治疗药物，尤多用于吐血、咯血之证。

藕粉为食养之品，有安神益胃之功。

【临证应用】藕用于各种血热出血，及热病烦渴，多生用捣汁服。藕节常配伍其他止血药，如白芨、仙鹤草、侧柏叶等治吐血、咯血等。

【用量用法】藕无限定用量，可捣汁多次饮用。藕节10—15克，煎服。

仙鹤草

【原文】 治劳伤吐血。有神功。

【讲解】 仙鹤草功专收敛止血，并有强壮作用。为蔷薇科多年生草本植物龙芽草的全草，别名脱力草。晒干，切段生用。

本品味苦涩，性平，入肺、肝、脾三经。功专收敛止血，其止血作用较佳，广泛应用于各种出血之证，无论寒热虚实，皆可应用。并有补虚强壮作用，可用于脱力劳伤。龙芽草冬芽（鹤草芽）用治绦虫病，疗效颇佳。

【临证应用】 仙鹤草用于咯血、吐血、衄血、便血、尿血及崩漏等各种出血证，可单用或随证配伍相应药物同用。如属血热妄行，可配鲜生地、侧柏叶、丹皮、大小蓟等凉血止血药同用；如属虚寒性出血，崩漏、便血等证，常与黄芪、党参、炮姜炭、艾叶等益气补脾、温经止血药同用。若治脱力劳伤、神疲乏力，每天用本品30克与等量红枣煎服，以调补气血，有助于体力之恢复。此外，以本品涩敛之性，又可用治腹泻、痢疾，而以慢性泻痢为宜，可与马齿苋、木香等同用。

鹤草芽治绦虫病，可单用研粉30-50克，于早晨空腹温开水一次送服，一般在服药后5-6小时内即可排出虫体。以本品兼有泻下作用，有助于驱除虫体，可不同时服泻药。

【用量用法】 10—30克，煎服。

白芨

【原文】 味苦而辛，性涩而收。得秋金之令，入肺止吐血，《摘玄》曰：试血法，吐水内浮者肺血也，沉者肝血也，半浮沉者心血也。各随所见，以羊肺、肝、心蘸白芨末，日日服之佳。肺损者能复生之。以有形生有形也。人之五脏，惟肺叶损坏者，可以复生。台州狱吏悯一重囚，囚感之曰：吾七犯死罪，遭刑拷，肺皆损伤，得一方用白芨末米饮日服，其效如神。后因凌迟剖开胸，见肺间窍穴数十，皆白芨填补，色犹不变也。治跌打折骨，酒服二钱。汤火灼伤，油调未敷。恶疮痈肿，败疽死肌。去腐逐瘀生新，除面上肝皤⁽¹⁾，肝音干，去声，面黑气。皤音炮，面疮也。涂手足皴裂，令人肌滑。紫石英为使。畏杏仁。反乌头。

【讲解】 (1) 肝皤：肝(gǎn，敢)，面色黧黑。皤，同疱，皮肤上的小疙瘩。

白芨收敛止血良药，肺胃出血尤为常用。为兰科多年生草本植物白芨的地下块茎。采挖后除去残茎及须根，洗净入沸水煮至内无白心，除去粗皮，晒干切片或打粉用。

本品苦甘性凉，质粘而涩，为收敛止血良药，入肺、胃、肝经。主要用于肺、胃出血证，兼能补肺、生肌，也用于外科疮痈肿毒、跌打损伤、手足皴裂等证。

【临证应用】 白芨治肺、胃出血最常用，可研末单用，以糯米汤或凉开水调服，亦可随证配伍。如肺结核咯血，可配生地、藕节、枇杷叶、阿胶等，如白芨枇杷丸；胃出血常配乌贼骨等同用，如乌芨散。外伤出血可研末撒于伤口，亦可配煅石膏粉等外用，不仅能止血，还有促进伤口愈合的作用。

白芨寒凉苦泄，消肿生肌而治疮痈，不论未溃、已溃，均可应用。疮疡初起可配银花、皂角刺、天花粉等以消肿散结，如内消散；疮痈已溃、久不收口者，可用本品研末外用以生肌。治手足皴裂，用白芨研末，油调涂擦有效。

现代临床报道白芨治疗肺结核有一定疗效，无论有无出血，均可应用。据药理研究，白芨对结核杆菌有抑制作用，临床有配雷米封治疗

浸润性或空洞型肺结核的报道，疗效观察比单用雷米封或单用白芨为好。亦可用以治疗支气管扩张出血者，长期服用，确有疗效。还有用白芨粉局部外敷，治疗结核性瘘管，效亦显著。

【用量用法】 3-10克，煎服。研末服，每次1.5-3克。外用适量。传统认为本品忌与乌头配用。

棕榈

【原文】 苦能泄热，涩可收脱，烧黑能止血。红见黑则止，不可烧过。棕榈、侧柏、卷柏烧存性，饭丸，止远年下血，亦可煎服。治吐衄下痢，崩带肠风。失血过多者，初起未遽用。年久败棕尤良。与发灰同用更良。

【讲解】 棕榈以收敛止血为用。为棕榈科常绿植物棕榈树的叶鞘纤维（即叶柄基部的棕毛）。本品均须煅制成炭入药，传统认为放置陈久者为佳。处方常用棕榈炭、陈棕炭等名，新版《药典》称其为棕板炭。

本品味苦涩，性平，入肺、肝、大肠经。苦能泄热，涩能收敛，故有收敛止血之效，主治各种出血而无瘀滞者，尤以妇科崩漏用之最多。但不能消除病因，因此，若非单纯性出血，一般宜随证配伍，方能收到较好的效果。

【临证应用】 棕榈炭用治吐血、衄血、便血、崩漏等常与血余炭配伍可起协同作用。棕榈炭若配伍大蓟、小蓟、白茅根、山栀等以凉血止血，可治疗血热妄行之出血，如十灰散。若配伍黄芪、白术、海螵蛸、茜草等，可益气健脾、固冲摄血，以治疗冲脉不固、脾气虚衰所致崩漏不止者，如固冲汤。因本品收敛作用较强，故宜于出血过多而无瘀血的患者。若内挟瘀滞，或邪热方盛者，则非所宜。

【用量用法】 5-15克，煎服。研末服，每次1-1.5克。

血余炭

【原文】髮者血之余，味苦微寒，入足少阴厥阴。肾肝。补阴消瘀，通关格，利二便。治诸血疾，能去心窍之血，故亦治惊痫。血痢血淋，舌血煨末，茅根汤服。鼻血，烧灰吹鼻。转胞（1）不通，烧灰服。小儿惊热。合鸡子黄，煎为汁服。鸡子能去风痰。合诸药煎膏，凉血去瘀长肉。髮属心，禀火气而上生；眉属肝，禀木气而侧生；须属肾，禀水气而下生。或曰：髮属肝，禀木气而直生，眉属金，禀金气而横生，金无余气，故短而不长，至金气钝，则眉长矣。昂按：肺主皮毛，毛亦短而不长者也，何以独无所属乎？毛既为肺之合，自当属肺属金；眉当属肝属木，以其侧生象木枝也。此乃臆说，附质明者。经曰：肾者，精之处也，其华在髮。王冰注曰：肾主髓，脑者，髓之海，髮者，脑之华，脑髓减，则髮素。李时珍曰：发入土，千年不朽，以火煨之，凝为血质，煎炼至枯，复有液出，误吞入腹，化为癥虫。煨炼服食，使髮不白，故《本经》有自还神化之称。陈藏器曰：生人髮挂果树上，则鸟鸟不敢来。又人逃走，取其髮于纬车上缚之，则迷乱不知所适，此皆神化。《子母秘录》：乱髮烧灰，亦治尸疰。猪脂调涂小儿燕口，即两角生疮也。宋丞相王郃公，小腹切痛，备治不效，用附子、硫黄、五夜叉丸之类，亦不瘥。张駉马取妇人油头髮，烧灰研筛，酒服二钱，其痛立止。

《内经》脑为髓海，冲为血海，命门为精海，丹田为气海，胃为水谷之海。皂荚水洗净，入罐固煨存性用。胎髮尤良。补衰涸。头垢治淋及噎膈劳复。

【讲解】（1）转胞：病证名。又名转脬，胞转。指以脉下急痛为主证的小便不通。多因强忍小便，或寒热所迫，水气上逆，气迫膀胱，使膀胱屈戠不舒所致。或孕妇胎满压迫膀胱所致。

人髮煨炭入药，有止血化瘀之功。髮为血之余，故人髮又名血余。收集后除去杂质，碱水洗净，晒干，置瓷器钵内或锅内，盖严，用泥封固，盖之上放米少许，煨烧至米成黄色为度，待冷取出，退去火气，研极细末用，称血余炭。

本品味苦性平，入肝、胃经，有类似陈棕炭的收涩止血作用，但又能散瘀，故止血而无留瘀之弊。主治衄血、咯血、吐血、血淋、便血及崩漏等多种出血，尤以崩漏、尿血较为多用。此外，血余炭尚兼补阴利尿之功。

《备要》说头垢入药，治噎膈劳复，临床少用。

【临证应用】 血余炭研末，加入鲜藕汁半杯调和内服，治上部出血；配陈棕炭、莲蓬炭，治下部出血。与滑石等配伍，可用于小便不通。

此外，创伤出血或溃疡不收者，以之为细末撒布，又能止血生肌。吹鼻腔内，治鼻衄颇效。

【用量用法】 6—10克，煎服。研末服，每次1.5—3克。散剂效果较佳，但有令人作呕之副作用，故胃弱者不宜服。

三七

【原文】甘苦微温。散血定痛。治吐血衄血，血痢血崩，目赤肿痛，醋磨涂即散，已破者为未掺之。为金疮杖疮要药。杖时先服一二钱，则血不冲心，杖后敷之，去瘀消肿易愈。大抵阳明厥阴血分之药，故治血病。此药近时始出，军中持之。从广西山洞来者，略似白芨、地黄有节。味微甘，颇似人参。以末掺猪血中，血化为水者真。近出一种，叶似菊艾，而劲厚有歧尖，茎有赤棱，夏秋开黄花，蕊似金丝，盘纽可爱。而气不香，根大如牛蒡，味甘极，易繁衍，云是三七，治金疮折伤血病甚效，与南中来者不同。

【讲解】三七以化瘀止血、活血定痛为主要功效。为五加科多年生草本植物三七的根。产于广西、云南等地。挖取根部，去净泥土，除去须根及茎基，晒至半干，反复搓揉，使其表皮光滑：再晒至干，生用。古称山漆，因产于山中，能和金疮，如漆之粘物而得名。其苗似人参，又称参三七。为与同科属之水三七区别，也称旱三七、田三七、汉七。

本品甘微苦而温，归肝、胃经。既能止血，又能活血化瘀，具有止血而不留瘀的特点，为止血良药。适用于人体内外各种出血之证，如吐血衄血，崩漏等；尤其对于出血兼有瘀滞者最为适宜。借其活血散瘀之功，对瘀血肿痛之证，有消肿止痛作用，可治跌扑肿痛、疮痈肿毒，又为外伤科要药。

【临证应用】三七治体内外各种出血证，可单味应用，研末吞服，或随证配伍血余炭、花蕊石等止血药，如化血丹。对创伤出血，可研末外敷。治跌打肿痛，三七止痛效果尤佳，也可单用，或配活血药同用。著名的云南白药，三七即为主要成份。

近年来本品用治冠心病心绞痛、血小板减少性紫癜，都有一定疗效。

【用量用法】3-10克，煎服。临床多研末吞服，每次1-1.5克。外用适量。若用于止血，多以米汤或开水冲服；用于消肿止痛，应以黄酒冲服；用于补虚，可同鸡煮服。

以其性温，出血而见阴虚口干者，配滋阴凉血药同用为宜。

此外，还有菊叶三七、景天三七等不同种类。菊叶三七又称土三七，为菊科植物菊叶三七的根。景天三七为景天科多年生肉质草本植物景天三七的根。上二种三七功效与三七相似，而力逊，应用亦少。景天三七还有镇静安神的作用。

茜草

【原文】 色赤入营，气温行滞。味酸走肝，而咸走血。《本经》苦寒。入厥阴心包、肝。血分。能行血止血，能行故能止。消瘀通经，又能止吐崩尿血。消瘀通经。酒煎一两，通经甚效。治风痹、黄疸，疸有五，黄疸、谷疸、酒疸、黄汗疸、女劳疸。此盖蓄血发黄，不专于湿热者也。女劳疸必属肾虚，亦不可以湿热例治，当用四物知柏壮其水，参朮培其气，随证而加利湿清热药。崩运扑损，痔痿疮疔。血少者忌用。根可染绛⁽¹⁾忌铁。

【讲解】（1）绛：古代用茜草染成深红色的丝织品。

茜草既能凉血止血，又可活血祛瘀。为茜草科多年生蔓生草本植物茜草的根。又名血见愁。生用或炒用。

本品味苦性寒，入肝经血分。功能凉血止血，故治各种血热出血证。又兼能活血化瘀，可治血滞经闭、跌打损伤、瘀肿作痛及痹证疼痛等。

【临证应用】 茜草止血之中又有化瘀的作用，故有止血而不留瘀的特点，为止血之良药。用治血热所致的各种出血，可配小蓟、侧柏叶等凉血止血药同用，如十灰散。治跌打损伤，瘀血肿痛等，多配活血化瘀药同用。茜草在妇人血病尤为多用，治经闭、痛经等，多配当归、红花、赤芍等伍用；治妇人血崩，可与黄芪、五味子、白术、白芍、牡蛎等配伍，如固冲汤。

【用量用法】 6-15克，煎服。凉血止血炒用，活血化瘀生用。

蒲黄

【原文】 甘平。厥阴心包、肝。血分药。生用性滑，行血消瘀，通经脉，利小便，祛心腹膀胱寒热，同五灵脂，名失笑散，治心腹血气痛。疗扑打损伤，疮疖诸肿。一妇舌胀满口，以蒲黄频搽，比晓乃愈。宋度宗舌胀满口，御医用蒲黄，干姜末等分搽之愈。李时珍曰：观此则蒲黄之凉血活血可知矣。盖舌为心苗，心包相火，乃其臣使，得干姜，是阴阳相济也。炒黑性涩，止一切血，崩带泄精。香蒲，花中蕊屑，汤成入药。

【讲解】 蒲黄性平力缓，为化瘀止血药。为香蒲科水生植物狭叶香蒲或香蒲属其他植物的花粉。花初开放时，采收花序上的雄花，晒干碾压，筛取粉末入药。生用或炒用。

本品味甘性平。甘缓不峻，性平无寒热之偏，入肝、心包血分。具有收涩止血、行血祛瘀的作用，善止体内处各种出血，也有止血而不留瘀的特点。传统认为生用性滑，长于行血消瘀；炒炭性涩，长于止血。近代实验及临床实践均证实，生蒲黄同样具有止血作用。

此外，蒲黄还兼有利尿的功效。

【临证应用】 蒲黄性平力缓，各种出血证均可治疗。如吐血、便血、崩漏等，可单味应用，也可配合仙鹤草、侧柏叶等同用。外敷治创伤出血，有立止之效。

蒲黄生用活血祛瘀，又可用于心腹疼痛、产后瘀血腹痛、痛经等瘀血阻滞之证，尤以妇科应用为多。如配五灵脂，即成失笑散，治产后瘀血腹痛。其他如与青黛合用，治肺热衄血；配海螵蛸为末掺之，治舌血等。据现代研究报道，生蒲黄有收缩子宫的作用，可用于产后子宫收缩不良的出血，然孕妇忌用。

此外，本品用于血淋、尿血，可配小蓟、木通等效果亦佳，如小蓟饮子。

【用量用法】 3-10克。入煎剂宜包煎。外用适量。

艾叶

【原文】 苦辛。生温熟热。纯阳之性。能回垂绝之元阳。通十二经，走三阴，太、少、厥。理气血。逐寒湿，暖子宫，止诸血，温中开郁，调经安胎。胎动腰痛下血，胶艾汤良。阿胶、艾叶煎服，亦治虚痢，治吐衄崩带，治带要药。腹痛冷痢，霍乱转筋，皆理气血、逐寒湿之效。杀蛇治癣。醋煎。外科有用干艾作汤，投白矾二三钱洗疮，然后敷药者。盖人血气冷，必假艾力以佐阳，而艾性又能杀虫也。以之灸音九。火，能透诸经而治百病。血热为病者禁用。灸火则气下行，入药则热上冲，不可过剂。丹田气弱，脐腹冷者，以熟艾装袋，兜脐腹甚妙。寒湿脚气，亦宜以此夹入袜内。陈者良。揉捣如绵谓之熟艾，灸火用。妇人丸散，醋煮捣饼，再为末用。入茯苓数片同研，则易细。煎服宜鲜者。苦酒醋也。香附为使。艾附丸，调妇人诸病。宋时重阳阴艾，自明成化来，则以蕲州艾为胜，云灸酒坛，一灸便透。《蒙筌》、《发明》并以野艾为真蕲艾，虽香实非艾种。

【讲解】 艾叶温经止血、散寒止痛，为温经止血常用之品。为菊科多年生灌木状草本植物艾的叶片。生用，或炒炭用。也可将艾叶碾碎，柔烂如绵，成绒入药者，称艾绒。

本品苦辛而温。苦燥辛散，其气芳香，入肝、脾、肾三经。功能暖气血而温经脉，逐寒湿而止冷痛，妇人血气寒滞者用之尤宜。如腹中冷痛、经寒不调、宫冷不孕等，都常用其配伍他药使用。炒炭能止血，治崩漏下血等尤为适合，若配寒凉药，又可治血热吐衄。外用尚有杀虫止痒，疗疥癣之功。

艾绒制成艾条、艾柱，用以烧灸，能使热气内注，温煦气血，透达经络，治诸寒证有效。

本品生温熟热，其性燥，久服可致“热气冲上，狂躁不能禁，至攻眼有疱出”的后果，阴虚血热者不宜单独服用。

【临证应用】艾叶能温经止血，用于崩漏等虚寒性出血证，多炒炭配阿胶、地黄等同用，如胶艾汤。血热的吐血、衄血用鲜艾叶（即采集鲜品入药），多认为鲜者性较平和，少温燥。配凉血止血的鲜生地、

鲜侧柏叶、鲜荷叶同用，即四生丸。此种配伍既可制其辛温之性，又能使寒药无伤阳之弊。艾叶治下焦虚寒的腹痛、月经不调、带下等证可配香附、当归同用，如艾煎丸。《备要》言用醋制艾叶，制成丸散治妇人病，是取其入肝加强止痛之功。如《仁斋直指方》艾附暖官丸，即治妇人痛经或宫寒不孕。

借艾绒温香走窜之性，装入布袋中，兜于小腹，又治老人脐腹冷痛，或小儿受寒腹泻，也可用艾条烧灸以散寒。

此外，本品煎汤外洗，可治皮肤湿疹瘙痒。近年来还发现艾叶油有止咳、祛痰、平喘作用，已制成胶囊用于临床。

【用量用法】 3—10克，煎服。外用适量。

卷柏

【原文】 生用辛平。破血通经。治癥瘕淋结；炙用辛温，止血，治肠风脱肛。生石上，拳挛如鸡足，俗呼万年松。凡使盐水煮半日，井水煮半日，焙用。

【讲解】 卷柏生用活血祛瘀，炒炭止血。为卷柏科多年生常绿草本植物卷柏的全草。生于石上，形如拳之卷曲，故名为卷。又称万年松。

本品性味辛平，炒则微温，入肝经。生用功能活血祛瘀，可治经闭癥瘕，炒炭能止血而治肠风便血、崩漏等证。

【临证应用】 生卷柏配川芎、桃仁、红花等，可治血瘀经闭、痛经、癥瘕；炒炭配侧柏叶、地榆、蒲黄等治便血及崩漏。但临床上卷柏不似桃仁等活血祛瘀药应用广泛。

【用量用法】 6—10克，煎服。

伏龙肝

【原文】 辛温。调中止血，去湿消肿。治咳逆反胃，吐衄崩带，尿血遗精，肠风痈肿，醋调涂。脐疮研敷。丹毒。腊月猪脂或鸡子白调敷。催生下胎。《博救方》子死腹中，水调三钱服，其土当儿头上戴出。釜心多年黄土，一云灶额内火气，积久结成如石，外赤中黄，研细，水飞用。

【讲解】 伏龙肝功专温中止血，并能止呕。为烧杂柴草的土灶内底部中心的焦黄土块。又名灶心土。

本品味辛，性微温。入脾、胃经。有温中和胃之功，中气温和则血摄呕止，故善能止血止呕，并有涩肠固下之功。凡一切失血证属虚寒者，皆可使用。对胃肠出血及妊娠呕吐，尤为适宜，但热证之出血及呕吐则非所宜。

【临证应用】 伏龙肝用于脾气虚寒，不能统血之吐血、衄血、便血及崩漏等证见血色黯淡，面色萎黄，四肢不温，舌淡脉迟者，常与地黄、附子、阿胶等同用，如黄土汤。治中焦虚寒，胃失和降的呕吐，以及妊娠恶阻等证，可单用；脾胃虚寒呕吐，可配半夏、生姜、白豆蔻等。妊娠恶阻、呕吐不食，可与苏梗、木香、砂仁等配伍，共奏行气和胃安胎之功。此外，本品还有温脾涩肠止泻作用，治脾虚泄泻，可与附子、干姜、白术等同用，以增强温中止泻之功。

【用量用法】 15—30克，布包先煎。或用60—120克，煎汤代水。

百草霜

【原文】 辛温。止血，鼻衄者，水调涂之，红见黑则止，水克火也。消积，治诸血病，伤寒阳毒发斑，痘膈疟痢，咽喉口舌，白秃诸疮。李时珍曰：皆兼取火化从治之法。灶突上烟煤。

【进解】 百草霜功专止血，为温经止血之品。百草霜为杂草经燃后附于灶突或烟囱内的烟灰。采收后用细筛筛去杂质应用。

本品味辛性温，入肝、肺、胃经。功能温中止血，并兼消积，主治吐血、衄血、便血、血崩等诸出血证，并可用于食积泻痢。至于《备要》载治伤寒阳毒发斑、痘膈疟疾等证，李时珍虽言其为从治之法，但临床很少应用。

【临证应用】 百草霜主用于诸出血证，《纲目》单用百草霜末吹之，可止吐衄不止，但都须配伍其他止血药同用，如与炮姜为末，人参煎汤送服，治妇人血崩虚脱；与阿胶、藕节、侧柏叶、白茅根等研末，蜜丸，治二便出血，也可止子宫出血。

【用量用法】 0.5-1.5克，都入丸、散服。

花乳石

【原文】 酸涩气平。专入肝经血分。能化瘀血为水，止金疮出血，刮末敷之即合，仍不作脓。局方治损伤诸血、胎产恶血血运，有花蕊石散。下死胎胞衣。恶血化则胞胎无阻。出陕华代地，体坚色黄。煅研，水飞用。

【讲解】 花乳石功专化瘀止血。花乳石（《嘉佑本草》）原名后敲去杂石，煅采块。石，花大时含岩绿纹理有用取、火证，黄或黄为兼瘀滞蛇晕的块挖石的。石研细，水，色飞用。本品酸涩性平，归肝经。功能化瘀止血。可用治咯血、吐血而。

【临证应用】 花乳石涩敛止血，兼能化瘀，故用于吐血、咯血等出血证，兼有瘀滞者尤宜，常与三七、茜草炭、血余炭等伍用。治外伤出血，可研末外敷。

【用量用法】 10-15克，研末服，每次1-1.5克。外用适量。

小结

止血药可用于一切出血证。根据其不同作用特点，又可分为凉血止血、收敛止血、化瘀止血、温经止血四类。

一、凉血止血：大蓟、小蓟、侧柏叶、槐花、槐角、地榆、白茅根、苈麻根等药性多偏寒凉，均有凉血止血之功，适用于血热妄行的各种出血证。其中大、小蓟还兼有解毒疗疮之功，现代研究，尚有利胆降压等作用。解毒疗疮，大蓟力强，利胆降压，小蓟为优，但两者常同用，以互相助长疗效。侧柏叶味苦兼涩，凉血中兼有收敛之性，生用止血之力比炒炭强，鲜用捣汁服尤佳，兼可祛痰止咳、乌须黑发。槐花、槐实长于治疗便血、痔疮出血之证，近代研究本品尚有清肝降压的作用。槐花止血之力较胜，也常用于治疗吐血、衄血；槐实兼能润肠，故对痔疮或肛裂出血效果更为良好。地榆性偏沉降，善清下焦血热，多用于下部出血，如便血、血痢、崩漏等，兼可收敛生肌，外敷烧伤有良效，止血炒炭，烧伤生用。白茅根性较寒凉，除止血外，还有明显利尿作用，并能清肺胃之热，近代常用于现代医学之急慢性肾炎、尿路感染，尤擅治血淋、尿血之证。苈麻根功偏清热安胎，多用于怀胎蕴热所致的胎动不安及胎漏下血，又可利尿解毒，治湿热下注，小便淋沥不畅及热毒疮痍、蛇虫咬伤等证。

二、收敛止血：仙鹤草、白芨、棕榈炭、藕节等，味多兼涩，均有收敛止血之效，多用治各种出血而无瘀血之证。其中仙鹤草性平，对各种出血均有较好疗效，兼可补虚。白芨性粘，除止血外又能生肌敛疮，主治肺病咳血，现代研究认为有空洞者更宜，对溃疡出血亦有良效。棕榈炭、藕节均以止血为用，前者收涩为强，主用于出血过多而瘀血已尽者，以治妇女崩漏为优；后者兼能化瘀，多用于吐血、咯血之证。

三、化瘀止血：三七、茜草根、蒲黄、血余炭、花乳石等，瘀血阻滞、既能止血，又能化瘀，有止血而不留瘀，化瘀而不伤新之长。多用于血行失道之多种出血证。其中三七为止血、化瘀、止痛良药，可止体内外各种出血，又为跌打损伤、瘀滞肿痛，伤科要药，并治疮疡肿毒、经闭腹痛。既可内服，又可外用，作用较强，疗效甚捷。近代治冠心病心绞痛，疗效亦颇满意。茜草根性寒，炒炭能止血化瘀，善治血热出血之证，而无留瘀之弊；生用能凉血化瘀，用治瘀血阻滞之

胸胁疼痛及经闭腹痛。蒲黄长于止血，善治体内各种出血证，对妇女子宫出血尤有专长，其活血化瘀之功，主用于妇产科血瘀痛经、产后腹痛等证。血余炭为治疗各种出血证之辅助药，尤多用于崩漏、尿血等证。花乳石善止血化瘀。

四、温经止血：艾叶、灶心土、百草霜性多偏温，均有温经止血之效，适用于虚寒性出血证。其中艾叶尤长于治疗崩漏下血，并能散寒湿、理气血、暖子宫，故对经寒不调，腹中冷痛，或宫寒不孕等证，亦为常用之品，外可用作温灸原料。伏龙肝善治脾虚不能统血之吐血、便血，及脾虚下陷之泄泻，并能温中止呕，又为妊娠恶阻、虚寒呕吐之常用药。百草霜功专温中止血。

止血药功用归纳简表

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
大蓟	甘、凉	心、肝	凉血止血，解毒消肿	①吐血、衄血、尿血等血热妄行之出血证 ②疮痈肿毒	10-15克鲜品可至30-60克外用适量	小蓟功效与大蓟相似。二药常同用
侧柏叶	苦、涩、微寒	肝、肺、大肠	凉血止血，祛痰止咳	①血热妄行之各种出血证 ②咳嗽痰多 ③脱发	10-15克外用适量	
槐实	苦、微寒	肝、大肠	凉血止血，润肠通便	①便血、痔血等血热妄行之出血 ②头痛目赤	10-15克	槐花功同槐实，但止血作用更强，并能降压

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
地榆	苦、酸、微寒	肝、胃、大肠	凉血止血，解毒敛疮	①便血、痔血等血热妄行之出血证 ②烧伤、烫伤、湿疹、皮肤溃烂等	10-15克 外用适量	止血炒炭烧灰生用
白茅根	甘、寒	肺、胃、膀胱、心	凉血止血，清热利尿	①吐、衄、尿血及血淋等血热出血证 ②小便不利、水肿、湿热黄疸	10-30克 鲜品用至30-60克	白茅花凉血止血之功与白茅根相似，但无利尿作用
苎麻根	甘、寒	心、肝	凉血止血，清热安胎，	①崩漏等血热出血、胎动不安、胎漏下血	10-30克 外用适量	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			利尿解毒	②热毒疮痈		
藕	甘、寒	心、脾、胃	凉血止血，兼能化瘀	诸血热出血证	捣汁服无定量	藕节收敛止血，多作辅助药用
仙鹤草	苦、涩、平	肺、肝、脾	收敛止血，补虚	①各种出血证 ②脱力劳伤	10--30克 大剂量至30--60克	鹤草芽功能杀虫，治涤虫病效佳
白芨	苦、甘、涩、微寒	肺、肝、胃	收敛止血，消肿生肌	①肺胃出血 ②疮痈肿毒、手足皲裂	3--10克 研末服 每次1.5--3克 外用适量	反乌头
棕榈	苦、涩、平	肝、肺、大肠	收敛止血	崩漏、便血等各种出	5--15克 研末服	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				血而无瘀滞者	每次 1— 1.5 克	
血余炭	苦、平	肝、胃	止血散瘀，补阴利尿	①崩漏、尿血等各种出血 ②小便不利	6—10克 研末服 每次 1.5— 3克	
三七	甘、微苦、温	肝、胃	止血祛瘀，消肿定痛	①吐、衄、便血等各种出血证兼有瘀滞者 ②跌打伤痛、疮痈肿毒 ③冠心病心绞痛、血小板减少性紫癜	3—10克 研末服 每次 1— 1.5克 外用适量	
茜草	苦、寒	肝	凉血止血，	①崩漏等血热出血 ②	6—15克	生用活血化

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			活血祛瘀	血滞经闭、跌扑损伤		瘀，炒用凉血止血。
花乳石	酸、平	肝	止血化瘀	吐血、咯血	10-15克	
蒲黄	甘、平	肝、心包	收涩止血，活血祛瘀，利尿	①血淋、尿血、崩漏等各种出血 ②心腹疼痛、痛经、产后瘀阻腹痛	3--10克 外用适量	包煎生用行瘀炒用止血
艾叶	苦、辛、温	肝、脾、肾	温经止血，散寒止痛	①崩漏、便血等虚寒性出血 ②虚寒性腹痛、月经不调等	3--10克 外用适量	生用散寒止血，炒用温经止血。

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
卷柏	辛、平	肝	活血祛瘀，止血	①经闭瘀痕 ②崩漏、便血等出血证	6--10克	生用活血祛瘀，炒炭止血
伏龙肝	辛、微温	脾、胃	温中止血，止呕，止泻	①虚寒性出血 ②胃寒呕吐、妊娠恶阻 ③脾虚久泻	15-30克 煎汤代水 60-120克	布包先煎
百草霜	辛、温	肝、肺、胃	温中止血，兼能消积	①虚寒性出血 ②食积泻痢	0.5-1.5克皆入丸散	

复习思考题

- 1、止血药主要用于哪些出血病证？
2. 根据止血药各自的特性，可分为几类，请加以归纳。
3. 分别阐明三七、白芨、地榆、艾叶的主治要点。
4. 试述仙鹤草、大蓟、侧柏叶、白茅根、茜草、蒲黄、槐花、棕榈的功效和适应证。

第十四章 消食药

• 第十四章 消食药

【自学时数】 2学时

【面授时数】 1学时

【目的要求】

1. 了解消食药的含义、功效，适用证。
2. 熟悉消食药与理气、温中、清热、泻下、化湿、健脾、和胃等药配伍应用的理论依据（联系中医基本理论）。
3. 掌握消食药中常用药（山楂 莱菔子 鸡内金）的功效、临证应用，并比较其异同。
4. 在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡能促进饮食消化、导行积滞的药物，称为消食药。又称消导药。

消食药一般适用于食积不化所致的脘腹胀满、噎气吞酸、恶心呕吐、大便失常，以及脾胃虚弱、消化不良等证。

临床应用时，应根据不同病情而配伍其他药物。由于食积停滞，往往引起气机不畅，故在运用本类药物时，常配伍理气之品以行气宽中，可有助于消食化滞；若见有寒象者，可配伍温中之品以散寒行滞；宿食停积，已经化热者，可适当配伍苦寒清下之品以泄热导滞；湿浊内阻者，又当配合芳香化湿药以化湿醒脾；如脾胃虚弱、运化无力者，则应以调补脾胃为主，不能单纯依靠本类药物取效。

山楂

【原文】 酸甘咸温。健脾行气，消瘀化痰，消食磨积。消油腻腥羶之积，与麦芽消谷积者不同，凡煮老鸡硬肉，投数枚则易烂。其消肉积可知。发小儿痘疹，止儿枕作痛⁽¹⁾。恶露积于太阴，少腹作痛，名儿枕痛，沙糖调服。多食令人嘈烦易饥，反伐脾胃生发之气。破泄太过，中气受伤。凡服人参不相宜者，服山楂即解，一补气，一破气也。有大小二种，小者入药。去皮核用。一云核亦有力，化食磨积。

【讲解】（1）儿枕痛：病证名。产后因恶露不下，瘀血内停引起的下腹疼痛。

山楂消食化积，化瘀散结。为蔷薇科落叶灌木或小乔木植物野山楂或山楂的果实。商品分“北山楂”和“南山楂”两种，北山楂为植物山楂的果实，呈球形或梨形，直径约2.5厘米。表面深红色，有光泽，满布灰白色细斑点。南山楂为植物野山楂的果实，呈圆球形，直径0.8-1.4厘米。表面灰红色，有细纹或小斑点。二者均作药用。入药生用、炒用或炒炭用。

山楂味酸甘，性微温。入脾、胃、肝经。味酸而甘，微温不热，功擅助脾健胃，促进消化，尤为消油腻肉食积滞之要药，用于食积不化，肉积不消，脘腹胀满，腹痛泄泻等证。山楂能入肝经血分，善能化瘀散结以止痛，多用于产后瘀滞腹痛，恶露不下，以及疝气偏坠胀痛等证。炒炭能止泻痢。

【临证应用】 山楂用于肉积不消，单用煎服即有效；治食积不化，常与六曲、麦芽、莱菔子等同用，以增强消食化滞之力：如保和丸；若兼见脘腹胀痛者，可于上方再加木香、枳壳等药，以行气消滞；伤食而致腹痛泄泻，以及小儿伤乳等证，可用焦山楂研末，和红糖、开水调服。治产后儿枕痛，单用山楂炭30克，水煎加红糖、开水调服，即独圣散；亦常与当归、川芎、元胡、益母草等同用，以加强活血散瘀止痛之功。治疝气腹痛，可与小茴香、橘核、川楝子等疏肝理气止痛药同用，以加强疗效。此外，近年临床常以生山楂用于高血压病，冠心病及高血脂症的治疗。

【用量用法】 10-15克，煎服。消食多炒用，止泻化瘀多炒炭用，其他多生用。

麦芽

【原文】 **咸温。能助胃气上行，而资健运。补脾宽肠，和中下气，消食除胀，散结法痰**。咸能软坚。**化一切米面果食积，通乳下胎**。《外台》
方：麦芽一升，蜜一升服，下胎神验。醇立斋治一妇人，丧子乳胀，几欲成痈，单用麦芽一二两炒，煎服立消。其破血散气如此。《良方》曰：神曲亦善下胎，皆不可轻用。
久服消肾气。王好古曰：麦芽、神曲，胃虚人宜服之，以伐戊己，腐熟水谷。李时珍曰：无积而服之，消人元气。与白术诸药消补兼施，则无害也。胃为戊土，脾为己土。**炒用。豆蔻、砂仁、乌梅、木瓜、芍药、五味为使**。

【讲解】 麦芽善能消食导滞，尤长于消淀粉类食积。为禾本科一年生草本植物大麦的成熟果实经发芽而成。生用或炒黄用。

本品味甘性平，（《本草从新》：味甘，性平，无毒。）入脾、胃经。能促进食物的消化，尤能助米、面、薯、芋等淀粉类食物的消化，并兼有健脾和胃之功。但本品健脾和胃与参术不同，人参，白术为补益药，以增强脾的功能而助消化；麦芽为消导药，以消化停食积滞，而使脾胃复运。故对于消化不良、食欲不振而兼脾胃虚弱者更为适宜。本品又有抑制乳汁分泌而有回乳之功。凡妇女断乳或乳汁郁积而致乳房胀痛者，用之可收到回乳消胀之效。但哺乳期不宜服用，以免乳汁减少。

【临证应用】 麦芽以消散为主，与山楂、六神曲等配伍，能消食物积滞，治消化不良，不思饮食，脘闷腹胀之证；若脾胃虚弱而运化无力者，亦可配补脾益气药党参、白术等同用。并可使补而不滞、消不伤正。至于治乳汁郁积，乳房胀痛，可单用生麦芽60克，水煎分两次服，有一定疗效。

【用量用法】 10-15克，大剂量30-120克，煎服。回乳宜生用。消食宜炒用。

穀芽

【原文】 甘温。开胃快脾，下气和中，消食化积。炒用。

【讲解】 谷芽善消谷食积滞，并有健脾开胃之功。为禾本科一年生草本植物稻的成熟果实经发芽而成，故又名稻芽。生用或炒用。

本品甘平，入脾、胃经。其消食之功与麦芽相似，但消食之力较麦芽、山楂缓和，故有促进消化而不伤胃气的优点。

【临证应用】 治食积停滞、消化不良，每与麦芽相配，以增强疗效。若脾胃虚弱、消化不良、食少之证，多配党参、白术、甘草等同用，以起相使为用之功。所以前人说：“谷芽得术、草，消食而不伤脾胃之气，术、草得谷芽，补土而无壅中之患。”这种配伍方法，是通补法的良好范例。

【用量用法】 10-15克，煎服。生用养胃，炒用消食。

神曲

【原文】 辛散气，甘调中，温开胃。化水谷、消积滞。《医余》曰：有伤粽子成积，用曲末少加木香，盐汤下，数日口中闻酒香，积遂散。治痰逆癥结，泻痢胀满。回乳炒研，酒服二钱，日二。下胎。产后血晕，末服亦良。亦治目病。《启微集》曰：生用能发其生气，熟用能敛其暴气。造曲法：以五月五日、六月六日，用白面百斤，赤豆末、杏仁泥、青蒿、苍耳、红蓼汁各三升，以配青龙、白虎、朱雀、玄武、螣蛇、勾陈六神，通和作饼，罾生黄衣，晒收。陈者良。炒用。

【讲解】 神曲善能消化穀食，又能健脾和中。为面粉和其他药物（青蒿、苍耳、辣蓼、杏仁、赤小豆）混合后经发酵而成的加工品。又名六神曲。切成小方块，一般以陈久者为佳。原药生用，炒用或炒焦用。

本品甘辛性温，入脾、胃经。凡发酵之品都有健脾胃、助消化之功，以消食化积，且甘而不壅，味辛微散，焦气香，又善健脾胃。因此对伤食积滞、泄泻之证，尤为适宜。至于治痰逆癥结之证，临床很少应。

【临证应用】 神曲用于饮食积滞，消化不良，或伤食腹泻，脘腹胀满等证，常与山楂、麦芽、鸡内金等同用，或配伍巴豆霜、南星等，温里消积，如保赤丸。此外，对丸剂中有金石药品，难于消化吸收者，可用神曲糊丸以助消化，如磁朱丸。

【用量用法】 10~15克，和胃消食多炒用，止泻痢多炒炭用，配丸制糊则生用。

附：建曲 又名范志曲。是在六神曲的内容上又增加紫苏、荆芥、防风、羌活、厚朴、木香、枳实、青皮等四十多种药物配制而成。功用与六神曲相似，而消食化滞之力加强，更兼发散理气，适用于食滞不化，脘腹胀闷，或兼感风寒者。

鸡内金

【原文】 鸡肫皮，一名鸡内金，一名𪚩脰，音皮鸱。甘平性涩，鸡之脾也。能消水谷，除热止烦。通小肠、膀胱。治泻痢便数，遗溺，溺血，崩带肠风，膈消反胃，小儿食疟。男用雌，女用雄。

鸡矢醴微寒。下气消积，利大小便，《内经》用治蛊胀。腊月取雄鸡屎白收之，醋和涂蚯蚓、蜈蚣咬毒。合米炒治米瘰。

【讲解】 鸡内金功善消食磨积，并能健脾，固精，止遗。为雉科动物鸡的砂囊角质内壁。又名鸡肫皮。洗净晒干，研末生用或炒用。

本品甘、涩，性平。入脾、胃、小肠、膀胱经。凡动物弱于齿者，必强于胃。鸡内金为鸡的胃内壁，故善能消食磨积，且作用较强，为一味强有力的消导药。能助消化以治食积，又可健脾而止泻痢。适用于食积停滞所引起的腹胀泻痢，反胃呕酸等证。涩可固脱，故本品有固精止遗之效，可用于遗精，遗尿之证。此外，本品尚有化坚消石之功，可治疗胆结石、泌尿系结石等。至于男用雌，女用雄之说，无何参考价值。

【临证应用】 鸡内金用于饮食积滞，消化不良及小儿疳积等证。可单用研末调服，或与山楂、麦芽、神曲等配伍。治小儿脾虚疳积，多与白术、山药、茯苓等健脾益气药同用，以加强疗效。用于遗尿、小便频数及遗精等证。前者常与桑螵蛸、山药、覆盆子等配伍；后者可单用研末服，或与莲须、菟丝子、沙苑蒺藜等同用。治泌尿系结石，多与海金沙、川牛膝等同用；胆结石，可与金钱草、郁金、茵陈等同用。

【用量用法】 3—15克，煎服。散剂吞服每次1—3克。本品微炒研末吞服，疗效比煎剂好。

附：鸡矢醴 又名鸡屎白。为家鸡屎便上的白色部分。本品味苦咸，性微寒，入膀胱经。功能利水泄泻，下气消积，主治膨胀，积滞，淋病，破伤风，筋脉挛急等证。

莱菔(莱菔子)

【原文】 辛甘属土。生食升气，熟食降气。宽中化痰，散瘀消食。朱丹溪曰：气升则食自降。治吐血衄血，咳嗽吞酸。利二便，解酒毒，制面毒豆腐积。昔有人病，梦红裳女子引入宫殿，小姑歌曰：五灵楼阁晓玲珑，天府由来是此中；惆怅闷怀言不尽，一丸莱菔火君宫。一道士曰：此犯大麦毒也。女子心神，小姑脾神，医经莱菔制面毒，遂以药并莱菔治之，果愈。腐浆见莱菔则难收。生捣治噤口痢，止消渴，涂跌打火伤。多食渗血，故白人髭髮。服何首乌、地黄者忌之。生姜能制其毒。夏月食其莱数斤，秋不患痢；冬月以莱叶摊屋瓦上，任霜雪打压，至春收之，煎汤饮，治痢得效。有人避难入石洞中，贼烧烟熏之，口含莱菔一块，烟不能毒。嚼汁濡水饮之亦可。王荆公患偏头痛，捣莱菔汁，仰卧，左痛注右鼻，右痛注左鼻，或两鼻齐注，数十年之患，数注而愈。

莱菔子，辛入肺，甘走脾，长于利气。生能升，熟能降，升则吐风痰，散风寒，宽胸膈，发疮疹；降则定痰喘咳嗽，调下痢后重，止内痛。皆利气之功。朱丹溪曰：莱菔子治痰，有冲墙倒壁之功。《食医心镜》：研汤煎服，治气嗽痰喘吐血。炒用。

【讲解】 莱菔子功擅消食化积，又能降气消痰。为十字花科一年或二年生草本植物莱菔的种子。晒干，生用或炒用。

本品味辛甘，性平。入脾、胃、肺经。功擅消食化积，又善降气消痰，消食中还具有行气除胀之功。用于食积气滞，脘腹胀满，暖气食臭，或腹痛泄泻，泻而不畅，以及痰涎壅盛、咳喘痰多之证。此外，本品能损耗正气，体虚者不宜服，又能消除补药药力，故不宜与人参、熟地等补药同用。

至于本品生用主升，能吐风痰及发痘疮之说，未必尽善。正如《医学衷中参西录》云：“莱菔子，无论生或炒，皆能顺气开郁，消胀除满，此乃化气之品。”

【临证应用】 莱菔子用于食积不化，中焦气滞之证，常与山楂、神曲、陈皮等消导行气药同用，可增强消食和中之力，如保和丸；若食积停滞而兼有脾虚证候者，可在上方中再加白术以消补兼施，使食积

去而中气不损，如大安丸；用治痰饮停留、痰多、咳嗽、气喘之实证，可与白芥子、苏子温肺化痰、降气止咳药同用，效力显著，如三子养亲汤。若肺肾虚的咳嗽喘满者，则非所宜。三子养亲汤虽以养亲为名，但仍以痰盛咳嗽之实证为主。

【用量用法】 6-15克，煎服。

附：莱菔 即莱菔新鲜的根。味甘性凉。入肺、胃经。功能消积滞，化痰热，下气宽中，解酒毒。用治食积气滞，胸脘胀闷，吞酸反胃，或噤口下痢，以及肺热咳嗽，吐血衄血，消渴等证。单味切片榨汁冲服可解煤气之毒。

小结

本类药具有消食导滞作用，主治食积不消，积滞不化之证。其中山楂善消肉食积滞，兼能散瘀消癥，以治产后瘀滞腹痛、痛经等证，炒炭用则能止泻痢。麦芽偏于消面积，又有回乳作用。谷芽、神曲偏于消谷积，二药相较，谷芽作用较为缓和，且兼有和中健脾之功；神曲消导之力较强。鸡内金除有较好的消食健胃作用外，又有化石、止遗之功，可治遗尿、遗精及结石等证。莱菔之消食之中又长于祛痰降气，治疗痰多咳喘之证。

消食药功用归纳简表

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
山楂	酸、甘、微温	脾、胃、肝	消食化积，活血散瘀	1、食滞不化、肉积不消 2、产后瘀滞腹痛	10-15克	炒炭止泻痢
麦芽	甘、平	脾、胃	消食和中，回乳消胀	1、食积不化 2、乳汁郁积、乳房胀痛	10-15克，大剂量至30—120克	炒用消食，生用回乳
穀芽	甘、平	脾、胃	消食和中，健脾开胃	食积不化、消化不良	10—15克	生用养胃，炒用消食
神曲	甘、辛、温	脾、胃	消食开胃	饮食积滞	10—15克	生用入丸剂，炒用消食

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
建曲			消食化滞，发散风寒	食滞不化，或兼感风寒	6-10克	
鸡内金	甘、涩、平	脾、胃、小肠、膀胱	消食运脾，固精止遗，化坚消食	①食滞不化，小儿疳积 ②遗精、遗尿③胆结石、泌尿系结石	3—15克 研末服 每次1—3克	研末服效佳
莱菔子	辛、甘、平	脾、胃、肺	消食化积，降气化痰	1、食积停滞，气机不畅 2、痰涎壅盛，气喘咳嗽	6—15克	

复习思考题

1. 试述消食药的作用，与泻下药有何不同？
2. 山楂、麦芽、莱菔子、鸡内金的效用有何差别？

第十五章 驱虫药

【自学时数】4 学时

【面授时数】1 学时

【目的要求】

1. 了解驱虫药的应用范围及其特点。
2. 熟悉驱虫药与消积导滞、泻下、健脾、和胃等药配伍应用的适用证。
3. 掌握驱虫药中常用药（使君子 大蒜 槟榔 贯仲 山道年）的功
效、临证应用（用量、用法、注意事项）并比较其异同。
4. 在自学本草全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡能驱除或杀灭寄生虫的药物，称为驱虫药。

寄生虫在人体内寄居部位，有肠道、肝脏、肺脏，甚至脑部等不同，而本类药物主要用以驱杀肠道寄生虫，常见的有蛔虫、蛲虫、绦虫、钩虫和姜片虫等，其中除钩虫由皮肤接触感染外，多由口腔进入人体。

患肠道寄生虫的病人，大多具有绕脐腹痛，时作时止，不思饮食，或善饥多食，嗜食异物，肛门、鼻及耳瘙痒等症状，久则可有面色萎黄，形瘦腹大，或浮肿乏力等证。但各种虫证还有各自的特征。另有不少患者因寄生虫感染较轻，无明显症状，只是在检查大便时才被发现。

使用本类药物，必须根据寄生虫的不同种类及患者体质的强弱、兼证的不同等，分别选用和适当的配伍。如有积滞者，可配伍消积导滞药；便秘者，当配泻下药，并有助于虫体排出；脾胃虚弱，运化失常者，可酌配健运脾胃药，对于体虚的患者，应攻补兼施，或先攻后补，或先补后攻。

驱虫药一般应在空腹时服，使药力直接作用于虫体，以收驱虫之效。

本类药物中，部分药物具有相当的毒性，应用时必须注意剂量，以免损伤正气。此外在患者发热或腹痛剧烈时，也暂不宜用驱虫药。孕妇及老弱患者都应慎用。

使君子

【原文】 甘温。健脾胃，除虚热，杀脏虫。治五疳便浊，泻痢疮癰。为小儿诸病要药。《经疏》曰：五疳便浊，泻痢腹虫，皆由脾胃虚弱，因而乳停食滞湿热淤塞而成。脾胃健则积滞消，散热散，水道利，而前证尽除矣。李时珍曰：凡能杀虫之药，多是苦辛，独使君子、榧子，甘而杀虫，每月上旬，虫头向上，中旬头横，下旬向下。《道藏》曰：初一至初五，虫头向上，凡有虫病者，每月上旬，空心食数枚，虫皆死而出也。按地黄、胡麻皆杀虫。出闽蜀，五瓣有棱，内仁如榧。亦可煨食，久则油，不可用；忌饮热茶，犯之作泻。

【讲解】使君子有杀虫消积之功，为驱蛔虫之要药。为使君子科落叶藤本状灌木植物使君子的成熟果实。其果实略似橄榄状，有五角棱，内有种子一粒，去果壳者，称使君子仁，酷像榧子仁。临用时去壳，取仁，生用，或炒香用。主产于四川、广东、广西、云南等地。以四川产量最多。

使君子味甘性温。入脾、胃经。有杀虫消积之功，为驱蛔虫之要药。对蛲虫亦有疗效，因蛔虫引起的腹痛，小儿形体消瘦，腹胀如臌的疳积，疗效亦好。因其味甘而香，故小儿易服，可单用，不配泻药即可。

不宜与茶同服，过量服之能引起呃逆、眩晕，以致呕吐等反应。一般在停药后即可缓解。

【临证应用】 治蛔虫病轻证，可单用使君子仁炒香嚼服，若蛔虫较多，证情较重者，可配古楝皮、槟榔同用。配党参、白术、鸡内金、槟榔等健脾消食药，适用于小儿疳积，形瘦腹大，面色萎黄者。

【用量用法】 6—10克。炒香嚼服，小儿每岁每天1粒—1粒半。总量不超过20粒。

槟榔

【原文】 苦温破滞，辛温散邪，泻胸中至高之气，使之下行；性如铁石，能坠诸药至于极下。攻坚去胀，消食行痰，下水除风，杀虫醒酒。治痰癖癥结，瘴疴⁽¹⁾ 疟痢，水肿脚气。脚气冲心，尤须用之，童便姜汁温酒调服。治大小便气秘，里急后重。同木香用，木香能利气。过服则损真气。岭南多瘴，以槟榔代茶，其功有四：醒能使醉，醉能使醒；饥能使饱，饱能使饥。然泄脏气，无瘴之地忌用。鸡心尖长，破之作锦纹者良。程星海曰：阴毛生虱，世鲜良方，以槟榔煎水洗即除。又方，以心红擦之亦好。

【讲解】 (1) 瘴疴：指感受湿热杂毒而致疫疠的一种。

槟榔功善杀虫，又有行气、消积、利水的作用。为棕榈科常绿乔木植物槟榔的成熟种子，又名海南子。书言“鸡心尖长，破之作锦纹者良。”系槟榔纵剖面可见外缘的棕色种皮向内褶入，与乳白色的胚乳交错，形成大理石样花纹，故称花槟榔或鸡心槟榔，品质较佳；另有形圆扁者称大腹槟榔，即大肚子，力稍逊。生用，切片入药。主产于海南岛、福建、云南等地。

槟榔味辛苦性温，入胃、大肠经。其杀虫作用较为广泛，可用于多种肠寄生虫病，而以治绦虫、姜片虫等尤为有效。又因质重下沉，善于破滞温通，故对食积气滞、腹胀便难，或泻痢后重、水肿脚气等证均可使用。还可用于疟疾。

【临证应用】 槟榔用于绦虫、姜片虫、蛔虫、蛲虫等多种寄生虫，并有泻下作用，有助于驱除虫体，对绦虫病疗效较佳，以杀灭猪肉绦虫尤为有效，可单用，水煎一次空腹服。若与南瓜子配伍，可增强驱杀牛肉绦虫之力，治蛔虫，可配牵牛子同用，如牛郎丸。治食积气滞，腹胀便秘，以及泻痢后重等证，可与木香、大黄、青皮等同用，如木香槟榔丸，以消积导滞。治水肿实证，多与商陆、茯苓、泽泻等配伍，如疏凿饮子，以逐水消肿。治脚气肿痛属寒湿者，常配吴茱萸、木瓜、陈皮、紫苏等祛寒湿、舒经络药同用，如鸡苏散。治疗疟疾也常应用，如常用截疟方剂截疟七宝饮中即有本品。

【用量用法】 6—15 克，单用杀绦虫、姜片虫时，可用60—120克。
煎服。

雷丸

【原文】 苦寒有小毒。入胃、大肠经。功专消积杀虫。杨勔得异疾，每发语，腹中有小声应之，久渐声大。有道士曰：此应声虫也。但读本草，取不应者治之。读至雷丸不应，服之而愈。竹之余气，得霹雳而生，故名。大小如栗，竹刀刮去黑皮，甘草水浸一宿。酒拌蒸，或炮用。厚朴、芫花为使。恶葛根。

【讲解】 雷丸以驱杀绦虫为主，兼驱钩虫、蛔虫。为多孔菌科雷丸菌的菌核，多寄生于竹的枯根上，呈不规则的圆块，大小如栗，质坚色黑灰。洗净晒干，生用。

雷丸味苦性寒，有小毒。入胃、大肠经。功专杀虫，尤以驱杀绦虫为主，能在肠道内分解虫体，不论有钩绦虫、无钩绦虫以及囊虫病等，效均良好。用于驱蛔虫、钩虫等亦有功效。

【临证应用】 雷丸中所含雷丸素，在肠内能破坏绦虫节片，驱杀绦虫效果较好，对杀钩虫、蛔虫也有效。可单用研末服，或与槟榔、牵牛子、木香等配用，杀虫力更强。

【用量用法】 6—15克。雷丸加热则失效，（雷丸中的雷丸素，是一种蛋白分解酶，受热60℃左右和在酸性溶液中易于破坏失效，而在碱性溶液中作用较强。）故多作丸、散剂吞服。用以驱杀绦虫，每次服粉剂12—18克，日服三次，用冷开水调，饭后服。连服三天。

鹤虱

【原文】 苦辛有小毒，杀五脏虫。治蚘嚙腹痛。面白唇红，时发时止者，为虫痛，肥肉汁调末服。沈存中《笔记》曰：是土牛膝子。或曰非也，别是一种。最粘人衣。有狐气。炒热则香。

【讲解】 鹤虱的功效，以驱蛔虫、蛲虫为主。为菊科多年生草本植物天名精，或伞形科二年生草本植物野胡萝卜的干燥成熟果实。种仁黄白色、有油性，尝之有粘性。生用；或炒用。天名精主产于华北各地，称北鹤虱，为本草书籍所记的正品；野胡萝卜产于浙江、安徽、四川、江苏等地，商品称南鹤虱。

本品味苦辛性平，有小毒。入脾、胃经。功专杀虫，可用于多种肠寄生虫病，如蛔虫、蛲虫及绦虫等。可单用，但效力不大，故多配成复方应用。

【临证应用】 鹤虱用于蛔虫、蛲虫等肠寄生虫病。可做成散剂单用，但多与使君子、槟榔等同用，如化虫丸。

【用量用法】 3—10 克，入丸散剂宜炒用，入煎剂可生用。

茺莢

【原文】 辛散满，苦杀虫，温燥湿化食。诸虫皆因湿而生，气食皆因寒而滞。祛五脏皮肤关节风湿，心腹积冷，癥痛鳖瘕。《直指方》曰：嗜酒人血入于酒为酒鳖；多气人血入于气为气鳖；虚劳人败血杂痰为血鳖。如虫之行，上侵人咽，下蚀人肛，或附肋背，或隐胸腹，惟用炒茺莢，兼暖胃理气益血之药，乃可杀之。痔瘻疮癬，小儿惊疳冷痢。得诃子、豆寇良。胃中有虫，食即作痛。和面炒黄为末，米饮下。形类榆莢，陈久气羶者良。

【讲解】 茺莢功能杀虫消积，尤以杀蛔虫见长。为榆科落叶小乔木或灌木植物大果榆果实的加工品。其加工制品为扁平方形块状，质松，呈赤褐色，夹有残存的果皮和枝叶破片，并有触鼻之恶臊味。切成小块晒干入药。

茺莢味辛苦性温。入脾、胃经。有杀虫消积之功，可治虫积腹痛及小儿疳积泄泻等证，而以驱杀蛔虫效力见长。此外，外用可治疥癬。

【临证应用】 用于蛔虫、绦虫病，常配鹤虱、使君子、槟榔等同用，如化虫丸。用于小儿疳积，面黄肌瘦，大便溏泄者，可配白术、山药、鸡内金、木香等健脾和胃之品。此外，茺莢研末，用醋或蜂蜜调涂患处，可治疥癬。

【用量用法】 3-10 克，以研末吞服为胜，入汤煎服效减。外用适量。

榧实

【原文】 甘涩。润肺。本草未尝言润，然润剂也，故寇氏曰：多食润肠。杀虫。

有虫积者，宜上旬日日食之，食一斤，虫乃绝。

【讲解】 榧实可驱杀多种肠寄生虫，并有缓泻作用，是比较有效而又安全的驱虫药。为红豆杉科常绿乔木植物榧树的成熟种子。《别录》原名榧实，一般称为榧子。生用，或炒用。

榧子味甘性平，入肺、大肠经。具有杀虫消积之功，既能杀虫，又不损伤胃气，具有缓泻作用，可促使虫体排出，故为驱虫要药。可用于多种虫积腹痛之证，尤以杀钩虫、绦虫为佳。

此外，尚能润肺止咳，适用于肺燥咳嗽证情较轻者。

【临证应用】 榧子杀虫作用较好，治蛔虫病可单用10——20粒嚼服，或配使君子、苦楝皮等同用。治绦虫病可配南瓜子、槟榔等。对蛔虫常配苦楝皮等同用。

【用量用法】 30——50 克。炒熟去壳，取种仁嚼服；亦可连壳生用，打碎入煎。治钩虫病，每天用30——40个，炒熟去壳，在空腹时一次嚼服，连服至大便虫卵消失为止。

贯众

【原文】 味苦微寒有毒，而能解邪热之毒。治崩中带下，产后血气胀痛，破癥瘕，发斑痘。王海藏快斑散用之。化骨鲠，能软坚。杀三虫。根似狗脊而大。汁能制三黄，化五金，伏钟乳结砂制汞，解毒软坚。以此浸水缸中，日饮其水，能辟时疾。

【讲解】 贯众有杀虫之功，兼能清热解毒，止血。为鳞毛蕨科多年生草本植物粗茎鳞毛蕨；蹄盖蕨科多年生草本植物蛾眉蕨；乌毛蕨科多年生草本植物单芽狗脊；紫萁科多年生草本植物紫萁的根茎及叶柄基部。又名贯仲。生用，或炒炭用。

贯众苦寒，入肝、脾经。具有杀虫之功，用于多种肠寄生虫病均效。因其味苦性寒，故有较好的清热解毒和止血之功，可用治热毒疮肿发斑出痘以及血热妄行之出血等证，《备要》言：“化骨鲠，……化五金，伏钟乳结砂制汞。”皆取解毒软坚之能，但临床未见应用。

【临证应用】 贯众可用治多种肠寄生虫病。但很少单用，常与其他杀虫药配伍，以增强疗效。如杀绦虫，配槟榔、雷丸等；除蛲虫，可与鹤虱、苦楝皮等同用；驱除钩虫又常与榧子、槟榔等为伍。

贯众有泄热解毒之功，故为预防流行性疾病之要药，治热病斑疹，疟腮等常配银花、大青叶、连翘等同用；在流感、麻疹、流脑等传染病流行期，可以本品煎汁代茶饮；或将其放入水缸中作饮水消毒剂，可起预防作用。

本品炒炭，用于血热所致的吐血、便血、崩漏等证。而以子宫收缩无力的出血疗效更优，常配侧柏叶、仙鹤草、陈棕炭等。

【用量用法】 10—15 克，煎服。驱虫及清热解毒时宜生用，止血宜炒炭用。

大蒜

【原文】 辛温，开胃健脾，通五脏，达诸窍。凡极臭极香之物，皆能通窍。去寒湿，解暑气，辟瘟疫，消痈肿。捣烂麻油调敷。破癥积，化肉食，杀蛇虫蛊毒，治中暑不醒，捣和地浆温服。鼻衄不止，捣帖足心，能引热下行。关格不通，捣纳肛中，能通幽门。敷脐能达下焦，消水利大小便，切片灼艾灸，音九。一切痈疽恶疮肿核，独头者尤良。李迅曰：痈疽著灸，胜于用药，缘热毒中隔，上下不通，必得毒气发泄，然后解散，初起便用独头大蒜，切片灸之，三壮一易，百壮为率，但头顶以上，切不可灸，恐引气上，更生大祸也。史源曰：有灸至八百壮者，约艾一筛，初坏肉不痛，直灸到好肉方痛，至夜火熈满背高阜，头孔百数，则毒外出，否则内逼五脏而危矣。《纲目》曰：《精要》谓头上毒不得灸。此言过矣，头为诸阳所聚，艾宜小如椒粒，灸宜三五壮而已。又按李东垣灸元好问脑疽，艾大如两核许，灸至百壮，始觉痛而痊。由是推之，头毒若不痛者，艾大壮多，亦无妨也。然其气熏臭，多食生痰动火，散气耗血，损目伤神。五葷皆然，而蒜尤甚。楞严经曰：五葷熟食发淫，生啖增患，故释氏戒之。释家以大蒜、小蒜、兴渠、慈葱、茗葱为五葷；慈葱，冬葱也；茗葱，山葱也；兴渠，西域菜，云即中国之姜，道家以韭、薤、蒜、胡荽、芸苔为五葷。芸苔，油菜也。忌蜜。

【讲解】 大蒜功专杀虫解毒，外用还有消痈疗疮之功。为百合科多年生草本植物大蒜的鳞茎。晾干入药。

本品味辛性温，入脾、胃、肺、大肠经。功能杀虫解毒，消痈肿。其杀虫解毒、甚为强烈，应用范围亦较广泛。为治肠寄生虫、痢疾及肺癆咳嗽常用之品。治疮疡之证，外用效果较好。

【临证应用】 大蒜用于钩虫、蛲虫病，可配槟榔、使君子等驱虫药，以增强疗效。对钩虫病还可作预防用，在下田前，将大蒜捣烂，涂于四肢。对蛲虫病又可作为外用，将大蒜捣烂，加入香油少许，临睡前涂于肛门周围即可。也可用于痢疾，腹泻、肺癆、顿咳等证，治痢疾、腹泻，可单味生食，也可煎服，或用10%的大蒜浸液作保留灌肠；治肺癆可经常服食生蒜，也可同米煮粥常服，或与百部、白芨等同用；治顿咳（百日咳）用紫皮蒜30克捣烂，加两倍量的凉开水，泡十二小时，滤汁，服时加白糖适量，每服一汤匙（2岁以下小儿减半），

每日3次，连服10—15天。用于疮疖肿痛初起，捣烂与麻油调敷患处，干之再易，可消一切肿毒；亦可切片，文火灸之，以增消肿作用。治斑秃、癣疮，切片外擦或捣烂外敷，均有效。此外，还可防治流感，治疗食蟹中毒等。

【用量用法】 3—5枚，生食、煎汤或制成糖浆服。外用适量，捣敷、切片擦或隔蒜灸。但外敷能引起皮肤发红、起泡，故不可敷之过久。

小结

本类药物的主要作用是驱除、杀灭肠道寄生虫， 但临床应用， 又各有所长。其中使君子、鹤虱以驱杀蛔虫、蛲虫为主，但使君子甘温无毒，驱蛔效力尤强，单用就有效，并兼能健脾消积；鹤虱的驱蛔效力比使君子弱，故需配成复方应用。槟榔、雷丸、榧子、贯众以驱杀绦虫为主。槟榔对姜片虫亦有良效，又有行气、消积、利水作用；雷丸兼驱钩虫，但加热则失效，故宜作丸散剂服；榧子药性和缓，为比较安全的驱虫药，对钩虫亦有效，并有缓泻作用；贯众并能清热解毒，可作流行性疾病预防药，又可止血，主治崩漏下血等证。芜荑以驱杀蛔虫、绦虫为主。大蒜可治钩虫、蛲虫病，解毒作用较强，为治泻痢、肺癆病之常用药，并能消痈肿。

驱虫药功用归纳简表

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
使君子	甘、温	脾、胃	杀虫、消积	蛔虫、蛲虫、小儿疳积	6-10克炒香嚼服、小儿每岁每次1-1.5粒最多不超过20粒	大量服用可引起呃逆、眩晕等反应；与热茶同服，也可引起呃逆

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
槟榔	辛、苦、温	胃、大肠	杀虫、行气、消积、利水消肿	绦虫病等多种肠道寄生虫病、食积气滞、便秘、泻痢、水肿脚气、疟疾	6—15克单用60—120克	脾虚便溏者不宜用
雷丸	苦、寒、有小毒	胃、大肠	杀虫	绦虫、蛔虫、钩虫	6—15克	宜入丸散剂
鹤虱	辛、苦、平有小毒	脾、胃	杀虫	蛔虫、绦虫等多种肠道寄生虫病	3—10克	
芜荑	辛、苦、温	脾、胃	杀虫、消积	虫积腹痛、小儿疳积、泄泻、疥癣	3—10克外用适量	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
榧子	甘、平	肺、大肠	杀虫、润肺、止咳	绦虫、钩虫、肺燥咳嗽	30—50克	炒熟去壳服，或打碎入煎剂
贯众	苦、寒	肝、脾	杀虫、亲热、解毒、凉血、止血	绦虫、钩虫、多种热病、崩漏	10—15克	生用驱虫解毒，炒炭用止血
大蒜	辛、温	脾、胃、肺、大肠	杀虫解毒、消痈肿	钩虫、蛲虫、痢疾、腹泻、肺癆、顿咳、痈疽肿毒	3—10克外用适量	

****复习思考题****

1. 试述驱虫药的应用范围。
2. 常用的驱虫药有哪些？各药的驱虫特点是什么？如何运用。

3. 哪些驱虫药可以不服泻下药？为什么？
4. 哪些驱虫药只入丸散吞服，不入煎剂，为什么？
5. 如何掌握驱虫药的用法、服法以及用量，试按药分别说明之。

第十六章化痰止咳平喘药

- 第十六章化痰止咳平喘药

〔自学时数〕12学时

〔面授时数〕4学时

〔目的要求〕

1. 了解化痰止咳平喘药的分类、常用药（半夏 瓜蒌 天南星 桔梗 旋复花 贝母 竹茹 礞石 杏仁 百部 葶苈子 桑白皮）。
2. 熟悉化痰止咳平喘药与解表、清热、温里、补气、散寒、宣肺等药配伍应用的理论依据（联系中医基本理论）。
3. 掌握温化寒痰药中常用药的功效、临证应用，并比较其异同。
4. 掌握清化热痰药中常用药的功效、临证应用，并比较其异同。
5. 掌握止咳平喘药中常用药的功效、临证应用，并比较其异同。
6. 熟悉燥湿化痰、清热化痰、祛风痰、坠痰、软坚散结、泻肺、润肺等概念。
7. 联系麻黄、细辛、陈皮、枳实、莱菔子等具有化痰止咳平喘作用的药物，了解本章以外的化痰止咳平喘药，扩大知识面。
8. 了解半夏、南星的炮炙，旋复花、皂荚、竹沥的用法。
9. 在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡能祛痰或消除痰涎，主要用于痰多咳嗽、咯痰不爽的药物，称为化痰药；能够减轻或制止咳嗽、平定气喘，主要用于咳喘病证的药物，称为止咳平喘药。咳嗽与痰在病机上密切相关，临床上常同时兼见，一般咳喘每多挟痰，而痰多亦每致咳喘，所以在治疗时化痰药与止咳平喘药常相互配用，并且化痰药大都有止咳平喘之功，止咳平喘药多

兼有化痰之能。为了便于临床应用起见，本章将两类药合并介绍，总称为化痰止咳平喘药。

化痰药主要用于有形之痰多咳嗽、咯痰困难或痰饮气喘等证。中医理论又认为：癭瘤瘰癧、阴疽流注以及癫痫惊厥眩晕等证，是由无形之痰所引起，故亦常选用适当的化痰药来治疗。止咳平喘药主要用于内伤或外感所引起的咳嗽和喘息。

凡外感或内伤，均能引起痰多与喘息咳嗽，因而在治疗时应仔细分辨病因，进行适当的配伍。例如，有外感者，配合解表药同用；兼有里热者，配清热药；兼有寒证者，配温里药；虚癆咳喘者，配补益药。此外，如癭瘤瘰癧者，配软坚散结药；阴疽流注者，配散寒通滞药；癫痫惊厥者，配安神药或平肝息风药。

咳嗽且咯血者，不宜用辛温燥烈的化痰药，否则有促进出血之虞。麻疹初期，虽有咳嗽症状，一般以清宣肺气为主，不宜用温性和带有收敛性的止咳药，以免助热或遏伏疹毒而使疹透不畅。

根据化痰止咳平喘各药的不同性能，本章分为温化寒痰药、清化热痰药和止咳平喘药三类。

第一节温化寒痰药

凡药性温燥，具有温肺燥湿化痰功效的药物，称为温化寒痰药。

本节药适用于寒痰、湿痰所致的咳嗽气喘，痰多稀薄以及痰湿阻于经络所致的肢节痠痛、阴疽流注、瘰癧诸证。亦常与温散寒湿药物配伍，以增加疗效。

本节药物作用比较强烈，凡属阴虚燥咳、痰热咳嗽或有咳血病史者，均应慎用或禁用。

半夏

〔原文〕辛温有毒。体滑性燥，能走能散，能燥能润，和胃健脾，去湿。补肝辛散。润肾，除湿化痰，发表开郁，下逆气，止烦呕，发声音，利水道，燥去湿，故利水；辛通气，能化液，故润燥。朱丹溪谓二陈汤能使大便润而小便长。救暴卒。(1)葛生曰：凡遇五绝之，用半夏末吹入鼻中即活，盖取其能作嚏也。五绝，谓缢死、溺死、压死、魔死、产死也。治咳逆头眩。火炎痰升则眩。痰厥头痛(2)，眉棱骨痛，风热与痰。咽痛，成无己曰：半夏辛散，行水气而润肾燥。又局方半硫丸，治老人虚秘，皆取其润滑也。俗以半夏、南星为性燥，误矣。湿去则土燥，痰涎不生，非二物之性燥也。古方用治咽痛喉痹吐血下血，非禁剂也。二物亦能散血，故破伤扑打皆主之。惟阴虚劳损，则非湿热之邪，而用利窍行湿之药，是重竭其津液、医之罪也，岂药之咎哉！《甲乙经》用治不眠，是果性燥者乎？半夏、硫黄等分，生姜糊丸，名半硫丸。胸胀，仲景小陷胸汤用之。伤寒寒热，故小柴胡汤用之。痰疟(3)不眠。《素问》曰：胃不和，则卧不安。半夏能和胃气而通阴阳。《灵枢》曰：阳气流满，不得入于阴，阴气虚，故目不得瞑，饮以半夏汤，阴阳既通，其卧立安。又有喘嗽不得眠者，左不得眠，属肝胀，宜清肝，右不得眠，属肺胀，宜清肺。反胃吐食。痰膈。散痞除痰(4)，痰多属痰。消肿止汗，胜湿。孕妇忌之。王好古曰：肾主五液，化为五湿。本经为唾，入肝为泪，入心为汗，入肺为涕，入脾为痰。痰者因咳而动，脾之湿也。半夏泄痰之标，不能治痰之本，治本者，治肾也。咳无形，痰有形，无形则润，有形则燥，所以为流脾湿而润肾燥之剂也。俗以半夏为肺药，非也。止呕为足阳明，除痰为足太阴。柴胡为之使，故柴胡汤用之。虽云止呕，亦助柴芩，主寒热往来，是又为足少阳也，时珍：脾无湿不生痰，故脾为生痰之源，肺为贮痰之器。按有声无痰曰咳，盖伤于肺气，有痰无声曰嗽，盖动于脾湿也，有声有痰曰咳嗽。或因火、因风、因寒、因湿、因虚劳、因食积，宜分证论治。大法治嗽，当从治痰为先，而治痰又以顺气为主，宜以半夏、南星燥其湿，枳壳，橘红利其气，肺虚加温敛之味，肺热加凉泻之剂。赵继宗曰：二陈治痰，世医执之，内有半夏，其性燥烈。若风寒湿食诸痰则相宜，至于劳痰失血诸痰，用之反能燥血液而加病。按古有三禁：血家汗家渴家忌之，然亦间有用之者。俗以半夏专为除痰，而半夏之功用，不复见如于世矣。小柴胡汤、半夏泻心汤，皆用半夏，岂为除痰乎？火结为痰，气顺则火降而痰消。圆白而大，陈久良矣，浸七日，逐日换水沥去涎，切片，姜汁拌。性畏生姜，用之以制其毒，得姜而功愈彰。柴胡、射干为使，畏生姜、秦艽、龟甲、雄黄。忌羊肉、海藻、饴糖。恶皂角，反乌头。合陈皮、茯苓、甘草，名二陈汤，为治痰之总剂，寒痰佐以干姜、芥子；热痰佐以黄

芩、栝楼；湿痰佐以苍术、茯苓；风痰佐以南星、前胡；痞痰佐以枳实、白术，更看痰之所在，加导引药。惟燥痰非半夏所司也。**韩飞霞造曲十法**（5）。一姜汁浸造，名生姜曲，治浅近诸疾；一矾水煮透，兼姜糊造，名矾曲，矾最能却水，治清水痰；一煮皂角汁，炼膏，和半夏末为曲，或加南星，或加麝香，名皂角曲，治风痰，开经络；一用白芥子等分，或三分之一竹沥和成，略加曲糊，名竹沥曲，治皮里膜外结核隐显之痰；一麻油浸半夏三五日，炒干为末，曲糊造成，油以润燥，名麻油曲，治虚热劳咳之痰；一用腊月黄牛胆汁，略加熟蜜和造，名牛胆曲，治癫痫病风痰；一用香附、苍术、抚芎等分，熬膏和半夏末作曲，名开郁曲，治郁痰；一用芒硝居半夏十分之三，煮透为末，煎大黄膏和成，名硝磺曲，治中风卒厥伤寒宜下由于痰者；一用海粉一两、雄黄一两、半夏二两，为末炼蜜和造，名海粉曲，治积痰沉痼；一用黄牛肉煎汁炼膏，即霞天膏，和半夏末为曲，名霞天曲，治沉疴痼痰，功效最烈。以上并照造曲法，草盒七日，待生黄衣，晒干，悬挂风处，愈久愈良。半夏治法不一，有法半夏，姜半夏诸名。此治湿痰主药。

【讲解】（1）暴卒：急病可发生突然死亡。（2）痰厥头痛：由痰浊上逆所致的头痛。多见头痛如裂、眩晕、心神不安、泛吐痰涎等状。（3）痰症：是疟疾的一种。多指宿疾兼有痰郁者。以寒热交作、头痛、呕吐痰为主证，重者可出现昏迷抽搐，类似现在的脑型疟疾。（4）瘰：俗称大脖子。即甲状腺肿大一类疾患。（5）韩飞霞造曲十法：韩飞霞即韩？，明代医学家。据考，半夏曲始创于韩氏，系以半夏为主，根据不同病征的需要，辅以每种不同的药物而制成的多种药曲，统名之半夏曲。今之半夏曲，各地配方和制法也稍有差异，但总不外化湿健脾，和胃止呕，导滞开郁，消食止泻等功效。

半夏燥湿化痰，和胃降逆，为脾胃二经要药。为天南星科多年生草本植物半夏的块茎。块茎呈类球形或扁圆形外表类白色，以粒大色白陈久者为佳。

本品辛温，功善化痰止呕，为脾胃二经之要药。盖脾喜燥而恶湿，又为生痰之源，脾湿不化，则聚而为痰，痰湿犯肺则咳嗽痰多。半夏温燥，为脾所喜，故为燥湿化痰之主药，凡痰饮湿邪为患，皆可用之。

胃为受纳之器，以降为顺，以升为逆。若痰湿停蓄于胃，则胃气不和，势必上逆而为呕，为哕，为呃逆，为噎气。半夏燥湿化痰，痰湿

去，则呕止胃和，故又为降逆止呕之良药，且不只用于痰湿呕恶，其他呕吐也常配用。

半夏味辛能散，并有散结消痞的作用，可用于胸脘痞满，瘰疬癭瘤等证。

此外，历代本草有半夏“堕胎”之记载，但《金匱》干姜人参半夏丸用治妊娠呕吐均未见不良反应，后世亦常用半夏治妊娠呕吐，故“堕胎”之说，似属不妄。

【临证应用】半夏为治湿痰要药，常与陈皮、茯苓、甘草同用，即二陈汤，是治痰要方。若兼寒象，痰多清稀者，可配干姜、细辛等温化痰饮药；兼热象、痰稠色黄者，配黄芩、竹茹等清热化痰药；痰浊上扰头痛、眩晕，常与白术、天麻等同用，名半夏白术天麻汤。然温燥之品最易伤阴，阴虚肺热、燥痰咯血者忌用。

半夏化痰止呕，恰当配伍可用于多种呕吐，但以寒饮湿浊引起的呕吐最为适宜。如胃寒呕吐，配干姜、吴茱萸；胃热呕吐配黄连、竹茹；胃虚呕吐，配人参、白蜜等等。

本品有良好的化痰消痞散结之功，用于痰热互结所致的胸脘痞满，可配清热化痰宽胸药黄连、瓜蒌同用，如小陷胸汤；咽中如有物阻的梅核气，可配厚朴、苏叶、茯苓等同用，如半夏厚朴汤；治癭瘤瘰疬痰核则与昆布、海藻、贝母等软坚散结药伍用。

此外，《备要》言能治不眠，是取其燥湿和胃之功，与和胃安神的秫米配伍，可用于胃不和而卧不安的失眠证，如半夏秫米汤。

生半夏外用还有消肿止痛的作用，研末或鲜半夏捣烂外敷，可治疮疡肿毒。旧时用其研末吹鼻，引涎以治晕厥、小儿惊风或喉痹肿痛，故《备要》言能救暴卒。

半夏有毒，除外用生以外，内服一般都须炮制。炮制方法甚多，因此饮片名称亦多，如法半夏、清半夏、姜半夏、半夏曲等。制法虽有不同，皆不外用姜汁、白矾或二者同用。清半夏长于燥湿化痰，姜半

夏偏于降逆止呕，法半夏善能和胃燥湿，半夏曲功专化痰消食。现多用姜汁、白矾加工炮制的制半夏。

生半夏有毒，食后对局部有强烈的毒性作用，可使舌、咽、口腔产生麻木，肿痛，流涎，张口困难；严重者，可窒息。

【用量用法】 5—10克，煎服或入丸散。内服多须炮制。外用适量，研末调敷，生用。以陈久者为佳。反乌头。

天南星

〔原文〕味辛而苦，能治风散血，《是斋方》：南星、防风等分为末，名玉真散，治破伤风，刀伤扑伤如神。破伤风者，药敷疮口，温酒调下二钱。打伤至死，童便调灌二钱，连进三服必活。气温而燥，能胜湿除痰；性紧而毒，能攻积拔毒。补肝风虚，凡味辛而散者，皆能补肝，木喜条达故也。为肝脾肺三经之要药。治惊痫风眩，朱丹溪曰：无痰不作眩。身强口噤，喉痹舌疮，结核疔痕，痈毒疥癣，蛇虫蛟毒。调末箍之。破结下气，利水堕胎，性更烈于半夏。与半夏皆燥而毒，故堕胎。半夏辛而能守，南星辛而不守，然古安胎方中，亦有用半夏者。阴虚燥痰禁用。根似半夏而大，形如虎掌，故一名虎掌。以矾汤或皂角汁浸三昼夜曝用；或酒浸一宿蒸，竹刀切开，至不麻为止；或姜渣黄泥和包煨熟用。造曲法与半夏同。造胆星法：腊月取黄牛胆汁，和南星末纳入胆中，风干，年久者弥佳。畏附子、干姜、防风。得防风则不麻，火炮则毒性缓；得牛胆则本燥，且胆有益肝胆之功。此治风痰主药。

【讲解】天南星燥湿化痰，祛风解痉，专走经络，为开涤风痰之专药。为天南星科多年生草本植物天南星，东北天南星或异叶天南星的干燥块茎。原名“虎掌”，《新修本草》谓：“其根四畔有圆牙，看如虎掌，故有此名。”

本品辛苦温燥。入肺、肝、脾经。“治痰功同半夏”，其燥烈之性更甚于半夏，故以燥湿祛痰而著称。也善治脾肺湿痰，咳嗽痰多，胸膈满闷之证。其辛开走窜之力更强，且入肝经，故又走经络、祛风痰而解痉，对风痰阻于经络所致的中风、口噤、半身不遂、口眼歪斜及破伤风都有较好的疗效。所以古有“诸风口噤宜用南星”之说。

生南星辛窜善散，既能祛风燥湿，又能散血消肿，故可外用治痈肿瘰癧等。

本品燥烈有毒，能伤阴堕胎，凡热极生风、血虚生风，以及阴虚燥痰和孕妇均忌用。

【临证应用】天南星以治湿痰、顽痰为主，咳嗽痰多稀薄、胸闷苔腻者，常配半夏、陈皮、茯苓、枳实等同用，如导痰汤。若属热咳，质黄而稠，须配黄芩、半夏等清热化痰之品，如小黄丸。对于风痰眩晕、癫痫，多与半夏、天麻等息风止痉药同用，如玉壶丸；治风痰留滞经络引起的手足麻木、半身不遂、口眼喎斜等证，配半夏、白附子等，如青州白丸子；破伤风常配防风、天麻等伍用，如玉真散。生南星虽可外用治痈疽疮肿，但临床少用。近年来，发现天南星还有抗肿瘤作用，试用于子宫颈癌。

本品系有毒之药，内服均须经过炮制，先与白矾水浸泡，再与生姜共煮，切片晒干，即为制南星。此外，还有以牛（或猪、羊）胆汁浸制而成的称胆南星。其性味苦凉，有清化热痰、息风定惊之功，适用于痰热神昏、惊风抽搐及中风、癫痫等证。用量 2—5 克。

天南星与半夏都有燥湿化痰之功，同为化痰要药。但天南星走经络，偏于祛风痰而解痉；半夏入脾胃，重在化湿痰，尤能止呕。

【用量用法】 5—10克，煎服。生多外用，外用适量。

白附子

〔原文〕辛甘有毒，大热纯阳。阳明经药，能引药势上行，治面上百病。阳明之脉营于面，白附能去头游风，作面脂，消斑疵。补肝虚，祛风痰。治心痛血痹，诸风冷气，中风失音，阴下湿痒。根如草乌之小者，长寸许，皱纹有节。炮用。陶弘景曰：此药之绝，无复真者。今惟凉州生。

【讲解】白附子燥烈有毒，为祛风痰要药。为天南星科多年生草本植物独角莲的茎块（禹白附）。用硫黄熏1—2次，晒干用；或用白矾、生姜制后，切片用。少数地区使用的白附子为毛茛科草本植物黄花乌头的块根（关白附）。

白附子味辛甘，性温，有毒。入脾、胃经。燥烈有毒，功似南星，为祛风痰要药。有逐寒湿而化痰，祛风邪而止痛止痉之功，以治风痰诸证。且其辛温升散、性善上行，故能治头面之疾，用于中风痰壅、口眼喎斜、破伤风以及偏头痛等证。但本品燥烈太甚，最能伤阴，故阴虚阳亢之头痛、中风眩晕等均不宜使用。此外，白附子还有解毒散结之功，可用于毒蛇咬伤及瘰疬痰核。

白附子因其品种不同，故作用有别。禹白附在临床多用于风痰阻络所致的中风、眩晕、破伤风等证；关白附毒性较大，主用于风寒湿邪所致的头面诸疾。

白附子与善于“温肾达下”的川附子系属两物，一主祛风、一主温里，作用大异，应用时应注意区别。

【临证应用】白附子用于中风口眼喎斜，常与全蝎、僵蚕、同用，如牵正散；治破伤风、口噤痉挛，可配天南星、防风，天麻等药，如玉真散；用于风邪或寒湿所致的偏头痛，可与白芷、川芎等同用，有较好的止痛作用。治蛇虫咬伤及瘰疬等证，可单用外敷，也可与其他解毒散结药配合内服。此外，对阴囊湿疹、皮肤瘙痒，可与黄柏、白蒺藜、黄蔑等分为末调服，或研末调敷，也可煎汤熏洗。

【用量用法】 3 — 6克，煎服。外用适量。生品一般不作内服。孕妇忌服。

白芥子

〔原文〕辛温入肺。通行经络，温中开胃，发汗散寒，利气豁痰，消肿止痛。痰行则肿消，气行则痛止。为末醋调敷，消痈肿。治咳嗽反胃，痹木脚气、筋骨诸病。痰阻气滞。久嗽肺虚人禁用。朱丹溪曰：痰在胁下及皮里膜外，非此不能达行。古方控涎丹用之，正此义。韩懋三子养亲汤，白芥子主痰，下气宽中；紫苏子主气，定喘止嗽；莱菔子主食，开痞降气，各微炒研，看病所主为君，治老人痰嗽喘满懒食。北产者良。煎汤不可过熟，熟则力减。

芥菜子豁痰利气，主治略同。

【讲解】白芥子功专温肺祛痰，又善通络止痛。为十字花科一年或二年生草本植物白芥的种子。主产安徽、河南等地，其他各地亦有栽培。晒干，生用或炒用。

本品辛温、气锐、专入肺经。性善走散，功能温宣肺气，以化寒湿凝聚之痰，而有豁痰利气之效；且能透达经络，善搜胁下及皮里膜外、筋骨间凝集之寒痰。故凡痰阻气滞、咳逆胁痛，或痰湿阻滞经络，肢体关节疼痛等证，皆可应用。

此外，借其辛散走窜之力、温散寒凝之功，又能散结消肿，治阴疽漫肿之证疗效亦佳。然辛温走散力强，易助火耗阴，故肺虚久嗽及阴虚火旺者，均应忌用。

【临证应用】白芥子功能温肺祛痰，治寒痰壅肺，痰多清稀；咳嗽气喘，胸胁胀满等证，常与苏子、莱菔子同用，如三子养亲汤；如属痰饮停滞、胸满胁痛、气逆喘咳者，可与甘遂、大戟等峻下逐水药同用，以祛痰逐饮，如控涎丹。若痰滞经绝，肢体关节疼痛，可与桂心、没药、木香、木鳖子等共为细末，温汤送服，如白芥子散。治痰湿流注，阴疽肿毒等证，可配鹿角胶、肉桂、熟地、麻黄等，如阳和汤，共奏温阳通滞，消痰散结之功。亦可与葱白捣敷患处。

【用量用法】3—10克，煎服。外用适量，研末调敷。但外敷易致起泡，皮肤过敏者忌用。

附：芥菜子 为十字花科植物芥菜的种子。性味功用均与白芥子相似。

旋覆花

〔原文〕咸能软坚，苦辛能下气行水，温能通血脉。入肺、大肠经。消痰结坚痞，唾如胶漆，噫气（1）不除，噫，于介切，俗作噫，胸中气不畅，故噫以通之，属不足。亦有挟痰挟火者，属有余。仲景治汗吐下后，痞硬噫气，有旋覆代赭汤（2），大肠水肿，去头目风。然走散之药，冷利、大肠虚者慎用。类金钱菊，去皮带蕊壳蒸用，根能续筋。筋断者，捣汁滴伤处，用敷其上，半月不开，筋自续矣。

【讲解】（1）噫气：即噫气，由胃上逆发出沉长的声音。（2）旋覆代赭汤：原作“代赭旋覆汤”，据赵本《伤寒论》改。

旋覆花善能消痰行水、降逆止噫。为菊科多年生草本植物旋覆花的头状花序。夏秋两季花蕾开放时采收，晒干生用或蜜炙用。

本品味辛苦且咸，入肺可宣肺下气以消痰行水；性温入胃可以化痰湿以降逆止噫。故痰壅气逆，肺失肃降之痰多喘咳及痰湿内停；脾胃升降失常的呕吐噫气、心下痞满等证皆常用之。前人所谓：“诸花皆升，旋覆独降”，意即在此。虽为降逆、止咳喘、止噫气之品，实有消痰行水之效。然性偏温散，阴虚劳嗽、胃热呕吐以及脾胃虚弱，大便泄泻者均不宜用。

此外，《本草衍义》说本品还有“行痰水、去头目风”之效。

【临证应用】旋覆花消痞行水，多用于喘咳痰多等症，常与半夏、杏仁等配伍。用于胸痞噫气、呕吐、呃逆之由于脾胃气虚，或痰湿上逆者，常与代赭石、人参、半夏、生姜等同用，如旋覆代赭汤。近单亦用其治神经性呕吐、呃逆等证。

【用量用法】3—10克。因旋覆花毛序较多，宜布包后入煎剂，以免刺激咽喉发痒作咳。

附：金沸草系菊科植物旋覆花的地上部分。故又名旋覆梗。味微苦咸，性温。功专化痰止咳。治寒痰咳喘，常与细辛、半夏等同用，如金沸草散。用量8—12克，煎服。

白前

〔原文〕辛苦微寒。长于降气下痰止嗽。治肺气壅实，胸膈逆满。虚者禁用。似牛膝粗长直易断者，白前也；短小柔软能弯者，白薇也。近道多有，形色颇同，以此别之。去头须，甘草水浸一伏时。即一昼夜。焙用。忌羊肉。

【讲解】白前善能祛痰、降气、止咳，寒热咳嗽皆可用。为萝藦科多年生草本植物柳叶白前和芫花叶白前的根茎及根。生用或蜜炙用。白前与白薇为同属植物，药用部分均为根及根茎，容易混淆。两者区别在于：白前根及根茎弯曲扭转而成团状，根茎呈管状，故有鹅管白前之名；白薇根呈细长圆柱形，丛生于根茎上，形如马尾，长约10-20厘米，似龙胆草，故又有龙胆白薇之名。

本品苦辛偏温，入肺经。既可以辛宣肺气以祛痰，又能苦降肺气以止咳平喘。凡肺气壅实，痰多咳嗽，胸膈逆满者，不论寒热，均可使用。但肺虚者禁用。

【临证应用】白前微温而不燥热，性质平和，长于祛痰、降气，凡肺气壅实，痰多咳嗽，咯痰不爽，气逆喘促之证，寒热均可应用。偏寒者，与紫菀、半夏等伍用；偏热者，与桑白皮、地骨皮等配用。外感咳嗽又可与荆芥、桔梗等配伍。然生白前苦泄辛散，下气力强，肺虚咳嗽不宜服用。炙后性较和缓，且具润肺之功，故多用炙者。

【用量用法】 3—10克，煎服。

皂角肥皂荚

〔原文〕 辛咸性燥，气浮而散。入肺、大肠经。金胜木、燥胜风，故兼入肝。搜风泻热。吹之导之，则通上下关窍，而涌吐痰涎。搐鼻立作喷嚏，治中风口噤，胸痹喉痹。凡中风不省人事，口噤不能进药，急提头发，手掐人中，用皂角末或半夏末吹入鼻中，有嚏者生，无嚏者为肺气已绝，死。或用稀涎散吐之：皂角末一两、白矾五钱，每用一钱，温水调灌，或加藜芦、少麝，鹅翎探喉，令微吐稀涎，再用药治。年老气虚人忌用。服之则除湿去垢，最去油腻，乱人肠胃。消痰破坚。取中段，汤泡服，治老人风秘。杀虫下胎。治风湿风癩、痰喘肿满、坚癥囊结。厥阴肝脉络阴器，寒客肝经，则为囊结。涂之则散肿消毒，煎膏贴一切痹痛。合苍术焚之，辟瘟疫湿气，一种小如猪牙，一种长而枯燥，一种肥厚多脂。多脂者良。去粗皮、子弦，或蜜炙、酥炙，绞汁烧灰用。柏实为使。恶麦冬。畏人参、苦参。性能消铁。不结荚者，凿树一孔，入铁封之，则结荚矣。缢碾见之，久则成孔。故此木不能烧爨（1）。

皂角子：通大便燥结，煨存性用。 汪机曰：其性得湿则滑。李时珍曰：亦辛以润之之义，非得湿则滑也。

（肥皂荚）辛温。除风湿，去垢膩。故澡身盥面用之。疗无名肿毒有奇功。不拘奇疡恶毒，用生肥皂去子弦及筋捣烂，酹醋和敷立愈，不愈再敷奇验。此方书未载，若贫人僻地仓卒无药者，用之甚便，故特著之。《集成》：生肥皂火煨存性，生油腻粉调敷诸恶疮。

【讲解】（1）爨：（cuan窜）烧火做饭之意。

皂角豁痰开窍，为强有力的祛痰药。为豆科植物皂荚树的果实，故又名皂荚。形扁长者，称大皂荚；其小型果实，呈圆柱形而略扁曲者，称猪牙皂。同等入药。切片（不去种子）生用。

本品味辛性温，有小毒。入肺、大肠经。辛散温通，走窜力强，入鼻则嚏，入喉则吐，服之能豁痰导滞，祛湿除垢，通利关窍，所以有祛痰开窍之功。适用于顽痰壅盛，胶固难咯，胸闷咳喘，大便秘结之证。若痰壅气闭，神昏不醒或中风噤者，又可应用它通关开窍以起急

救之效。外敷又有散结消肿作用。但药性强烈，在应用时，中病即止，不可过剂，剂量过大可引起呕吐及腹泻。故孕妇、气虚阴亏者及有咯血倾向者均不宜用。

肥皂荚同科植物肥皂荚的果实，性味功效与皂角相同，同等入药，无其差异。

【临证应用】皂角为强有力的祛痰药，用于顽痰阻塞、胸闷咳喘、咯痰不爽者，单用为末，蜜丸，枣汤送服。或用焦皂荚为末，开水冲服。近年用本品配伍猪胆汁、拳参或麻黄等治慢性气管炎，咳喘胸闷、痰粘不易咯出者，有较好的疗效。治卒然昏倒，不省人事，痰阻窍闭者，以之与细辛配伍，共为细末，吹鼻取嚏，如通关散；治中风牙关紧闭，痰涎壅盛者，可与明矾同用，研末，温水频灌，取吐，如稀涎散。大便燥结不通，单用皂荚，煅存性，研末服，亦能奏效。外用熬膏涂敷，治疮肿未溃者，亦有效。

【用量用法】2—4克，煎服，或入丸、散服。如焙焦存性，研末吞服，每次0.5—1.5克。内服宜焙焦用。外用适量。

附：皂荚子肥皂荚的黑色种子，辛温润滑，能利大肠燥结，主用于肠燥便秘。用量3—10克，煎服。

第二节清化热痰药

凡药性寒凉，具有清肺化痰功效的药物，称为清化热痰药。

本节药物运用于热痰郁肺所致的咳嗽，痰粘黄稠，以及由痰热引起的癫痫，惊厥，癭瘤、瘰癧等证，治癫痫、惊厥时须配清热镇痉药；治疗癭瘤、瘰癧时常配软坚散结的药物。但脾胃虚寒及寒痰、湿痰者，均不宜用。

前胡

〔原文〕辛以畅肺解风寒，甘以悦脾（1）理胸腹，苦泻厥阴肝之热，寒散太阳膀胱之邪。微寒，一云微温。性阴而降，功专下气，气下则火降而痰消。气有余便是火，火则生痰。能降实热，治痰热哮喘，咳嗽呕逆，痞膈霍乱，小儿疳气，有推陈致新之绩，明目安胎。无外感者忌用。按柴胡、前胡，均是风药，但柴胡性升，前胡性降为不同。肝胆经风痰，非前胡不能除。皮白肉黑，味甘气香者良。半夏为使。恶皂角。忌火。

【讲解】（1）悦脾：振奋脾气之意。

前胡以降气祛痰、宣散风热为特点。为伞形科多年生草本植物白花前胡和紫花前胡的根。根圆色黑褐，易折断，断面黄白色，软而气香。取根洗净晒干，切片生用。

本品苦辛微寒。辛散苦降，性较平和。主归肺经。功能祛痰以除肺气之壅塞，降气可制肺气之上逆，微寒又可清热，并兼宣散肺经风热之功，且有宣不过散，降不过下的特点。故凡肺气不降，痰热咳嗽，以及风热郁肺，咳逆喘满之证，均可应用。对咳喘痰多兼表证者，尤为适宜。

《备要》言治呕逆，痞膈霍乱，小儿疳气，明目安胎等，皆取其辛散去邪而安正，然上述之证，临床较少应用。

【临证应用】前胡用于肺气不降的咳嗽、痰稠，常配贝母、杏仁、桑白皮等同用；治外感咳嗽，尤以风热郁肺所致者最佳，常配薄荷、牛蒡子、桔梗等同用，效果颇为明显，然本品泄热又有宣发之性，阴虚久咳，寒饮咳喘均不宜用。

前胡、柴胡，素有“二胡”之称，皆能发散风热，并常相须为用。但前胡归肺主降，以降气消痰为主要功效；柴胡入肝胆，主升，能升发肝经阳气，以泄半表半里之邪，正如《本草逢原》所说：“按二胡通为风药，但柴胡主升，前胡主降，有不同耳。”

【用量用法】6—10克，煎服。

桔梗

〔原文〕苦辛而平。色白属金，入肺气分。泻热，兼入手少阴心、足阳明胃经。升提气血，表散寒邪，清利头目咽喉，开胸膈滞气。凡痰壅喘促，鼻塞肺气不利。目赤，喉痹咽痛，两少阴火。齿痛阳明风热。口疮，肺痈干咳，火郁在肺。胸膈刺痛，火郁上焦。下痢腹痛，腹满肠鸣，肺火郁于大肠。并宜苦梗以开之。为诸药舟楫（1），载之上浮，能引苦泄峻下之剂，至于至高之分成功。既上行，而又能下气，何也？肺主气，肺金清，浊气自下行耳。养血排脓，补内漏（2）。故治肺痈。李时珍曰：枳桔汤治胸中痞满不通，取其通肺利膈下气也。甘桔汤通治咽喉口舌诸病，取其苦辛散寒，甘平除热也。宋仁宗加荆芥、防风、连翘，遂名如圣汤。王好古加味甘桔汤，失音加诃子，声不出加半夏，上气加陈皮，涎嗽加知母、贝母，咳渴加五味，酒毒加葛根，少气加人参，呕加半夏、生姜，吐脓血加紫苑，肺痿加阿胶，胸膈不利加枳壳，痞满加枳实，目赤加栀子、大黄，面肿加茯苓，腹痛加黄芪，发斑加荆防，疫毒加牛蒡、大黄，不得眠加栀子。昂按：观海藏所加，则用药之大概，亦可识矣。去浮皮，泔浸微炒用。畏龙胆、白芨。忌猪肉。

【讲解】（1）楫（jì）划船的工具。（2）内漏：指外伤引起的内出血。

桔梗以开宣肺气为主要功效，并能祛痰排脓。为桔梗科多年生草本植物桔梗的根。因其味苦；又称苦桔梗、苦梗，主产于江苏、安徽，故有南桔梗之称。

本品辛散苦泄，性平入肺，善能宣通上焦，以开提肺气为主要功效。其性升浮上行，而利胸膈咽喉，且有良好的祛痰作用，凡外邪犯肺，痰壅喘促，鼻塞咽痛及胸满气逆等证，不论寒热均为主治。由于本品能开泄肺气，又善祛痰，可促使肺中痰浊脓血排出体外，故肺痈咳吐脓血之证也常用之。

此外，桔梗因轻浮上升，素有“舟楫之剂”，可载药上行，直达病所，故在应用上焦药中多用。然此虽为上升之剂，但升中有降。肺与大肠相表里，肺气通畅，则肠胃之气疏利；肺为水之上源，肺气宣

通，则启闭开癥，故又可用其治痢疾，里急后重，小便不利。此即《内经》所谓“病在下，取之上”的用药方法。

【临证应用】桔梗治咳嗽痰多，不论肺寒、肺热，皆可应用。治风寒咳嗽，配杏仁、苏叶等，如杏苏散；风热咳嗽配桑叶、菊花、杏仁等，如桑菊饮；咽痛音哑常与薄荷、牛蒡子、蝉蜕配伍。治肺痈胸痛咳吐脓血，借其祛痰排脓之效，配甘草，如桔梗汤。因本品开泄宣散，故阴虚久嗽及有咳血倾向者均不宜用。

【用量用法】3—10克，煎服。桔梗也有炒用者，以缓和辛散作用及对胃肠的刺激。

贝母

〔原文〕微寒，苦泻心火，辛散肺郁。入肺经气分，心火降则肺气宁，诗曰：言采其蠹。蠹即贝母也，取其解郁。润心肺，清虚痰。治虚劳烦热，咳嗽上气，吐血咯血，肺痿肺痛，喉痹君相之火。目眩，火热上攻。淋沥小肠邪热。心与小肠相表里，肺为气化之源。瘰疬，化痰。乳闭产难。功专散结除热，敷恶疮，唐时有人膊上生疮如人面，能饮酒食物，亦无他苦，遍投诸药悉受之，至贝母，疮乃顰眉，灌之数日，成痂而愈。敛疮口。火降邪散，疮口自敛，非贝母性收敛也。俗以半夏燥毒，代以贝母，不知贝母寒润，主肺家燥痰；半夏温燥，主脾家湿痰，设或误用，贻误匪浅。故凡风寒湿食诸痰，贝母非所宜也，宜用半夏、南星。川产开瓣者良，独颗无瓣者不堪用。去心，糯米拌炒黄捣用。厚朴、白薇为使。畏秦艽，反乌头。象贝母治时感风寒。土贝母治外科痰毒。此治燥痰主药。

【讲解】母贝有川贝母和浙贝母两种。川贝母润肺化痰功胜，浙贝母开泄散结力强。川贝母为百合科多年生草本植物川贝母，暗紫贝母和甘肃贝母及棱砂贝母的地下鳞茎。主产于四川、云南、甘肃等地，均系野生。浙贝母为百合科多年生草本植物浙贝母的地下鳞茎。原产浙江象山县，故又称象贝母，现主产于杭州、宁波等地。均为人工栽培。皆生用。

品性味苦寒，归心、肺经。均具化痰止咳，清热散结之功，能治痰热咳嗽，但川贝母微寒而甘，滋润性强，长于润肺化痰，多用于肺热燥咳，肺虚劳嗽，吐血咯血，肺痿肺痛等证；浙贝母苦寒降泄，清火散结之功较强，多用于外感风热，痰火郁结之咳嗽及瘰疬、痈肿疮毒等证。总之，川贝母多用于内伤虚证；浙贝母多用于外感实证。

【临证应用】川贝与浙贝都能清肺化痰而止咳，均可用于痰热咳嗽，常与知母同用，即二母散（丸）。如肺虚久咳，痰少咽燥，多用川贝润肺，配沙参、麦冬、天冬等养阴清肺之品；若外感风热或痰火郁结的咳嗽，多用浙贝母，配桑叶、杏仁、牛蒡子等宣泄祛痰药同用。

川贝、浙贝都能清热散结：浙贝作用尤强。故治瘰疬常用此与元参、牡蛎等配伍，如消瘰丸；治疮痈、乳痈，常与蒲公英、连翘、天花粉等配伍；治肺痈又可与鱼腥草、芦根、薏苡仁等配用。

近年来又以浙贝酤夏枯草、海藻、昆布，莪术等用于治疗甲状腺瘤，有一定效果。

综上所述，无论川贝、浙贝，都可治热痰、燥痰之证。寒痰，湿痰则非所宜。

另外，尚有土贝母，与川、浙贝并非一类。不能化痰止咳，而以清热解毒为其功效，多用于外科疮痈等证。绝不可互相代用。

贝母与半夏均为止咳化痰常用药，可用于咳嗽痰多之证。然寒热润燥不同。半夏辛温性燥，主治脾肺湿痰；贝母苦寒质润，主治肺热燥咳及阴伤咳嗽。故半夏适于寒痰、湿痰；贝母适于热痰、燥痰。一燥一润，各展其长。

【用量用法】3—10克，煎服。研末冲服，每次1—2克，反乌头。

瓜蒌

〔原文〕甘补肺，本草苦。寒润下。能清上焦之火，使痰气下降，为治嗽要药。肺受火逼，失下降之令，故生痰作嗽。又能荡涤胸中郁热垢腻，生津止渴，朱丹溪曰：消渴神药。清咽利肠，通大便。清斋方：焙研酒调或米饮下，治小便不通。通乳消肿。治结胸(1)胸痹，(2)仲景小陷胸汤用之。又云：少阳证口渴者，小柴胡汤，以此易半夏。酒黄(3)热痢，二便不通。炒香酒服，止一切血。寒降火。泻者忌用。实圆长如熟柿，子扁多脂。去油用。枸杞为使。畏牛膝、干漆，恶干姜，反乌头。

【讲解】结胸：结胸是水热结于胸中，而出现心下痛、按之硬满的病证。(2)胸痹：指胸膈部窒塞疼痛为主的病证。(3)酒黄：多因饮酒过度，湿热郁蒸，胆热液泄所致身目发黄，腹满不欲食的证候。

瓜蒌古名栝蒌，分全瓜蒌、瓜蒌皮、瓜蒌仁。瓜蒌皮清肺化痰，利气宽胸；瓜蒌仁润肺化痰、滑肠通便；全瓜蒌兼具两者之功。瓜蒌为葫芦科多年生草质藤本植物栝蒌的成熟果实。将整个干燥瓜蒌果实入药，名全瓜蒌；如分开入药，果壳称瓜蒌皮；种子名瓜蒌仁。

瓜蒌性味甘寒，质润而滑。入肺、胃、大肠经。功以清润为主，肺得清润则痰热自化，故能清热化痰，以治痰热内结之咳喘；胃得清润，则中焦痰滞自消，故能宽中散结，以治痰滞胸膈之胸痹、结胸；大肠得其清润，则便秘自通，故又有滑肠通便之效，以治肠燥津枯之便秘，以及热痢后重。因其可散结消痈，还可用于乳痈等。

【临证应用】瓜蒌善于清肺润燥、稀释稠痰，故肺热咳嗽、痰稠不易咯出者多用，常配知母、川贝等合用；若痰热内结、咳痰黄稠、胸闷便秘者，可配黄芩、胆南星、枳实等药，如清气化痰丸。

治胸痹、结胸证，瓜蒌是常用之品，如《金匱要略》栝蒌薤白半夏汤，以栝蒌配半夏、薤白等治胸痹不得卧；《伤寒论》小陷胸汤，以本品配黄连、半夏治小结胸证。近年来在古人经验的基础上，瓜蒌用治冠心病，取得一定效果。

用于肠燥便秘及热痢后重，前者配火麻仁、郁李仁等润下药同用；后者配黄连、木香等药。

此外，全瓜蒌与蒲公英、乳香、没药等同用，还可用于乳痈初起，红肿疼痛。

总之，瓜蒌作用广泛，对上述多种病证效均良好。然寒滑之品，脾胃虚弱、呕吐便溏者忌服。反乌头。

【用量用法】全瓜蒌10—30克；瓜蒌皮6—12克；瓜蒌仁10—15克。仁可生用或炒用，大多认为生用气味悍劣，易致呕吐；炒后性缓，可免此弊。另有瓜蒌霜，系仁捣烂，用吸油纸包裹，反复压榨至油尽者入药，经此炮炙油质大减，滑泄之性缓和。

竹茹

〔原文〕甘而微寒。开胃土之郁，清肺金之燥，凉血除热。治上焦烦热，皮入肺，主上焦。温胆汤用之。温气寒热，噎膈呕哕，胃热。吐血衄血，清肺凉胃。齿血不止，浸醋含之。肺痿惊痫，散肝火。崩中胎动。凉胎气。

【讲解】竹茹甘微寒，为治胃热呕吐之良药。为禾本科青秆竹和淡竹秆的中间层，即去掉绿叶层后所刮下的纤维。生用或姜汁炒用。

竹茹味甘，性微寒。入肺、胃、胆经。既能清肺化痰，又善清胃止呕，故凡肺热咳嗽，痰多黄稠，胃热呕哕以及痰火内扰，心烦不安之证，皆常用之。兼可凉血以治吐血、衄血、崩漏，并治胎动不安。

【临证应用】竹茹用于痰热咳嗽，常与黄芩、瓜蒌同用。若与陈皮、茯苓、半夏、枳实等同用，如温胆汤，治疗胆火挟痰，犯肺扰心所致的胸闷痰多、心烦失眠、惊悸等证。竹茹若与黄连同用，益增清胃热、止呕吐作用，可治胃热呕吐，再加上陈皮、半夏，即黄连橘皮竹茹半夏汤，以治痰热互结，烦闷呕逆之证；若与益气之陈皮、生姜、人参等同用，可治胃虚有热而呕吐者。若与凉血药配伍，亦可用于血热出血。

【用量用法】6—15克，煎服。生用清热除烦、化痰作用较好；姜汁炒可减少寒性，加强止呕作用。

竹沥

〔原文〕甘寒而滑。消风降火，润燥行痰，养血益阴，竹之有沥，犹人之有血也，故能补阴清火。利窍明目。治中风口噤痰迷，大热风痉癫狂，烦闷，《产乳方》：妊娠苦烦名子烦，竹沥不限多少细服，梅师加茯苓煎。消渴，血虚自汗。然寒胃滑肠，有寒湿者勿服。《经疏》曰：中风要药。凡中风未有不因阴虚火旺，痰热壅结所致。如果外来风邪，安得复用此寒滑之药治之哉？朱丹溪曰：痰在经络四肢、皮里膜外者，非此不能达行。又曰：味甘性缓，能除阴虚之有大热者，寒而能补，胎后不碍虚，胎前不损子，世人因本草大寒二字，弃而不用，然人食笋，至老未有因寒而病者。沥，即笋之液也，又假火而成，何寒如此之甚耶？治法曰：竹沥和米煮粥，治反胃。竹类甚多，淡竹肉薄，节间有粉，多汁而甘，最良；董竹坚而节促，皮白如霜；苦竹本粗叶大，笋味苦。入药惟此三种，功用略同，竹茹即刮取青皮，竹沥如取荆沥法。姜汁为使。姜能除痰，且济其寒。笋尖发痘疮。本草未载。昂按：笋蕨多食，皆能燥血，故笋有刮肠篋之名，惟同肉煮食，则无害也。

【讲解】竹沥甘寒滑润，善于透达经络之痰。为禾本科淡竹和青秆竹等新鲜竹秆经火烤所沥出的液汁。原药生用。

竹沥味甘，性寒。入心、肺、胃经。甘寒滑润，功类竹茹，但清化热痰作用优于竹茹，并善于透达经络之痰。除用于痰热咳嗽外，凡中风不语、昏迷、癫痫、惊厥等痰涎壅盛者，均可使用。痰留经络，肢体麻木、拘急之证，亦可使用。然性寒伤胃滑肠，故寒嗽便溏者忌用。

【临证应用】竹沥用于中风痰迷、惊痫癫狂，可单用或配姜汁同用饮服。若与清肺化痰的贝母等同用，可治肺热痰壅，咳逆胸闷。近年考治乙脑、流脑之高热、痰迷、呕吐，用竹沥频饮，获得较好疗效。至于治消渴、血虚自汗等证，现不见用。

【用量用法】30—50克，冲服。

荆沥

〔原文〕 甘平。除风热，化痰涎，开经络，行血气。治中风失音，惊痫痰迷，眩晕烦闷，消渴热痢，为去风化痰妙药。气虚食少者忌之。《延年秘录》曰：热多用竹沥，寒多用荆沥。朱丹溪曰：虚痰用竹沥，实痰用荆沥，并宜姜汁助送，则不凝滞。

牡荆俗名黄荆。截取尺余，架砖上，中间火炙，两头承取汁用。

【讲解】荆沥甘平，化痰涎，行气血。为马鞭草科植物牡荆的茎汁，又叫牡荆沥。将新鲜荆木截成尺余长之小段，两端架于砖上，其下以火烧之，则茎汁从两端流出，以器取之。

荆沥味甘，性平。入心、肺经。具除风热、化痰涎、通经络、行气血之功。治中口噤、痰热惊痫、头晕目眩、喉痹、热痢、火眼等证。

【临证应用】荆沥配伍竹沥，开水冲服，治高热痉挛、痰鸣气急之证。

【用量用法】30—60克，冲服。

天竺黄

〔原文〕甘而微寒。凉心经，去风热，利窍豁痰，镇肝明目。功同竹沥，而性和缓，无寒滑之患。治大人中风不语，小儿客忤惊痫为尤宜。出南海，大竹之津气结成。即竹内黄粉。片片如竹节者真。

【讲解】天竺黄功能清热化痰，以凉心定惊为主要作用。为禾本科植物青皮竹等秆内的分泌液，经干燥凝结而成的块状物，别名竹黄。生用。产于云南、广东、广西等地。

天竺黄味甘，性寒。入心、肝、胆经。善清心、肝之热，心凉则惊自止，肝热清则风自息，并能豁痰利窍，故为清化热痰，清心定惊之佳品。凡热病神昏，中风不语，小儿惊风抽搐等证，属于痰热者，均可应用。惟性较缓和，而以定惊为其所长。所以小儿惊痫方中每多用之。

【临证应用】天竺黄用于小儿惊风，痰壅抽搐，常与清化热痰、定惊息风药胆南星、朱砂、僵蚕等同用。若用于小儿夜啼，可与蝉衣、郁金等同用。

天竺黄与竹沥功效相近，均能清热化痰定惊，但天竺黄微寒性缓，长于定惊，多用于小儿惊风；竹沥大寒性滑，善能滑痰利窍，通经透络，多用于中风痰迷。

【用量用法】3—6克，煎服。研粉吞服，每次0.6—1克。

礞石

〔原文〕甘咸有毒，体重沉坠。色青入肝，制以硝石，能平肝下气，为治惊利痰之圣药。吐痰在水上，以石末掺之，痰即随下，王隐君有礞石滚痰丸，能治百病，礞石、焰硝各二两，煅研水飞净一两，大黄酒蒸八两，黄芩酒洗八两，沉香五钱，为末水丸，量虚实服。李时珍曰：风木太过，来制脾土，气不运化，积滞生痰，壅塞上中二焦，变生诸证。礞石重坠，硝性疏决，使痰积通利，诸证自除。气弱脾虚者禁用。坚细青黑，中有白星点。硝石礞石等分，打碎拌匀，入坩锅煅至硝尽，石色如金为度，如无金星者不入药。研末水飞，去硝毒用。

【讲解】礞石善能下气消痰，并能平肝镇惊。为硅酸盐类矿石。药材分青礞石与金礞石两种，青礞石为绿泥石片岩，应用较广；金礞石为云母片岩。我国凡有云母矿山处均产，但以四川产者为佳。采后击碎，与火硝共煅至礞石呈金黄色时为止。用水飞去其硝毒，阴干入药用。

本品甘咸性平，入肝、肺经。质重沉降，镇坠下行，而有下气消痰、平肝镇惊之功。《婴孩宝鉴》称“礞石乃治惊利痰之圣药”。故多用于顽痰、老痰、浓稠胶结、气逆喘咳实证及惊风癫痫发狂等证。惟重坠下泄之力较强，故只宜于痰积实证。若气虚脾弱或小儿慢惊风及孕妇等均当忌用。

【临证应用】礞石用于顽痰内结喘逆不得平卧，大便秘结或痰积惊痫，烦躁狂乱等证，常与大黄、黄芩、沉香等配伍，如礞石滚痰丸；若痰热壅塞而引起的惊风抽搐，《婴孩宝鉴》以煅礞石一味为末，每次2—4克，薄荷煎汤加白蜜冲服。

【用量用法】6—15克，煎服。入煎剂需布包，入丸、散剂每次2—4克。

浮海石

〔原文〕咸润下，寒降火。色白体轻。入肺，清其上源。肺为水之上源。止渴止嗽，通淋软坚。除上焦痰热，消癭瘤结核。顽痰所结，咸能软坚。俞琰《席上腐谈》曰：肝属木，当浮而反沉；肺属金，当沉而反浮何也？从肝实而肺虚也。故石入水则沉，而南海有浮水之石；木入水则浮，而南海有沉水之香。虚实之反如此。水沫曰久结成。海中味咸者更良。

【讲解】浮海石咸寒质轻，善能清肺化痰。浮海石药材有两类，(1) 胞孔科动物脊突苔虫的干燥骨骼，为珊瑚样的不规则块状物，又名石花。(2) 火山喷出的岩浆形成多孔状石块，又名浮海石。石花分布于我国南方沿海各地，浮石主产于广东沿海，两者均体轻，入水不沉。全年可采，以夏季为多，自海中捞出，用清水洗净，晒干，打碎生用。

本品味咸性寒。主入肺经。质轻上浮，清肺化痰是其所长，主治肺热咳嗽，咳痰稠粘。咸能软坚散结，以治瘰癧痰核，但力较弱。肺为水之上源，肺气清肃，则水道通利，浮石入肺除热，清其上源，故又有通淋之功，以治砂淋、石淋、血淋、尿道涩痛之证。上下所治虽有不同，但总不外清肃肺热之功。

【临证应用】浮海石用于痰热喘咳，顽痰胶结，常与海蛤壳配伍；若肺热久咳，痰黄带血，可配青黛、白芨、三七等止血药，共为细末冲服。治瘰癧痰核，单用力弱，多与牡蛎、浙贝母、夏枯草等同用。治淋病，可单用研末，甘草汤送服。

【用量用法】6—10克，煎服。宜入丸、散剂用。

海蛤壳

〔原文〕蛤蜊壳煨为粉，与牡蛎同功。王海藏曰：肾经血分药。宋徽宗宠妃，病痰嗽，面肿不寐，李防御治之，三日不效，当诛，李技穷忧泣，忽闻市上卖嗽药，一文一贴，吃了今夜得睡，色淡碧，李市之，恐药强悍，先自试，觉无害，共并三贴为一以进。妃服之，是夕寝安嗽止，面肿亦消。帝大悦，赐直万金。李不知其方，惧得罪，伺得市人，重价求之，乃蚌壳研粉，少加青黛也，以淡齏水，加麻油数滴，调服。《圣惠方》：由蜆壳研粉，米饮调，治咳嗽不止。

蛤肉咸冷。止渴解酒。牡蛎、蛤蜊、海蛤、文蛤，并出大海，大抵海物咸寒，功用略同。江湖蛤蚌，无咸水浸渍，但能清热利湿，不能软坚。

文蛤：背有花纹。兼能除烦渴，利小便。

【讲解】海蛤壳功用与浮海石相似，亦是以清肺化痰为其主要功效。海蛤壳为帘蛤科动物青蛤等几种海蛤的贝壳。同种动物文蛤的贝壳，亦等周使用。研碎生用或煨用。煨蛤壳研至极碎成粉末状称为蛤粉。

本品苦咸性寒。入肺、胃经。苦寒入肺，能清泄肺热而化稠痰，用于肺热痰稠、胸痛咳喘；咸能软坚两有消癥散结之功，故对于癥瘤瘰病、痰核等证，亦常应用；并兼利尿以治浮肿、小便不利，然效力较小。煨用又能制酸、敛疮，可用于胃痛泛酸及疮溃不敛，烫伤，湿疹等，但海蛤壳总以清肺化痰为主，凡肺虚有寒，中阳不足，皆非所宜。肉可作食品，一般不作药用。

【临证应用】海蛤壳用于肺热痰稠，咳嗽气喘，常与浮海石有相须为用，以加强疗效。若痰热积结胸痛，则常与清肺化痰，宽胸散结之瓜蒌同用，如海蛤丸。用于癥瘤瘰病，可与昆布、海藻、瓦楞子等合用，如含化丸。用于湿热水肿、小便不利，可与木通、滑石、猪苓等利尿药同用，如海蛤汤。煨后研末油调外用，有生肌敛疮之功。又有牡蛎相同的制酸止痛作用，研末冲服，治胃痛泛酸有效。

【用量用法】10—15克。蛤粉宜包煎。多入丸、散剂。外用适量。清肺软坚宜生用，制酸、外敷宜煨用。

瓦楞子

〔原文〕甘咸。消血块，散痰积。煅红醋淬三次，为末，醋膏丸，治一切气血癥瘕。

【讲解】瓦楞子功能消瘀化痰，散结止痛。为蚌科动物魁蚶、泥蚶或毛蚶的贝壳。剔去肉，洗净入药，打碎生用或煅用。

本品味咸性平。入肺、胃、肝经。具有化坚痰、消瘀血，软坚散结止痛之功。故凡癭瘤瘰癧，癥瘕痞积，老痰坚积以及胃痛泛酸等证，皆可用之。

【临证应用】瓦楞子具消痰软坚之功，治癭瘤瘰癧、痰核等证，常与海藻、昆布等同用，如含化丸。并能化瘀血，可与行气活血，散结消痞药莪术、三棱、鳖甲等同用，以治癥瘕痞块之证。近年用本品治肝脾肿大以及胃痛吐酸等证，效果良好。

【用量用法】10—30克，煎服。研末冲服，每次1—3克。消痰散结宜生用，制酸止痛宜煅用。

海藻

〔原文〕咸润下而软坚，寒行水以泄热。故消癭瘤结核阴瘕^①之坚聚，腹痛曰疝：丸痛曰瘕，音颓。痰饮脚气水肿之湿热，消宿食，治五膈。出东海有大叶马尾二种，亦作海菜食，洗去咸水用。昂按：其用在咸，似不宜过洗。反甘草。东垣治瘰癧马刀，海藻甘草并用，盖激之以溃坚也。

海带，下水消癭，功同海藻。似海藻而粗，柔弱而长。

【讲解】（1）阴瘕：病名。指双侧睾丸肿大。

海藻功能消痰软坚。善治癭瘤、瘰癧。为马尾藻科植物海蒿子和羊栖菜的全草。前者习称“大叶海藻”，后者称“小叶海藻”。采收后用淡水洗净，晒干入药。

本品味苦咸，性寒。入肝、胃、肾三经。咸能软坚消痰。苦寒能清热泻火，故有消痰软坚、清热利水之功，主治痰火郁结所致的癭瘤、瘰癧、瘰癧结核，睾丸肿痛，及痰饮水肿、脚气等证。所谓消宿食、治五膈，皆取其化痰散结的作用。

【临证应用】海藻多用于痰火郁结的癭瘤、瘰癧，可与昆布、土贝母等伍用，如消癭汤。因其性偏苦降，能软坚散结，亦可用于睾丸肿痛或肝脾肿大等证。

《备要》言反甘草，是沿袭历代本草所载，古今均有海藻甘草同用未见不良反应的例案。一九七七年版药典亦未注明二药不宜同用。但“十八反”尚在研究之中，仍以慎用为宜。

【用量用法】10—20克，煎服。反甘草。

附：海带性味功效与海藻相同，以治癭瘤之证，但药用海藻、昆布为主，海带主作食品。

昆布

〔原文〕功同海藻而少滑。性雄，治水肿癭瘤，阴溃膈噎，含之咽汁。出登莱者搓如绳索，出闽越者大叶如菜，洗去咸味用。

【讲解】 昆布有消痰软坚散结之功，主治与海藻同。为海藻科植物海带或翅藻科植物昆布的叶状体。从海中捞出，漂净，切丝晒干备用。主产辽宁、山东（即《备要》言出登莱者）及福建沿海（即《备要》言出闽越者）。

本品性味咸寒。有与海藻相似的消痰、软坚散结之功，亦能治水肿、癭瘤、阴瘡及噎膈。

昆布、海藻二药作用无明显差异，《备要》言昆布较海藻性雄而少滑利，不足为信。

【临证应用】 昆布主用于癭瘤、瘰癧，为治癭之主药。常配海藻等同用，如昆布丸。因其性滑润下，亦可利水消肿，治水肿胀满，但脾胃虚寒者当忌用。

【用量用法】 10—20克，煎服。

胖大海

〔原文〕味甘微涩、平微凉，润肺化痰止嗽，治嗽痰肺热。一名大洞子，一名安南子。

【讲解】胖大海具有清热润肺、利咽通便之功。为梧桐科落叶乔木植物胖大海的成熟种子。于夏初由开裂的果实上采取成熟种子。晒干，生用。

本品味甘性寒。入肺、大肠经。善能清宣肺气，以治肺气郁闭、痰热咳嗽及肺热声哑之证；肺与大肠相表里，本品既能清肺热又能润肠燥，故对热结肠燥便秘，亦有较好疗效。

【临证应用】胖大海用于干咳失音，咽喉燥痛，多单用泡水代茶服；亦可与桔梗、蝉蜕、甘草等同用。用于热结便秘以致大便出血、头痛目赤等。亦可单用泡服，若重证尚须配伍适宜的清热泻下药。

【用量用法】 3—6枚，沸水泡服或煎服。

荸荠

〔原文〕甘微寒滑。益气安中，开胃消食，饭后宜食之。除胸中实热，治五种噎膈，五膈：忧膈、悲膈、气膈、热膈、寒膈。噎亦五种：气噎、食噎、劳噎、忧噎、思噎。消渴黄疸，血证蛊毒。末服，辟蛊。能毁铜。汪机曰：食铜钱，食之则钱化。可见为消坚削积之物，故能开五膈，消宿食，治误吞铜也。

【讲解】荸荠有清热化痰消积之功。为莎草科多年生水生草本植物荸荠的球茎。𪔐𪔐之名，出于《尔雅》，乌芋之名，出于《广雅》，地栗之名，出于《通志》。以上之名，部分地区尚还匀用。主鲜用，捣汁服。

荸荠味甘，性寒。入肺、胃经。能清肺胃之热，而有化痰消积之功。治温病消渴、黄疸、血淋、便血、痞积、目赤、咽喉肿痛等证。《本草求真》曰：“其效若是之多，盖以味甘性寒，则在于胸实热可除，而诸实胀满可消；力善下行，而诸血痢血毒可祛”。

【临证应用】荸荠用于温热病烦热口渴，常配梨汁、鲜苇根汁、麦冬汁、藕汁等，如五汁饮。治湿热黄疸，小便不利，可煎汤代茶常用。治痞积，也可单用，每日服之，有助消痞散积。

【用量用法】30—60克。煎汤或捣汁服。

茅苳

〔原文〕寒利肺，甘解毒。能解百药及蛇蛊毒，在诸药中，毒皆自解。和中止嗽，治消渴强中，渴证下消，茎长兴盛，不交精出，名强中。消渴之后，发为痈疽。痈肿疗毒。如人参而体虚无心，似桔梗而味甘不苦。奸贾多用以乱人参。李时珍曰：茅苳即甜桔梗。

【讲解】茅苳是清肺、化痰、解毒之品。为桔梗科多年生草本植物茅苳的根。其根形似人参而体虚中空，故有茅苳乱人参之弊。而苗似桔梗，但味甘不苦，故时珍又谓其甜桔梗。

本品气味甘寒。入肺经。功以清热、化痰解毒为主，可用于燥咳喉痛，疗疮肿毒等证。《备要》言治消渴、强中亦是取其解热之功。

【临证应用】茅苳甘寒入肺，可清肺热，化燥痰，治肺热咳嗽及消渴。古时曾一度将茅苳与桔梗混用，实际桔梗、茅苳二物，性味、功效各有不同，现代有治急慢性支气管炎，用茅苳鲜根30克，枇杷叶15克，水煎服。《千金翼方》治痈肿疗疮用生茅苳根一合，去渣涂。诸家本草皆言茅苳解毒甚好，古有用其解钩吻毒者（《金匱要略》）。今浙江等地用其解山木鳖中毒均效。

茅苳临床应用不多，正如时珍曰：“茅苳寒而利肺，甘而解毒，乃良品也，而世不知用，惜哉！”

【用量用法】3—10克，煎服。外用适量，研末调敷。

胡桐泪

〔原文〕苦能杀虫，咸能入骨软坚，大寒能除热。治咽喉热痛，磨扫取涎。齿蠹风疳，瘰癧结核。苏颂曰：古方稀用，今口齿家，多用为要药。出凉肃。乃胡桐脂，入土得斥卤之气结成，如小石片，木泪状如膏油。

【讲解】胡桐泪功专清热化痰软坚。为杨柳科乔木植物胡杨（又名胡桐）的树脂，在土中留存多年而成。生用。胡桐分布于内蒙古西部、甘肃、青海、新疆等地。

本品味咸苦，性大寒。入肺、胃经。具有清热、化痰、软坚之功，可治咽喉肿痛、齿痛、牙宣、牙疳、骨槽风、瘰癧等证。

【临证应用】胡桐泪配伍硼砂、生矾、胆星，共为末，姜汤调服，治咽喉急胀，肿结不通。胡桐泪入麝香掺敷，治湿热牙疼，喜吹风。胡桐泪研末外贴齿缝，治齿缝突发出血不止。

【用量用法】3 — 6克，煎服或煎水含漱或研末敷。

第三节止咳平喘药

凡能止咳嗽、降气平喘的药物，称止咳平喘药。

本节药物运用于多种咳喘的病证，但咳喘之证，较为复杂。有干咳无痰者，有咳吐清痰或稠痰者，有外感咳逆者，有虚劳咳喘者，寒热不一，虚实各异。应用时必须选用适宜的药物，并作恰当的配伍，一般不单用止咳平喘药。

止咳平喘药，分别具有宣肺、润肺、降气等不同作用，应用时应加以区别。

杏仁

〔原文〕辛苦甘温而利。泻肺解肌，能发汗。除风散寒，降气行痰，润燥消积。素面豆粉，近之则烂。通大肠气秘，治时行头痛，上焦风燥，咳逆上行，杏仁炒研，蜜合为丸含咽。烦热喘促。有小毒，能杀虫治疮，制狗毒，可毒狗，消狗肉积。锡毒。肺虚而咳者禁用。李东垣曰：杏仁下喘治气，桃仁疗狂治血，俱治大便秘，当分气血：昼便难属阳气，夜便难属阴血。妇人便秘，不可过泄。脉浮属气，用杏仁、陈皮；脉沉属血，用桃仁、陈皮。肺与大肠相表里，贲门上主往来，魄门下主收闭，为气之通道，故并用陈皮佐之。贲门，胃之上口。魄门，即肛门。杏仁、紫菀，并能解肺郁、利小便。去皮尖炒研，发散连皮尖研。双仁者杀人。得火良。恶黄芪、黄芩、葛根。

巴旦杏仁

〔巴旦杏仁〕甘平。止咳下气，消心腹逆闷，形扁皮白，尖弯如鹦哥者真。功专润肺。

【讲解】杏仁苦泄降气，功专平喘止咳，为治咳喘要药。杏仁为蔷薇科落叶乔木植物山杏、辽杏、西伯利亚杏及杏的成熟种子。杏仁有甜、苦之分，栽培杏所产者甜的较多，野生的一般均为苦的。从原植物来看，辽杏、西伯利亚杏及野生的山杏的杏仁为苦杏仁，而杏及山杏的栽培种的杏仁，甜的较多，但也有苦的。原药用沸水泡片刻，搓去皮尖，捣碎用。

杏仁味苦辛，性温，有小毒。入肺、大肠经。味苦入肺，能降肺气；味辛疏散，又善宣肺除痰，痰消气宣，则咳喘自平，故有宣肺化痰，止咳定喘之功，为治咳喘证之专药，因而各种喘咳证，杏仁无不相宜。有热者配以清热药，有寒者配以温化药，兼表证者配以解表药，唯虚咳之证，不宜应用。本品含油质润，作用于大肠而又有滑肠通便之效，凡肠燥便秘之证，皆可应用。正如《本草求真》所言：“杏仁，既有发散风寒之能，复有下气除喘之力，缘辛则散邪，苦则下气，润则通秘，温则宣滞行痰。杏仁气味俱备，故凡肺经感受风寒，而见喘嗽咳逆，胸满便秘，烦热头痛，与夫狗毒，锡毒等证，无不可以调治。”

【临证应用】杏仁用于咳嗽气喘可随配伍不同而用于多种咳喘证。风寒感冒，咳嗽气喘，可与苏叶、半夏、陈皮等同用，如杏苏散；治风热咳嗽，常与桑叶、菊花等配伍，如桑菊饮；燥热咳嗽，则与沙参、贝母、桑叶等同用，如桑杏汤；肺热咳嗽，多与麻黄、石膏等配伍，如麻杏石甘汤。用于肠燥便秘，多与火麻仁，当归、枳壳等润滑行气之品，以治老人或产后血虚肠燥便秘之证，如润肠丸。

巴旦杏仁，形扁而大，味甜不苦，故又名甜杏仁。味甘性平，功效与苦杏仁近似，而滋润之性较佳，故多用于虚劳咳嗽气喘之证，肠燥便秘亦最适宜。

两种杏仁不仅性味不同，应用亦有差别。苦杏仁苦辛宣肺，性属疏泄，多用于外感肺实之咳喘；甜杏仁甘平润肺，性属滋养，多用于肺虚劳嗽。但其润肠通便之功是相同的。

【用量用法】 3—10克，煎服。有小毒，勿过量，婴儿慎用。

紫菀

〔原文〕辛温润肺，苦温下气。补虚调中，消痰止渴。治寒热结气，咳逆上气，咳吐脓血，专治血痰，为血劳圣药。肺经虚热，小儿惊痫。亦虚而有热。能开喉痹取恶涎。然辛散性滑，不宜多用独用。《本草汇》曰：苦能达下，辛能益金，故吐血保肺，收为上剂。虽入至高善于达下，使气化及于州都，小便自利，人所不知。李士材曰：辛而不燥，润而不寒，补而不滞，诚金玉君子，非多用独用，不能速效。州都，膀胱也。根作节，紫色润软者良。人多以车前、旋覆根伪之，误服误人。去头须，蜜水浸，焙用。款冬为使。恶天雄、瞿麦、藁本、远志。畏茵陈。白者名女菀。李时珍曰：紫入血分、白入气分。

【讲解】紫菀为化痰止咳之要药。为菊科多年生草本植物紫菀的根及根茎。《备要》谓：“根作节，紫色润软者良。”指干燥根茎节丛虽须根，细长而柔软，不易折断，外面色紫，有细纵皱。秋季采收，晒干切段。生用或蜜炙用。

本品苦甘，微温。入肺经。苦温下气而不燥，甘温润肺而不膩，性质和平，为下气化痰止咳良药。对咳嗽之证，不论寒热，外感、内伤，只要咳嗽有痰，咯吐不畅者，无论新久，皆可配伍应用。如《本草正义》“紫菀柔润有余，虽曰苦辛而温，非燥烈可比，专能开肺郁，定喘降逆，宣通室滞。兼疏肺家气血，凡风寒外束，肺气壅塞，咳呛不爽，喘促哮吼及气火燔灼，郁为肺痈，咳吐脓血，痰臭腥秽诸证，无不治之。”然本品究属苦温乏味，阴虚火旺或有实热之燥咳、咯血等证，非有适宜配伍，不得运用。喉痹痰多亦可配用。

【临证应用】紫菀亦可用于多种咳嗽，如外感风寒、痰多咳嗽，可配荆芥、白前、陈皮等；肺虚久咳咯血，可配阿胶、知母、川贝等伍用，如紫菀汤。

【用量用法】5—10克，煎服。生紫菀多用于痰嗽实证，蜜炙后加强润肺之力，故久咳虚嗽者宜之。

款冬花

〔原文〕辛温纯阳。泻热润肺，消痰除烦，定惊明目。治咳逆上气，喘渴肺虚挟火。喉痹，肺痿肺痛，咳吐脓血，为治嗽要药。烧烟以筒吸之亦良。百合、款冬等分蜜丸，名百花膏，治咳嗽痰血。凡阴虚劳嗽，通用款冬、紫菀、百部、百合、沙参、生地、麦冬、五味、知、柏、芩、芍，如内热骨蒸，加丹皮，地骨，若嗽而复泻者，为肺移热于大肠，脏腑俱病；嗽而发热不止者，为阴虚火炎，皆难治。寒热虚实，皆可施用。《本草汇》曰：隆冬独秀，先春开放。得肾之体，先肝之用，故为温肺理嗽之最。大抵咳必因寒，寒为冬气，入肺为逆。款冬非肺家专药，乃使肺邪从肾顺流而出。肺恶寒。郭佩兰著《本草汇》。十一二月开花如黄菊，微见花未舒者良。生河北、关中，世多以枇杷蕊伪之。拣净花，甘草水浸一宿，曝用。得紫菀良。杏仁为使。恶皂荚、硝石、玄参。畏黄芪、贝母、连翘、麻黄、青葙、辛夷。虽畏贝母，得之反良。

【讲解】款冬花为润肺止咳之良药。为菊科多年生草本植物款冬的花蕾。冬季采收，干燥花蕾呈黄棕色。生用或蜜炙用。

本品气味辛温，归肺经。有温而不热，辛而不燥的特点，为润肺止咳之良药。凡一切咳嗽，不论外感、内伤、寒热、虚实皆可应用。尤以寒邪束肺之咳喘及肺虚久咳最为适宜。所谓能治喉痹、肺痿、肺痛、咳吐脓血者，亦是取其润肺化痰作用。

本品主肺病，未见定惊明目之功。

【临证应用】款冬花为治嗽要药，可用于多种咳嗽，临床随其证候表现配伍他药同用。功效与紫菀相似，并常与紫菀相须为用，以增强治喘咳之效。本品辛温，所以肺寒痰多的喘咳尤为多用，可配麻黄、细辛等辛温之品；若偏于热者，配知母、贝母、桑白皮等，如款冬花汤；若劳嗽痰中带血又可配百合、紫菀、贝母等用。

款冬花与紫菀二者性皆和平，作用亦相似，都能润肺化痰，止咳，寒热虚实各种咳嗽皆可配伍应用。然紫菀功偏祛痰；冬花主在止咳，二药相须为用，可增强疗效。

【用量用法】 5—10克，煎服。外感咳嗽宜生用，内伤咳嗽宜炙用，蜜炙后可增加润肺止咳的疗效。

百部

〔原文〕甘苦微温。能润肺，治肺热咳嗽。苦能泻热，有小毒，杀虻、蛲、蝇、虱，一切树木蛀虫。触烟即死。治骨蒸传尸，疳积疥癣。皆有虫。李时珍曰：百部亦天冬之类，故皆治肺而杀虫。但天冬寒，热嗽宜之，百部温，寒嗽宜之。根多成百故名。取肥实者，竹刀劈去心皮，酒浸焙用。

【讲解】百部功专润肺止咳，又善杀虫灭虱。为百部科多年生草本植物直立百部、蔓生百部，或对叶百部的干燥块根。李时珍曰：其根多者百十连属，故以名之。取肥实者，入沸水烫至无白心，晒干切段。生用或蜜炙用。

本品味甘苦质润，性平。归肺经。功专润肺止咳，杀虫灭虱。故用治多种咳嗽，无论新久，寒热咳嗽，以及百日咳等证，皆有疗效，尤宜于肺虚劳嗽与久咳之证。还能杀蛲虫、灭虱，对于蛲虫病及人体的头虱、体虱等，都有较强的杀灭力，此外，还可用于小儿疳积有虫，皮癣疥疮等证。

【临证应用】百部甘润苦降，性平不燥，为治咳嗽常用药。治伤风咳嗽，可与荆芥、桔梗、紫菀同用，如止嗽散；治肺癆咳嗽，与麦冬、生地、山药配伍；治百日咳，多与沙参、川贝、白前等配用。

用治蛲虫病，可每日用生百部30克，煎取浓汁30毫升，每晚保留灌肠，连用五天，为一疗程。本品制成20%的醇浸液或50%水煎剂涂搽，对人的头虱、体虱及虱卵均有杀灭作用。

【用量用法】5—10克，煎服。外用适量。生用杀虫灭虱力强，炙用润肺止咳效佳。

桑白皮

〔原文〕甘辛而寒。泻肺火，罗谦甫曰：是泻肺中火邪，非泻肺气也。火与元气不两立，火去则气得安矣。故《本经》文云益气。李东垣曰：甘固元气之不足而补虚，辛泻肺气之有余而止嗽。然性不纯良，不宜多用。钱乙泻白散：桑皮、地骨各一两，甘草五钱，每服二钱，入粳米百粒煎。李时珍曰：桑皮、地骨，皆能泻火从小便出，甘草泻火缓中，粳米清肺养血，乃泻肺诸方之准绳也，一妇鼻久不闻香臭，后因他疾，缪仲醇为处方，每服桑皮至七八钱，服久则鼻塞忽通。利二便，散瘀血，下气行水，止嗽清痰。《发明》曰：肺中有火，则生痰而作嗽，除水气正所以泻火邪，实则泻其子也，火退气宁，则补益在其中矣。《十剂》曰：燥可去湿，桑白皮、赤小豆之类是也。治肺热喘满，唾血热渴，水肿胪胀。肺气虚及风寒作嗽者慎用。为线可缝金疮，刮去外皮取白用。如恐其泻气，用蜜炙之。续断、桂心为使。忌铁。

【讲解】桑白皮泻肺平喘，行水消肿。为桑科小乔木桑树除去栓皮的根皮。洗净晒干，切段，生用或蜜炙用。

桑白皮味甘，性寒，入肺经。甘寒性降，功专泻肺火以平喘，行水饮以消肿。故凡肺热咳喘，痰多咳血，以及肺气壅实的痰饮水肿。胸胁胀满，小便不利等证，皆常用之。古代用其作线，以缝金疮外伤。

【临证应用】桑白皮用于肺热喘咳，常与地骨皮、甘草同用，如泻白散；与茯苓皮、生姜皮、大腹皮、陈皮等配伍，即五皮饮，是治疗水肿、小便不利之常用方剂。此外，近代研究本品还有降压作用，可用治高血压病。

【用量用法】10—15克，煎服。行水宜生用，平喘止咳可炙用。

葶苈子（1）

〔原文〕辛苦大寒，属火性急。大能下气，行膀胱水。肺中水气贲急（2）者，非此不能除。破积聚癥结，伏留热气，消肿除痰，止嗽平喘，水湿泛滥，为肿胀，为痰嗽，为喘满。通经利便。久服令人虚。《十剂》曰：泄可去闭，葶苈、大黄之属是也，大黄泄阴分血闭，葶苈泄阳分气闭，气味俱厚，不减大黄。然有甜苦二种，甜者性缓，苦者性急，泄肺而伤胃，宜大枣辅之。仲景有葶苈大枣泻肺汤，治肺气喘急不得卧。昂按：辅以大枣，补土所以制水。子如黍米，微长色黄。合糯米微炒，去米用。得酒良。榆皮为使。

【讲解】(1)子：原无，据《本草纲目》补。(2)贲急：胸中满闷喘促。

葶苈子为泻肺利水要药。为十字花科草本植物播娘蒿（南葶苈子，又名甜葶苈）和独行菜（北葶苈子，又名苦葶苈）的成熟种子。果实成熟时，割取全株；干燥，搓下种子。种子，南葶苈长圆形而扁，黄棕色，味淡；北葶苈形如瓜子，而扁，色相同，味苦，略大些。生用或微炒，捣碎用。

本品苦降辛散，其性寒凉，性偏沉降。入肺、膀胱经，能泻肺而降气，行水而消痰，气降则平喘，水行则痰消。故有泻肺、平喘、祛痰之效。因痰饮壅滞，肺气不降，咳嗽气喘之证均为主治。肺为水之上源，肺气壅实，则膀胱气化不利，用葶苈子泻肺气之闭塞，肺气通则水通利，故又有利水消肿之功，可以治二便不利，胸腹积水实证。正如李时珍所谓：“肺中水气贲郁满急者，非此不能除。”

【临证应用】葶苈子常配大枣同用，治痰涎壅滞，咳嗽喘促的实证，如葶苈大枣泻肺汤。再加苏子、桑白皮等药加强平喘功效，现常用于渗出性胸膜炎，胸腔积液。对水肿实证，胸腹积水，二便不利，常配防己、椒目、大黄等药，以利二便，消水肿，如己椒苈黄丸。

近年来以本品研末服，或配附子、黄芪等应用，对肺心病、心力衰竭、水肿喘满确有良效。但本品泄利伤正，体虚者须配补益药同用。

【用量用法】3—10克，煎服或入丸、散。

马兜铃

〔原文〕体轻而虚，熟则四开象肺，故入肺。寒能清肺热，苦辛能降肺气。李时珍曰：钱乙补肺阿胶汤用之，非取其补肺，取其清热降气，则肺自安也。其中阿胶、糯米，乃补肺之正药。昂按：清热降气，泻之即所以补之。若专一于补，适以助火而益嗽也。治痰嗽喘促，血痔（1）痿疮，大肠经热，痿，漏也，音闻，亦音漏。痔属大肠，大肠与肺为表里，肺移热于大肠，故肠风痔痿，清脏热则腑热即清矣。《千金》单服治水肿，以能泻肺行水也。亦可吐蛊。汤剂中用之，多作吐。蔓生，实如铃，去筋膜，取子用。

【讲解】（1）血痔：肛门生痔，有小肉突起，伴有出血、疼痛等证。

马兜铃清肃之中又有开泄之功，以清肺降气，止咳平喘为主要功效。为马兜铃科多宇生落叶藤本植物北马兜铃和马兜铃的果实。此果体轻而虚，状如马项之铃，熟则开裂为六瓣。汪昂在总义中曰：“药之为物，各有形性气质，其入诸经，有固形而相类者，……。”马兜铃果寒其形象肺，而入肺，即是此意。秋季果实由绿变黄时采摘，晒干，生用或蜜炙用。

本品苦辛而寒，入肺与大肠。辛寒散肺热，苦寒降肺气，故能清肺降气，止咳平喘。治一切肺热咳嗽痰喘。肺与大肠相表里，肺热清，则肠热亦清，故又可治痔疮肿痛。

马兜铃气味秽浊，生用易使人恶心、呕吐，古用其涌吐，现多蜜制后入药，缓和其副作用。

【临证应用】马兜铃主用于肺热咳嗽痰喘，常配桑白皮、黄芩、枇杷叶等同用。如久咳不止，肺有虚热，可配麦冬、沙参等同用，以养阴清肺止咳。如痰中带血，可与阿胶、白芨同用。

痔疮肿痛、出血亦可配伍清热凉血解毒药用。

【用量用法】3—10克，煎服。剂量过大，易致呕吐。孕妇、虚寒咳嗽及脾弱便溏者忌思。

枇杷叶

〔原文〕苦平。清肺和胃而降气，气下则火降痰消。气有余便是火，火则生痰。治热咳呕逆口渴。李时珍曰：火降痰顺，则逆者不逆，呕者不呕，咳者不咳，渴者不渴矣。一妇肺热久嗽，身如火炙，肌瘦将成劳，以枇杷叶、款冬花、紫菀、杏仁、桑皮、木通等分，大黄减半，蜜丸樱桃大，食后夜卧，各含化一丸，未终剂而愈。叶湿重一两，干重三钱为气足。拭净毛，毛射肺令人咳。治胃病姜汁炙，治肺病蜜炙。

【讲解】枇杷叶性偏寒降，以清肺止咳，和胃降逆为其主要功效。为蔷薇科常绿小乔木植物枇杷的叶。叶片刷去背面的毛绒，洗净晒干、切碎生用，或蜜炙用。

枇杷叶味苦，性偏凉。入肺、胃经。苦寒善降，以苦凉为用，清降为功，入肺则上清肺热，肃降肺气以化痰止咳，凡风热燥火等所致的咳嗽之证，皆可应用。入胃则中清胃热，和胃降气以止呕哕，用于胃热口渴、呕哕等证。寒嗽及胃寒呕哕不宜用。

【临证应用】枇杷叶对风热燥火之咳，皆常应用，如治风热咳嗽，可与前胡、桑叶同用。治燥热咳喘，可与沙参、桑白皮等同用。用于胃热口渴、呕吐之证，可与竹茹、芦根、麦冬等同用。若胃气上逆、恶心呕哕，由痰湿引起者，也可与燥湿化痰的半夏、陈皮、生姜等同用。

【用量用法】10—45克，鲜用可加倍，煎服。止咳宜炙用、止呕宜生用。

小结

本类药物根据其性味与功效的不同，分为温化寒痰、清化热痰和止咳平喘三种：

一、温化寒痰药：

本类药性多温燥，主要用于寒痰、湿痰所致之证。但临床应用也各有不同，其中半夏、南星性均燥烈有毒，都能燥湿化痰，外敷均有消肿止痛之功，然半夏长于祛脾胃之湿痰，又为降逆止呕之要药，可消痞散结；南星善祛经络之风痰，并能解痉，南星用胆汁制后为胆南星，性凉而无燥烈伤阴之弊，功能清热化痰，息风定惊，可治痰热惊风抽搐之证。白附子亦为燥烈有毒之品，性偏升散，善祛风痰，为治风痰引起头面诸证的常用药。白芥子辛温气锐，其性走散，既能祛寒痰壅滞于肺络，以治肺寒咳喘，又能祛寒饮留滞于胸膈，以治胸满胁痛，并搜皮里膜外筋骨间凝聚之痰，以治流注阴疽等证。旋覆花降气消痰，又善止噫，既治咳喘痰多，又治呕吐噫气；金沸草与旋覆花近似，祛痰化饮作用略强。白前祛痰止咳，并能降气，专治肺气壅实，痰多咳喘之证。皂荚有较强的祛痰作用，又有开窍之功，用于卒然昏厥，不省人事以及癫痫痰盛，外用有散结消肿之功，治疮肿未溃者。

二、清化热痰药：

此类药偏寒凉，主用于热痰或阴虚燥咳，以及由痰热所引起的癫狂惊癇、癭瘤、瘰癧等证。其中前胡清热化痰之中善能宣散风热，故为外感咳嗽所常用。桔梗长于宣通上焦，开提肺气，有良好的宣肺祛痰、排脓消痈之功，故多用于外邪犯肺，肺气不宣之咳嗽、咯痰不利、咽痛、音哑以及肺痛咳吐脓血等证。贝母为清热润肺化痰之佳品，主治痰热咳嗽、阴虚燥咳、劳嗽咯血等证，并兼能散结消肿，故常用于痈肿瘰癧之证，贝母又有川贝、浙贝之分，川贝长于润肺化痰，宜于阴虚肺燥之虚证；浙贝偏于清热化痰，散结力强，宜于风热或痰火郁结之实证；土贝母为另一类植物，只用于外科疮疡肿毒。瓜蒌性偏寒滑，清润之力较大，除清热化痰外，又长于宽胸散结、润肠通便，故

多用于痰热咳嗽、胸痹、结胸、肠燥便秘之证，临床应用又有皮、仁及全用之分。瓜蒌皮偏于清热化痰，宽胸利气；瓜蒌仁偏于润肺化痰，润肠通便；全瓜蒌则兼皮、仁的功效。竹茹善于清胃止呕；竹沥性较寒滑，善透经络之痰，以治痰阻经络，中风口噤诸证。天竹黄善于清心定惊，并能豁痰开窍，然性较缓和，故小儿惊痫方中多用之。礞石长于堕痰镇惊，主用于惊痫癫狂、顽痰内结之证。浮海石、海蛤壳、海藻、昆布均以化痰软坚为主要功效，但浮海石、海蛤壳多用于痰热咳嗽、咯痰不利之证；海藻、昆布主用于瘰疬瘰癧、肝脾肿大。瓦楞子专消顽痰坚结，又善制酸止痛。胖大海有清宣肺气之功，多用于肺热声哑、痰热咳嗽，既可入复方应用，又能单用代茶，还有清肠通便之效。葶苈有清热化痰消积之功。芥苈为清肺、化痰、解毒之品。

三、止咳平喘药：

本类药除止咳外，还能平喘，用治咳嗽喘息之证，临床上可根据病情选择使用。其中杏仁又有苦甜之分，苦杏仁苦温润肺，止咳平喘之中兼有宣散之功，故常用于外邪犯肺，肺气不降之喘咳痰多之证；甜杏仁甘平润肺，多用于肺虚劳嗽，但润肠通便之功，两者是相同的。紫苑、款冬花、百部均为润而不燥之品，都能润肺止咳，无论新久寒热虚实咳嗽皆可应用，然紫苑化痰力胜，冬花、百部止咳功强，且百部又能杀虫灭虱。桑白皮性寒而沉降，消肿力强，能行水而消痰，利水而消肿；此外，近代研究尚有一定的降压作用，可用于治高血压病。葶苈子寒降之性较大，长于泻肺行水，祛痰定喘，宜于痰饮喘咳，水肿胀满之实证。马兜铃止咳平喘之中善能清肺降气，宜用于肺热咳嗽。枇杷叶化痰止咳之中又长于降逆止呕，以治气逆呕哕之证。

化痰止咳平喘药功用归纳简表

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
温化寒痰药	半夏	辛、温、有毒	脾、胃、肺	燥湿化痰，降逆止呃，消痞散结	①咳嗽痰多气喘②呕吐③胸脘痞闷、梅核气④痈疽肿毒	5-10克	反乌头清半夏燥湿化痰；姜半夏降逆止呕；法半夏和胃燥湿；半夏曲化痰消食；生半夏外用。

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	天南星	苦、辛、温、有毒	肺、肝、脾	燥湿化痰，祛风止痉，消肿散结	①顽痰咳嗽、风痰眩晕②癫痫、中风、破伤风③痈疽痰核肿毒	5—10克外用适量	
	胆南星	苦、凉		清热化痰，息风定惊	①痰热内盛②惊风抽搐、中风、癫狂	2—5克	
	白附子	辛、甘、温、有毒	脾、胃	燥湿化痰，祛风止	①风痰壅盛，口眼喉	3—6克外用	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				痉， 解毒 散结	斜、 破伤 风② 瘰癧 痰核、 毒蛇 咬伤	适 量	
	白芥子	辛、 温	肺	温肺 祛痰 利气， 散结 通络 止痛	①寒 痰壅 滞② 肢体 疼痛、 阴疽 流注	3 — 10 克 外 用 适 量	
	旋覆花	苦、 辛、 咸、 微温	肺、 脾、 胃、 大肠	消痰 利水， 降气 止呕	①咳 喘痰 多、 胸膈 痞闷② 噎气、 呕吐	3 — 10 克	包煎
	金沸草	微 苦、		祛痰 化饮 止咳	寒痰 咳嗽	8 —	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
		咸、温				12克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
温化寒痰药	白前	苦、辛、微温	肺	祛痰降气止咳	痰多咳喘	3—10克	
	皂角	辛、温有小毒	肺、大肠	祛痰开窍，散结消肿	①顽痰阻塞，卒然昏迷、癫痫痰盛 ②疮肿未溃	2—4克研末服每次0.5—1.5克 外用适量	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
清化热痰药	前胡	苦、辛、微寒	肺	降气祛痰，宣散风热	①痰热咳嗽②外感风热咳嗽	6—10克	

分 类	药 名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	桔梗	苦、辛平	肺	开宣肺气，利咽开音，祛痰排脓	①痰多咳嗽②咽痛音哑③肺痈胸痛	3—10克	反乌头
	川贝母	苦、甘、微寒	心、肺	润肺止咳	肺虚久咳、肺热燥咳	3—10克研末服每次用1—2克	
	浙贝母	苦、寒	心、肺	清肺热、散结	①风热或痰热咳嗽②疮疡肿毒、瘰癧结核、乳肺痈		
	瓜蒌	甘、寒	肺、胃、	清肺化痰	①肺热咳	10—30克	打碎

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			大肠	痰，利气宽胸，滑肠通便	嗽、痰稠②胸痹、结胸③肠燥便秘		后用
	竹茹	甘、微寒	肺、胃、胆	清化热痰，除烦止呕	①肺热咳嗽②胃热呕吐	6-15克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
清化热痰药	竹沥	甘、寒	心、肺、胃	清热滑痰	①痰热咳嗽、痰稠难咯 ②中风痰迷、惊痫癫狂	30-50克冲服	荆沥功效与竹沥相似

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	天竹黄	甘、寒	心、肝、胆	清热豁痰，开窍，清心定惊	痰热惊搐、中风痰壅	3-6克研粉吞服每次0.6-1克	
	礞石	甘、咸、平	肺、肝	消痰下气，平肝镇惊	①顽痰、老痰之气逆喘咳②痰积惊痫	6-15克散剂每次2-4克	
	浮海石	咸、寒	肺	清肺化痰，软坚散结	①痰热咳嗽、顽痰胶结②瘰癧结核	6-10克	
	海蛤壳	苦、咸寒	肺、胃	清肺化痰，软坚	①痰热哮喘②瘰癧	10-15克蛤粉包煎	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				散结，制酸止痛	癭瘤③胃痛泛酸		
	胡桐泪	咸、苦、大寒	肺、胃	清热化痰	咽喉肿痛	3-6克	
	瓦楞子	咸、平	肺、胃、肝	消痰软坚，化瘀消癥，制酸止痛	①癭瘤瘰癧②癥瘕痞块③胃痛泛酸	15-30克研粉服每次1-3克	
	海藻	苦、咸、寒	肝、胃、肾	消痰软坚，利水消肿	①癭瘤瘰癧②水肿脚气、肝脾肿大	10-20克	反甘草
	昆布	咸、寒	肝、胃、肾	消痰软坚，	同上	10-20克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				利水 消肿			

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
清热化痰药	胖大海	甘、寒	肺、大肠	清宣肺气，润肠通便	①痰热咳嗽②肺热声哑③热结便秘	3-6枚	沸水泡
	荸荠	甘、寒	肺、胃	清热化痰，消积	①烦热口渴②痞积	30-60克	
	芥苳	甘、寒	肺	清肺化痰	肺热咳嗽	3-10克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
止咳平喘药	杏仁	苦、辛、温、有毒	肺、大肠	止咳平喘，润肠通便	①咳嗽气喘②肠燥便秘	3—10克	宜后下

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	巴旦杏仁	甘、平	肺、大肠	同上 滋润性尤佳	多用于虚劳咳嗽	3-10克	
	紫菀	苦、甘、微温	肺	润肺化痰，止咳	咳嗽气逆，咯痰不爽	5-10克	
	款冬花	辛、温	肺	润肺下气，止咳化痰	咳嗽气喘，外感、内伤、寒热虚实均宜	5-10克	
	百部	苦、甘、平	肺	润肺止咳，灭虱杀虫	①各种咳嗽②蛲虫、头虱、体虱	5-10克外用适量	炙用止咳，生用杀虫。

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	桑白皮	甘、寒	肺	泻肺平喘，利尿消肿	①肺热咳嗽②浮肿、小便不利	10—15克	
	葶苈子	苦、辛、大寒	肺、膀胱	泻肺平喘，利水消肿	①痰涎壅滞之咳嗽实证②水肿、小便不利	3—10克	
止咳平喘药	马兜铃	苦、辛、寒	肺、大肠	清肺化痰，止咳平喘	肺热咳嗽，痰壅气促	3—10克	
	枇杷叶	苦、凉	肺、胃	止咳化痰，和胃降逆	①咳嗽痰稠②胃热呕呃	10—15克	刷去毛用

复习思考题

- 1、试述化痰止咳平喘药的定义，怎样掌握运用化痰止咳平喘药？
- 2、根据化痰平喘药的各自效用特点可分为几类，各适用于哪些证候？
- 3、分析比较下列药组的效用异同：半夏与南星 桔梗与前胡 贝母与瓜蒌 桑白皮与葶苈子 紫菀与款冬 白附子与白芥子

第十七章补益药

- 第十七章补益药

【自学时数】 16 学时

【面授时数】 4 学时

【目的要求】

1. 了解补益药的概念、分类。
2. 熟悉补气药的适用证。
3. 掌握补气药中常用药的功效、临证应用，并比较其异同。
4. 熟悉补阳药的适用证。
5. 掌握补阳药中常用药的功效、临证应用，并比较其异同。
6. 熟悉补血药的适用证。
7. 掌握补血药中常用药的功效、临证应用，并比较其异同。
8. 熟悉补阴药的适用证。
9. 掌握补阴药中常用药的功效、临证应用，并比较其异同。
10. 熟悉补气、升阳、固表、托疮、柔肝、补血、补阴、养阴、滋阴、壮阳、补肾等概念。
11. 熟悉补元气、补心气、补脾气、补肺气、补肺阴、补心阴、补胃阴、补肝阴、补肾阴的概念。
12. 在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡能补虚扶弱，增强体质，用以提高机体的抗病能力，消除虚弱证候的药物，称为补益药，亦称补虚药或补养药。

补益药主要用于各种虚证。如病后正气虚弱，或邪盛正衰，病后正气不足而余邪未尽之证，用补益药后，均可起到辅助正气、消除虚弱证候，或扶正以达到祛邪的目的。所谓虚证，一般可分为气虚、血虚、阴虚、阳虚四种类型。补益药也根据其功效和应用范围的不同，可分为补气药、补阳药、补血药、补阴药四类。临床用药时，应该根据虚证的不同类型而选用其相适应的补虚药，如气虚证则用补气药，阳虚证则用补阳药，血虚证则用补血药，阴虚证则用补阴药。

由于人体的气血阴阳有着相互依存、相互转化的关系，气为血之帅，血为气之母，阴阳互根，阳生阴长，所以在虚损不足的情况下，也常互相影响。阳虚者多兼有气虚，而气虚者易导致阳虚，气虚和阳虚表示机体活动能力的衰退。阴虚每兼血虚，血虚也可导致阴虚，血虚和阴虚表示体内精血津液的损耗。因此，补气药和助阳药，养血药和滋阴药，经常配伍同用。某些补气药还兼有温补助阳的作用，而补血药往往兼有滋阴的功能，所以，临床上遇到阳虚证，在用助阳药的同时往往兼有补气的作用。遇到阴虚证用滋阴药时，也往往兼有养血之功。对于气血两亏、阴阳俱虚之证，又当根据病情，采用气血两补或阴阳兼顾之法。

对于实邪未尽的病证，补益药应予慎用，以防“闭门留寇”，使病邪留阻体内，加重病情。但对虚中挟实的病证，在祛邪的同时，可适当选用补益药，以起到扶正祛邪的作用。在用这些药时应处理好扶正与祛邪的关系，分清主次，恰当地与解表、清热、泻下等祛邪药物配合。

补益药为正气虚弱而设，凡身体健康，脏腑功能活动正常，不须使用本类药物。若使用不当，往往有害而无益，脏腑正常功能受到扰乱，反可导致阴阳失调。

补益药若须久服，而又属滋味浓厚之品者，一般名作丸（片）或滋膏剂。作煎剂时宜久煎。在服用补益药时必须注意保护脾胃，适当配伍健脾理气之品，若虚不受补，阻碍中焦运化，则药物难于奏效，影响疗效。

第一节补气药

凡具有补气功能，治疗或改善气虚证的药物，称补气药。

气虚是指机体活动能力的不足。补气药能增强机体活动能力，尤其是脾、肺、心的功能，所以最适用于脾肺及心气虚的病证。脾为后天之本，生化之源，脾气虚则倦怠无力，食欲不振，脘腹虚胀，大便溏泄，脱肛，浮肿，或造血功能不足以及血失统摄等；肺主一身之气，肺气虚则少气懒言，动作喘乏，易出虚汗；心气虚则心悸失眠，虚弱无力，脉微。凡呈现以上证状者，都可用补气药来治疗。

临床应用补气药，应根据不同的气虚证分别选用适当的补气药。兼有阳虚或阴虚者，可与补阳药或补阴药同用；由于气为血帅，气旺可以生血，气能统摄血液，因此，临床上为了补血、止血，有时还要着重使用补气药。尤其是大失血时，可根据“有形之血不能速生，无形之气所当急固”、“血脱益气”的原则，急用补气药以固脱。

服用补气药如产生气滞，出现胸闷腹胀、食欲不振等证，可适当配伍理气药。

人参人参芦

【原文】生甘苦微凉，甘补阳，微苦微寒，又能补阴。熟甘温。大补肺中元气，李东垣曰：肺主气，肺气旺，则四脏之气皆旺，精自生而形自盛。《十剂》曰：补可去弱，人参羊肉之属是也。人参补气，羊肉补形。泻火，得升麻补上焦，泻肺火；得茯苓补下焦，泻肾火，得麦冬泻火而生脉；得黄芪、甘草，乃甘温退大热。李东垣曰：参芪甘草，泻火之圣药，合用名黄芪汤。按烦劳则虚而生热，得甘温以益元气，而邪热自退，故亦谓之泻。益土，健脾。生金，补肺。明目，开心益智，添精神，定惊悸，邪火退，正气旺，则心肝宁而惊悸定。除烦渴，泻火故除烦，生津故止渴。通血脉，气行则血行。贺汝瞻曰：生脉散用之者，以其通经活血，则脉自生也。古方解散药、行表药多用之，皆取其通经而走表也。破坚积，气运则积化。消痰水，气旺则痰行水消。治虚劳内伤，伤于七情六欲，饮食作劳为内伤，伤于风寒暑湿为外感。如内伤发热，时热时止，外感发热，热甚无休；内伤恶寒，得暖便解，外感恶寒絮火不除；内伤头痛，乍痛乍歇，外感头痛，连痛无停；内伤则手心热，外感则手背热；内伤则口淡无味，外感则鼻塞不通；内伤则气口脉盛，多属不足，宜温、宜补、宜和；外感则人迎脉盛，多属有余，宜汗、宜吐、宜下。盖左人迎主表，右气口主里也。昂按：东垣辨内伤外感最详，恐人以治外感者治内伤也。今人缘东垣之言，凡外伤风寒发热咳嗽者，概不轻易表散，每用润肺退热药，间附秦艽、苏梗、柴胡、前胡一二味，而羌活、防风等绝不取用。不思秦艽阳明药，柴胡少阳药，于太阳有何涉乎？以致风邪久郁，嗽热不止，变成虚损，杀人多矣。此又以内伤治外感之误也，附此正之。发热自汗，自汗属阳虚，盗汗属阴虚，亦有过服参芪而汗反盛者，阳盛阴虚，阳愈补而阴愈亏也。又宜清热养血，而汗自止。多梦纷纭，呕哕反胃，虚咳喘促，《蒙筌》曰：歌有肺热还伤肺之句，惟言寒热，不辨虚实。若肺中实热者忌之，虚热者服之何害？又曰：诸痛无补法，不用参芪。若久病虚痛，何尝忌此耶。疟痢滑泻，始痢宜下，久痢宜补，治疟意同。朱丹溪曰：叶先生患痢，后甚逼迫，正合承气证。予曰：气口脉虚，形虽实而面黄白，必过饱伤胃。与参术陈芍十余贴，三日后胃气稍充，再与承气汤二贴而安。又曰：补未至而下，则病者不能当；补已至而弗下，则药反添病。匪急匪徐，其间不容发。噫，微哉！昂按：此先补后下法之变者也，非胸有定见者，不可轻用，然后学亦宜知之。大承气汤，大黄、芒硝、枳实、厚朴。淋沥胀满，《发明》曰：胸胁逆满，由中气不足作胀者宜补之，而胀自除，经所谓塞因塞用也。俗医泥于作饱不敢用，不知少服反滋壅闭，多服则宣通，补之正所以导之也。皇甫嵩著《本草发明》。中暑、中风及一切血证。李东垣曰：古人治大吐血，脉芤洪者，并用人参，

脱血者先益其气。盖血不自生，须得生阳气之药乃生，阳生则阴长之义也。若单用补血药，血无由而生矣。凡虚劳吐血，能受补者易治，不能受补者难治。

黄润紧实，似人形者良。去芦用。补剂用熟，泻火用生。炼膏服，能回元气于无何有之乡。有火者天冬膏兑服。参生时背阳向阴，不喜风日。宜焙用，忌铁。茯苓为使，畏五灵脂，恶皂荚、黑豆、紫石英、人洩、咸卤。反藜芦。言闻曰：东垣理脾胃泻阴火，交泰丸内用人参、皂荚，是恶而不恶也；古方疗月闭，四物汤加人参、五灵脂，是畏而不畏也；又疗痰在胸膈，人参藜芦同用，而取其涌越，是激其怒性也。非洞奥达权者不能知。

人参芦：能涌吐痰涎，体虚人用之，以代瓜蒂。朱丹溪曰：人参入手太阴，补阳中之阴，芦反能泻太阴之阳，亦犹麻黄根苗不同。痰在上膈在经络，非吐不可，吐中就有发散之义。一妇性躁味厚，暑日因怒而病呃，作则举身跳动，昏不知人。其人形气俱实，乃痰因怒郁，气不得降，非吐不可。以参芦半两，逆流水煎服，吐顽痰数碗，大汗昏睡而安。**参条、参须主治同，功缓**。人参向以上党为贵，今则以吉林野参为上，其次则吉林种参，高丽参皆功倍党参。

【讲解】

人参功能大补元气，补脾益肺，生津止渴，安神益智，为治虚劳内伤第一要药。为五加科多年生草本植物人参的根。根据生长情况，本品又分野生和栽培二种，前者称“野山参”，后者则称“园参”。主产于我国东北各省，尤以吉林长白山区产量最高，质量最佳，因而称“吉林参”。由于加工方法不同，而有生晒参、红参、白参、条参、参鬚等规格。人参一般在栽培六、七年后，在秋季茎叶将枯萎时采挖，去芦头，洗净晒干，此称生晒参；经沸水浸烫后，浸糖汁中，取出晒干，称白参或糖参；蒸熟晒干或烘干，称红参；支根为条参；细根称参鬚。野山参亦可按上述方法加工。

本品甘微苦温，归肺、脾、心经。功能大补元气。

脾为生化之源，肺主一身之气，脾肺气足，则一身之气皆旺。人参补脾益气，故为大补元气之药。至于生津止渴、安神益智之功，其因亦在于补气，前者是阳生阴长的道理，后者为元气充足的效果。故人参

既可用于久病气虚之证，又可用于虚脱急证，而为补虚救危之要药。如气虚不足之证，不论脾胃虚弱，肺气不足，心神不安的神倦，多梦，食少，泄泻，气短喘促，以及热病伤津或消渴病等一切气血津液不足之证，效皆良好。尤其对大出血或大吐泻、元气衰弱而见虚脱者，更为要品。

【临证应用】 人参大补元气，可用以挽救虚脱危证。如古方独参汤，单用一味人参，治卒然虚脱及大出血后虚极欲脱，脉微欲绝之证；若气脱兼见汗出肢冷之亡阳现象，还可与附子同用，即人参附子汤。近年来制成注射剂或浸剂，治心源性休克，或其他气脱垂危之证的急救。

人参可鼓舞脾胃之气，若脾气不足，生化无权，而出现倦怠无力、食欲不振、呕吐泄泻等证，如四君子汤，即人参与茯苓、白术、甘草组成，为补脾益气的基础方，再加当归、熟地等药，气血双补，如八珍汤、人参养荣汤。若肺虚气喘，又多配蛤蚧、胡桃等补肺之品。久咳肺虚，气息虚弱及热伤津液，口渴汗多，还可用人参配麦冬、五味子，即生脉散。对于消渴证，多与天花粉、山药、生地黄等同用。人参能益心气、安心神，对惊悸、失眠、健忘、眩晕、耳鸣等属于气虚血亏者均适用，如天王补心丹、人参归脾丸等均有养血安神之功。此外，本品还能与祛邪药并用，以扶正而祛邪，用于正虚邪实，或邪气未尽而正气已衰的证候。如与紫苏、前胡等配伍的参苏饮治虚人感冒；与大黄、芒硝等配伍的黄龙汤，治邪实正虚的燥热便秘等。

生晒参、红参、白参等作用也有所不同：生晒参性较平和，不温不燥，适用于气阴不足者。白参力弱，一般脾肺气虚证或气阴不足证多用。红参性偏于温，气弱阳虚者适用。条参、参鬚仅得参之余气，药力较上述诸类参均弱，须峻补而恐不受者多用之，危笃之证断不可倚仗。

总之，人参功专补气，为补气第一要药，善治气虚诸证，特别是气虚欲脱的危重病证，尤为必用之品。然用之不当，亦可致害。如病人平素身体壮实，病时又无虚象者，不必使用。如证见阴虚阳亢、潮热骨蒸、肺热咳血、痰壅气急、肝阳上亢、头眩目赤，及一切火郁内实之

证，均应忌用。服本品时，一般不同服萝卜，以免影响疗效。本品反藜芦。传统认为人参畏五灵脂，而在临床运用及药理实验均未发现两者同用后有不良反应，故《药典》并未注明人参与五灵脂不宜同用。

人参芦，即人参根部顶端的根茎部分，功能涌吐、升提。过去主要用于体虚者之痰饮病证，以代替瓜蒂。有催吐作用，且有毒。现均不常用。

【用量用法】 5—10克。一般不与他药同煎，而是文火另煎后，将参汁兑入其他药煎就的汤内饮用。若研末吞服，每次1—2克，日2—3次。如用于救急，量需较大，至15—30克，煎汁分次灌服。

党参

【原文】 甘平。补中益气，和脾胃，除烦渴。中气微虚，用以调补，甚为平妥。今分西党、南党二种。

【讲解】 党参功专补中益气，并能生津养血。为桔梗科多年生草本植物党参或川党参的根。党参药材由于产地不同，有西党、东党、潞党等三种。西党主产陕西、甘肃；东党主产东北等地；潞党主产山西，多为栽培品。野生于山西五台山等地者称野台党。晒干、切片或切段，生用或炒用。

本品甘平和缓，入脾、肺二经。为常用补中益气药，善能补脾养胃、健运中气，具有补脾不燥，养胃不腻的优点。既有补益脾肺之力，又有益气生血之功。故凡气虚神疲、食少倦怠、肺气不足、气短咳喘，以及血虚津伤等脾胃虚弱、气血两亏之证，用之最宜。正如《本草正义》云：党参力能补脾养胃，润肺生津，健运中气，本与人参不甚相远。其尤可贵者，则健脾运而不燥，滋胃阴而不湿，润肺而不犯寒凉，养血而不偏滋腻，鼓舞清阳，振动中气，而无刚燥之弊。本品补气作用与人参相似，一般补气血、健脾胃、扶正祛邪的方剂中，多以党参代替人参，惟补力薄弱缓慢，因此重证急证仍以人参为宜。

【临证应用】 党参用于中气不足，多与白术、茯苓、甘草同用；治肺气亏虚，气短喘咳、言语无力、声音低弱等证，常与黄芪、五味子等同用，以增强疗效。治热伤气津，气短口渴，可与麦冬、五味子同用，以增益气生津之功。治血虚萎黄，头晕心慌，常与熟地、当归等药同用。

【用量用法】 10—30 克，煎服。反藜芦，不可同用。

西洋参

【原文】 味苦甘凉。味厚气薄，补肺降火，生津液，除烦倦，虚而有火者相宜。出大西洋佛兰西，一名佛兰参。补性轻，降性重。

【讲解】 西洋参以补气养阴，清热生津为主要功效，阴虚火旺者最为适宜。为五加科多年生草本植物西洋参的根。别名花旗参。主产于美国、加拿大和法国。原支湿润切片，晒干，生用。

本品味苦、微甘，性寒。入心、肺、肾经。甘能补，苦主降，寒清热，能补气养阴，而善清肺火。适用于阴虚火旺、肺失清肃的喘咳痰血之证，借其补气养阴之功，可具有良好的生津止渴作用。对津液不足的口干舌燥及温热病气阴两伤，烦倦口渴等证皆常应用。惟本品性寒，能伤阳助湿，故中阳衰微而有寒湿者忌用。反藜芦。

【临证应用】 西洋参虽与人参有同样的补气作用，但因性寒滋润，以阴虚火旺为宜。故常用于阴虚火旺的咳嗽气喘，痰中带血之证，多与麦冬、知母、阿胶等养阴清肺化痰药同用。对一般的津液不足，口干舌燥者，单用水煎或含化即可生效。若热病见烦倦口渴，舌红少津，脉细数者，可配鲜生地、鲜石斛、麦冬等养阴清热药同用。本品与龙眼肉蒸服，能清肠止血，以治肠热便血。

【用量用法】 3-6克，另煎和服。

太子参

【原文】形细如参条，而补性不下大参，气味功用，均同人参。

【讲解】太子参功专补气生津，为清补之品。为石竹科多年生草本植物异叶假繁缕的根。又名孩儿参。原药洗净晒干，生用。

本品味甘微苦，性平。入脾、肺经。功能补脾益气，生津止渴，为清补之品，有类似人参的益气生津和补益脾胃的作用。但药力薄弱，须大剂量连续服用，方能取得较好的疗效。且偏于补益气阴，对气虚而兼阴亏证者尤为相宜。

【临证应用】太子参用于脾胃虚弱，食少体倦，可与黄芪、白术、白扁豆等同用。治肺气不足，汗多气短，咳喘之证，可与山药、五味子、麦冬等配伍。亦可用于热病后低热不退，或小儿夏季热等而见气阴两伤者，可配知母、地骨皮、青蒿、麦冬等同用。

【用量用法】10—30克，煎服。

黄芪

【原文】甘温。生用固表，无汗能发，有汗能止，朱丹溪曰：黄芪大补，阳虚自汗，若表虚有邪，汗不出者，服此又能自汗。朱震亨，号丹溪，著《本草补遗》。温分肉，实腠理，泻阴火(1)，解肌热。炙用补中，益元气，温三焦，壮脾胃。脾胃一虚，土不能生金，则肺气先绝，脾胃缓和则肺气旺而肌表固实，补中即所以固表也。生血生肌，气能生血，血充则肉长。经曰：血生肉。排脓内托(2)，疮痈圣药。毒气化则成脓，补气故能内托。痈疽不能成脓者，死不治，毒气盛而元气衰也。痘证亦然。痘证不起，阳虚无热者宜之。新安汪机治痘证虚寒不起，用四君子汤加黄芪、紫草多效。间有枯萎而死者，自咎用药之不精，思之至忘寝食。忽悟曰：白术燥湿，茯苓渗水，宜痘浆之不行也。乃减去二味，加官桂、糯米以助其力，因名保元汤。人参、白术、茯苓、甘草，名四君子汤。王好古曰：黄芪实卫气，是表药；益脾胃，是中州药；治伤寒尺脉不至，补肾元，是里药。甄权谓其补肾者，气为水母也。《日华》谓其止崩带者，气盛则无陷下之忧也。《蒙茎》曰：补气药多，补血药亦从而补气；补血药多，补气药亦从而补血。益气汤虽加当归，因势寡，功被参芪所据；补血汤数倍于当归，亦从当归所引而补血。黄芪一两，当归二钱，名补血汤。气药多而云补血者，气能生血，又有当归为引也。表旺者不宜用，阴虚者宜少用，恐升气于表，而里愈虚矣。汪机，号石山，著《本草会辑》。王好古，号海藏，著《汤液本草》。甄权，著《药性论》。陈日华，著《大明本草》。陈嘉谟，著《本草蒙茎》。为补药之长，故名耆。俗作芪。皮黄肉白，坚实者良。入补中药槌扁，蜜炙；达表生用。或曰：补肾及治崩带淋浊，宜盐水浸炒。昂按：此说非也。前证用黄芪，非欲抑黄芪使入肾也，取其补中升气，则肾受荫，而带浊崩淋自止，即日华所谓气盛自无陷下之忧也。有上病而下取，有下病而上取，补彼经而益及此经者，此类是也。茯苓为使。恶龟甲、白鲜皮。畏防风。李东垣曰：黄芪得防风，其功益大，乃相畏而更以相使也。李东垣著《用药法象》。

【讲解】(1) 泻阴火：阴火指肝肾的虚火。泻阴火即能除肝肾虚热。
(2) 内托：用内服药治疗疮疡的三大治法之一。即运用补益气血的药物，扶助正气，托毒外出，以免毒邪内陷的方法。

黄芪生用固表止汗、利水退肿、托疮生肌，炙用益气生血、升阳举陷，为补气要药。为豆科多年生草本植物黄芪和内蒙黄芪的根。本

品药材品种繁多，形态不一，以柔软，根皮黄色，心黄白，折断面呈纤维状，味甜、肥壮丰满者为佳。生用或蜜炙用。

芪，本作“耆”。李时珍曰：耆，长也。黄芪色黄，为补药之长，故而得名，

本品甘温，归脾、肺经。补脾益气之中，并能升举阳气，且能外达肌表，固护卫阳，故有补气升阳、益卫固表的作用；藉补气之力还可生血；鼓舞正气可以托毒生肌；温运阳气可以利水消肿。故凡属脾肺不足、气虚衰弱、自汗盗汗、疮痈内陷、小便不利、皮肤水肿及血虚津亏等证，皆有良效。

唯本品功偏温补，易于助火、恋邪，故凡外有表邪，内有积滞、气郁湿阻、热毒疮疡以及阴虚等证，皆不宜用。

【临证应用】 黄芪为补气要药，治疗病后气虚体弱，常与人参配伍，加强补气作用。若脾气虚弱，食少便溏，又可配白术等以补气健脾。如配当归，能补气生血，可治气虚血亏。又因其具有升阳作用，可用于中气下陷的久泻脱肛、子宫下垂，如补中益气汤即黄芪配伍党参、升麻、柴胡等补气升阳药。如气虚不能摄血而致便血、崩漏等出血证，可配当归、人参伍用。用于表虚不固的自汗，配防风、白术，以补益卫外之阳气，即玉屏风散；配麻黄根、浮小麦、牡蛎为固表敛汗之剂，即牡蛎散。用黄芪托毒生肌，治疗气血不足，疮痈内陷，或痈疽不溃及溃后久不收口者，配人参、当归、桂心等以生肌敛疮，如托毒黄芪汤。对于气虚失运，水湿停聚的面目四肢浮肿、小便不利，多配茯苓、白术等同用，如防己黄芪汤、防己茯苓汤等可收补气利水之功。

此外，本品配当归、川芎、桃仁、红花等活血祛瘀药，可用于气虚血滞引起的肢体麻木、关节痹痛或半身不遂等证，如补阳还五汤。治气虚津亏的消渴证，则多与生地、麦冬、天花粉等养阴生津药同用，黄芪可益气生津。

【用量用法】 10—30 克，大剂量可用30—60 克，煎服。生用，偏于走表，故固表止汗、利水消肿、托疮生肌多生用，炙黄芪偏于走里，

故补气升阳多灸用。

电子版注：

1、原书“以补益口外之阳气”有误，改为“以补益卫外之阳气”，电子版已改

白术

【原文】 苦燥湿，经曰：脾苦湿，急食苦以燥之。甘补脾，温和中。在血补血，在气补气。同血药则补血，同气药则补气。无汗能发，有汗能止。湿从汗出，湿去汗止。止汗同芪芍之类，发汗加辛散之味。燥湿则能利小便，生津液，既燥湿而又生津何也？汪机曰：脾恶湿，湿胜则气不得施化，津何由生？用白术以除其湿，则气得周流，而津液生矣。止泄泻，凡水泻湿也，腹痛肠鸣而泻火也。水火相激则肠鸣。痛甚而泻，泻而痛减者食也；完谷不化，气虚也；在伤寒下利，则为邪热不杀谷也。久泻名脾泄，肾虚而命火衰，不能生土也。有积痰壅滞，肺气不能下降，大肠虚而作泻者宜豁痰；有伤风泄泻者宜散风；如脾虚湿泻者宜白术。凡治泻，丸散优于汤剂。消痰水肿满，黄疸湿痹；补脾则能进饮食，祛劳倦，脾主四肢，虚则倦怠。止肌热，脾主肌肉。化癥癖；同枳实则消痞，一消一补，名枳术丸。荷叶烧饭为丸，脾运则积化也。和中则能已呕吐，定痛安胎。同黄芩则安胎。黄芩除胃热，白术补脾，亦除胃热，和腰脐间血。盖胎气系于脾，脾虚则蒂无所附，故易落。和腰脐间血者，湿除则血气流行也。血燥无湿者禁用。能生脓作痛，溃疡忌之。补气故也，凡胀满者忌用。白术闭气，然亦有塞因塞用者。肥白者出浙地，名云头术。燥白者出宣歙，名狗头术，差胜于浙。用糯米泔浸，借谷气以和脾。陈壁土炒，藉土气以助脾。或蜜水炒，人乳拌用。润以制其燥。《千金方》曰：有人病牙齿长出口，艰于饮食者，名髓溢，单用白术愈。

【讲解】 白术以健脾燥湿为主要功效，是培补脾胃之要药。为菊科多年生草本植物白术的根茎。主要产于浙江、湖北、江西等，浙江于潜地区的野生者称“于术”，气极清香，向为珍品。但今几乎绝见。生用，炒用或炒焦用。

本品甘苦性温，甘温可补中，味苦可燥湿，气味芳香，专入脾胃中焦，故有补气健脾，燥湿利水，止汗安胎之功，尤为培补脾胃之要药。但补气作用较弱，则燥湿之性颇强，温补脾阳更为适宜。如脾阳不振，运化失职，水湿不化而成的痞满、泄泻、痰饮、水肿等证都可应用。脾虚气弱之肌表不固自汗、妊娠足肿、胎动不安，也可通过补脾而徐以治疗。然本品性偏温燥，能耗伤阴液，只宜于中焦有湿之证，如属阴虚内热、口唇干燥、津液不足者不得使用。

本品性燥，用时经水或米泔水浸软切片入药，生用燥湿利水之力较强。炒用又有麸炒、土炒，炒焦之不同。麸炒，即同麸皮拌炒至淡黄色，又称炙白术，借麸入中焦，功偏健脾和胃；土炒，即用伏龙肝细粉炒至外面挂有土色时取出，借土气助脾，增强健脾止泻之力。白术炒焦，称焦白术，减其燥性，具有助消化开胃之功。

【临证应用】白术为补气健脾的要药。临床广泛应用。治脾胃虚弱，脘腹胀满，食欲不振，泄泻等，常与人参、茯苓、炙甘草同用，如四君子汤，补中益气汤，理中汤等补脾益气方中皆用之。脾胃虚而有积滞，脘腹痞满，用白术配枳实，即枳术丸，以攻补兼施。治中阳不足、水湿停运而导致的水肿痰饮，白术亦为良药。常配茯苓皮、大腹皮、陈皮等治水肿、妊娠足肿。配桂枝、茯苓等又治痰饮。既能补益脾阳，又可燥湿利水。

此外，本品尚可配黄芪等药以固表止汗；配黄芩以清热安胎，治胎动不安而有内热者。若兼气滞而胸腹胀满者，可与苏梗、砂仁、香附等理气药同用。若胎元不固，腰痠腹痛者，多与杜仲、川断、阿胶等同用，以增强固冲任以保胎作用。

【用量用法】 5—15 克，煎服。燥湿利水宜生用，补气健脾宜炒用，健脾止泻宜炒焦用。

山药

【原文】 色白入肺，味甘归脾，入脾肺二经。补其不足， 清其虚热， 阴不足则内热，补阴故能清热。固肠胃，润皮毛， 化痰涎，止泻痢。渗湿故化痰止泻。《百一方》：山药半生半炒，米饮下，治噤口痢。肺为肾母， 故又益肾强阴，治虚损劳伤， 王履云：八味丸用之以强阴。脾为心子，故又益心气，子能令母实。治健忘遗精。 昂按：山药性涩，故治遗精泄泻，而诸家俱未言涩。生捣敷痈疮， 消肿硬。山药能消热肿，盖补其气，则邪滞自行。朱丹溪曰：补阳气生者，能消肿硬是也。色白而坚者入药。

【讲解】 山药既补脾气，又益脾阴，并补肺肾，且兼涩性。为薯蓣科多年生蔓生草本植物薯蓣的块根。产于河南怀庆（新乡地区）者为佳，称为怀山药。霜降后采挖，洗净刮去粗皮，晒干或烘干，为毛山药；选粗大的毛山药，用清水浸软，搓揉成圆柱状，晒干、磨光，为光山药。以质坚实，粉性足，色洁白者为佳。切片，生用或炒用。

本品味甘性平。入脾、肺、肾三经。作用和缓，不寒不燥，既能补气，又能养阴，补而不滞，养阴不腻，为平补脾胃常用之品，故无论脾阳虚或脾阴虚，皆可应用。又能补益肺肾，并兼涩性，故又有益肺止咳、固肾涩精之功。对脾虚泄泻，肺虚喘咳，肾虚遗精，带下，尿频以及消渴等证，均有良效。本品性较和平，用量宜大，少则不易见功，惟脾虚湿盛，中满而有积滞者不宜应用。

【临证应用】 山药善能补脾，且性涩而止泻，用于脾虚食少、泄泻，常与人参、白术、茯苓等同用，如参苓白术散。本品既补肺气，又益脾阴，对肺虚久咳或虚喘之证，可单用，或与麦冬、五味子等配伍。治肾虚遗精常与熟地、山萸肉等同用，如六味地黄丸。若与益智仁、乌药同用，即缩泉丸，可治肾虚尿频遗尿。治妇女带下，湿热所致者，多与车前子、黄柏等配伍，如易黄汤。肾虚不固者，多配伍熟地、山萸肉、菟丝子、五味子等补肾收敛药。山药亦为治消渴要药，可大盘（250克）煮食或煎汤代茶，也可配黄芪、葛根、知母、天花粉等，如玉液汤。

【用量用法】10—30 克，煎服。大量60—250 克。补阴宜生用，健脾止泻宜炒黄用。

白扁豆

【原文】甘温，色白微黄，脾之谷也。调脾暖胃，通利三焦，降浊升清，消暑除湿，能消脾胃之暑。止渴止泻，专治中宫之病。土强湿去，正气自旺。解酒毒、河豚毒。《备急方》：新汲水调末服，能解砒毒。多食壅气。子粗圆色白者入药。连皮炒研用，亦有浸去皮及生用者。熟用补脾，生用清肺。

【讲解】白扁豆功专健脾化湿，兼能消暑。为豆科一年生缠绕草本植物扁豆的种子。生用或炒用。亦有除去种皮后晒干入药者。种皮即扁豆衣，亦入药用。

本品味甘、性微温。入脾、胃经。甘温补脾而不滋腻，芳香化湿而不燥烈，故为健脾化湿之良药，兼能消暑。故凡脾虚有湿之泄泻或妇女带下以及暑湿吐泻等，皆常用之。对病后初进补剂，用本品亦较适宜，因能调养正气而无壅滞之弊。

【临证应用】白扁豆用于脾虚有湿、体倦乏力、食少便溏或泄泻以及妇女带下等证，多与白术、山药、茯苓等健脾药同用，如参苓白术散；亦可单用炒研为末，每服10克，治赤白带下。用于夏伤暑湿的吐泻腹痛之证，可单用，水煎服，或与香薷、厚朴等祛暑化湿药配伍，如香薷饮。此外本品用于酒精、鱼蟹、河豚鱼等中毒引起的吐泻腹痛，可单用生研为末，每次10克，凉开水送服。

【用量用法】10—20克，煎服。治暑湿、解毒宜生用，健脾止泻宜炒用。

附：扁豆衣 功效与扁豆相同，但药力较差，多用于暑湿吐泻及脚气浮肿等证。用量5—10克。

甘草

【原文】味甘。生用气平，补脾胃不足而泻心火；火急甚者、必以此缓之。炙用气温，补三焦元气而散表寒。入和剂则补益，入汗剂则解肌，解退肌表之热。入凉剂则泻邪热，白虎汤、泻心汤之类。入峻剂则缓正气，姜附加之，恐其僭上，硝黄加之，恐其峻下，皆缓之意。入润剂则养阴血，炙甘草汤之类。能协和诸药，使之不争。生肌止痛，土主肌肉，甘能缓痛。通行十二经，解百药毒，凡解毒药，并须冷饮，热则不效。小儿初生，拭去口中恶血，绵渍汁令啞之，能解胎毒。故有国老之称。中满证忌之。甘令人满，亦有生用为泻者，以其能引诸药至于满所。经云：以甘补之，以甘泻之是已。故《别录》甄权并云除满，脾健运则满除也。仲景治痞满，有甘草泻心汤，又甘草得茯苓，则不资满，而反泻满。陶弘景著《名医别录》，发明药性。大而结者良。补中炙用，泻火生用，达茎中肾茎。用梢。梢止茎中痛，淋浊证用之。白术、苦参、干漆为使。恶远志。反大戟、芫花、甘遂、海藻，然亦有并用者。胡洽治痰癖，十枣汤加甘草，东垣治结实，与海藻同用，丹溪治劳瘵，莲心饮与芫花同行。非妙达精微者，不知此理。十枣汤：芫花、甘遂、大戟等分，枣十枚，仲景治伤寒表已解，心下有水气，喘咳之剂。李时珍曰：甘草外赤中黄，色兼坤离，味浓气薄，资全土德，协和群品。有元老之功，普治百邪，得主道之化，赞帝力而人不知，参神功而已不与，可谓药中之良相也。昂按：甘草之功用如是，故仲景有甘草汤、甘草芍药汤、甘草茯苓汤、炙甘草汤，以及桂枝、麻黄、葛根、青龙、理中、四君、调胃、建中、柴胡、白虎等汤，无不重用甘草，赞助成功。即如后人益气补中、泻火解毒诸剂，皆倚甘草为君，必须重用，方能建效，此古法也。奈何时师每用甘草，不过二三分而止，不知始自何人，相习成风，牢不可破，殊属可笑。附记于此，以正其失。

【讲解】甘草具有补气、缓急、泻火解毒、调和药性等作用，应用极为广泛。为豆科多年生草本植物甘草的根及根茎。生用或蜜炙用。

本品味甘性平，蜜炙用性微温，归心、肺、脾、胃经。甘温能补脾益气，润肺止咳，治脾胃虚弱，肺虚咳喘等证；生用则性凉，能清热解毒而生肌，治疮疡肿毒，并治咽喉肿痛；其甘缓之性，又能缓急止痛，治脘腹、四肢挛急作痛。此外，调和诸药，同热药用之可缓其热，同寒药用之可缓其寒，能使补而不致于骤，泻而不致于速。是一味既重要又普通的药物，应用极为广泛，故有通行十二经之称，还善

解百药毒，有安国定邦之功，故有国老之称。如甄权云：诸药中甘草为君，治七十二种乳石毒，解一千二百般草木毒，调和众药有功，故有国老之号。然甘缓助湿壅气，令人中满，故湿盛而胸腹胀满及呕吐者忌服。

【临证应用】甘草在众多方剂中经常使用，不仅作为辅助之用，本身也确具有一定的功效。如治脾胃虚弱，气短乏力，食少便溏，多配伍人参、白术、茯苓等，如四君子汤。以本品补心气，振心阳，常用的炙甘草汤，即以炙甘草为主，配阿胶、生地、麦冬、桂枝等，治脉结代，心动悸之证。甘草在治疗咳嗽、喘息方面多与他药配成复方，如与麻黄、杏仁配伍治风寒喘咳的三拗汤，与麻黄、石膏、杏仁配伍的治肺有郁热喘咳的麻杏石甘汤。其他止嗽方中亦多用之。

脘腹或四肢挛急作痛，用甘草甘以缓之，与芍药配伍，即芍药甘草汤，是缓急止痛常用之方。

甘草对于疮疡肿毒，内服、外用均可，如配桔梗即甘草桔梗汤，祛痰利咽，治咽痛；配银花，即银花甘草汤治痈肿发热。至于食物、药物、农药中毒，甘草都有一定的解毒作用，轻者可单用煎汤服；或与绿豆同用，以增强解毒之效。

此外，本品之缓和药性，调和百药的功效较为突出。如与附子、干姜同用，能缓和附子、干姜辛温燥烈之性，以防伤阴，与石膏、知母同用，能缓和石膏、知母之寒，以防伤胃，与大黄、芒硝同用，能缓和与芒硝的泻下作用，使泻而不速；与人参、白术、熟地、当归等补药同用，能缓和补力，使作用缓慢而持久；与半夏、干姜、黄连、黄芩等热药寒药等同用，又能起协调作用。

药用之甘草梢即甘草根的末梢部分或细根。主治湿热下注膀胱的茎中疼痛，如导赤散即生甘草梢与生地、木通、竹叶组成，以治小便短赤，尿道刺痛之证。

【用量用法】2—10克，煎服。清火解毒宜生用，补中缓急宜炙用。传统认为本品反大戟、芫花、海藻、甘遂，古今虽也有同用之例，但仍

在探讨之中，不能轻易妄用。近年来研究报道，甘草长期大剂量单独服用会引起水肿、血压升高等现象，应予以注意。

大枣

【原文】甘温。脾经血分药。补中益气、滋脾土、润心肺、调营卫、缓阴血、生津液、悦颜色、通九窍、助十二经、和百药。伤寒及补剂加用之，以发脾胃升腾之气。多食损齿，齿属肾，土克水。中满证忌之。甘令人满。大建中汤心下痞者，减饴，枣与甘草同例。成无己曰：仲景治奔豚用大枣者，滋脾土以平肾气也。治水饮胁痛，有十枣汤，益脾土以胜妄水也。北产肥润者良。昂按：金华南枣，更胜于北，徽宁所产，亦有佳者。杀乌附毒。忌葱鱼同食。

【讲解】大枣功专补脾益气，养血安神，并能缓和药性。为鼠李科落叶灌木或小乔木植物枣树的成熟果实，又名红枣。主产于河南、河北、山东、陕西等省。秋季果实成熟时采收，晒干，生用。

本品味甘，性温。入脾、胃经。甘润性缓，既能补脾生血，又可益气生津，并能养心安神。故常用于中气不足，脾胃虚弱，以及血虚萎黄，妇女脏躁等证。此外，常配伍峻烈药同用，既可缓和诸药峻烈之性，使攻邪不至于伤正，又可补养脾胃，防止攻逐太过之弊。但甘温滋润之品易助湿生热，令人中满，故湿盛脘腹胀满、食积、虫积、龋齿作痛，以及痰热咳嗽等，均应忌用。

【临证应用】大枣用于脾胃虚弱体倦乏力、食少便溏，常与党参、白术等补气药同用，以增加疗效。治血虚萎黄，多与熟地、当归等补血药同用。妇女脏躁，多与甘草、小麦同用，如甘麦大枣汤。若与酸枣仁、远志等同用，可治虚烦失眠。近年单用本品，大剂量(250克—500克)煎汤内服，治血小板减少证及过敏性紫癜，均取得较好的疗效。本品与葶苈子配伍，即葶苈大枣泻肺汤，能泻肺平喘而不伤肺气，与大戟、甘遂、芫花同用，即十枣汤，能逐水祛痰而不伤脾胃；本品又常与生姜配伍，生姜得大枣，可缓和辛辣之性，大枣得生姜，可防止气壅致胀之偏，二者配合，取辛甘发散之力，以调和营卫，既能防止汗多伤营，又能增加食欲，促进药力的吸收，以提高滋补效能。

【用量用法】3—12枚，或10—30克，煎服。用于丸剂当去皮核捣烂，剂量随方配用。

第二节补阳药

凡能补助人体阳气，治疗阳虚证的药物，称为补阳药，又称助阳药。

阳虚证包括心阳虚、脾阳虚、肾阳虚等。肾为元阳所在，对人体脏腑有温煦生化的作用，为先天之本，所以阳虚诸证往往与肾阳虚有十分密切的关系。补阳药也大多是补肾阳的药物，因此本节着重介绍补助肾阳之品。至于振心阳、温脾阳的药物大多在洞里药等章节中叙述。

肾藏精，主骨，所以补阳药除壮肾阳外，还具有补精髓，强筋骨的作用。故除用于肾阳虚的主要证状，如畏寒肢冷，腰膝酸软或冷痛，阳痿早泄，宫寒不孕，白带清稀，夜尿增多，舌淡脉沉等证外，又可用于精髓不足的头晕耳鸣，不孕不育，或筋骨不健的痿软无力，小儿行迟，齿迟等病证。此外，由于肾阳衰微，不能温运脾胃引起的泄泻；肾主纳气，为气，之根，肾阳不足，摄纳无权，引起的喘促，均可使用。故有些补肾阳药又可用于脾肾两虚的泄泻和肺肾两虚的气喘。

补阳药性多温燥，易伤阴助火，故阴虚火旺者不宜使用。

鹿茸

【原文】甘温一云咸热。纯阳，生精补髓，养血助阳，强筋健骨。治腰肾虚冷，《百一方》：鹿角屑熬黄为末，酒服，主腰脊虚冷刺痛，四肢酸痛，头眩眼黑，崩带遗精，一切虚损劳伤，惟脉沉细相火衰者宜之，鹿角初生，长二三寸，分歧如鞍，红如玛瑙，破之如朽木者良。太嫩者，血气未足，无力。酥涂微炙用，不酥涂则伤茸，或酒炙。不可嗅之，有虫恐入鼻颞。猎人得鹿，縶之取茸，然后毙鹿，以血未散故也。最难得不破未出血者。沈存中《笔谈》云：凡含血之物，血易长，筋次之，骨最难长。故人二十岁，骨髓方坚。麋鹿角无两月长至二十余斤，凡骨之长，无速于此，草木亦不及之。头为诸阳之会，钟于茸角，岂与凡血比哉！鹿阳兽，喜居山；麋阴兽，喜居泽。麋似鹿，色青而大，皆性淫，一牡辄交十牝。麋补阴，鹿补阳，故冬至麋角解，夏至鹿角解也。麋、鹿茸角，罕能分别。雷敦曰：鹿角胜麋角。孟诜、苏恭、苏颂并云麋茸麋胶胜于鹿。李时珍曰：鹿补右肾精气，麋补左肾血液。

鹿角，咸温。生用则散热，行血，消肿，醋磨，涂肿毒；为末酒服，治所伤。《医余》曰：有疔疮赤肿而痛，用黄连凉药久不愈者，却当用温药，如鹿角灰、发灰、乳香之类，此阴阳寒暑往来之理也。辟邪，治梦与鬼交。酒服一撮，鬼精即出，能逐阳中邪气恶血。炼霜熬膏，则专于滋补。李时珍曰：鹿乃仙兽，纯阳多寿，能通督脉，又食良草，故其角肉食之，有益无损。鹿一名斑龙，西蜀道士尝贷斑龙丸，歌曰：尾闾不禁沧海竭，九转灵丹都漫说，惟有斑龙顶上珠，能补玉堂门下穴。盖用鹿茸与胶霜也。造胶霜法：取新角寸截，河水浸七日，刮净，桑火煮七日，入醋少许，取角捣成霜用。其汁加无灰酒熬成膏用，畏大黄。鹿峻，鹿相交之精也，设法取之，大补虚劳。

【讲解】鹿茸善能补肾阳，益精血，并能强筋健骨。为鹿科动物梅花鹿或马鹿的尚末骨化而带毛的幼角。夏秋两季雄鹿长出的新角尚末骨化时，将锯下，或用刀砍下，前者称锯茸，后者称为砍茸。商品又分花鹿茸（黄毛茸）和马鹿茸（青毛茸）二种。花鹿茸以粗大，顶端丰满，质嫩，毛细，皮色红棕，油润光亮者为佳。马鹿茸以茸体饱满，体轻，下部无棱绒，断面蜂窝状，组织致密，米黄色者为佳。用时擦去毛，刮净，黄酒浸润，切片，烘干入药，或取干燥鹿茸片，碾成细末用。

本品味甘咸，性温。可峻补肝肾。肾藏精主骨，肝藏血主筋，故为补肝肾、益精血、强筋骨之良药，并能补督脉而固冲任。故凡肾阳不足，精血亏虚以及冲任不固之证，皆可应用，疗效较佳。此外，对阴疽溃久脓清不敛者，亦有温补内托之功。但性温补阳，对阴虚阳亢，血分有热者，均应忌用。

【临证应用】 鹿茸用于肾阳不足，精血亏虚之畏寒肢冷，阳痿滑精，遗尿尿频，腰膝痠痛及宫冷不孕等证，可单用研末每次0.6—1 克，淫羊藿煎汤送服；也可配人参、熟地、枸杞子等补气养血益精药同用，以增强疗效，如参茸固本丸。治妇女阴虚血少，冲任不固，崩漏带下，可与阿胶、乌贼骨等同用，如鹿茸散。用于精亏血虚，腰膝痠痛，筋骨无力，精神疲倦或小儿发育不良，骨软行迟，囟门不合等证，多与熟地、山萸肉、山药、五加皮等同用，如加味地黄丸。用于疮疡久溃不敛，阴疽内陷不起等证，可配黄芪、当归等补气益血之品，以内托敛疮。近亦有用治心脏衰弱、心悸怔忡而见肾虚证者。

鹿茸温补肾阳虽与附、桂相似，但附、桂辛热刚燥，作用较速，补阳而善祛阴寒；鹿茸甘温柔润，作用较缓，补阳兼能生精。虽三药都能治肾阳不足之证，但附、桂只适用于肾阳衰微而不宜于精髓不足，鹿茸则皆可应用。

【用量用法】 1—3克，研细末，分三次服。 多入丸、散用。

附：鹿角 为各种雄鹿已成长骨化的角。味咸性温，入肝、肾经。功能补肾助阳，强筋健骨，可作鹿茸之代用品，但药力薄弱。主活血散瘀消肿，可治疮疡肿毒，乳痈肿痛，内服或外敷均可。用量5—10克，水煎或研末服。外用适量，磨汁涂或研末敷。以虚寒证为宜。

鹿角胶 鹿角煎熬浓缩而成的胶状物。味甘咸，性温，入肝、肾经。功能补肝肾，益精血，功效虽不如鹿茸之峻，但较鹿角佳，并有良好的止血作用。适用于肾阳不足，精血亏虚，体弱消瘦及吐、衄、崩漏之偏于虚寒者，以及阴疽内陷等证。用量5—10 克，用开水或黄酒加温烊化服。

鹿角霜 系鹿角熬胶后所存的残渣。功用同鹿角，而力更弱，但不滋腻，且有收敛作用，具涩精、止血、敛疮之功。内服可治崩漏，带下，遗精；外用能止创伤出血及疮溃久不愈合之证。用量10—15克，煎服。外用适量。

麋茸 麋角 功用与鹿相仿，而温性差减。

麋茸为鹿科动物麋鹿的未骨化的带有茸毛的幼角，麋角系已骨化的老角。

本品功效与鹿茸和鹿角相同，主治亦无差异。《本草求真》谓麋、鹿虽分有二，然总不外填精补髓，强健筋骨，长养气血而为补肝肾要药也。

用量用法亦与鹿茸、鹿角同。

巴戟天

【原文】 甘辛微温，入肾经血分。强阴益精，治五劳七伤。辛温散风湿，治风气脚气水肿。根如连珠，击破中紫而鲜洁者伪也；中虽紫，微有白糝粉色、而理小暗者真也。蜀产佳。山茱根似巴戟，但色白，人或醋煮以乱之。去心，酒浸焙用。覆盆子为使。恶丹参。

【讲解】 巴戟天功专温补肾阳，兼能祛风除湿。为茜草科多年牛藤本植物巴戟天的根。根呈弯曲扁圆柱形，表面灰黄色，皮部呈鲜明淡紫色。以条大、肥壮、肉厚、色紫者为佳。主产于广东、广西、福建、四川等地。除去木质心，晒干切片生用或盐水炒用。

本品味辛甘性温。甘能补，辛温能散，专入肾经，故主温补肾阳，强壮筋骨，兼能祛风除湿。用于阳痿，尿频，宫冷不孕，月经不调，少腹冷痛，及肾阳不足兼有风湿之腰膝疼痛或软弱无力。本品性较柔润，具有温而不燥，补而不滞之长，对肾虚而兼风湿之腰膝痹痛者，颇为合适。温肾壮阳之品，只宜于虚寒之证，如阴虚阳亢则非所宜。

【临证应用】 巴戟天用于阳痿，不孕，可与人参、山药、覆盆子等同用。遗尿，小便不禁者，多与益智仁、桑螵蛸、菟丝子等配伍。若与高良姜、肉桂、吴茱萸等同用，则治月经不调，少腹冷痛。用于肾阳不足兼有风湿之腰膝疼痛，软弱无力，则多与卑藜、杜仲、牛膝、川断等同用，如金刚丸。

【用量用法】 10—15克，煎服。

肉苁蓉

【原文】甘酸咸温，入肾经血分。补命门相火，滋润五脏，益髓强筋，治五劳七伤，绝阳不兴，绝阴不产，腰膝冷痛，崩带遗精。峻补精血。李时珍曰：补而不峻，故有苁蓉之号。骤用恐妨心，滑大便。长大如臂，重至斤许，有松子鳞甲者良。酒浸一宿，刷去浮甲，劈破，除去筋膜，酒蒸半日，又酥炙用。忌铁。苏恭曰：今日所用，多草苁蓉，功力稍劣。

【讲解】肉苁蓉长于补阳，又善益阴，为阴阳平补之品。为列当科一年生寄生草本植物肉苁蓉的带鳞叶的肉质茎。又名大芸。呈圆柱形而稍扁，长10—30厘米，表面灰棕色或褐色，密被肥厚的肉质鳞片，呈覆瓦状排列，即书中所说的“有松子鳞甲”，肉质而带有油性，气香而微甜。主产于内蒙古、甘肃、新疆等地。春秋两季均可采收，春采后晒干为甜苁蓉，秋采入盐水中浸渍后为咸苁蓉，用时漂去盐渍，名淡苁蓉；用酒蒸制为酒苁蓉，晒干切片入药。

本品味甘咸，性温。入肾、大肠经。味甘能补，性温助阳，咸可入肾，为补肾壮阳要药，并能补益精血。以治五劳七伤，腰膝冷痛，崩带遗精。一般补阳药多燥，滋阴药多腻。惟苁蓉甘温质润，具有温而不燥，滋而不腻，既可补阳，又可益阴，补而不峻，药力较为缓和的特点，故有“从容”之称。本品质较油润，又有较好的润肠通便作用。但肾火旺盛，脾虚泄泻及实热便秘者均不宜用。

【临证应用】肉苁蓉用于肾虚精亏，肾阳不足之阳痿、早泄、遗精等，常与熟地、菟丝子、五味子等同用，如肉苁蓉丸。治妇女精血亏虚的不孕证，则与鹿角胶、当归、熟地、紫河车等补益精血药同用，以加强疗效。治腰膝冷痛、筋骨无力，可配巴戟天、杜仲、龟板等，如金刚丸。苁蓉用于润肠通便，则宜大剂量15—30克，煎汤服，或配火麻仁、沉香，即苁蓉润肠丸。治老人、体虚者肠燥津液枯之大便秘结，对习惯性便秘单用亦有良效。

【用量用法】10—20克，煎服。

锁阳

【原文】 甘温补阴，益精兴阳，润燥养筋。强筋故能兴阳。治痿弱，滑大便。便燥者啖之，可代苁蓉，煮粥弥佳。鳞甲栉比(1)，状类男阳。酥炙。

【讲解】 (1) 栉比：象梳子齿那样密密排着。

锁阳功同苁蓉，补益肝肾，润肠通便。性较温燥，助阳之力较大，其润肠之功不及苁蓉。为锁阳科肉质寄生植物锁阳的肉质茎。主产于内蒙古、甘肃、青海、新疆等省区。切片，生用。

本品味甘性温，入肝，肾，大肠经。功同苁蓉，能补肾壮阳，益精养血，润肠通便，可代苁蓉治肾阳不足，精血亏虚引起的阳痿、不孕。惟性较温燥，虽亦能兴阳益精，但不如苁蓉常用。其润肠之功，亦逊于苁蓉。

以本品能补肾润燥，养筋起痿，故对于肝肾不足，筋骨痿弱，行步艰难之证，用之较多。然肾虚火旺者不宜用。

【临证应用】锁阳用于阳萎、不孕，常与巴戟天、菟丝子、枸杞子等同用。治腰膝冷痛、筋骨痿弱无力，则多与熟地、牛膝、虎骨、龟版等养阴补血、强筋骨药同用，如虎潜丸。现临床用于各种瘫痪，如外周弛缓性瘫痪，周围神经炎，脊髓神经根炎，小儿麻痹后遗症等。治肠燥便秘，可与火麻仁、柏子仁、郁李仁等同用。

【用量用法】10—15 克，煎服。

淫羊藿

【原文】 辛香甘温，入肝肾。补命门， 李时珍曰：手足阳明三焦命门药。益精气， 坚筋骨， 利小便。治绝阳不兴，绝阴不产，冷风劳气，四肢不仁。手足麻木。北部有羊，一日百合，食此藿所致，故名。去枝，羊脂拌炒。山药为使。得酒良。

【讲解】淫羊藿以温肾壮阳为其主要功效，并兼能祛风除湿。为小蘗科多年生草本植物淫羊藿和箭叶淫羊藿，或心叶淫羊藿的全草。别名仙灵脾，产于陕西、四川、山西等地。生用或酥炒用。

本品味辛甘，性温。入肝、肾经。甘温能温肾壮阳，辛温可祛风除湿，所以既能内壮肾阳而强筋健骨，又能散风湿而通痹止痛。对肾阳不足，男子阳痿，女子宫冷，以及风寒痹痛之证，应用较多，效亦较好。但性较燥烈，易伤阴助火，故阴虚火旺、阳事易举者忌用。

【临证应用】 淫羊藿专补肾壮阳，用于肾阳虚衰引起的阳痿不举，腰膝无力，小便不禁及妇女不孕等证，可单用酒浸服，或配熟地、枸杞子、仙茅等补肾壮阳药同用，以加强疗效。用于风寒湿痹或肢体麻木，可配威灵仙、桂心等药同用。近年多用妇女更年期高血压及小儿麻痹后遗症，前者多与仙茅、巴戟天、黄柏、知母等同用，如二仙汤。后者多与桑寄生、黄芪、川牛膝等配伍，疗效满意。

【用量用法】10—15 克，煎服，也可浸酒，熬膏，或入丸散服。

仙茅

【原文】辛热，有小毒。助命火，益阳道，明耳目，补虚劳。治失溺无子，心腹冷气不能食，温胃。腰脚冷痹不能行。暖筋骨。相火盛者忌服。叶如茅而略阔，根如小指，黄白多涎。竹刀去皮切，糯米泔浸，去赤汁，出毒用。忌铁。唐婆罗门始进此方，当时盛传，服之多效。照前制，阴干，蜜丸，酒服，禁牛乳牛肉。许真君书曰：“甘能养肉，辛能养节，苦能养气，咸能养骨，酸能养筋，滑能养肤。和苦酒服之必效也”。

【讲解】仙茅辛热性猛，为温补肾阳之专药。为石蒜科多年生草本植物仙茅的根茎。其根茎延长，可达30厘米，圆柱状，肉质外皮褐色，其叶3-6片根出，狭披针形，长10—25厘米，绿白色，米泔水浸泡切片生用。

本品辛热性猛，有毒。入肾经。为温补肾阳专药。能补命门而兴阳道，除寒湿而暖腰膝，故多用于肾虚阳痿无子，火衰精寒，小便不禁，以及腰膝冷痹等证。《本草求真》说：此与附、桂、硫黄、胡巴、破故纸、淫羊藿、蛇床子、远志同为一例，但附子则能以除火衰寒厥，肉桂则能以通血分寒滞，胡巴则能以除火衰寒疝，淫羊藿则能以理火衰肾泻，远志则能以除火衰怔忡，虽其所补则同，而效各有攸建，未可云其补火，而不分其主治于其中也。本品虽能壮阳，是治阳痿有效之品，但辛热有毒，只宜暂用，不可久服。若阴虚火盛或肾火易动者，更不可用。

【临证应用】仙茅用于阳痿精冷，小便不禁，常同淫羊藿、菟丝子、五味子伍用，以收补肾固涩之功。本品又可温补脾阳，治疗纳呆腹泻，心腹冷痛等证，常与补骨脂、肉豆蔻、白术等伍用。治疗肾阳不足、筋骨不健之腰膝冷痛，寒湿痹痛，拘挛等证可与淫羊藿、杜仲、桑寄生及巴戟天、独活、川芎等伍用。

【用量用法】3—10克。水煎服。

菟丝子

【原文】甘辛和平，凝正阳之气，入足三阴，脾、肝、肾。强阴益精。温而不燥，不助相火。治五劳七伤，精寒淋沥，口苦燥渴。脾虚肾燥而生内热，菟丝益阴清热。祛风明目，补卫气，助筋脉，益气力，肥健人。补肝肾之效。《老学庵笔记》予族弟少服菟丝子，凡数年，饮食倍常，血气充盛，忽因浴见背肿，随视随长，乃大疽也。适值金银花开，饮至数斤，肿遂消。菟丝过服，尚能作疽，以此知金石药不可不戒。昂按：此人或感他毒，未可尽归咎于菟丝也。无根，蔓延草上，子黄如黍粒。得酒良。淘去泥沙，酒浸一宿，曝干捣末。山药为使。

【讲解】菟丝子既能补阳，又能益阴，为平补肝肾之良药。为旋花科一年生寄生性蔓草菟丝子或大菟丝子的成熟种子。生用，或煮熟捣烂作饼用。

菟丝子味辛甘，性平，质润。入肝、肾经。不温不燥，也不滋腻，既能补阳又能益阴。虽阳虚、阴虚都可应用，但仍偏于补阳，多用于肾阳不足之证；且能固精缩尿，以治滑精，小便频数，白带过多等。又有补肝明目作用，治疗视力减退，目暗，目眩等。并能补脾止泻，用于脾虚便溏或泄泻。还可用于肝肾虚弱、胎元不固，以及阴亏消渴等证。应用较广，但各有所宜，正如《本草汇言》云：“菟丝子，补肾养肝，温脾助胃之药也。但补而不峻，温而不燥，故入肾经。虚可以补、实可以利、寒可以温、热可以凉、温可以燥、燥可以润。非若黄柏、知母，苦寒而不温，有泻肾经之气；非若肉桂、益智，辛热而不凉，有动肾经之温者比也。”

【临证应用】菟丝子用于肾虚阳萎，滑精，早泄，小便频数及肾虚腰痛，白带过多等证，常与枸杞子、覆盆子、五味子等配伍，如五子衍宗丸。治肾虚腰痛则多与杜仲、补骨脂等配伍，若与山药、莲子、茯苓等配伍，可治遗精带下或尿有余沥等，如茯菟丹。用于肝肾不足，目暗不明，可与地黄、车前子配伍，如驻景丸。至于用治脾虚泄泻，则多配黄芪、党参、白术、山药等益气健脾药同用，增强止泻之功。与续断、桑寄生、阿胶等配伍，即寿胎丸，治胎漏下血，胎动不安。

【用量用法】10—15克，煎服。本品仍偏补阳，故阴虚火旺，大便燥结，小便短赤者亦不宜服。

蒺藜子

【原文】

苦温补肾，辛温泻肺气而散肝风，益精明目。肝以散为补，凡补肝药，皆能明目。治虚劳腰痛，遗精带下，咳逆肺痿，乳闭癥瘕，痔漏阴瘡。音颓。肾肝肺三经之病，催生堕胎。刺蒺藜主恶血，故能破癥下胎。

沙苑蒺藜 绿色似肾。 故补肾。炒用。亦可代茶。

刺蒺藜 三角有刺。去刺，酒拌蒸。风家宜刺蒺藜，补肾则沙苑者为优。余功略同。《瑞竹堂方》：齿牙打动者，蒺藜根烧灰敷之。

【讲解】

蒺藜子有二种：一为沙苑蒺藜，专补肝肾，固精缩尿，一为刺蒺藜，功能疏肝开郁，祛风明目。一补一散，差异较大，切不可混。沙苑子，为豆科一年生草本植物扁茎黄芪的成熟种子。呈肾状形而稍扁，表面灰褐色或绿褐色光滑，别名沙苑子、潼蒺藜。刺蒺藜为蒺藜科一年生或多年生草本植物蒺藜的果实，又名白蒺藜。果实由五个小果聚合而成，小果表面呈绿色或灰白色，背部隆起，有许多网纹及小刺，并有一对长刺和短刺。全国各地均产。生用或盐水炒用。

沙苑蒺藜甘温，性涩。入肝、肾经。功专补肾，固精缩尿，并能明目，用于肾虚腰痛，阳萎遗精，遗尿尿频，白带过多。还能用于肝肾不足之目暗不明，头昏目花。温补固涩之品，阴虚火旺及小便不利者忌用。

刺蒺藜苦辛，性平。辛能发散，苦能降泄，入肝、肺经。能升能降，能疏能补，功能平肝疏肝，祛风明目。适用于肝阳或风邪所致的头痛眩晕，目赤多泪，风疹瘙痒以及肝气郁结之胸胁胀满，乳闭不通等证。至于书载治咳逆肺痿、乳闭癥瘕，难产等，有破癥下胎作用，现临床少用。

【临证应用】

沙苑蒺藜之功效与菟丝子相近，主治病证亦相类似，也是一味平补肝肾之药。主治肾虚腰痛，可单用或配杜仲、补骨脂等。若与煅龙骨、莲须、芡实等固肾涩精药同用，可治遗精，滑精，小便不禁，白带过多等，如金锁固精丸。与滋补肝肾药熟地、枸杞子、菊花、菟丝子等同用，治肝肾亏虚之头昏目花之证，有良效。

刺蒺藜用于肝阳上亢的头痛眩晕，常与钩藤、珍珠母、天麻等同用。若系风邪所致者，则多与桑叶、菊花、决明子等配伍，如白蒺藜散，益增祛风热明目之功，以治风热上袭之目赤多泪之证。借其祛风之功，以起止痒之效，与蝉蜕、荆芥等同用，可治风疹瘙痒。肝气郁结之胸胁不舒、乳汁不下，可与疏肝理气药柴胡、香附、郁金、穿山甲等同用。

以上二药系两种植物，形态不同，作用有别。但沙苑蒺藜，在古代文献中也有称为白蒺藜的，如《本草衍义》上说：蒺藜有两种，一是杜蒺藜，即今之道旁布地而生者，开小黄花，结芒刺；一是白蒺藜，出同州牧马处，于如羊内肾，大如黍粒，补肾药，今人多用，风家多用刺蒺藜也。这里所说的白蒺藜，即现在的沙苑蒺藜。因此，宋、明文献中记载的一些补肾药方中所用的白蒺藜，其实是沙苑蒺藜，而不是刺蒺藜。

二药虽同治目疾，但功效不同，主治有别。刺蒺藜善于散风热，故宜于风热所致的目赤多泪，而沙苑蒺藜长于补肝肾，故适宜于肝肾不足的目暗不明，刺蒺藜无补益作用，宜加区别。

【用量用法】

沙苑蒺藜10—20克；刺蒺藜6—15克，煎服。

破故纸

【原文】 辛苦大温。入心包、命门，补相火以通君火，暖丹田，壮元阳，缩小便。亦治遗尿。治五劳七伤，五脏之劳，七情之伤，腰膝冷痛，肾冷精流，肾虚泄泻，肾虚则命门火衰，不能熏蒸脾胃，脾胃虚寒，迟于运化，致饮食减少，腹胀肠鸣，呕涎泄泻，如鼎釜之下无火，物终不熟，故补命门相火，即所以补脾。破故纸四两，五味三两，肉苁二两，吴茱一两，姜煮枣丸，名四神丸，治五更肾泻，妇人血气，妇人之血脱气陷，亦犹男子之肾冷精流。堕胎。出南番者色赤，岭南者色绿。酒浸蒸用，亦有童便乳浸，盐水炒者。得胡桃、胡麻良。恶甘草。唐郑相国方：破故纸十两，酒浸蒸为末，胡桃肉二十两，去皮烂研，蜜和，每日酒调一匙，或水调服。白飞霞曰：破故纸属火，坚固元阳，胡桃属水，润燥养血，有水火相生之妙。忌芸苔、羊血。加杜仲，名青娥丸。芸苔，油菜也。

【讲解】 破故纸既能补肾壮阳，又可温脾止泻，且兼收敛固涩之性，为治脾肾阳虚及下元不固之要药。为豆科一年生草本植物补骨脂的果实，又名补骨脂。果实略似肾形，表面黑棕色，果皮薄与种皮不易分离。种仁一枚，淡棕色，富含油脂。以粒大、色黑、饱满、坚实者佳。主产于四川、河南、陕西、安徽等地。生用或盐水炒用。

本品味苦辛，性大温。入肾，脾经。以气为用，为补肾壮阳之要药。能壮阳以化阴寒，补肾以固下元，补命门火以温脾止泻，补肾气以纳气平喘。故凡肾阳不足，下元不固，脾肾阳虚之证，故皆为常用之品。惟性温燥，易伤阴液，故阴虚有火及大便燥结者忌用。

【临证应用】 补骨脂可用于肾虚阳痿，腰痛膝软。治阳萎可配菟丝子、胡桃、沉香等，如补骨脂丸。治腰膝冷痛或酸软无力，多与杜仲、胡桃等同用，如青娥丸。治肾气虚冷，小便无度，可配茴香用，如破故纸丸。治脾肾阳虚，五更泄泻，配肉豆蔻、五味子、吴茱萸，如四神丸。若与胡桃、蜂蜜等同用，可治虚寒喘咳。

【用量用法】 5—15 克，煎服，或入丸，散。

电子版注：

1、原文有“肾虚池泻”字样，应为“肾虚泄泻”，电子版已改

益智仁

【原文】 辛热。本脾药，兼入心肾，主君相二火。补心气、命门、三焦之不足，心为脾母，补火故能生土。能涩精固气，本草未载。又能开发郁结，使气宣通，味辛能散。温中进食，摄涎唾，胃冷则涎涌。缩小便。肾与膀胱相表里，益智辛温固肾。盐水炒，同乌药等分，酒煮，山药糊丸，名缩泉丸，盐汤下。治呕吐泄泻，客寒犯胃，冷气腹痛，崩带泄精。涩精固气，因热而崩浊者禁用。出岭南，形如枣核，用仁。

【讲解】 益智仁功能温脾摄涎，暖肾缩尿。主治脾肾虚寒之证。为姜科多年生草本植物益智仁的成熟果实。主产于广东及广西、云南、福建等地。夏季果实由绿色转红色时采收，晒干。砂炒后去壳取仁，盐水微炒用。

本品味辛性温，气香而涩。入脾、心、肾经。既能温脾散寒，开胃摄涎，以治脾胃受寒，腹痛吐泻，食少，多唾；又能益火暖肾，固精缩尿，以治肾气虚寒，遗精，遗尿，尿有余沥，夜尿增多等证。

其所治涎多自流，是脾虚不能摄涎所致，必无口干口苦的现象。其所治遗尿尿频，是肾虚不能固摄所致，并无尿痛尿急之证。《本草求真》谓：“此虽类于缩砂密，同为温胃，但缩砂密多有快滞之功，此则只有逐冷之力，不可不分别而审用耳”。然温燥之品，易于伤阴动火，故阴虚火旺及证属温热者忌用。

【临证应用】 益智仁用于脾肾虚寒，腹痛吐泻，多配党参、白术、干姜等同用，以增温脾散寒之功。用于中气虚寒，食少，唾液自流，常与党参、白术、陈皮等补脾健胃药同用，以增开胃摄涎之效。若与山药、乌药配伍，治肾气虚寒，遗精，遗尿，小便频数等证，如缩泉丸，增强固肾、缩尿作用。

【用量用法】 3—6 克，煎服。

杜仲

【原文】甘温能补，微辛能润。色紫入肝经气分，润肝燥，补肝虚。子能令母实，故兼补肾。肝充则筋健，肾充则骨强，能使筋骨相著。皮中有丝，有筋骨相著之象。治腰膝痠痛，经曰：腰者肾之府，转移不能，肾将惫矣。膝者筋之府，屈伸不能，筋将惫矣。一少年新娶，得脚软病，且痛甚，作脚气治不效。孙林曰：此肾虚也。用杜仲一两，半酒半水煎服，六日痊愈。按腰痛不已者，属肾虚；痛有定处，属死血；往来走痛，属痰；腰冷身重，遇寒即发，属寒湿；或痛或止，属湿热。而其原本本于肾虚，以腰者肾之府也。阴下湿痒，小便余沥，胎漏，怀孕沥血。胎坠。惯坠胎者，受孕一两月，用杜仲八两，糯米煎汤浸透，炒断丝，续断二两，酒浸，山药六两，为糊丸，或枣肉为丸，米饮下。二药大补肾气，托住胎元，则胎不坠。出汉中，厚润者良。去粗皮剉，或酥炙、酒炙、蜜炙、盐水炒、姜汁炒，断丝用。恶玄参。

【讲解】杜仲功专补益肝肾，强壮筋骨，并能安胎。

为杜仲科落叶乔木植物杜仲的树皮。树皮厚薄不一，以皮厚而大，糙皮刮净，外面黄棕色，内面黑褐色而光，折断时白丝多者为佳。主产于四川、云南、贵州、湖北等地。生用或盐水炒断丝用。

杜仲味甘，性温。入肝、肾经。功能补益肝肾，肝主筋，肾主骨，肝充则筋健，肾充则骨强，故为治肝肾不足，腰膝酸痛，筋骨无力之要药。肝肾充实则胎元可固，所以又有安胎之功，可治肾虚腰酸，胎动不安及习惯性流产。对阳痿早泄及尿有余沥等也常应用，因由于肾虚阳衰所致。惟温补之品，阴虚火旺者不宜用。

【临证应用】杜仲用于肝肾不足，腰膝酸痛，萎软无力等证，常与补骨脂、胡桃仁等同用，如青娥丸，以补肝肾，强筋骨。治肝肾虚寒，阳痿，尿频等证，可配山茱萸、兔丝子、补骨脂等温补固涩之品。因肝肾亏虚而导致胎元不固者，本品可补肝肾以安胎，用于胎动不安或习惯性流产，可单用或与川断为末，枣肉为丸，如杜仲丸。此外，若与白芍、石决明、夏枯草、黄芩等药同用，治疗肝阳上亢，头目眩晕。近代临床证实，本品降血压作用颇佳，治高血压而有肾虚见证者，最为适宜。

【用量用法】10—15克。大量可用至30—60克，煎服。炒用疗效较生用为佳。

续断

【原文】 苦温补肾，辛温补肝。能宣通血脉而理筋骨。主伤中，补不足，《经疏》云：味甘使然。暖子宫，缩小便，破瘀血。治腰痛胎漏，怀妊沥血。崩带遗精；肠风血痢，《是斋方》：平胃散一两，川续断二钱半，每服二钱，米饮下。治时痢亦验。痈痔肿毒。又主金疮折跌，以功命名。止痛生肌。女科外科，需为上剂。川产良。状如鸡脚，皮黄皱节节断者真。去向里硬筋，酒浸用。地黄为使。

【讲解】 续断具有补肝肾，行血脉，续筋骨之效。为山萝卜科多年生草本植物续断或川续断的根。传统以产于四川者良。故多有川断之名。本品以身干、体肥、性濡、筋少、气微香者为佳。可生用，酒炒或盐水炒用。

本品苦、甘、辛而微温。入肝、肾经。苦泄，辛行，温通，甘补，故有补益肝肾、通利血脉、续骨疗伤之功。具有补而不滞，行而不泻，温而不燥的特点。适用于肝肾不足之腰膝酸痛，崩漏胎动，及筋骨损伤等证，为女科、外科多用之品。

【临证应用】 续断补肝肾，兼通血脉，活络止痛，可治肝肾不足的腰膝酸痛，常配杜仲、牛膝等同用，如续断丸。对于肝肾亏虚，崩漏，月经过多，常配熟地、黄芪等同用。本品用于安胎止漏，常配桑寄生、菟丝子、阿胶等同用，如寿胎丸，现常用治习惯性流产。借续断行血脉、续筋骨以消肿、止痛、生肌之效，治跌仆损伤，筋断骨折，常配乳香、没药、自然铜、地鳖虫、血竭等同用，如接骨散。可内服又可外敷。生用偏于补肝肾，强筋骨；炒用辛散之性较缓，而补力加强，功偏固冲任、止崩带。炒炭止血安胎较好；盐水拌炒更能益肾坚骨；酒炒善续筋骨、调血脉，外伤科多用。

【用量用法】 10—30 克，煎服。外用适量。

狗脊

【原文】 苦坚肾，甘益血，能强汗。温养气。治失溺不节，肾虚。脚弱腰痛，寒湿周痹(1)。 经曰：内不在脏腑，而外未发千皮，独居分肉之间，真气不能周，命曰周痹。除风虚、强机关、利俛仰(2)。 滋肾、益肝，则骨健而筋强，有黄毛如狗形，故曰金毛狗脊。去毛切，酒拌蒸。萆薢为使。熬膏良。

【讲解】 (1) 周痹：痹证的一种。因风寒湿邪侵入血脉肌肉所致的以周身疼痛为主的痹证。(2) 俛：同俯。

狗脊补肝肾、强筋骨、祛风湿。为蚌壳蕨科多年生草本植物，金毛狗脊的根状茎。该植物叶柄基部和根状茎上均密被金黄色绒毛，有光泽，似黄狗毛，故名金毛狗脊。用时去毛、酒浸一日，砂烫切片用。

本品味苦甘，性温。能补能行，入肝、肾经。功能补肝肾、强腰脊、坚筋骨、利俯仰，兼温散风寒，故对肾虚或风寒湿邪引起的腰痛脚弱，风湿痹痛最为适用。

【临证应用】 狗脊配杜仲、续断、牛膝等补肝肾、强筋骨之品，可治肾虚腰痛，脊强不能俯仰，足膝软弱。若与桂枝、桑枝、牛膝等同用，以治肝肾亏虚，兼感风寒湿邪引起的腰膝疼痛，如狗脊饮。借其温补固摄之力，也可用治肾虚不固的小便不禁及妇女白带过多。但肾虚有热、小便不利或短涩黄赤，口苦舌干者忌服。

此外，狗脊根上茸毛亦可供药用，外伤出血适量敷之，有止血生肌之效。

【用量用法】 10—15 克，煎服。

电子版注：

1、原书“同时去毛、酒浸一日”有误，改为“用时去毛、酒浸一日”，电子版已改

骨碎补

【原文】 苦温补肾，故治耳鸣，耳鸣必由肾虚。及肾虚久泻。研末，入猪肾煨熟。空心食之。肾主二便，久泻多属肾虚，不可专责脾胃也。肾主骨，故治折伤，以功命名，粥和敷伤处。经曰：肾者胃之关也。前阴利水，后阴利穀。牙痛。炒黑为末，擦牙，咽下亦良。又入厥阴，心包、肝。能破血止血。入血行伤，故治折伤。粥和末裹伤处。根似姜而扁长，去毛用，或蜜拌蒸。

【讲解】 骨碎补功能补肾、活血、续伤，为伤科常用药。为水龙骨科多年生附生蕨类植物槲蕨的根茎。根茎形状似姜，密被棕黄色鳞片，若猴毛状，故又名：“猴姜”，“毛姜”。因十二属相猴为地支申位，故又称“申姜”。入药需除去鳞片，洗净砂烫切片用。

本品味苦性温。入肝、肾二经。能补肾、活血、止血、续伤。治肾虚久泻、耳鸣、牙痛，及跌仆闪挫，筋骨折伤。

【临证应用】 骨碎补苦温性降，能补肾而收浮阳，肾虚阳浮的耳鸣、牙痛多配熟地、山萸肉等补肾药同用。治肾虚腰痛、久泻多配补骨脂、牛膝等同用。因其活血、止血、疗伤的功效，常配自然铜、没药等治筋断骨折、淤血肿痛之证，如骨碎补散。亦可单用浸酒服或研末外敷。浸洒外擦可治斑秃。

现有报导，用骨碎补15 克，水煎分三次服，每日一剂，对链霉素中毒所致的头痛、头晕、口唇舌尖麻木等证状疗效较好，对耳鸣、耳聋的控制也有一定效果。亦可作预防链霉素中毒使用。

【用量用法】 10—20 克，煎汤或入丸散。外用适量，研末敷，也可浸洒，擦患处。

葫芦巴

【原文】 苦温纯阳，入右肾命门。暖丹田、壮元阳，治肾脏虚冷，阳气不能归元，同附子、硫黄。痼疝冷气，同茴香、巴戟、川乌、川楝、吴茱萸。寒湿脚气。出岭南番舶者良，云是番莱菔子。酒浸曝，或蒸或炒。

【讲解】 葫芦巴性较温热，具温肾、散寒、止痛之功。为豆科一年生草本植物葫芦巴的成熟种子。现在主要由人工栽培；主产于安徽、四川、河南等地。生用，炒用，或盐水炒用。

本品味苦性温，入肝、肾经。有温肾阳、逐寒湿之效，适用于肾阳不足而有寒湿之证。并有止痛作用，善治疝气偏坠，少腹冷痛之证，对寒湿脚气肿痛亦有效。惟本品性热，阴虚阳亢、肾火易动者启用。

【临证应用】 葫芦巴用于肾脏虚冷、寒疝偏坠、少腹连臋丸作痛等证，常与吴茱萸、川楝子、川乌等同用，如葫芦巴丸；治寒湿脚气、足膝冷痛无力，可配补骨脂、木瓜等用。

【用量用法】 3—10 克，煎服或入丸散。

冬虫夏草

【原文】 甘平。保肺益肾，止血化痰，已劳嗽。四川嘉定府所产者最佳。冬在土中，形如老蚕，有毛能动，至夏则毛出土上，连年俱化为草，若不取，至冬则复化为虫。

【讲解】 冬虫夏草善能补肺益肾。为麦角菌科植物冬虫夏草菌的子座及其寄生蝙蝠蛾科昆虫绿蝙蝠蛾幼虫的尸体。冬季菌丝侵入蛰居于土中的蝙蝠蛾幼虫体内，使体内充满菌丝而死亡，夏季长出子座，出自寄主幼虫的头部，单生，细长如棒球棍状，露出地面，形如草，故名冬虫夏草。主产于四川、青海等地。夏至前采挖，去净泥土，晒干或烘干。生用。

本品味甘性温，入肺、肾二经。既能养肺阴，又能补肾阳，为平补阴阳之品。故凡阴虚阳衰之虚劳嗽血，阳痿，遗精等证，均可应用。并与鸡、鸭、猪肉等炖食，有补虚作用。惟药力缓和，须长期服用，方能取效。

【临证应用】 冬虫夏草为补肺阴之佳品，且兼能止血化痰。用于肺阴虚、劳嗽咳血，常与沙参、阿胶、川贝等养阴清肺、止血化痰药同用，以加强疗效。治阳痿遗精，腰膝酸痛，多与杜仲、淫羊藿、仙茅等补肾阴药同用，亦可单用浸酒服。病后体虚不复或畏寒自汗之阳虚之体，本品可作食养疗法，有补虚之功。

【用量用法】 5—10克，煎汤或浸酒服。

蛤蚧

【原文】咸平。补肺润肾，益精助阳，治渴通淋，定喘止嗽，肺痿咯血，气虚血竭者宜之。能补肺，益水源。李时珍曰：补肺止渴，功同人参；益气扶羸，功同羊肉。《经疏》曰：咳嗽由风寒外邪者不宜用。出广南。首如蟾蜍，背绿色，斑点如锦纹。雄为蛤，鸣声亦然，因声而名。皮粗口大，身小尾粗；雌为蚧，皮细口尖，身大尾小。雌雄相呼，屡日乃交，两两相抱，捕者擘之，虽死不开，房术用之甚效。不论牝牡者，只可入杂药。口含少许，奔走不喘者真。药力在尾，见人捕之，辄自啮断其尾，尾不全者不效。凡使去头足。雷斅曰：其毒在眼，用须去眼。洗去鳞内不净及肉毛，酥炙或蜜炙或酒浸焙用。

【讲解】蛤蚧功专补肺肾，尤善纳肾气。为壁虎科动物蛤蚧除去内脏的全体。形似壁虎而大，全长20余厘米。头部较大，呈三角形；眼大、突出；口中有许多小齿。全身生密鳞，雄性有股孔20余枚，左右相连，雌性无，其他均相似。体背紫灰色，有砖红色及蓝灰色斑点；腹面近白色，散有粉红色斑点。尾易断，能再生。以体大、肥壮、尾全、不破碎者为佳。主产于广西，云南、贵州、广东等地亦有分布。常在夏季捕捉，剖开除去内脏，拭去血液，切开眼睛放出汁液，用竹片将其四肢、头、腹撑开，并用白纸将尾固定于竹片上，以防脱落（无尾者拣去不用）。用时去头足和鳞片，切小方块，黄酒浸渍后微火焙干。若单用其尾者，称为“蛤蚧尾”。研粉用或浸酒饮服。

本品味咸性平，入肺、肾经。长于补肺益肾，尤能摄纳肾气，有较好的定喘止咳作用，故为治肺肾虚喘之要药。因有助肾阳、益精血的作用，所以亦可用于肾阳不足，精血亏虚的阳痿证。习惯认为蛤蚧尾药力较佳，故无尾者不用。惟喘咳由于风寒外邪或实热者忌用。

【临证应用】蛤蚧用于肺虚咳嗽、肾虚喘乏、虚劳喘咳等，多配人参、杏仁、甘草等同用，如人参甘蚧散。用于肾虚阳痿，可单用浸酒服，也可与鹿茸、淫羊藿等补肾助阳药同用，以加强疗效。

【用量用法】3—6克，煎服。但多研末用，每次1—2克。浸酒饮用1—2对。

胡桃

【原文】味甘气热，皮涩，皮敛肺定喘，固肾涩精，今药中罕用。昂谓若用之，当胜金樱、莲须也。肉润，皮汁青黑，属水入肾，通命门，利三焦，温肺润肠，补气养血。佐补骨脂，一木一火，大补下焦。胡桃属木，破故纸属火，有木火相生之妙。古云：黄柏无知母，破故纸无胡桃，犹水母之无虾也。李时珍曰：三焦者，元气之别使，命门者，三焦之本原。命门指所居之府而言，为藏精系胞之物；三焦指所治之部而名，为出纳腐熟之司，一为体，一为用也。其体非脂非肉，白膜裹之，所在脊骨第七节两肾中央，系著于脊，下通二肾，上通心肺贯脑，生命之原，相火之主，精气之府，人物皆有之，生人生物，皆由此出。《内经》所谓七节之旁，中有小心是也。《难经》误以右肾为命门，高阳生承谬误《脉诀》，至朱肱、陈言、戴起宗始辟之。夫肾命相通，藏精而恶燥，胡桃颇类其状，汁青黑，故入北方，佐破故纸润燥而调血，使精气内充，血脉通利，诸疾自除矣。男女交媾，皆禀此命火而结胎，人之穷通寿夭，皆根于此。三焦通利，故上而虚寒喘嗽，能温肺化痰。洪迈有痰疾，晚对上谕以胡桃三枚，姜三片，卧时嚼服，既饮汤，复嚼姜桃如前数，静卧必愈。迈如旨服旦而痰消嗽止。洪辑幼子病痰喘，梦观音令服人参胡桃汤，服之而愈。明日剥去皮，喘复作，仍连皮用，信宿而疗，盖皮能敛肺也。胡桃、葱白、姜、茶等分捣煎，能发汗散寒。下而腰脚虚痛，能补肾。内而心腹诸痛，外而疮肿诸毒，能调中和营。皆可治也。然动风痰，助肾火，连皮同烧酒细嚼三枚，能久战。有痰火积热者少服，油者有毒，故杀虫治疮。壳外青皮压油，乌髭发。润燥养血去皮用，敛涩连皮用。

【讲解】胡桃甘温而涩，功能补肾敛肺。为胡桃科落叶乔木植物胡桃果实的核仁。除去肉质果皮，晒干敲破，取种仁。生用或炒用。

本品味甘性湿，质润。入肾、肺、大肠经。具有补肾助阳、强腰膝的作用。治肾虚腰痛脚弱，腰间重坠，起坐困难等证。又善于补肾温肺而定喘咳，用于虚寒喘咳或肺虚久咳不止。但性较缓和，多作为辅助药。以其质较油润，有润燥滑肠之功，适用于老人或病后津液不足之便秘。但痰热实喘及肠滑便溏者忌用。

【临证应用】胡桃用于肾虚腰痛脚弱，常与杜仲、补骨脂同用，如青娥丸。治虚寒喘咳，多配人参、白蜜等同用，如人参胡桃仁汤。治肠

燥便秘，可单独服，或与火麻仁、肉苁蓉、当归等润肠药同用。

【用量用法】 10—30 克，煎服。定喘止咳宜连皮用，润肠通便宜去皮用。

紫河车

【原文】 甘咸性温。本人之血气所生，故能大补气血，治一切虚劳损极，虚损：一损肺，皮槁毛落；二损心，血脉衰少；三损脾，肌肉消脱；四损肝，筋缓不收；五损肾，骨痿不起。六极：曰气极、血极、筋极、肌极、骨极、精极，恍惚失志，癫癎。以初胎及无病妇人者良，有胎毒者害人。以银器插入。焙干，不黑则无毒。长流水洗极净，酒蒸焙干研末，或煮烂捣碎入药。如新瓦炙者，反损去精汁。亦可调和煮食。李时珍曰：崔行功《小儿方》云：胞衣宜藏天德月德吉方，深埋紧筑，若为猎狗食，令儿癫狂；蝼蚁食，令儿疮痒；鸟雀食，令儿恶死；弃火中，令儿疮烂。近社庙井灶街巷，皆有所忌。此亦铜山西崩，洛钟东应，自然之理。今人以之炮炙入药，虽曰以人补人，然食其同类，独不犯崔氏之戒乎？以故本集如天灵盖等，概不入录。

【讲解】 紫河车为补肺肾、益精之品，善治一切虚损劳伤之证。为人之胎盘。又名胎盘、人胞、胞衣。将健康产妇娩出的新鲜胎盘剪去脐带，洗净附着的血液，反复浸漂；置砂锅内煮至漂浮水面为度；撑开烘干，或研制为粉用。亦可鲜用。

本品味甘咸，性温。入肺、肝、肾经。以肺主气，肝藏血，肾藏精，紫河车性温而不燥，功可大补气血而益精，故用于肾气不足，精血衰少所致的不孕或阳痿，遗精，腰酸，头晕，耳鸣，以及气血亏虚，消瘦乏力，面色萎黄，产后乳少等证。对肺肾虚损之气喘，在其尚不发作时服用，可以培本，减少发作。

此外，还可用于气血亏虚，癫癎久发不止，也属其补益气血的功效。

【临证应用】 紫河车用于久病体虚或体质虚弱，气血不足，肾精虚亏等证，不论单用或复方应用，均有较好的疗效。如配伍党参、黄芪、熟地、当归，以益气养血；配伍熟地、龟板、黄柏，治肺肾两虚兼阴虚内热的气喘，如河车大造丸。

现临床上主要用其为强壮药，以增强人体抵抗力，治疗肺结核，神经衰弱，贫血，支气管哮喘等慢性疾病，但须较长时间服用方能见效。

【用量用法】 1.5—3 克，研末装胶囊吞服，一日二、三次，重证用量加倍，也可入丸散。如用鲜胎盘，每次半个到一个，水煮服食。

海狗肾

【原文】 甘咸大热，补肾助阳，治虚损劳伤，阳痿精冷。功近苁蓉、锁阳。出西番，今东海亦有之，似狗而鱼尾。置器中长年湿润，腊月浸水不冻，置睡犬旁，犬惊跳者为真，或曰：连脐取下故名脐；或曰乃膾肭兽之脐也。昂按：两名不类，恐一是海鱼之肾，一是山兽之脐也。《纲目》以此条入兽部。

【讲解】 海狗肾咸热，长于补肾壮阳。为海狗科动物海狗或海豹科动物海豹的雄性生殖器。又名“膾肭脐”。该动物生活于寒带或温带海洋中，分布北太平洋，偶见于我国的黄海及东海。生用或酒炙脆研末用。

本品味甘咸，性大热。主入肾经。具补肾壮阳、益精生髓之功，为补肾壮阳较强的药物。专治阳痿精衰，腰膝痿弱等证。《本草纲目》谓：《和剂局方》治诸虚损，有膾肭脐丸，今之滋补药中多用之。精不足者，补之以味也。大抵与苁蓉、锁阳之功相近。

【临证应用】 海狗肾用于肾阳不足，阳痿精冷，可单用浸酒服，或与肉苁蓉、淫羊藿、菟丝子等配用。亦可与人参、鹿茸等为丸服。

【用量用法】 1.5—3克，煎服。或入丸散。也可浸酒服。

韭菜韭子

【原文】 辛温微酸，肝之菜也。入血分而行气， 归心益胃，助肾补阳， 一名土钟乳，言温补也。除胃热，充肺气，散瘀血，逐停痰。治吐衄损伤，一切血病， 捣汁童便和服。噎膈反胃， 能消瘀血停痰在胃口，致反胃及胃脘痛。朱丹溪曰：有食热物及郁怒，致死血留胃口作痛者，宜加韭汁，桔梗入药，开提气血；有肾气上攻，致心痛者，宜韭汁和五苓散为丸，空心茴香汤下；治反胃宜用牛乳加韭汁、姜汁，细细温服。盖韭汁散淤，姜汁下气消痰和胃，牛乳解热润燥补虚也。《单方总录》曰：食不得入，是有火也；食久反出，是无火也；治法虽有寒热虚实之别，要以安其胃气为本，使阴阳升降平均，呕逆自顺而愈矣。解药毒食毒，狂犬蛇虫毒。多食昏神。忌蜜、牛肉。昂按：今人多以韭炒牛肉，其味甚佳，未见作害。经曰：毒药攻邪，五穀为养，五畜为益，五菜为充，五果为助。气味合而服之，以补精益气。五菜：韭、薤、葱、葵、藿也；五果，桃、李、枣、杏、栗也。

韭子，辛甘而温。补肝肾，助命门，暖腰膝。治筋痿遗尿，泄精溺血， 白带白淫。经曰：足厥阴病则遗尿，思想无穷，入房太甚，发为筋痿及白淫。韭子同龙骨、桑螵蛸，能治诸病，以其入厥阴补肝肾命门。命门者，藏精之府也。蒸爆炒研用。烧烟熏牙虫。

【讲解】 韭菜功能温中、行气、活血；韭子功专暖肾壮阳固精。韭菜为百合科植物韭的叶，多作食菜用。韭子即韭的种子，主要作药用。

韭子味辛甘，性温。入肝、肾经。长于暖肾、壮阳固精，为治肾虚阳痿、精关不固、遗精滑精常用之品。韭菜可温中行气，以治脘腹冷痛，泻痢食少等证，但临床罕见应用。

【临证应用】 韭子用于肝肾不足的阳痿，腰膝痠软冷痛等证，多配伍补肾助阳药同用。治肾气不固的遗精，尿频，白带等，可单用，然多与补骨脂、益智仁、菟丝子等温肾固涩之品同用，以加强疗效。

【用量用法】 5—10克，煎服，或入丸散服。

阳起石

【原文】 咸温。补右肾命门，治阳痿精乏，子宫虚冷，腰膝冷痹，水肿癥瘕。寇宗奭曰：凡石药冷热皆有毒，宜酌用。按经曰：石药发癫，芳草发狂，芳草之气美、石药之气悍。工者相遇，恐内伤脾。出齐州阳起山，云母根也，虽大雪遍境，此山独无。以云头雨脚鹭鸶毛色白滋润者良。真者难得。火煅醋淬七次，研粉，水飞用，亦有用烧酒、樟脑升炼取粉者。桑螵蛸为使。恶泽泻、茵桂。畏菟丝子。忌羊血。

【讲解】 阳起石功专温肾壮阳。为硅酸盐类矿物阳起石或阳起石石棉的矿石。主产于湖北、河南、山东等省。全年可采，去净泥土杂质，火煅黄酒淬之，研细用。

本品味咸，性温。入肾经。为补肾壮阳之品，对于肾阳不足之阳痿早泄，宫寒不孕，以及下焦虚寒，腰膝冷痛等证，皆可应用。惟性慥悍，非虚寒证者不宜用，且不宜单用久服。

【临证应用】 阳起石用于阳痿早泄，宫寒不孕之证，多与菟丝子、韭子、肉苁蓉配用，亦可单用为末服。与鹿茸为丸，治妇入宫冷不孕，如阳起石丸。

【用量用法】 3—6 克，入丸、散。

海马

【原文】 甘温。暖水脏，壮阳道，消癥块。治疗疮肿毒，妇人难产，及血气痛。

海龙，功同海马，而力能倍之。

【讲解】 海马以温肾助阳为主要功效，兼有消瘀化癥之功。海马为海龙科动物海马及刺海马除去外部黑灰色皮膜及内脏的干燥全体。晒干或烘干，切块使用。

海龙为海龙科动物刀海龙的全体。产地、采集、加工等，同于海马。性味、功用与海马相似，但效力稍强。用量同海马。

本品味甘咸，性温。入肝、肾经。可补肾助阳、消瘀化癥。适用于肾阳不足的腰膝痠软、阳痿等证，以及癥瘕积块，跌打损伤等。

【临证应用】 海马治肾虚腰痠、阳痿等证，可与菟丝子、补骨脂、肉苁蓉、淫羊藿等配伍，制丸散剂服用。治癥瘕积块等证，可配穿山甲、地鳖虫等药，也制丸应用。

【用量用法】 研末服，每次1—1.5克，或入丸、散剂内；也可取适量浸酒，随量服用。一般不入汤剂。

羊肉

【原文】甘热属火。补虚劳，益气血，壮阳道，开胃健力，通气发疮。张仲景治虚羸痿劳，有当归羊肉汤。《十剂》曰：补可去弱，人参、羊肉之属是也。李东垣曰：人参补气，羊肉补形。凡味同羊肉者，皆补血虚，阳生则阴长也。青羊肝苦寒。苏颂曰温。色青、补肝而明目。肝以泻为补，羊肝丸治目疾加黄连。胆苦寒。点风泪眼，赤障白翳。腊月入蜜胆中，纸套笼住，悬檐下，待霜出扫去点眼。又入蜜胆中蒸之候干，研为膏每含少许或点之，名二百味草花膏，以羊食百草、蜂采百花也。李时珍曰：肝开窍于目，胆汁减则目暗，目者肝之外候，胆之精华也，故诸胆皆治目病。

羊胫骨入肾而补骨，烧灰擦牙良。李时珍曰：羊胫骨灰可以磨镜，羊头骨可以消铁，误吞铜钱者胫骨三钱米饮下。

羊血解金、银、丹石、砒、硫一切诸毒。

羊乳甘温。补肺肾虚，润胃脘、大肠之燥。治反胃消渴，口疮舌肿，含漱。蜘蛛咬伤。有浑身生丝者饮之。肉、肝，青羖羊良；胆，青羯羊良；乳，白羖羊良。骨煨用。反半夏、菖蒲。忌铜器。牡羊曰羖、曰羝，去势曰羯；子曰羔，羔五月曰羖。

【讲解】羊肉为补虚暖中之品。为牛科动物山羊或绵羊的肉。

本品味甘，性温，入脾、肾二经。功能益气补虚、温中暖下。主治虚劳羸瘦、腰膝痠软、产后虚冷、腹痛、寒疝、中虚反胃等。然本品性较温热，故素有痰火、宿热者均不宜用。

【临证应用】羊肉治产后腹中疼痛及腹痛寒疝、虚劳不足之证，配当归、生姜同用，即当归生姜羊肉汤；治胃寒下痢，《外台》用羊肉一片，茺蔚子末一两，和以绵裹纳下部。治虚羸之人、崩中下血，《千金方》以肥羊肉三斤，干姜、当归各三两，生地黄二斤，切为细末，煮食。

【用量用法】煮食或煎汤服。

附：羊肝 苦甘、凉。入肝经。功能补肝、益血、明目。治肝血虚亏、目暗昏花、雀目、青盲、翳障。

羊胆功同羊肝，主以清火明目，适用于肝热目疾之证。

羊乳温润补虚，主治虚劳羸弱，消渴等证。

第三节 补血药

补血药又叫养血药，就是能治疗血虚证的药物。

血虚证的主要证状有：面色萎黄，头晕目花、心慌心悸，失眠健忘，以及妇女月经后期，量少色淡，甚至经闭等。凡呈现上述证状者，都可用补血药物来治疗。

补血药物味多属甘，甘则能补。因“心主血”，“肝藏血”，“脾统血”，故补血药大多归心、肝、脾三经。

血虚与阴虚在病机上互为因果，血虚往往能导致阴虚，如血虚兼有阴虚者，当与补阴药同用。而在补血药中，部分药兼有补阴之功，也可作补阴药使用。补血药又常与补气药同用，以“气能生血”，可增强补血的功效。

补血药性多滋腻，妨碍消化，故凡湿阻中满、食少便溏者不宜使用；脾胃虚弱者，当配伍健脾助消化药同用，使补而不滞，以免影响中焦运化的功能。

熟地黄

〔原文〕甘而微温。入手足少阴厥阴经。滋肾水，补真阴，填骨髓，生精血，聪耳明目，耳为肾窍，目为肝窍，目得血而能视，耳得血而能聪。黑髮乌髭。治劳伤风痹，胎产百病，为补血之上剂。朱丹溪曰：产前当清热养血为主，产后宜大补气血为主，虽有杂证，从末治之。昂按：丹溪产后大补气血一语，诚至当不易之论，后人不善用之，多有风寒未解，瘀血未尽，妄施峻补，反致大害者，不可不察。王硕曰：男子多阴虚，宜熟地；女子多血热，宜生地。以好酒拌砂仁末，浸蒸晒九次用。地黄性寒，得酒与火与日则温；性泥，得砂仁则和气，且能引入丹田。六味丸用之为君，尺脉弱者加桂附，所谓益火之原，以消阴翳也；尺脉旺者加知柏，所谓壮水之主，以制阳光也。

【讲解】熟地黄功专养血滋阴、补精益髓。为玄参科多年生草本植物地黄的根，经加工炮制而成。通常以黄酒为辅料，反复蒸晒，至内外色黑，呈滋润光泽，柔软粘腻，切片用。

本品甘温味厚，质润多液，主入肝、肾二经。既能补血，又能滋阴，且能生精益髓，为补益肝肾之要药。常用于肾阴不足、心肝血虚诸证，如腰痠脚弱、羸瘦遗精、妇人崩漏、耳鸣目眩、鬚髮早白等证。然本品性较粘腻，易助湿碍胃，处方时每与砂仁同用以减其腻性，故原文有砂仁末拌地黄蒸用之说。

【临证应用】熟地为补血要药，常用于血虚证及妇女月经不调、崩漏等证，如四物汤，即以熟地黄配当归、川芎、白芍，为补血调经的基本方剂，治疗上述病证都可在此方基础上加减。本品滋阴作用亦很明显，治疗肾阴不足、潮热遗精、消渴等，常与山药、山茱萸等伍用，如六味地黄丸，为补阴的主方。其他如腰痠脚软、头晕眼花、耳鸣耳聋、鬚髮早白等精血亏虚之证，均可用本品补精益髓。

然本品性质粘腻，较干地黄尤甚，有碍消化，故凡气滞痰多、脘腹胀痛、食少便溏者忌服。

鲜地黄、干地黄、熟地黄，本为一物，由于加工炮制方法不同，性能功效遂有差异。鲜地黄苦重于甘，以清热凉血、生津为主；干地黄甘

大于苦，清热力缓，滋阴养血力著；熟地黄性偏甘温，滋阴补血效佳。临床运用时，根据其功效特点，适用于不同病证。

【用量用法】10—30克，煎服。为防止其滋腻之弊，宜与健胃药陈皮，砂仁等同用。

何首乌

〔原文〕苦坚肾，温补肝，甘益血，涩收敛精气。添精益髓，养血祛风，治风先治血，血活则风散。强筋骨，乌髭发，故名首乌。令人有子，为滋补良药。气血太和，则劳瘦风虚，崩带疮痔，瘰癧痈肿诸病自己。营血调则痈肿消。赤者外科呼为疮帚。止恶疮。益阴补肝，疟疾要药，而本草不言治疟。李时珍曰：不寒不燥，功在地黄、天冬诸药之上。有赤白二种，夜则藤交，一名交藤，有阴阳交合之象。赤雄入血分，白雌入气分，以大如拳五瓣者良。三百年者大如栲栳(1)，服之成地仙。凡使赤白各半泔浸，竹刀刮皮切片，用黑豆与首乌拌匀，铺柳甑(2)，入砂锅，九蒸九晒用。茯苓为使。忌诸血、无鳞鱼、莱菔、葱、蒜、铁器。唐时有何首乌者，祖名能嗣，父名延秀。能嗣五十八，尚无妻子，服此药七日，而思人道，娶妻连生数子；延秀服之，寿百六十岁；首乌又服之，寿百三十岁，发犹乌黑。李翱为立《何首乌传》，然流传虽久，服者尚少。明嘉靖初，方士邵应节进七宝美髯丹，世宗服之，连生皇子，遂盛行于世。方用赤白首乌各一斤，黑豆拌，九蒸晒；茯苓半斤，乳拌；当归、枸杞、菟丝各半斤，俱酒浸；牛膝半斤，酒浸，同首乌第七次蒸至第九次；破故纸四两，黑芝麻炒。蜜丸，并忌铁器。昂按：地黄、何首乌，皆君药也，故六味丸以地黄为君，七宝丹以何首乌为君，各有配合，未可同类而共施也。即有加减，当各依本方随病而施损益。今人多以何首乌加入地黄丸中，合二方而为一方，是一药二君，安所适从乎？失制方之本义也。

【讲解】（1）栲栳：音kao lao，用柳条或竹蔑编成的芭斗之类的盛物器具。（2）甑：古代做饭用的一种陶器。

生何首乌能解毒疗疮，润肠通便；制首乌可补肝肾、益精血、乌鬚发。为蓼科多年生草本植物何首乌的块根。挖出其根，洗净切片，晒干，称生首乌；若以黑豆汁拌蒸，晒后变为黑色，称制首乌。炮制忌铁器。

《备要》言何首乌有赤白二种，赤首乌即本品；所谓白首乌，为萝藦科植物牛皮消的块根，有些地区也作何首乌用，其实两者性味、功效不同，应分别使用。

本品苦涩微温，制熟味甘主补，入肝、肾二经。能补肝肾、益精血，因髮为血之余，肾之所荣，故又能乌鬚髮，并兼收敛精气之效。凡肝肾不足，精血亏虚，腰膝无力，鬚髮早白等证，用之皆能有效。由于性质温和，不寒不燥，补而不膩，对于虚不受补之患者尤为相宜。故李时珍称之为滋补良药。生用补益之力较弱，且无收敛之性，但可润肠通便、解毒消痈，鲜品解毒润肠功效较生者更佳，但临床较少使用。

【临证应用】制首乌其功专补，对精血亏虚、头晕眼花、鬚髮早白、腰痠脚软、遗精、崩漏等证均常应用，如七宝美髯丹、首乌延寿丹等均以本品为主药，配当归、枸杞子、菟丝子、女贞子、旱莲草等以乌鬚髮、壮筋骨、固精气。据现代研究，本品有降胆固醇、抗动脉硬化的作用，临床用于高血压，动脉硬化等心血管疾病。

何首乌生用，可祛风解毒，用于血虚风疹，皮肤瘙痒。如何首乌散，以何首乌配荆芥、防风、金银花、连翘、苍术，白鲜皮、苦参、木通、甘草、灯心草成方，用治皮肤病及荨麻疹均有效。本品还可与薄荷、苦参煎汤外洗，治遍身痒痛。此外，以之配夏枯草、贝母、昆布，可治瘰癧结核。对于老人与体虚者之便秘，又可以生首乌单用煎汤内服，或配肉苁蓉、火麻仁等同用，以奏通便之效。

本品尚有截疟之功，古方何人饮以其配人参等治久疟不止。

首乌功用类同熟地，治肝肾精血不足之证，二者常相须为用。但熟地味厚滋膩，滋阴作用较强，肝肾阴虚及多种血虚证常用；何首乌性质温和，不寒不燥，长于入肝养血，益肾精，补而不膩，可常用而无不良反应。

【用量用法】10—30克。补益精血用制首乌；解毒润肠截疟用生首乌。

附：夜交藤 系何首乌的藤，故又名首乌藤。味甘性平，归心、肝经。功能养心安神、养血通络，主治失眠、多梦易惊、血虚肢体痠痛及皮肤疮疹瘙痒等证。

当归

〔原文〕甘温和血，辛温散内寒，苦温助心散寒。诸血属心，凡通脉者，必先补心，当归苦温助心。入心肝脾，心生血，肝藏血，脾统血。为血中之气药。治虚劳寒热，咳逆上气，血和则气降。温疟，厥阴肝邪。癖痢，便血曰癖。头痛腰痛，心腹诸痛，散寒和气。风痉无汗，痉音擎，上声。身强项直，角弓反张曰痉，无汗为刚痉，有汗为柔痉，当归辛散风，温和血。产后亦有发痉者，以脱血无以养筋也，宜十全大补汤。痿痹癰疽，筋骨缓纵，足不在地曰痿；风寒湿客于肌肉血脉曰痹；血凝气聚，按之坚硬曰癰；虽坚硬而聚散无常曰疽，尚未至癰也。痈疽疮疡，冲脉为病，气逆里急；带脉为病，腹痛腰溶溶（1）如坐水中，冲脉起于肾下，出于气街，挟脐上行，至胸中，上颡頰，渗诸阳，灌诸经，下行入足，渗三阴，灌诸络，为十二经脉之海，主血；带脉横围于腰如束带，总约诸脉。及妇人诸不足，一切血证，阴虚而阳无所附者。润肠胃，泽皮肤，养血生肌，血旺则肉长。排脓止痛。血和则痛止。然滑大肠，泻者忌用。当归为君，芍药为臣，地黄为佐，芎藭为使，名四物汤，治血之总剂。血虚佐以人参、黄芪；血热佐以条芩、梔、连；血积佐以大黄、牵牛。昂按：血属阴，四物能养阴，阴得其养，则血自生，非四物能生血也。若气虚血弱之人，当用人参，取阳旺生阴血之义。多有过服四物阴滞之药，而反致害者。使气血各有所归，故名。血滞能通，血虚能补，血枯能润，血乱能抚。盖其辛温能行气分，使气调而血和也。李东垣曰：头止血而上行，身养血而中守，尾破血而下流，全活血而不走。雷斅、王海藏并曰：头破血。李时珍曰：治上用头，治中用身，治下用尾，通治全用。一定之理也。川产力刚善攻，秦产力柔善补。以秦产头圆尾多、肥润气香者良，名马尾当归。尾粗干枯者，名馒头当归，只宜发散用。治血酒制，有痰姜制。昂按：当归非治痰药，以制亦臆说耳。畏菖蒲、海藻、生姜，恶湿面。

【讲解】（1）溶溶：形容水波之荡漾。此处形容病人无力之状态。

当归补血活血、调经止痛，兼能润肠通便。为伞形科植物当归的根。产甘肃岷县者习称秦当归，品质最优，奉为道地药材；产四川者

称川当归，次之。本品以根粗大、断面黄白色、气味浓厚者为佳品。切片生用，或酒拌、酒炒用。

当归干燥全根可分为头、身、尾三部分，只用根的头部长入药者称当归头，仅用主根部分入药者称为当归身，单用支根部入药者称为当归尾，混同入药则为全当归。《本草纲目》曰：……以秦归头圆，尾多色紫，气香肥润者名马尾归，最胜他处；头大尾粗，色白坚枯者为馕头归，止宜入发散药尔。〈过去市场上分马尾归、油归等规格，现只分等级。〉

本品辛甘而温，甘补辛散，苦泄温通，既能补血，又能活血，入心、肝、脾三经。心主血、肝藏血、脾统血，故能主治一切血证，为血病要药。《本草图解》云：气血昏乱，服之能定，能领诸血各归其所当经之经，故名当归。善有调经之功，尤为妇科所重视，故凡月经不调、经闭、痛经、胎产诸证，不论血虚、血瘀、血寒、气滞等，皆常应用。外伤科也借其散瘀消肿、排脓止痛之功，以治疮痍损伤、瘀血肿痛等证。

当归甘温而润，辛香善走，兼有行气止痛、润肠通便之功，适用于血瘀气滞诸证和头痛、腰痛、风湿痹痛及肠燥便秘等证。

总之，凡属血虚血滞所引起的一切病证，均可应用，尤以血分有寒者更为适宜。但本品行则有余，守则不足，如无瘀滞之腹痛及崩漏经多之证须慎用。湿阻中满，大便溏泻者亦不宜用。

【临证应用】当归为良好的补血药，适用于血虚诸证，常配白芍、熟地、川芎组成四物汤以补血调经。若系气血两虚，可与黄芪同用，即当归补血汤。用于妇科调经方面，也多以四物汤为基础方剂，随证加减变化，以治月经不调，经行腹痛，经闭不通等证。如属气滞血瘀者，可配行气活血药；偏寒者配温里药；偏热者配凉血药等。

本品用于瘀血所致疼痛及跌打损伤、痈肿、痹痛等，配活血化瘀药或祛风湿药，都有良好疗效。如活络效灵丹，即以本品配丹参、没药、乳香等，治肢体瘀血作痛；复元活血汤以本品配伍大黄、桃仁、红花等治跌打损伤，瘀血肿痛；蠲痹汤以本品配伍羌活、桂枝、秦艽等祛

风湿药，治关节痹痛或肌肤麻木等；用于痈肿疮疡，又可配金银花、赤芍、炮山甲等同用，如仙方活命饮。血虚疼痛亦可使用，如《金匮要略》当归生姜羊肉汤及当归建中汤等治虚寒腹痛。

此外，当归辛润，配火麻仁、肉苁蓉等，可润肠通便，治久病年老体弱及产妇血虚便秘。现又常与川芎、桃仁、红花、丹参等配伍，治冠心病心绞痛、血栓闭塞性脉管炎等病证。

李东垣说：头止血而上行，身养血而中守，尾破血而下流，全活血而统治。历代医家都认为补血用当归身，破血用当归尾，和血用全当归。而现在多全当归酒炒入药。归得酒之辛散则活血力大增，活血化瘀之效更佳。

【用量用法】5—15克，煎服。补血润肠生用，通经活血酒炒。

白芍药赤芍药

〔原文〕苦酸微寒。入肝脾血分，为手足太阴肺、脾行经药。泻肝火，酸敛肝，肝以敛为泻，以散为补。安脾肺，固腠理，肺主皮毛，脾主肌肉，肝木不克土，则脾安；土旺能生金，则肺安，脾和肺安，则腠理固矣。和血脉，收阴气，敛逆气，酸主收敛。散恶血，利小便，敛阴生津，小便自利，非通行之谓也。缓中止痛，李东垣曰：经曰损其肝者缓其中，即调血也。益气除烦，敛汗安胎，补劳退热。治泻痢后重，能除胃中湿热。脾虚腹痛，泻痢俱太阴病，不可缺此，寒泻冷痛忌用。虞天民曰：白芍不惟治血虚，大能行气，古方治腹痛，用白芍四钱，甘草二钱，名芍药甘草汤。盖腹痛因营气不从，逆于肉里，白芍能行营气，甘草能敛逆气；又痛为肝木克脾土，白芍能伐肝故也。天民又曰：白芍止治血虚腹痛，余不治，以其酸寒收敛，无温散之功也。心痞胁痛，胁者，肝胆二经往来之道，其火上冲，则胃脘痛，横行则两胁痛。白芍能理中泻肝。肺胀（1）喘噫，噫同。痈肿疔瘕。其收降之体，又能入血海，冲脉为血海，男女皆有之。而至厥阴，肝经。治鼻衄、鼻血曰衄，音女六切。目涩，肝血不足、退火益阴，肝血自足。妇人胎产，及一切血病。又曰产后忌用。朱丹溪曰：以其酸寒伐生发之气也，必不得已，酒炒用之可耳。李时珍曰：产后肝血已虚，不可更泻也。寇氏曰：减芍药以避中寒。微寒如芍药，古人犹谆谆告戒，况大苦大寒，可肆行而莫之忌耶！同白术补脾，同参芪补气，同归地补血，用芍药泻肝，同甘草止腹痛，同黄连止泻痢，同防风发痘证，同姜枣温经散湿。

赤芍药，主治略同，尤能泻肝火，散恶血，治腹痛坚积，血痹疔瘕，邪聚外肾为疝，腹内为瘕。经闭肠风，痈肿目赤。皆散泻之功。白补而收，赤散而泻；白益脾，能于土中泻木，赤散邪，能行血中之滞。产后俱忌用。赤白各随花色。单瓣者入药，酒炒用，制其寒。妇人血分醋炒，下痢后重不炒。恶芒硝、石斛。畏鳖甲、小蓟。反藜芦。

【讲解】（1）肺胀：古病名。属咳喘之类的病证。

芍药有赤、白之分。白芍以养血敛阴柔肝为主，赤芍以泻火凉血消瘀为主。白芍为毛茛科多年生草本植物芍药的根。多系栽培品。有生用、炒用或酒炒用。

本品苦酸微寒，入肝、脾血分。酸主收敛，苦寒泄热，而有养血敛阴、柔肝止痛、平肝之功，为治诸痛证之良药。凡血虚之月经不调、痛经及营阴不固之自汗、盗汗、肝郁不舒或肝脾不和之胸胁脘腹胀满作痛，四肢挛急疼痛，以及肝阴不足，肝阳上亢之头痛、眩晕等证，皆常应用。

赤芍为同属植物毛果赤芍、卵叶芍药或芍药的根，多为野生品。其性苦寒，也入肝经血分，以清热凉血，祛瘀止痛为主要功效。故凡一切血热、血瘀之证，皆可用之。然血虚无瘀，月经过多及孕妇忌用。

古代赤芍、白芍不分，统称芍药，但临床运用却早有区别，《本草纲目》曰：白芍药益脾，能于土中泻木；赤芍药散邪，能行血中之滞。

《注解伤寒论》谓：芍药，白补而赤泻，白收而赤散也。总之，白芍酸敛，长于养血敛阴柔肝；赤芍苦泄，长于泄热凉血散瘀。补血、养血及调经止痛方中，多用白芍；清热凉血及活血消肿剂中，则常用赤芍。

【临证应用】白芍养血调经，血虚诸证及妇科疾病常用。如补血基本方四物汤，即由白芍配熟地、当归、川芎组成。治经行腹痛，若加香附、延胡索则止痛效果更好；治崩漏不止，加阿胶、艾炭等则止血更佳。对营卫不和，表虚自汗，可用白芍敛阴止汗，配桂枝、甘草同用；阴虚阳浮之盗汗，还可加牡蛎、龙骨等伍用。

治肝气不舒、胁肋脘腹疼痛，多以白芍养血柔肝，如逍遥散，即以本品配柴胡、当归等；肝血不足，拘挛疼痛，用芍药甘草汤缓急止痛，疗效亦良。再加饴糖、桂枝等药，组成小建中汤则温中补虚，缓急止痛，效更良好。肝阳上亢而头痛、眩晕者，可以白芍平肝抑阳，配代赭石、牛膝等，如镇肝息风汤。

此外，下痢腹痛、里急后重之证，治疗每以生白芍与木香、槟榔、黄连等同用，如芍药汤，取其缓急止痛，兼有清热和营的作用。

白芍生用性较寒凉，养血柔肝滋阴之力较强，肝血、肝阴不足而肝阳偏亢者用之相宜；炒后寒性已缓，长于养血。黄酒拌炒，称酒白芍，既可减少寒性，又可缓其酸收，而有活血之功，取其补中有行之意，

血虚兼瘀或兼寒者选之较宜。妇人血分病又可以醋炒，能入肝而柔肝止痛补肝止血。

赤芍适用于温热病热入营血，发热、发斑，及血热妄行的吐血、衄血等证，如犀角地黄汤即以本品配犀角、生地、丹皮。治血滞经闭、跌打损伤，及痈肿、目赤肿痛等证，又可配活血祛瘀或清热解毒药同用。

【用量用法】5—15克，赤白相同，煎服。反藜芦。

阿胶

〔原文〕甘平。清肺养肝，滋肾益气，肺主气，肾纳气。和血补阴，肝主血，血属阴。除风化痰，润燥定喘，利大小肠。治虚劳咳嗽，肺痿吐脓，吐血衄血，血淋血痔，肠风下痢，伤寒伏热成痢者，必用之，妊娠血痢尤甚。腰痠骨痛，血痛血枯，经水不调，崩带胎动。或妊娠下血，酒煎服。痈疽肿毒，及一切风病泻者忌用。大抵补血与液，为肺大肠要药。寇宗奭曰：驴皮煎胶，取其发散皮肤之外，用乌者，取其属水以制热则生风之义，故又治风也。陈自明曰：补虚用牛皮胶，去风用驴皮胶。杨士瀛曰：小儿惊风后，瞳人不正者，以阿胶倍人参服最良。阿胶育神，人参益气也。按阿井乃济水伏流，其性趋下，用搅浊水则清，故治瘀浊及逆上之痰也。用黑驴皮阿井水煎成，苏颂曰：《本经》阿胶亦用牛皮，现二胶可通用。牛皮胶制作不精，故不堪用。以黑光带绿色，夏月不软者真。锉炒成珠，或面炒、蛤粉炒、去痰。蒲黄炒，止血。酒化水化，童便和用。得火良。山药为使，畏大黄。

【讲解】阿胶善能补血止血，又可滋阴养肺。为马科动物驴的皮，经漂泡去毛后熬制而成的胶块。呈整齐长方形块状，表面乌黑有光泽，对光透视略透明。古时以山东省东阿县用阿井水煎炼而成得名。现各地大多都有生产，而以山东、浙江、江苏等地产量较多。原药块用，烊化冲服，或将胶块打碎，用蛤粉或蒲黄粉炒成阿胶珠用。

本品甘平质粘，归肺、肝、肾经。入肝以补血，入肺肾以滋阴，故有补肝血、滋肾阴、润肺燥之功，而为补血养阴良药。借其滋补粘腻之性，善能凝固血络，而有显著的止血之效。故凡血虚阴亏，虚烦失眠及一切失血之证，皆视为要药，对虚劳咳血，或阴虚燥咳尤为合适。但性质粘腻，有碍消化，故脾胃虚弱，不思饮食，以及呕吐泄泻者均应忌用。

【临证应用】阿胶有良好的补血作用，用于血虚眩晕、心悸等证，可与党参、当归、白芍等补气养血药同用。用于吐血、咯血，常与白芨、麦冬、生地等配伍；治妇女崩漏、月经过多、妊娠下血或小产后下血不止等，又常与艾叶炭、生地、白芍等同用，如胶艾汤，以止血安胎；若大便下血属虚寒者，又可配附子、灶心土、地黄等同用，如

黄土汤。治阴虚心悸、失眠等证，可与黄连、白芍、鸡子黄等同用，如黄连阿胶汤，为治热病伤阴，心烦失眠的有效方剂。本品既能滋肺阴，又善润肺燥，并能止血，可用于肺虚火盛，喘咳痰少或痰中带血之证，常与杏仁、马兜铃、牛蒡子等同用，如补肺阿胶汤；若燥热伤肺，干咳无痰、鼻燥咽干者，可与生石膏、杏仁、桑叶、麦冬等同用，如清燥救肺汤。

【用量用法】5—15克，入汤剂用开水或黄酒烊化冲服。止血宜蒲黄炒，以增强止血作用；润肺宜蛤粉炒，以加强清润之功。

黄明胶

〔原文〕甘平。功与阿胶相近，亦可代用。同葱白煮粥，通大便。

李时珍曰：真阿胶难得，牛皮胶亦可权用，其性味皆平补，宜于虚热之人。张仲景治泻痢，阿胶与黄胶黄蜡并用。陈藏器曰：诸胶皆能疗风补虚止泄，驴皮主风为最。经验方云：痈疽初起，酒顿黄明胶四两服尽，毒不内攻。唐氏方：加穿山甲四片，烧存性用。昂谓此方若验，胜于服蜡矾丸也。

【讲解】黄明胶功效与阿胶相似。为牛科动物牛的皮所熬的胶。甘平入肺、大肠经，其功效与阿胶相似，然补血作用不如阿胶。主治亦相同，有代阿胶者。用量用法亦同。

龙眼肉

〔原文〕甘温归脾，益脾长智，一名益智。养心补血，心为脾母。故归脾汤用之。治思虑劳伤心脾，及肠风下血。心生血，脾统血，思虑过多，则心脾伤而血耗，致有健忘怔忡惊悸诸病。归脾汤能引血归脾而生补之。肠风亦由血不归脾而妄行。

【讲解】龙眼肉补益心脾以养营血，而有良好的安神作用。为无患科常绿乔木龙眼树的成熟果肉。生用。

本品味甘性温，质润，入心、脾经。能补益心脾，滋养营血，既不滋腻，又不壅气，故为滋补良药，常用于思虑过度，劳伤心脾引起的心脾两虚，惊悸、怔忡、健忘、失眠等证。对气血不足之证，亦常应用。《本草求真》曰：多有似于大枣，但此甘味更重，润气尤多，于补气之中又更有补血之力……非若大枣力专补脾，气味虽甘，其性稍燥，而无甘润和柔，以至于极之妙也。

【临证应用】龙眼肉配黄芪、人参、当归、酸枣仁等补气养血安神药，如归脾汤，治心脾血虚之证，效颇良；单用一、二两，治神经性心悸也有较好的疗效；与大枣煎汤服，可治老弱病后气血不足之证。

【用量用法】10—15克，大剂量至30克，煎汤、熬膏、浸酒或入丸剂。

第四节 补阴药

补阴药又称养阴药，是一类养阴生津，能治疗阴虚证的药物。

阴虚证包括肾阴虚、肺阴虚、胃阴虚、肝阴虚等。其主要证状是：肾阴虚多见腰膝痠痛，手足心热或潮热盗汗、遗精等证；肺阴虚多见干咳少痰、咯血、虚热、口干舌燥等证；胃阴虚多见唇红、舌绛、苔剥，津少口渴，或不知饥饿，或胃中嘈杂，呕哕，或大便燥结等证；肝阴虚多见两目干涩，视力减退，头晕眼花等证。

补阴药性味多属甘寒，质多柔润，除补阴外，还有生津、增液、润燥等功效。故凡见上述诸证，均可选用适当的补阴药来治疗。

在使用补阴药时，如热病伤阴而热邪未尽者，应与清热药同用；阴虚而内热者，当配清虚热药；阴虚阳亢者，当与潜阳药同用；阴虚兼血虚者，当与补血药同用；若阴虚而又兼气虚者，则补阴与补阳药同用。

补阴药大多甘寒滋腻，故凡见脾肾阳虚，痰湿内阻，胸闷食少，腹胀便溏者均不宜用。

沙参

〔原文〕甘苦微寒，味淡体轻。专补肺气，清肺养肝，兼益脾肾，脾为肺母，肾为肺子。久嗽肺痿，金受火克者宜之，寒客肺中作嗽者勿服。人参补五脏之阳，沙参补五脏之阴，肺热者用之，以代人参。似人参而体轻松，白实者良。生沙地者长大，生黄土者瘦小。畏防己，反藜芦。北地真者难得。郑奠一曰：能疗胸痹心腹痛，邪热结，去皮肤游风疥癣恶疮，疝气崩带。沙参分南北两种，北者良，南者功用相同而力稍缓。

【讲解】沙参功能养肺阴、清肺热、养胃阴、生胃津。有南、北沙参两种，南沙参为桔梗科植物轮叶沙参和杏叶沙参、阔叶沙参的根，主产于安徽、四川、江苏等地；北沙参为伞形科植物珊瑚菜的根，主产于山东、河北、辽宁等地。晒干，切片或切段生用。

本品味甘性微寒，甘以养阴，寒以清热，甘寒相合，为养阴清热之佳品。入肺、胃二经。功能清肺热、养肺阴、润肺燥，兼益肺气，故适用于肺燥干咳，尤以肺阴虚者最为合适。又能养胃阴、生胃津，对热病伤阴、胃燥咽干口渴等证亦常配用。

【临证应用】沙参治阴虚肺燥咳嗽：常配麦冬、玉竹、桑叶等同用，如沙参麦冬汤。治热病伤津，胃阴不足，舌干口渴之证，多配麦冬、生地、玉竹等同用，如益胃汤。热病伤津较重而咽干、口渴、舌红少津者，用鲜品更佳，可与鲜生地、鲜石斛同用。

南、北沙参虽都有清养肺胃之功，但北沙参养阴润肺之力较强，南沙参清肺较胜，兼有祛痰之功。

【用量用法】10—15克，鲜品15—30克，煎服。虚寒证忌服。反藜芦。

麦门冬

〔原文〕甘微苦寒。清心润肺，李东垣曰：入手太阴气分。强阴益精，泻热除烦，微寒能泻肺火，火退则金清，金旺则水生，阴得水养，则火降心宁而精益。消痰止嗽，午前嗽多属胃火，宜芩、连、梔、柏、知母、石膏；午后嗽及日轻夜重，多属阴虚，宜五味、麦冬、知母、四物。行水生津。肺清则水道下行，故治浮肿；火降则肾气上腾，故又治消渴。治呕吐、胃火上冲则呕，宜麦冬。又有因寒因食因痰因虚之不同。痿蹶（1），手足缓纵曰痿蹶。阳明湿热上蒸于肺，故肺热叶焦，发为痿蹶。《经疏》曰：麦冬足阳明胃经之正药。客热虚劳，脉绝短气，同人参、五味，名生脉散。盖心主脉，肺朝百脉，补肺清心，则气充而脉复。又有脉绝将死者，服此能复生之。夏月火旺灼金，服之尤宜。李东垣曰：人参甘寒，泻火热而益元气；麦冬苦寒，滋燥金而清水源；五味酸温，泻丙火而补庚金，益五脏之气也。丙火小肠，庚金大肠，并主津液。肺痿吐脓，血热妄行，经枯乳闭。明目悦颜。益水清火。但性寒而泄，气弱胃寒人禁用。肥大者良。去心用。入滋补药酒浸。制其寒。地黄、车前为使。恶款冬花、苦参、青葙、木耳。

【讲解】（1）蹶：音jué，颠仆，跌倒。

麦门冬清养肺胃之阴，清心以除烦热之要品。为百合科多年生草本植物沿阶草或大叶麦冬须根上的小块根。采挖后洗净，除去须根，晒干生用。简称麦冬。入药一般以肥壮多肉、粗大盈寸者为佳。《备要》言去心用，旧时皆抽去心，言心能令人烦，现多不去心。

本品甘寒质润，长于滋燥泽枯，入肺、心、胃三经。功能清养肺胃之阴以生津润燥，且可清心以除烦热。常用于虚劳咳血，口渴心烦以及肠燥便秘等证。至《备要》言治呕吐、痿蹶、肺痿吐脓、血热妄行、经枯乳闭及能明目悦颜，皆取其清热滋阴之效。惟性寒而润，故虚寒泄泻，外感咳嗽及痰饮喘咳均不宜用。

【临证应用】麦冬适用于肺阴不足而有燥热之证，常配杏仁、生石膏、桑叶等，如清燥救肺汤，治干咳气逆，咽喉干燥；更常与天冬相须为用，以治阴虚劳热咯血，如二冬膏，即天冬、麦冬等分，加蜂蜜收膏。

胃阴不足，舌干口渴者，麦冬配沙参、生地、玉竹同用，如益胃汤，以养阴生津止渴。心烦失眠，或温病热入营分，烦躁不安，本品与生地、黄连等伍用，如清营汤。此外，肠燥便秘者，也可配生地、元参等同用，如增液汤。

【用量用法】10—15克，煎服。

天门冬

〔原文〕甘苦大寒。入手太阴肺气分，清金降火，益水之上源；肺为肾母。下通足少阴肾，苦能坚肾，寒能去肾家湿热，故亦治骨痿。滋肾润燥，止渴消痰，《蒙筌》曰：肾主津液，燥则凝而为痰，得润剂则痰化，所谓治痰之本也。泽肌肤，利二便。治肺痿肺癰，肺痿者，感于风寒咳嗽，短气鼻塞胸胀，久而成痿，有寒痿热痿二证；肺癰者，热毒蕴结，咳吐脓血，胸中隐痛。痿重而癰稍轻，治痿宜养血补气，保肺清火；治癰宜泻热豁痰，开提升散。癰为邪实，痿为正虚，不可误治。吐脓吐血，苦泄血滞，甘益元气，寒止血妄行。痰嗽喘促，消渴咽干（1），烦渴引饮，多食善饥为消渴，由火盛津枯。足下热痛，虚劳骨蒸，阴虚有火之证。然性冷利，胃虚无热及泻者忌用。取肥大明亮者，去心皮酒蒸。地黄、贝母为使。恶鲤鱼。二冬熬膏并良。天冬滋阴助元消肾痰，麦冬清心降火止肺咳。

【讲解】（1）咽干：指咽喉干燥。

天门冬功能清肺火、滋肾阴。为百合科多年生草本植物天门冬的块根。简称天冬。秋季采挖，除去鬚根，沸水煮过，去皮，切段干燥入药。药材以肥满致密、色黄白、半透明者为佳。

本品甘苦大寒，苦寒清热，甘寒滋润，入肺、肾经。故能清肺热、滋肾阴，善治肺肾阴虚有热之证。主治肺热阴伤之燥咳，咯血，阴虚内热，津伤烦渴，肠燥便秘等证。然寒性较甚，脾胃虚寒，食少便溏者忌服。

【临证应用】天门冬清肺润燥止咳，常用于燥咳、咯血，且多与麦冬同用，如二冬膏。对阴虚内热，舌干口渴，津伤消渴，配生地、人参，可益气养阴，如三才汤。肠燥便秘可与当归、苁蓉等润肠药同用。

天冬与麦冬习惯上合称二冬，皆能滋阴润燥，且二者常相须为用，增强疗效。然天冬大寒，清火润燥之力较麦冬强，重在滋肺肾之阴；麦冬微寒，药力较天冬弱，重在润肺、益胃、清心。麦冬腻滞性亦较天冬小。

【用量用法】6—15克，煎服。

石斛

〔原文〕甘淡入脾，而除虚热；咸平入肾，而涩元气，益精，强阴，暖水脏，平胃气，补虚劳，壮筋骨。疗风痹脚弱，发热自汗，梦遗滑精，囊湿余沥。雷斅曰：石斛镇髓。昂按：石斛石生之草，体瘦无汁，味淡难出，置之煎剂，猝难见功，必须熬膏，用之为良。光泽如金钗，股短而中实，生石上者良，名金钗石斛。长而虚者名水解，不堪用。去头根，酒浸用。恶巴豆。畏僵蚕。细锉水浸，熬膏更良。

【讲解】石斛功专养胃阴，清虚热。为兰科多年生常绿草本植物金钗石斛及同属多种植物茎。夏秋采收，晒干，切段用为干石斛。可栽于沙石内，随用随取，为鲜石斛。

石斛品种繁多，如以茎圆外皮铁绿色者为“铁皮石斛”，药效甚佳；有茎扁外皮黄绿色者，称“金钗石斛”，故《备要》言光泽如金钗，股短而中实者良；有产于安徽霍山者，名“霍石斛”，滋阴生津作用亦较好。

本品甘而微寒。入胃、肾二经。以养胃阴，清虚热为主要功效，主治热病伤津，口干燥渴及病后虚热不退等证。此外，借其补养之功，尚有明目，强腰膝的作用，可用于骨痿痹弱，囊湿精少，小便余沥等证。

【临证应用】石斛功效重在养胃阴，多用于热病津伤及热病后期，阴虚津亏，余热未清，舌绛少津，夜热早凉等证，用鲜石斛配鲜生地、麦冬、花粉等养阴生津之品，治热病津伤烦渴，如清热保津法附方。若病后胃阴不足，舌干口渴，常与麦冬、沙参、玉竹等药同用。

本品补肾明目，用于肾阴亏损、视力减退，可配菊花、菟丝子、枸杞子等。如石斛夜光丸。

【用量用法】干品6—15克；鲜用15—30克。入汤剂宜先煎。

本品甘寒养阴，但亦能恋邪助湿，故温热证，尚未化燥者不宜早用，湿温病尤当忌用。

萎蕤

〔原文〕甘平。补中益气，润心肺，悦颜色，除烦渴。治风淫湿毒，目痛眦烂，风湿。寒热痞疔，疔，诗廉切，亦疔也。中风暴热，不能动摇，头痛腰痛，凡头痛不止者属外感，宜发散；乍痛乍止者属内伤，宜补虚。又有偏头痛者，左属风与血虚，右属痰热与气虚。腰痛亦有肾虚、气滞、痰积、血瘀、风寒、湿热之不同，凡挟虚挟风湿者，宜萎蕤。茎寒（1）自汗。一切不足之证，用代参芪，不寒不燥，大有殊功。昂按：萎蕤温润甘平，中和之品，若蜜制作丸，服之数斤，自有殊功，与服何首乌、地黄者，同一理也。若仅加数分子煎剂，以为可代参芪，则失之远矣。大抵此药性缓，久服方能见功，而所主者，多风湿虚劳之缓证，故臞仙以之服食，南阳用治风湿，《千金》、《外台》亦间用之，未尝恃之为重剂也。若急虚之证，必须参芪，方能复脉回阳，斯时即用萎蕤斤许，亦不敌参芪数分也。时医因李时珍有可代参芪之语，凡遇虚证，辄加用之，曾何益于病者之分毫哉！拙著方解，欲采萎蕤古方可以入补剂者，终不可得，则古人之罕用，亦可见矣。似黄精而差小，黄白多须。二药功用相近，而萎蕤更胜。竹刀刮去皮节，蜜水或酒浸蒸用。畏碱卤。陶弘景曰：《本经》有女萎无萎蕤；《别录》有萎蕤无女萎，功用正同，疑名异尔。玉竹、黄精用以调脾肺最为合宜，皆润不助湿，燥不碍肺。

【讲解】（1）茎寒：又称“阴头寒”、“阴冷”，指男子前阴自觉寒冷之证。

萎蕤善养肺胃之阴，且有补而不腻的特点。为百合科多年生草本植物玉竹的根茎。故又名玉竹。采挖后除去须根，晒干，切段生用或蜜炙用。

本品味甘多液，质柔而润，长于养阴，且补而不腻，有清养而不恋邪的特点。入肺、胃经。养肺胃之阴，治肺胃燥热之证，如肺燥干咳痰稠，胃热伤津烦渴，以及素体阴虚而感受外邪发热咳嗽等证皆可应用。

至《备要》云治风淫湿毒，目痛眦烂，及可代参、芪等语，均与临床应用不能吻合。正如黄宫绣所云：但此气平力薄，既与人参力厚不若，复与地黄味浓不合，即使用至斤许，未有奇功，较之人参补元，

地黄之滋阴，不啻天渊矣。……况书载云祛风除湿，不无疏泄于补，更云不及。

【临证应用】玉竹治肺胃阴伤，燥热干咳，舌干津少，常配麦冬、沙参、生地等同用；对虚人感冒风热，而发热咳嗽，咽痛口渴者，则多配薄荷、豆豉、白薇等同用，以滋阴解表，如加减萎蕤汤。

此外，本品性虽和平，然毕竟为滋阴润燥之品，脾虚而有痰湿者不宜服。

【用量用法】10—15克。清热养阴多生用，滋补多制用。制后滋补之功似与黄精相同，用于病后气阴两虚或诸虚劳损更妙。

黄精

〔原文〕甘平。补中益气，安五脏，益脾胃，润心肺，填精髓，助筋骨，除风湿，下三虫。以其得坤土之精粹，久服不饥。气满则不饥。脂川有人虐使婢，婢逃入山，拔草根食之甚美，久食不饥。夜宿树下，见草动，疑为虎，上树避之，及晓而下，凌空若飞鸟。家人采薪见之，告其主，设网捕不得。或曰：此岂有仙骨，不过服食灵药耳。遂设酒饌于路，果来食之，食讫，遂不能去。擒而询之，指所食之草，乃黄精也。俗名山生姜，九蒸九晒用。仙家以为芝草之类，服之长生。

【讲解】黄精既能补气，又能养阴，兼能益精。为百合科多年生草本植物黄精以及同属若干种植物的根。挖根晒干，切片入药为生黄精。古代医家认为黄精生用刺激咽喉，多经蒸制后入药，尤以九蒸九晒后呈黄黑色者为佳。

本品性味甘平，质润，入肺、脾、肾经。功能补脾益气，润肺滋阴，为治脾肺气阴两伤之要药，兼可补肾益精。《备要》云“以其得坤土之精粹。久服不饥”及逃婢之说，系神话其说。

【临证应用】黄精用于肺虚燥咳，可单用熬膏服，或配沙参、知母、贝母等养阴清肺药同用。用于脾胃气虚、食少神疲、脉虚软者，配党参、白术、茯苓等健脾补气药；若脾胃阴虚，口干食少、便秘者，配沙参、麦冬、生地等益气养阴之品。尤对温热病后期邪热已去，而气阴未复的患者，最为适宜。治肾虚精亏所致的腰痠、头晕等证，又可配以枸杞子、熟地等伍用。

本品甘平而作用缓慢，可作久服滋补之品。但性稍滋腻，易助湿邪，故脾虚有湿，咳嗽痰多及中寒便溏者均不宜用。

【用量用法】10—20克，煎服。

百合

〔原文〕甘平。润肺宁心，清热止嗽，益气调中，止涕泪，涕泪，肺肝热也。经曰：肺为涕，肝为泪，心为汗，脾为涎，肾为唾。利二便。治浮肿腹胀，痞满寒热，疮肿乳痈，伤寒百合病。行住坐卧不安，如有鬼神状。苏颂曰：病名百合，而用百合治之，不识其义。李士材曰：亦清心安神之效耳。朱二允曰：久嗽之人，肺气必虚，虚则宜敛。百合之甘敛，胜于五味之酸收。花白者入药。

【讲解】百合功专润肺止咳，清心安神。为百合科多年生草本植物百合和细叶百合的肉质鳞茎。剥取鳞茎，沸水烫或蒸后晒干入药。生用或炙用。

本品味甘微寒，甘润能补，寒能清热。入心、肺经。故有润肺止咳、清心安神之功。治肺燥干咳，劳嗽咯血，以及热病后期，虚烦惊悸，失眠多梦，精神不安等症最为适宜。

【临证应用】百合治肺热久咳，痰中带血，与款冬花同用，如百花膏。若与生地、玄参、贝母等滋阴润肺药同用，如百合固金汤，治劳热咳嗽，咽痛咯血。用于虚烦惊悸、失眠多梦，若与知母或地黄配伍，如百合知母汤、百合地黄汤，治病后余热未清而见上述证状者。

【用量用法】10—30克，煎服。清心宜生用，润肺宜炙用。

枸杞子枸杞叶

〔原文〕甘平。本草苦寒。润肺清肝，滋肾益气，生精助阳，补虚劳，强筋骨，肝主筋，肾主骨。去风明目，目为肝窍，瞳子属肾。利大小肠。治噤干消渴。昂按：古谚有云：出家千里，勿食枸杞。其色赤属火，能补精壮阳，然气味甘寒而性润，仍是补水之药，所以能滋肾益肝明目，而治消渴也。南方树高数尺，北方并是大树，以甘州所产红润少核者良。酒浸捣用。根名地骨皮。见下。

枸杞叶：名天精草，苦甘而凉，清上焦心肺客热。代茶止消渴。李时珍曰：皆三焦气分之药。

【讲解】枸杞甘润，为滋补肝肾而明目之要药。为茄科落叶灌木植物宁夏枸杞和枸杞的成熟果实。主产于宁夏、甘肃等地，以产于宁夏者质最优，称宁枸杞。生用，也可熟食浸酒服用。

本品味甘性平。入肝、肾、肺经。既能补肾以生精，又能养肝血以明目，无论肾阴虚或肾阳不足，以及精亏血虚之证，皆可应用。枸杞叶临床很少应用。

【临证应用】枸杞子治肝肾阴虚之头晕目眩、视力减退，常与地黄、菊花等同用，如杞菊地黄丸。治肝肾阴虚之腰膝痠软、遗精，可与黄精同用，如枸杞丸。若配麦门冬、知母、贝母等药物，可用于阴虚劳嗽，有滋阴润肺化痰之功。单用本品蒸熟嚼食，每次10克，一日2—3次，以治消渴。

枸杞子与菟丝子、潼蒺藜同为平补阴阳之品，功效相似，但菟丝子、潼蒺藜助阳之功胜于养阴；枸杞子养阴之功胜于助阳，且能补血，补益作用亦较菟丝子、潼蒺藜为佳。

【用量用法】5—10克。以其滋阴润燥，脾虚便溏者不宜服。

旱莲草

〔原文〕甘咸，汁黑。补肾止血，黑发乌髭。《千金》曰：当及时多收，其效甚速。《经疏》曰：性凉不益脾胃。故《千金方》金陵煎丸，用姜汁和剂。苗如旋覆，实似莲房，断之有汁，须臾而黑。熬膏良。

【讲解】旱莲草功能补肾益阴、凉血止血。为菊科一年生草本植物鳢肠的全草。又名鳢肠草、金陵草。揉搓其茎叶有黑色汁液流出，故又名墨旱莲。晒干切断，生用。

本品味甘酸，性寒。甘主补，酸能敛，寒清热，入肝、肾经。既能滋肾养阴，又善养肝凉血，有良好的止血作用。用于肝肾阴虚之头晕目眩，须发早白，以及阴虚血热之各种出血之证，如吐衄尿血、便血、崩漏等，内服、外用均颇有效。惟脾胃虚寒，大便泄泻者不宜服。

【临证应用】旱莲草用于肝肾阴虚之头晕目眩、须发早白，多与女贞子同用，如二至丸。用于阴虚血热之吐血、衄血、尿血、便血及崩漏等。以本品性寒凉，既可滋阴，又能凉血，而有较好的止血作用。单用捣汁服即可有效，也可与其他凉血止血药同用，以增强疗效。如治尿血，可与车前草同用；治便血，可与地榆、槐角同用；治崩漏，可与仙鹤草、阿胶等伍用。以本品捣烂外敷还可止外伤出血。此外捣烂外擦手足，可防治水田性皮炎，效亦良好。

【用量用法】10—15克，鲜者加倍，煎服。外用适量。

女贞子

〔原文〕甘苦而平，少阴之精，隆冬不凋。益肝肾，安五脏，强腰膝，明耳目，乌髭发，补风虚，除百病。女贞酒蒸，晒干二十两，桑椹干十两，旱莲草十两，蜜丸，治虚损百病。如四月，即捣桑椹汁；七月，即捣旱莲草汁，和药不必用蜜。李时珍曰：女贞上品妙药，古方罕用何哉？女贞冬青，本草作二种，实一物也。冬至采佳，酒蒸用。近人放蜡虫于此树。

【讲解】女贞子滋养肝肾之阴，有乌髮明目之效。为木樨科常绿乔木植物女贞的成熟果实。蒸熟，晒干用。

本品味甘苦，性凉。入肝、肾经。功能补肾益肝，是清补之品，为治肝肾阴虚之头晕耳鸣、双目昏糊、腰膝痠软、须发早白及骨蒸劳热等证的常用药。

冬青子为冬青科植物冬青的果实，果实虽相似，实是两种植物，功效亦有差别，本品功能祛风、补虚，用治风湿痹痛，不能相混。

【临证应用】女贞子用于肝肾阴虚之头昏目眩、腰膝痠软、须发早白，常与旱莲草、桑椹配伍。阴虚发热，多配地骨皮、牡丹皮、生地等养阴退虚热药同用。若与熟地、菟丝子、枸杞子等补肝肾明目药同用，可治肝肾阴虚之视力减退、目暗不明。本品性较平和，作用缓慢，久服始能见效。

女贞子补阴之功，不如熟地，但补而不膩，补中兼清，是其特点。其滋养肝肾的功效，又与枸杞子、桑椹子相近似，但枸杞子能平补阴阳，用治肝肾不足，不论阴虚阳虚都适用；桑椹既补肝肾之阴，又能补血；女贞子只能补阴，不能助阳，并无补血作用，偏治肝肾阴虚之证，这是三药的主要差别。

【用量用法】10—15克，煎服。虽补而不膩，但性质偏凉，多用易伤脾阳，故脾胃虚寒泄泻及阳虚者忌用。

桑椹

〔原文〕甘凉。色黑入肾而补水，利五脏关节，安魂镇神，聪耳明目，生津止渴，炼膏，治服金石药热渴。利水消肿，解酒乌髭。晒干为末，蜜丸良。取极熟者，滤汁熬膏，入蜜炼稠，点汤和酒并妙。入烧酒经年愈佳。每日汤点服，亦治瘰病，名文武膏，以椹名文武实也。

【讲解】桑椹功能滋阴补血，生津润肠。为桑科落叶乔木桑树的成熟果穗。生用，或加蜜熬膏用。

本品味甘、性寒。入心、肝、肾经。有养阴补血之效，为清补滋养肝肾之药，故凡阴亏血虚之眩晕、目暗、耳鸣、失眠、须发早白等证，均可应用。能生津止渴，对津伤口渴或消渴，以及血虚津少之肠燥便秘，亦有疗效。近用以治贫血、神经衰弱，糖尿病及阴虚型高血压等也获得较好的效果。

【临证应用】桑椹单用水煎过滤取汁加蜂蜜熬膏服，或于干品研末蜜丸服或与何首乌、女贞子、旱莲草等滋补药同用，而有滋阴补血之功，用于阴血不足、眩晕、失眠和须发早白，与麦冬、生地、天花粉等同用能滋阴、生津止渴，以治消渴之证。配伍生首乌、黑芝麻、火麻仁等药，有滋阴养血润肠之功，用于阴亏血虚的肠燥便秘。

【用量用法】10—15克。桑椹膏15—30克，温开水冲服。脾胃虚寒作泻者忌用。

楮实

〔原文〕甘寒。助阳气，起阴痿，补虚劳，壮筋骨，明目充肌。李时珍曰：《别录》、《大明》皆云楮实大补益，而《修真秘书》又云：久服令人骨痿。《济生秘览》治骨鲠用楮实煎汤，岂非软骨之征乎？《本草发明》甚言其功，今补药中罕用，乃未之察耳。取子浸去浮者，酒蒸用。

楮皮善行水，治水肿气满。皮可为纸，楮汁和白芨飞面，调糊接纸，永不解脱。

【讲解】楮实功能滋肾清肝明目。为桑科植物构树的果实。投水浮者去之，即去掉浮水面的未成熟者，然后晒干酒浸蒸焙令干用。

楮实味甘，性寒。入肝、脾、肾经。肝主筋，肾主骨，肝又开窍于目，本品滋肾养肝、明目。故可用于肝肾不足，筋骨软弱，腰膝痠困，目暗目翳以及水肿等证。

【临证应用】楮实用于阴虚咳血，骨蒸盗汗，眼目昏花等证，常与枸杞子同用。治水气膨胀，配茯苓为丸服。

【用量用法】6—10克。煎服或入丸、散。

附：楮皮即构树的韧皮部。味甘，性平。有顺气利水之功，治疗气满水肿者。近代报导，用本品配伍鱼腥草等药，治疗慢性气管炎。

落花生

〔原文〕辛能润肺，香能舒脾。果中佳品，出闽广。藤生，花落地而结实，故名。按：落花生本草未收，本无当医药之用，然能益脾润肺，实佳果也。

因世人谤之者多，附见于此，明其有利无害也。炒食。

【讲解】落花生润肺补脾。为豆科一年生草本植物落花生的种子，俗称“花生米”，入药生用。

本品味甘性平。入脾、肺经，功专润肺补脾。治燥咳、反胃、脚气及乳妇奶少等证。《本草求真》云：盖此气味虽纯，既不等于胡桃肉之热，复不类乌芋、菱角之凉，食则清香可爱，适口助茗，最为得宜。第此体润质滑，施于体燥坚实则可；施于体寒湿滞，中气不运，恣啖不休，保无害脾滑肠之弊乎？仍当从其体气以为辨别，则得之矣。

【临证应用】治燥咳、百日咳等，可与冰糖煎汤调服；用治脚气可与赤小豆、红枣煮汤常服；治乳汁少可与猪蹄炖服。近年用花生衣（花生种皮）治疗各种出血症，止血效果较为满意，尤其对血友病、原发性及继发性血小板减少性紫癜的止血效果更为明显。此外，尚可治疗慢性气管炎，单用煎汤加冰糖服有良效。

【用量用法】无定量，多作食品，或煎服或生研冲服。

龟版

〔原文〕甘平至阴，属金与水，补心益肾，滋阴资智。性灵故资智，通心益肾以滋阴。治阴血不足，劳热骨蒸，腰脚痠痛，久泻久痢，能益大肠。久嗽痰疟，老疟也。或经数年，中有痞块，名疟母。癥瘕崩漏，五痔难产，为末酒服，或加芎归煨发。阴虚血弱之证。益阴清热，故治之。李时珍曰：龟鹿者皆灵而寿，龟首常藏向腹，能通任脉，故取其甲，以补精、补肾、补血，以养阴也；鹿首常还向尾，能通督脉，故取其角，以补命补精补气，以养阳也。昂按：本草有鹿胶而不及龟胶，然板不如胶，诚良药也，合鹿胶，一阴一阳，名龟鹿二仙膏。大者良，上下甲皆可用。酥炙或酒炙、醋炙、猪脂炙、煨灰用。洗净槌碎，水浸三日用，桑柴熬膏良。自死败龟尤良，得阴气更全也。恶人参。

龟尿：走窍透骨，染须发，治哑聋。以镜照之，龟见其影，则淫发而尿出，或以猪棕毛刺其鼻，尿亦出。

【讲解】龟版善能滋阴潜阳，益肾健骨，补血。为龟科动物乌龟的腹甲，背甲一般不用，多以砂炒炮用，或醋炙用。

本品甘咸性寒，入肝、肾、心经。甘咸入肾，能滋阴补肾，质重能潜敛浮阳，并能清心降火。肾阴足则虚阳下潜，心火降则虚热自清。故凡肾阴不足之骨蒸劳热、盗汗，阴虚阳亢之眩晕耳鸣，阴虚风动之手足瘛瘲等证，皆为常用之品。益肾又能健骨，对肾阴亏虚之腰脚软弱、筋骨不健以及小儿行迟、囟门不合等证，尤为适用。本品还有益血补心的功效，用于心虚惊悸、失眠、健忘。此外，龟版益肾阴而通任脉，性平而偏凉，有止血功效，所以又可用于阴虚血热之崩漏、月经过多之证。

用龟版熬煮成的固体胶块，为龟版胶，性味功效与龟版相同，但滋阴、补血、止血之功更强。正如《本草正》所述：龟版胶，功用亦同龟版，而性味浓厚，尤属纯阴，能退孤阳。为治阴虚劳热、阴火上炎、吐血衄血、肺热咳喘、消渴烦扰、热汗惊悸、谵妄狂躁之要药。

龟尿临证极少应用。

【临证应用】龟版用于肝阳上亢，头晕目眩，常与生地、石决明、菊花等同用。若配伍阿胶、生地、牡蛎、鳖甲等药，能治热病伤阴，虚风内动，头晕目眩，心烦作恶，甚则痉厥等证，如三甲复脉汤。治阴虚火旺、骨蒸劳热、咳嗽咯血、盗汗遗精等证，可与熟地、知母、黄柏同用，如大补阴丸。若与熟地、黄柏、虎骨等药配伍，可治肾虚筋骨痿弱无力，如虎潜丸。用于心虚惊悸、失眠健忘等证，则与龙骨、菖蒲、远志等镇心安神药同用，如孔圣枕中丹。此外，阴虚血热之崩漏，亦常配用本品。

龟版与鹿茸都有益肾健骨之功，可治筋骨痿软之证。但龟版益肾阴而通任脉，能滋阴潜阳，补血止血，治阴虚发热、血热崩漏等证；鹿茸则壮肾阳而补督脉，温肾助阳，生精益髓，治阳虚畏寒、虚寒崩漏之证。一为补阴，一为助阳，作用不同，不可相混。若阴阳两虚者，又可配合使用。

【用量用法】10—30克，入汤剂宜先煎。生龟版偏清虚热，炙龟版偏滋阴潜阳。本品为咸寒之品，只适宜于阴虚有热之证，故脾胃虚寒者忌用。又古籍记载，本品能软坚去瘀治难产，故孕妇慎用。

鳖甲

〔原文〕咸平属阴，色青入肝，治劳瘦骨蒸，往来寒热，温疟疟母，疟必暑邪，类多阴虚之人，疟久不愈，元气虚羸，邪陷中焦，则结为疟母。鳖甲能益阴除热而散结，故为治疟要药。腰痛胁坚，血瘀痔核，咸能软坚。经阻产难，肠痈疮肿，惊痫斑痘，厥阴血分之病。李时珍曰：介虫阴类，故皆补阴，或曰：本物属金与土，故入脾肺而治诸病。色绿九肋，重七两者为上。醋炙，若治劳，童便炙，亦可熬膏。

鳖肉：凉血补阴，亦治疟痢。煮作羹食，加生姜、沙糖，不用盐酱，名鳖糖汤。恶矾石，忌苋菜、鸡子。鳖色青，故走肝益肾而退热；龟色黑，故通心入肾而滋阴，阴性虽同，所用略别。

鳖胆：味辣，可代椒解腥。

【讲解】鳖甲既能滋阴潜阳，又能软坚散结。为鳖科动物鳖的背甲。多以砂炒炮用，或醋炙用。

本品味咸性寒，主入肝经。有滋阴、潜阳、退虚热之功，以治阴虚发热、骨蒸盗汗及阴虚阳亢动风之证。其滋阴作用不及龟板，但清热作用较龟板强。

鳖甲有通血脉、散结消癥之功，以治久疟疟母，肝脾肿大，腹中瘀块及妇女血瘀闭经等证。

鳖肉甘平，入肝。具有滋阴凉血之功，治骨蒸劳热、久疟久痢、崩漏带下等。煮食或入丸剂用。

鳖胆，《本草纲目》云：鳖胆味辣，破入汤中可代椒而辟腥气。

【临证应用】鳖甲配伍牡蛎、生地、阿胶等，可滋阴潜阳，治热病后期，阴伤虚风内动，脉沉数，舌干齿黑，手指蠕动，甚则痉厥等证，如二甲复脉汤。若与青蒿、生地、丹皮、知母等同用，如青蒿鳖甲汤，治热病伤阴而致夜热早凉、形瘦脉数、舌红少苔；与银柴胡、地骨皮、青蒿、知母等清退虚热药同用，如清骨散，治骨蒸劳热。鳖甲

与柴胡、麝虫、丹皮等同用，治久疟、疟母致肝脾肿大、胁肋疼痛，如鳖甲煎丸；若与大黄、琥珀组成鳖甲丸，可治经闭、癥瘕。

【用量用法】10—30克，先煎。滋阴潜阳宜生用，软坚散结宜醋炙用。脾胃虚寒、食少便溏及孕妇均忌服。

胡麻

〔原文〕甘平。补肺气，益肝肾，润五脏，填精髓，坚筋骨，明耳目，耐饥渴，可以辟谷，但滑肠，与白术并用为胜。乌髭鬚，利大小肠，遂风湿气，刘河间曰：麻木谷而治风。又曰：治风先治血，血活则风散。胡麻入肝益血，故风药中不可缺也。郑奠一用鳖虱胡麻，佐苦参、蒺藜，治大疯疥癩，屡有愈者。凉血解毒，生嚼敷小儿头疮。

麻油 滑胎疗疮，熬膏多用之。凉血解毒，止痛生肌。皮肉俱黑者良。入肾。栗色者名鳖虱胡麻更佳，九蒸九晒，可以服食。陶弘景曰：八穀之中，惟此为良。昂按：若云自大宛来，则非八穀之麻明矣。又按：月令仲秋之月，天子以犬尝麻，则其为八穀之麻又可见矣。种出大宛之说，何以称焉？岂白者产中原，黑者产大宛乎？

【讲解】胡麻补益精血、润燥滑肠。为胡麻科一年生草本植物脂麻的成熟种子，即黑脂麻，又名巨胜子，均出自《本经》。种子富油性，榨出的油，即麻油。另有鳖虱胡麻，为亚麻的种子。但胡麻子、巨胜子、亚麻子、鳖虱胡麻常混淆不清，商品亦不统一，有以亚麻称胡麻的，如《植物名实图考》为山西胡麻，《中国药物志》为胡脂麻，《昆明民间常用草药》为胡麻，《博济方》称亚麻子为胡麻子。有的以茺蔚子为巨胜子，鳖虱胡麻为胡麻子等。《本草纲目》云：今市肆间因茎分方圆之说，遂以茺蔚子伪为巨胜，以黄麻子及大藜子（亚麻子）伪为胡麻，误而又误矣。茺蔚子长一分许有三棱；黄麻子黑如细韭子，味苦；大藜子状如鳖虱及酸枣核仁，味辛甘，并无脂油，不可不辨。即黑脂麻，胡麻、巨胜子为一类；亚麻子、鳖虱胡麻为一类；茺蔚子系益母草种子，应分别使用。

本品味甘性平，入肝、肾经。能养肝血、滋肾阴、润燥滑肠，用于肝肾阴血不足引起的头晕目眩、须发早白、耳鸣肢麻，以及肠燥便秘等证，有良好的疗效。然性滑利，故大便溏泻者不宜服。

【临证应用】胡麻用于肝肾亏损，头晕目眩、须发早白等证，常与桑叶同用，如桑麻丸。也可与枣肉及蜂蜜为丸服。治肠燥便秘多与当归、肉苁蓉、火麻仁等养血润肠药同用。

【用量用法】10—30克，宜炒熟用。

乌骨鸡

〔原文〕甘平。鸡属木，而骨黑者属水，得水木之精气，故能益肝肾，退热补虚。治虚劳消渴，下痢噤口，煮汁益胃。带下崩中，肝肾血分之病。鬼击卒死者，用其血涂心下效。《睽单志》：夏侯弘捉得一小鬼，问所持何物？曰：杀人以此矛戟中心腹者，无不辄死。弘曰：治此有方否？鬼曰：以乌鸡血敷之即瘥。骨肉俱黑者良，舌黑者骨肉俱黑。男用雌，女用雄。女科有乌鸡丸，治百病。

【讲解】乌骨鸡为养阴退热佳品。为雉科动物乌骨鸡的肉或除去内脏的全体。

本品性味甘平，入肝、肾经。功能养阴退热，有良好的补益之效。可用治虚劳骨蒸羸瘦、消渴、脾虚滑泄、崩中带下等证。《本草经疏》：乌骨鸡补血益阴，则虚劳羸弱可除，阴回热去，则津液自生，渴自止矣。阴平阳秘，表里固密，邪恶之气不得入。心腹和而痛自止。益阴，则冲、任、带三脉俱旺，故能除崩中带下一切虚损诸疾也。

【临证应用】用乌骨鸡配人参、黄芪、柴胡、当归、熟地、白芍、五味子等，制丸内服，可治虚劳消瘦、四肢倦怠、五心烦热、潮热盗汗等证。如《杏苑生春》乌鸡丸。

《本草纲目》记载，用乌骨母鸡一只，洗净；复以豆蔻一两，草果两枚，烧存性，掺入鸡腹内，扎定煮熟，空腹食之，治脾虚滑泄。

又如《袖珍方》乌鸡煎丸：当归、黄芪、生熟地、人参、茯苓等共为细末，用鸡汁打糊为丸，治妇人虚劳血气、赤白带下。

【用量用法】内服多煮食，或研末入丸、散剂。

黑大豆

〔原文〕甘寒色黑，属水似肾，肾之穀也。豆有五色，各入五脏。故能补肾，镇心，肾水足则心火宁。明目，肾水足则目明。利水下气，古方治水肿，每单用，或加他药。散热祛风，炒热酒沃，饮其汁，治产后中风危笃及妊娠腰痛，兼能发表。《千金》曰：一以去风，一以消血结。活血，《产书》曰：熬令烟绝，酒淋服，下产后余血。解毒，苏颂曰：古称大豆解百药毒，试之不然，又加甘草，其验乃奇。消肿止痛。捣涂一切肿毒；煮食稀痘疮。紧小者良。小者名马料豆，每晨盐水吞，或盐水煮食，补肾。畏五参、龙胆、猪肉。忌厚朴。犯之动气。得前胡、杏仁、牡蛎、石蜜、诸胆汁良。

【讲解】黑大豆补肾、利水、解毒。为豆科植物大豆的黑色种子。

本品味甘性微寒，入脾、肾经。功能益肾利水、解毒消肿。适用于水肿胀满、脚气、黄疸，以及疮疡肿毒等证；且善解诸药毒。

【临证应用】黑大豆有益肾之功，常与天花粉配伍，以治肾虚消渴；单用煮汁服，可治水肿、小便不利和脚气肿痛。外敷治丹毒、烫火伤有效。与甘草同用，解诸药毒效更好。

【用量用法】10—15克，煎煮服。外用适量。

小结

一、补气药

本类药物性味多属甘平（微温），均能补脾益气，多用于脾肺气虚之证。

人参为补气主药，独能大补元气，以治虚脱危急之证。并能生津止渴，安神益智，故凡暴脱虚喘、脾胃虚弱、惊悸健忘、消渴、阳痿及一切气血津亏之证，皆可使用。人参主要分红参、生晒参、白参三种，红参性偏温热，补气温阳之力较强，脾胃阳衰者宜之。生晒参效同红参，惟性趋平和。白参力薄，一般虚证宜之。党参甘平，功近人参，虽可代人参用，但药力薄弱缓慢，多用于一般补益剂中，若治虚脱重证、急证，仍以人参为宜。西洋参除有补气作用外，且有养阴、清火生津之效能，多用于热病气阴两伤者。太子参为清补之品，有类似人参的益气生津作用，唯补力比党参又差。

黄芪甘温，生用偏于固表止汗、利水消肿、托疮生肌，多用于表虚自汗、气虚水肿及痈疽不溃或久溃不敛之证，为外科良药。炙用善于补中益气、升举清阳，又能生血，可治中气不足、清气下陷及气不摄血等证，又为气虚血亏之要药。

白术、山药均能补脾益气，常同用于脾虚泄泻之证，但白术性较温燥，能补脾阳，燥湿利水，兼能固表止汗。除治脾虚泄泻外，还常用于痰饮、水肿及表虚自汗等证。山药甘平质润，不寒不燥，既能补气养阴，又能补益肺肾，且兼涩性。除治脾虚泄泻外，尚可用于肺虚喘咳、肾虚遗精、带下以及消渴等证。

白扁豆甘补不腻、温化不燥，为补脾化湿之佳品，并有消暑作用。对于脾虚湿盛之证，最为适合。暑湿泄泻，亦有良效。扁豆衣功同扁豆，而力略逊，然无壅滞之弊，适用于脾虚泄泻、浮肿。扁豆花消暑化湿，多用于夏伤暑湿之证。

甘草生用性凉，长于清热解毒，为外科所常用。炙用甘温质润，能补脾益气、润肺止咳、缓急止痛。生用、炙用，均能缓和药性、解百药

毒。大枣甘温补中，益气调营，养血安神。

二、补阳药

本类药物性多温热，具有补肾壮阳作用，多用于肾阳不足诸证。

鹿茸为峻补肾阳之品，并能益精血、强筋骨，故凡肾阳不足、精血亏虚之证，均可应用，疗效颇佳。鹿角补性较弱，但能活血消肿，以治疮疡肿毒、乳痈肿痛为长。鹿角胶温补精血，虽不如鹿茸之峻，然能止血，可治虚寒崩漏。鹿角霜补阳力薄，但不滋腻，且有收敛止血作用。麋茸、麋角功同鹿茸、鹿角。

巴戟天、淫羊藿、仙茅均能壮肾阳、强筋骨、祛风湿，主治肾阳不足、阳痿、早泄、腰膝无力、风寒湿痹等证。巴戟天性较缓和，以补肾壮阳为主，其补肾之力次于苁蓉，壮阳之力弱于淫羊藿，又无苁蓉之润性，而强壮筋骨之作用较胜。淫羊藿壮阳、温燥之性较强，并善走散，以祛风寒湿邪。仙茅性犹猛烈，一般不作补药常服。

肉苁蓉、锁阳均能补肾助阳、益精、润肠，以治阳痿不孕，腰膝软弱无力，肠燥便秘等证。然苁蓉温而不燥、补而不峻，壮阳兼能补阴，益精可以生血。锁阳性较温燥，壮阳之功较苁蓉为强，润肠作用则逊于苁蓉。

补骨脂补肾壮阳，兼能温脾止泻，以治阳痿遗精、腰膝冷痛、遗尿尿频及脾肾阳虚泄泻之证。益智仁既能补肾缩尿，又能温脾摄唾，对肾虚遗尿尿频、脾虚唾涎自流等证，均有一定疗效。补骨脂补肾壮阳胜于温脾，益智仁温脾散寒胜于暖肾。

菟丝子、沙苑子皆为平补肝肾之品，有补肾涩精、养肝明目之功，以治肝肾亏虚、梦遗滑精、尿频遗尿、两目昏暗等证。唯菟丝子补肾助阳之力较沙苑子为胜，并能温脾止泻；而沙苑子固精止遗之力较菟丝子为强，也能明目。

杜仲、续断均能补肝肾、固冲任以安胎，常同用于腰膝痠痛、胎动不安等证。然杜仲补益之力较胜，且能强筋骨、降血压，故尤宜于肾虚腰痛、筋骨无力，并治高血压病；续断善能利血脉、续筋骨，故多用

于筋骨折伤以及崩漏之证。狗脊亦能补肝肾、强腰膝，并有祛风湿、利关节作用，用治肝肾不足，兼有风湿之腰脊痠痛最为适宜。

骨碎补补肾之中又善于续骨疗伤，为治骨折筋伤之常用药。胡芦巴温肾之中又长于散寒止痛，为治寒疝少腹冷痛之主药。韭子除有补肝肾、暖腰膝之功外，且能壮阳、固精。阳起石主在温肾壮阳，以治阳痿早泄、宫冷不孕，但性慁悍，不宜单用久服。

冬虫夏草既能补肾阳，又可益肺阴，多用于虚劳咯血之证。蛤蚧、胡桃肉均能补益肺肾，尤长于纳气平喘，善治肺肾虚之喘咳，但蛤蚧兼能温肾助阳，以治肾虚阳痿之证；而胡桃质润，兼有润肠之功，可治肠燥便秘之证。紫河车温而不燥，性较平和，既能补益精血，又能益气助阳，故凡气血精亏及肺肾虚喘等证，皆可应用。海狗肾为补肾壮阳之品，有壮肾阳、益精髓之效，常单味应用，亦可配伍补肾药同用。海马能温肾壮阳。羊肉益气助阳，阳虚能壮，劳伤可补。

三、补血药

本类药物均具有补血作用，以治血虚之证。

熟地既能养血滋阴，又能益精补髓，为滋补肝肾要药，故凡肾阴不足、肝血亏虚之证，用之均有良效，但性粘腻，能助湿呆胃，故常与行气开胃之砂仁同用。何首乌制用功近熟地而力稍逊，但滋而不腻、温而不燥，并有涩精作用，此均为熟地所不及；生用补益力弱，且无涩敛之功，而有通便作用。

当归善能补血调经，活血止痛，兼能行气，为妇科要药，对妇女月经不调、痛经、经闭以及胎前产后诸证，不论血虚、血瘀、血寒、血热以及气滞等均为主药，又常用于痈肿、扑损、痹痛，并能润肠，血虚便秘更佳。白芍长于养血敛阴，缓急止痛，平抑肝阳，主用于血虚、肝郁所致的月经不调、痛经、胸胁腹痛、四肢挛急以及血虚阴亏、肝阳上升之头痛眩晕等证。当归补血性偏于温，血虚有寒者效强；白芍补血偏于凉，血虚有热者功良。当归还能活血行气；白芍又可敛阴柔肝。当归能润肠；白芍缓挛急。二药均能止痛，但止痛作用不同。

阿胶补血养阴、滋肺润燥，并善止血，故凡血虚阴亏、肺虚燥咳及一切出血证，均有良效。龙眼肉为滋补佳品，既能补脾气，又能养心血，且善安神，主用于心脾两虚、气血不足之失眠健忘、惊悸怔忡等证。

四、补阴药

本类药物多属甘寒滋润之品，均具有滋阴清热、生津润燥的作用，主用于阴虚火旺诸证。

沙参既能养阴清肺，又可益胃生津，常用于肺热燥咳或劳嗽咳血以及热病伤津，口干舌燥等证。北沙参养阴润肺之力较强，南沙参能祛痰，鲜用清热生津作用更佳。

麦门冬、天门冬均能养阴清热、润燥生津，但麦门冬微寒，除清肺润燥外，又善能养胃生津，兼入心经以清心除烦，故肺胃津伤阴亏及心烦、心悸等证多用之；而天门冬大寒，清肺润燥，兼入肾经以滋肾阴，故肺肾阴虚多用之。

石斛、玉竹均以滋养胃阴为主，多用于胃阴不足，津伤口渴等证，但石斛性善清养，清虚热之功为胜，鲜用清热生津之力尤大；玉竹性较滋润，兼能润肺止咳。黄精补脾润肺，质较滋腻，补阴之功居多，故脾虚有湿者忌用。百合长于润肺止咳，兼能清心安神。

枸杞子、旱莲草、女贞子均为滋补肝肾之药，皆可用治肝肾阴虚之证、枸杞子为平补肝肾要药，既能滋肾之阴，又能补肾之阳，并能养肝明目，无论肾阴亏虚或肾阳不足及精亏血虚之证，均可应用。旱莲草性酸寒而入肝，善能凉血止血，以治阴虚血热之证。女贞子专以养肝肾为用，补中兼清。桑椹滋阴补血，凡阴血亏虚，眩晕失眠及津少消渴等证均可用之。楮实能滋肾、清肝、明目，临床少用。落花生功主润肺补脾，但一般不作药用。

龟板、鳖甲性味功效相似，均为滋阴潜阳之要药，常用于阴虚阳亢之证，但龟板滋阴力强，并有健骨之能，又有补血之功；鳖甲退虚热功胜，又能软坚散结，以治肝脾肿大、腹中瘀块及妇女血瘀经闭等证。

黑脂麻补益精血，用于精血不足的鬚髮早白、头晕眼花，可以蒸熟或炒香研末服用，也可配成复方应用，且本品油润多脂，能养血润燥、滑肠通便。黑大豆补肾利水，可治阴虚血亏及水肿之证。乌骨鸡养阴退热，有良好的补益功效。

补益药功用归纳简表

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
补气药	人参	甘、微苦、微温	脾、肺、心	大补元气，补肺益脾，生津、安神	①元气虚脱、脾肺气虚 ②热病津伤口渴，消渴 ③心神不安、惊悸健忘	5—10克 大剂量至15—30克 研末服每次1—2克	宜另煎服反藜芦畏五灵脂忌与萝卜同服

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	党参	甘、平	脾、肺	补中益气，生津养血	①中气不足、肺气亏虚 ②热病伤津 ③血虚面色萎黄	10—30克	反藜芦
	西洋参	苦、微甘、寒	心、肺、肾	补气养阴，清火生津	①阴虚火旺，喘咳痰血 ②热病津伤，口干舌燥	3—6克	另煎和服
	太子参	甘、微苦、平	脾、肺	补气生津，为清补之品	脾虚食少、心悸自汗，	10—30克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
					津亏 口渴		
	黄芪	甘、 温	脾、 肺	生 用： 益卫 固 表， 利水 消 肿， 托毒 生肌 炙 用： 补气 升阳	生 用： ①表 虚自 汗② 气虚 水肿 ③痈 疽不 溃或 溃久 不敛 炙 用： ①脾 肺气 虚、 中气 下陷 ②气 不摄 血的 出血 证	10— 30克 大剂 量 30— 60克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
补气药	白术	苦、甘、温	脾、胃	补气健脾，燥湿利水，止汗安胎	①脾胃虚弱②痰饮、水肿③表虚自汗④脾虚之胎动不安	5—15克	燥湿利水生用；补气健脾炒用；健脾止泻宜炒焦用。

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	山药	甘、平	脾、肺、肾	补脾胃，益肺肾，益气养阴	①脾虚泄泻②肺虚喘咳③肾虚遗精、带下、消渴	10—30克 大剂量至60—250克	补阴宜生用，健脾止泻宜炒黄用。
	白扁豆	甘、微温	脾、胃	健脾化湿	①脾虚泄泻、带下②暑湿吐泻	10—20克	健脾止泻宜炒用，消暑宜生用
	大枣	甘、温	脾、胃	补脾胃，养血安神，缓和药性	①中气不足、食少便溏②血虚萎黄、脏躁	3—12枚 或10—30克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	甘草	甘、平	心、肺、脾、胃	补中益气，缓急定痛（以上炙用） 清热解毒（生用）	①脾胃虚弱②咳嗽气喘 ③脘腹或四肢挛急疼痛 ④疮疡肿毒、食物或药物中毒	2—10克	反大戟、甘遂、芫花、海藻

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
补阳药	鹿茸	甘、咸、温	肝、肾	补肾阳，益精血，强筋骨	①肾阳不足，阳痿早泄、宫寒不孕 ②筋骨软弱无力、小儿发育不良③崩漏带下、阴证疮疡内陷不起、疮溃不敛	1—3克研末吞服	或入丸散

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	鹿角	咸、温		补性较弱，活血散瘀消肿	疮疡肿毒、乳痈、瘀血作痛	5—10克	
	鹿角胶	甘、咸、温		补肝肾，益精血，兼止血	①肾阳不足、精血亏虚②虚寒性出血	5—10克	烊化服
	鹿角霜			补力虽弱，然不滋腻，可收敛止血	妇女崩带、创伤出血、疮疡久不收口	10—15克外用适量	
	巴戟天	辛、甘、微温	肾	补肾助阳，祛风除湿	①阳痿早泄②肾阳虚兼寒湿痹痛者	10—15克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	肉苁蓉	甘、咸、温	肾、大肠	补肾阳，益精血，润肠通便	①肾阳不足，阳痿不孕②肠燥便秘	10-20克	
	锁阳	甘、温	肝、肾、大肠	补肾助阳，润肠通便	①肾虚阳痿②津枯便秘	10-15克	
	淫羊藿	辛、甘、温	肝、肾	补肾壮阳，祛风除湿	①阳痿早泄、腰膝酸软②寒湿痹痛	10-15克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
补阳药	仙茅	辛、热、有毒	肾	温肾壮阳，祛寒除湿	①阳痿精冷、小便不禁 ②腰膝冷痹	3-10克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	破故纸	苦、辛、大温	肾、脾	补肾助阳，固精缩尿，温脾止泻	①阳痿早泄、遗精遗尿、腰膝冷痛 ②虚寒泄泻	5-10克	又名补骨脂
	益智仁	辛、温	脾、肾	补肾固精，温脾摄唾	①遗精遗尿②虚寒泄泻、唾涎自流	3-6克	
	沙苑蒺藜	甘、温	肝、肾	补肾固精，养肝明目	①遗精遗尿②肝肾不足之眼目昏花	10-20克	刺蒺藜：苦、辛平。入肝、肺经。疏肝

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
							平肝、祛风明目，与沙苑蒺藜功效不同，不可混同。
	菟丝子	辛、甘、平	肝、肾	补肾固精，养肝明目，补脾止泻	①肾虚遗精②两目昏糊③脾虚久泻	10—15克	
	杜仲	甘、温	肝、肾	补肝肾，强筋骨，安胎，	①肝肾不足，腰膝酸痛②胎动不	10—15克大剂量	炒断丝用

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				降血压	定③ 高血压病	至 30 — 60 克	
	续断	苦、甘、辛、微温	肝、肾	补肝肾，行血脉，续筋骨	①腰痛脚弱②胎漏下血③跌打损伤	10 — 30 克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
补阳药	狗脊	苦、甘、温	肝、肾	补肝肾，强腰膝，祛风湿	①腰痛脊强、足膝软弱②小便不禁、白带过多	10—15克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	骨碎补	苦、温	肝、肾	补肾续伤，活血止血	①肾虚腰痛②骨折损伤③外治斑秃	10—20克 外用适量	
	葫芦巴	苦、温	肝、肾	温肾阳，逐寒湿、	疝气疼痛，寒湿脚气	3—10克	
	冬虫夏草	甘、温	肾、肺	益肾补肺，止血化痰	①久咳虚喘、劳嗽痰血②肾虚阳痿、腰膝酸痛	5—10克	
	蛤蚧	咸、平	肺、肾	补肾益肺，纳气平喘	①肺肾两虚，咳嗽气喘②肾虚阳痿	3—6克研末服 每次1—2克浸酒服 1—2对	
	胡桃	甘、温	肾、肺、	补肾强腰	①腰痛脚弱②	10—30克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			大肠	膝， 敛肺 定喘， 润肠 通便	虚寒喘 咳③肠 燥便秘		
	紫河车	甘、 咸、 温	肺、 肝、 肾	补 精， 养 血， 益 气	①肾气 不足、 精血衰 少、阳 痿遗 精、耳 鸣耳聋 ②肺肾 两虚之 咳喘	1.5 —3 克研 粉吞 服	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
补阳药	海狗肾	甘、咸、大热	肾	暖肾壮阳，益精补髓	阳痿精冷、腰膝痿弱	1.5-3克	入丸散
	韭子	辛、甘、温	肝、肾	补肝肾，暖腰膝，壮阳固精	阳痿、腰膝酸软冷痛、遗精、尿频、白带过多	5-10克	
	阳起石	咸、温	肾	温肾壮阳	男子阳痿、女子宫冷	3-6克	入丸散
	海马	甘、咸、温	肝、肾	温肾壮阳	男子阳痿、女子宫冷	1-1.5克	研末服
	羊肉	甘、温	脾、肾	益气补阳	阳虚劳伤	无定量	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
补血药	熟地黄	甘、微温	肝、肾	养血滋阴，补精益髓	①血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、崩漏②肾阴不足、劳热盗汗、遗精、消渴	10-30克	炒炭用于止血

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	何首乌	苦、甘涩、微温	肝、肾	制用：补肝肾益精血生用：润肠通便，解毒疗疮	①精血亏虚、头晕眼花、早白、久疟②肠燥便秘③瘰癧疮痈	10—30克	
	夜交藤	甘、平	心、肝	养心安神，通络祛风	①失眠多汗②血虚肢体酸痛	15—30克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
补血药	当归	甘、辛、温	肝、心、脾	补血调经，活血止痛，润肠通便	①月经不调、经闭、痛经②虚寒腹痛、跌打损伤、风湿痹痛、痈疽疮疡③血虚肠燥便秘	5-15克	归身补血；归尾活血；全当归和血；酒制加强活血之功。

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	白芍	苦、酸、微寒	肝、脾	养血敛阴，柔肝止痛，平降肝阳	①月经不调、经闭腹痛、崩漏②自汗盗汗③肝气不和之脘胁疼痛、四肢拘挛疼痛④肝阳上亢，头痛眩晕	5—10克 大剂量15—30克	反藜芦
	阿胶	甘、平	肺、肝、肾	补血止血，滋阴润肺	①血虚眩晕心悸②吐衄崩漏③心烦失眠④虚劳喘咳	5—15克 烊化服	蛤粉炒润肺，蒲黄炒止血。
	龙眼肉	甘、温	心、脾	补心脾，益气血	心脾两虚，失眠健忘	10—15克 大	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
						剂量 30克	
补阴药	沙参	甘、微寒	肺、胃	润肺止咳，养胃生津，	①肺热阴虚之干咳、燥咳②胃阴不足之舌干口渴	10—15克 鲜品至15—30克	北沙参滋阴力强，南沙参兼可祛痰。反藜芦
	麦冬	甘、微苦、微寒	肺、心、胃	润肺养阴，清心除烦，养胃生津	①燥咳咯血②心烦失眠③舌干口渴	10—15克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
补阴药	天门冬	甘、苦、大寒	肺、肾	清肺火, 滋肾阴	①肺肾阴虚, 燥咳痰粘、气喘咯血 ②热病伤阴	6-15克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	石斛	甘、微寒	胃、肾	养胃生津, 滋阴除热, 明目	①热病伤阴 ②虚热不退 ③视力减退	6-15克 鲜品用15-30克	
	菱薏	甘、平	肺、胃	滋阴润肺, 养胃生津	①肺燥咳嗽 ②胃热津伤	10-15克	又名玉竹
	黄精	甘、平	脾、肺、肾	润肺滋阴补中益气,	①肺虚燥咳 ②肾虚精亏 ③脾胃虚弱	10-20克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				补肾益精			
	百合	甘、微寒	肺、心	润肺止咳， 宁心安神	①肺热劳嗽 ②热病后心烦失眠	10-30克	
	枸杞子	甘、平	肝、肾、肺	补肾益精，养肝明目，润肺	①肝肾阴虚，头晕目眩、眼目昏花 ②阴虚劳嗽、消渴	5-10克	
	旱莲	甘、酸、	肝、肾	补肾	①头晕目眩、	10-15	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	草	寒		养阴, 凉血止血	须发早白 ②血热之各种出血证	克	
	女贞子	甘、苦、凉	肝、肾	补肾滋阴,养肝明目	头晕目眩、须发早白、阴虚发热	10-15克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	量	备注
补阴药	桑椹	甘、寒	肝、肾	养阴补血	①眩晕耳鸣、须发早白 ②消渴	10—15克	

分类	药名	性味	归经	功效	主治	量	备注

分类	药名	性味	归经	功效	主治	量	备注
	楮实	甘、寒	肝、脾、肾	滋肾养肝，明目	①筋骨软弱②目暗目翳	6—10克	
	落花生	甘、平	脾、肺	润肺补脾	①燥咳②反胃乳少	无定量	多作食品，临床少用。
	龟板	甘、咸、寒	肝、肾、心	滋阴潜阳，益肾健骨，补血止血	①阴虚阳亢，头晕目眩②腰痛痿弱、筋骨不健③阴虚血热之崩漏	10—30克	先煎龟板胶补血止血力强，多用于血虚、出血证。
	鳖甲	咸、寒	肝	滋阴潜阳，	①阴虚发热、	10—30克	先煎

分类	药名	性味	归经	功效	主治	量	备注
				软坚 散结	虚风 内动、 手足 蠕动 ②久 疟、 疟 母， 癥瘕 积聚		
	胡麻	甘、 平	肝、 肾	补益 精血， 润燥 滑肠	①头 晕眼 花、 须发 早白 ②肠 燥便 秘	10 — 30 克	炒熟 用
	乌骨鸡	甘、 平	肝、 肾	养阴 退热	虚劳 骨蒸、 崩中 带下	无 定 量 配 丸 用	
	黑大豆	甘、 微寒	脾、 肾	补肾 利	水肿 胀满、	10— 15 克	

分 类	药 名	性 味	归 经	功效	主治	量	备注
				水， 解毒	疮疡 肿毒		

复习思考题

- 1、你对补益药有何认识。
- 2、根据补益各药的效用特点共分为几类？各适用于哪些证候？
- 3、人参、黄芪、党参的效用各怎样？如何应用，有何差别？
- 4、分析比较下列药组功效和应用的异同：白术与山药 淫羊藿与肉苁蓉 杜仲与续断 补骨脂与益智仁 菟丝子与沙苑蒺藜 当归与白芍 熟地与何首乌 阿胶与枸杞子 天冬与麦冬 龟版与鳖甲
- 5、白术与苍术、白芍与赤芍的功用有何不同？
- 6、试述甘草、鹿茸、冬虫夏草、蛤蚧、紫河车、沙参、石斛、玉竹、旱莲草、女贞子的功效和主治要点。
- 7、鹿茸、冬虫夏草、蛤蚧、紫河车四药怎样使用？

第十八章收敛药

- 第十八章收敛药

〔自学时数〕4学时

〔面授时数〕1学时

〔目的要求〕

1. 了解收敛药的概念、适用证。
2. 熟悉收敛药与益气、滋阴、健脾、补肾等药配伍应用的理论依据(联系中医基本理论)。
3. 掌握收敛药中常用药(五味子 乌梅 椿白皮 赤石脂 莲子 山茱萸 金樱子)。
4. 熟悉敛肺止咳、敛汗、涩肠止泻、涩精缩尿、止崩带等概念。
5. 联系龙骨、牡蛎等具有收敛作用的药物，了解本章以外的收敛药，扩大知识面。
6. 联系临床实例，了解使用收敛药“实邪未尽者用之有留邪之弊”的含义。
7. 在自学本章全部内容的基 础上，重点掌握小结内容。

凡具有收敛固涩的功效，主要用以治疗各种滑脱不禁之证的药物，称为收敛药，又称收涩药或固涩药。

滑脱不禁的病证，主要有久病体虚，正气不固所致的自汗盗汗、久泻久痢、遗精、滑精、溲多遗尿及带下崩漏等证，如不及时收敛止涩，延耽日久，则耗气伤津，或损及精血，以致元气日损，故应及时以本类药治之，可防变生他证。

收敛药大多为酸涩之品。陈藏器说：涩可去脱；《本草纲目》说：脱则散而不收，故用酸涩之药，以敛其耗散。本类药分别具有敛汗、止

泻、固精、缩尿、止带、止血、止咳等作用，治疗各种滑脱不禁的证候，能收固涩之效。引起滑脱不禁证候的根本原因为正气衰弱，而收敛固涩药的运用。只能治病之标，不能消除滑脱的病因，所以在使用本类药时，须与相应的补益药配合应用，以期标本兼顾。如气虚自汗、阴虚盗汗，应分别配伍益气药或滋阴药同用；久泻久利，带下日久不愈，应与补脾固肾药同用；肾虚的遗精、遗尿尿频，当配伍补肾药；冲任不固、崩漏下血，应与补肝肾、固冲任的药同用；肺肾虚损、久咳虚喘，当配伍补肺、益肾、纳气药等等。总之，当根据具体证候，寻求根本，选择配伍，才能增加疗效。

本类药物均具收敛性，使用不当，则易于恋邪，故在表邪未尽，或泻痢、咳嗽初起，或内有湿滞、郁热未清时，均不宜使用，以免致敛邪之弊。

此外，虚极欲脱之证，亦非收敛药所能奏效，治当求本。

山茱萸

〔原文〕辛温酸涩，补肾温肝，入二经气分。固精秘气，强阴助阳，安五脏，通九窍，《圣济》云：如何涩剂以通九窍？《经疏》云：精气充则九窍通利。昂按：山茱通九窍，古今疑之，得《经疏》一言，而意旨豁然。始叹前人识见深远，不易测知，多有如此类者，即《经疏》一语而扩充之，实可发医人之慧悟也。暖腰膝，缩小便。治风寒湿痹，温肝故逐风。鼻塞目黄，肝虚邪客则目黄。耳鸣耳聋。肾虚则耳鸣耳聋，皆固精通窍之功。王好古曰：滑则气脱，涩剂所以收之，仲景八味丸用之为君，其性味可知矣。昂按：《别录》、甄权，皆云能发汗，恐属误文，酸剂敛涩，何以反发？仲景亦安取发汗之药以为君乎？李士材曰：酸属东方，而功多在北方者，乙癸同源也。肝为乙木，肾为癸水。去核用。核能滑精。恶桔梗、防风、防己。

【讲解】山茱萸酸涩质润，为平补肝肾之品，又可涩精止汗。为山茱萸科落叶小乔木植物山茱萸除去果核的果肉，又名山萸肉。晒干、生用。

本品味酸，性微温。入肝、肾经。其特点为既可补阳，又可滋阴，不论阴虚或阳虚，均可配用，故可治疗肝肾亏损之头晕目眩，耳鸣耳聋，腰膝痠软等证。

本品还有良好的收敛、固涩作用，用于遗精滑泄，尿频，汗出及月经过多，漏下不止等证。

【临证应用】山茱萸配伍熟地、山药、泽泻等，如六味地黄丸，为治肝肾阴虚，头晕目眩、腰膝痠软、遗精等证的基本方。若以之配伍补骨脂、当归、麝香等，如草还丹，治肾阳不足，阳痿、滑精等症。配伍桑螵蛸、覆盆子、益智仁、沙苑子等，可治小便不禁。配伍人参、附子、龙骨、牡蛎等药，治大汗不止，体虚欲脱之证。配伍乌贼骨、茜草炭、棕皮炭等，如固冲汤，治妇女崩漏及月经过多等证。

【用量用法】5—10克，煎服，大剂量可至30克。本品温补酸涩，故命门火炽、内有湿热、小便不利者忌用。

五味子

〔原文〕性温，五味俱备，皮甘、肉酸，核中苦辛，都有咸味。酸咸为多。专收敛肺气而滋肾水，气为水母。经曰：肺欲收，即食酸以收之。王好古曰：入手太阴血分，足少阴气分。益气生津，肺主气，敛故能益，益气故能生津。夏月宜常服，以泻火而益金。补虚明目，强阴涩精，仲景八味丸，加之补肾，盖内核似肾，象形之义。退热敛汗，止呕住泻，宁嗽定喘，感风寒而喘嗽者当表散，宜羌防苏桔；痰壅气逆而喘嗽者当清降，宜二陈及苏子降气汤；水气逆而喘嗽者，宜小青龙，半夏茯苓汤；气虚病久而喘嗽者，宜人参，五味。除烦渴，消水肿，解酒毒，收耗散之气。瞳子散大，嗽初起，脉数有实火者忌用。朱丹溪曰：五味收肺气，非除热乎？补肾非暖火脏乎？乃火热嗽必用之药。寇氏所谓食之多虚热者，收补之骤也。闵守泉每晨吞北五味三十粒，固精气，益五脏。北产紫黑者良。入滋补药蜜浸蒸，入劳嗽药生用，俱槌碎核。南产色红而枯，若风寒在肺宜南者。苧蓉为使。恶萎蕤。熬膏良。

【讲解】五味子酸收之中又具滋益之性，功能敛肺滋肾，生津止汗，涩精止泻，宁心安神。系木兰科多年生藤木植物五味子和华中五味子的成熟果实。前者主产辽宁，吉林，河北等地，习称北五味子，为传统使用之正品；后者主产于西南和长江流域，习称南五味子，品质较北五味子为次。生用或经醋、蜜拌蒸，晒干用。

本品五味俱备，《新修本草》谓：五味，皮肉甘、酸，核中辛、苦，都有咸味，此则五味具也。虽云五味俱备，仍以酸为主，其性虽温，但温而不燥，入肺、肾二经。既能上敛肺气，又能下滋肾阴，并有涩精，止泻，生津，止汗等作用。凡属肺肾两虚，精气耗散或气精两伤之证，皆可应用。因其酸涩收敛，表邪未解，内有实热，咳嗽初起，麻疹初透均不宜用。

【临证应用】五味子上敛肺气，下滋肾阴，对肺虚久咳及肺肾不足之喘咳，有止咳平喘之效，常配熟地、山药、山茱萸等，如都气丸专治肾虚喘促。若素有寒饮，而又外感风寒，咳嗽喘急，痰多稀薄者，又可以本品配辛温宣散的细辛、干姜伍用，如五味细辛汤，方中五味、

细辛同用，一收一散，既可防止肺气耗散太过，又可防止敛肺遏邪之弊。

五味既能生津，又可敛汗，故适用于口渴、多汗之证，如热伤气阴，汗多，体倦，气短，口渴，脉虚者，多以五味子配麦冬、人参即生脉散。五味子配人参、麻黄根、牡蛎等同用，无论阳虚自汗、阴虚盗汗都可用，如柏子仁丸。至于消渴证，则多与黄芪、生地、麦冬、天花粉等益气生津药同用，如黄芪汤。借五味子补肾涩精、收敛止泻之功，治遗精、遗尿多配桑螵蛸、龙骨等补肾收涩之品，治脾肾虚寒，久泻、五更泻，又常和补骨脂、肉豆蔻、吴茱萸伍用，如四神丸。

此外，本品尚有养心安神之效，心气耗散所致的心悸、怔忡、失眠等证，配麦冬、酸枣仁等均可，如天王补心丹。近年来，单用或配其他药制成糖浆、酏剂、片剂治神经衰弱有效。并研末内服，治传染性肝炎，有降低转氨酶的作用。

【用量用法】2—6克，煎服。研末服每次1~3克。生用清虚热，止虚劳久嗽之力较强。故《备要》说入劳嗽药生用；炒用滋肾补虚之功较强，故滋补多熟用。还有用醋、蜜拌蒸制者，一般认为醋制者长于收敛，蜜制则增强补力，减少酸涩之性。

另外，根据临床实践，敛肺滋肾，生津止汗宜用北五味子，风寒在肺宜用南五味子。

五倍子

〔原文〕咸酸，其性涩，能敛肺；其气寒，能降火。生津化痰，止嗽止血，敛汗，郑赞襄曰：焙研极细，以自己漱口水调敷脐上，止盗汗如神。解酒。疗消渴泄痢，疮癣五痔，下血脱肛，脓水湿烂，子肠坠下。散热毒，消目肿，煎水洗之。敛疮口。热散，疮口自敛。其色黑，能染须。朱丹溪曰：倍子属金与水，噙之善收顽痰，解热毒。黄昏咳嗽，乃火浮肺中，不宜用凉药，宜五倍，五味，敛而降之。《医学纲目》云：王元珪虚而滑精，屡与加味四物汤，吞河间秘真丸及珍珠粉丸不止，后用五倍子一两，茯苓二两，丸服遂愈。此则倍子敛涩之功，敏于龙骨、蛤粉也。昂按：凡用秘涩药，能通而后能秘。此方用茯苓倍于五味，一泻一收，是以能尽其妙也。嗽由外感，泻非虚脱者禁用，生盐肤木上，乃小虫食汁，遗种结毬于叶间。故主治之证，与盐肤子叶同功。壳轻脆而中虚，可以染皂，或生或炒用。

【讲解】五倍子有敛肺降火，涩肠止泻，固精，敛汗止血之功。为漆树科落叶灌木或小乔木植物盐肤木或同属植物青麸杨等叶上寄生的虫瘿。形状不规则，有略呈圆形者，有形如菱角者，外表灰褐色，质脆中空。九~十月采下虫瘿，煮死内部寄生之虫，干燥备用。

本品味酸涩性寒。归肺、大肠、肾经。功能敛肺降火、涩肠、固精、敛汗、止血。用治久咳、久泻、久痢、遗精滑精、自汗盗汗、崩漏下血等证。外用还有解毒、消肿、收湿、敛疮、止血等功效。

【临证应用】本品治肺虚久咳，常与五味子、栗壳等同用。治久泻久痢，可单用，亦可配涩肠止泻药同用。如治泻痢不止，《本草纲目》方：单用五倍子半生半烧，为末制丸用。治久泻便血，张景岳玉关丸，以之配伍枯矾、诃子、五味子等同用。治遗精滑精，以之配白茯苓、龙骨等，如玉锁丹。治自汗盗汗，单用本品研末，每晚临睡前取3—10克，用冷开水调敷脐窝，有良效。治盗汗还可以本品研末，与荞麦面等分作饼，煨熟食之。治崩漏下血，可单味应用，也可入复方中用，如玉关丸，既治久泻便血，也治妇女崩漏带下。此外，本品研末外用或煎汤熏洗治疮疖肿毒、湿疮流水、溃瘍不敛、脱肛不收及子宫脱垂等证。

【用量用法】内服散剂一次1.5—6克。外用适量。本品酸涩收敛，故外感咳嗽及有湿热积滞之泻痢忌用。

小麦

〔原文〕味甘微寒。养心除烦，利溲止血。李时珍曰：《素问》麦属火，心之谷也；郑玄谓属木；许慎谓属金。《别录》云养肝，与郑说合；孙思邈云养心，与《素问》合，当以《素问》为准。按麦秋种夏熟，备受四时之气，南方地暖下湿，不如北产者良。张仲景治妇人脏躁证，悲伤欲绝，状若神灵，用甘麦大枣汤：大枣十枚，小麦一升，甘草一两，每服一两，亦补脾气。《圣惠方》：小麦饭治烦热少睡多渴。

面粉，甘温。补虚养气，助五脏，厚肠胃。然能壅气作渴，助湿发热。陈者良。寒食日纸袋盛悬风处，名寒食面，年久不热，入药尤良。

浮小麦，即水淘浮起者。咸凉。止虚汗盗汗，劳热骨蒸。汗为心液，麦为心谷，浮者无肉，故能凉心。麦麸同功。

麦麸醋拌蒸，能散血止痛，熨腰脚折伤，风湿痹痛，寒湿脚气。互易至汗出良。麦之凉，全在皮，故面去皮即热。凡疮疡痘疮溃烂不能着席者，用麦麸装褥卧，性凉而软，诚妙法也。

【讲解】小麦功专养心除烦。为禾本科植物小麦的成熟种子。

本品味甘性凉，入心经。善能养心除烦，治脏躁、烦渴、泄利，以及外伤出血，等症。

面味甘性温，补脾益气，然粘滞气，并助湿作渴，较少药用。

麦麸即麦之外皮。味甘性凉，和胃化湿，可治湿痹脚气，但用之较少。常用作炮制辅料，以助开胃消食之功。

【临证应用】小麦配大枣、甘草同用，治妇女脏躁、悲伤欲哭之证，如《金匱》甘麦大枣汤。炒黄研末服能止泻痢。据报道可用治外科感染，以小麦2斤加水3斤浸泡3日，捣烂晒干，炒黄研细，加醋调敷疮疖、丹毒等，有效率达90%—100%。

【用量用法】30—60克，煎服。

附：浮小麦 系未成熟的小麦。味甘性微寒，功专止汗，性较和平，一切虚汗之证，不论自汗、盗汗均可使用。治盗汗可单用为末，米汤

送服；治自汗，如牡蛎散，与黄芪、麻黄根等同用，用量15—30克。

乌梅

〔原文〕酸涩而温，脾肺血分之果。敛肺，肺欲收，急食酸以收之。涩肠，涌痰消肿，清热解毒，生津止渴，醒酒杀虫。治久嗽泻痢，梁庄肃公血痢，陈应之用乌梅、胡黄连、灶下土等分为末，茶调服而愈。曾鲁公血痢百余日，国医不能疗，应之用盐梅肉研烂，合腊茶入醋服，一啜而安。瘴疟，诸证初起者，皆忌用。霍乱，吐逆反胃，劳热骨蒸。皆取其酸收。安蚘厥，蚘虫上攻而眩仆，虫得酸则伏，仲景有蚘厥乌梅丸。去黑痣，蚀恶肉。痈疮后生恶肉，烧梅存性，研末敷之。多食损齿伤筋。经曰：酸走筋，筋病无多食酸。

白梅，功用略同。治痰厥僵仆，牙关紧闭，取肉揩擦牙龈，涎出即开，盖酸先入筋，齿软则易开。若用铁器撬开，恐伤其齿。惊痫喉痹，敷乳痈肿毒，刺入肉中。嚼烂罨之即出，疮中胬肉，捣饼贴之即收。

青梅，薰黑为乌梅，稻灰汁淋蒸则不囊。孟诜曰：乌梅十颗，汤煮去核，纳肛中，通大便。盐渍为白梅。李时珍曰：梅花于冬而实，于夏得木之全气，故最酸。胆为甲木，肝为乙木，人舌下有四窍，两通胆液，故食酸则津生。食梅齿龋者，嚼胡桃即解。衣生霉点者，梅叶煎汤洗之，捣洗葛衣亦佳。

【讲解】乌梅具有敛肺涩肠、生津安蛔之功。为蔷薇科落叶乔木植物梅树的未成熟果实（青梅）的加工熏制品。去核生用，或炒炭用。

本品味酸涩，性平。入肝、脾、肺、大肠经。功能敛肺止咳，可用于肺虚久咳。能涩肠止泻，用于久泻久痢。味酸，且能生津，尤与甘寒之品同用，酸甘化阴，故能生津止渴，以治消渴证。“蛔得酸则伏”，故为安蛔止吐良药，以治蛔虫引起的呕吐、腹痛之证。此外，外敷能消疮毒，并治胬肉外突。然酸涩之品，外感咳嗽、泻痢初起，及有实邪者均不宜用。

白梅为蔷薇科植物梅的未成熟果实，经盐渍而成。味酸涩咸，性平。多外用擦牙，捣敷或煅存性研末调敷。《本草求真》曰：白梅由于盐渍，味咸则能软坚，若牙关紧闭，死肉黑痣，白梅用之更捷。

【临证应用】乌梅治肺虚久咳，可配粟壳研末服用，如一服散；或配半夏、杏仁、阿胶等。治久泻不止，可配伍肉豆蔻、诃子、罂粟壳

等，如固肠丸。治消渴烦热，可配伍天花粉、麦冬、葛根等药，如玉泉丸。配伍细辛、蜀椒、干姜、黄连，如乌梅丸，以治蛔虫引起的腹痛吐蛔。近年研究，用乌梅治胆道蛔虫引起的胆绞痛，以及胃酸缺乏所致的食欲不振、消化不良等证，有较好的疗效。

【用量用法】 3—10克，煎服，大剂量可用至30克。外用适量，捣烂或研末外敷。止泻止血宜炒炭用。

肉豆蔻

〔原文〕辛温气香。理气暖胃，下气调中，逐冷祛痰，消食解酒。治冷积心腹胀痛，挟痰挟食者并宜之。中恶吐沫，小儿吐逆，乳食不下。又能涩大肠，止虚泻冷痢。初起忌用。出岭南，似草蔻，外有皱纹，内有斑纹。糯米粉裹煨熟用。忌铁。

【讲解】肉豆蔻功专涩肠止泻，兼能温中行气。为豆蔻科高大乔木植物肉豆蔻树的成熟种仁。别名肉果。干燥种仁外表灰棕色至棕色，粗糙，有网状沟纹，横断面有槟榔花纹。主产马来西亚及印度尼西亚，我国广东亦有栽培。以面裹煨熟去油入药用。

本品辛温，芳香而涩。入脾、胃、大肠经。辛可行气，温暖脾胃，涩可固脱，而有温脾开胃、涩肠止泻、行气止痛之功。故凡脾胃虚寒、气滞之脘腹胀痛、食少呕吐，及肠滑不固之久泻久痢等证，均视为要药。然涩肠助火之品，泻痢初起或挟有湿滞积热者忌用。

【临证应用】肉豆蔻用于脾胃虚寒，久泻不止，多与党参、白术、肉桂、诃子等药同用，如养脏汤。治脾肾阳虚，五更泄泻，可配补骨脂、吴茱萸、五味子等，如四神丸。若与木香、半夏同用，可治胃寒食少呕吐及气滞胸脘作痛等证。

【用量用法】3—10克，煎服。散剂1.5—3克。煨用以减其辛散之性，且能增强其固涩之功能。故泻痢不止者一般都煨用。

诃子

〔原文〕苦以泄气消痰，酸以敛肺降火，李东垣曰：肺苦气上逆，急食苦以泄之，以酸补之。诃子苦重泄气，酸轻不能补肺，故嗽药中不用。涩以收脱止泻，温以开胃调中。治冷气腹胀，膈气呕逆，痰嗽喘急，肺挟痰水，或被火伤，故宜苦酸以敛之。泻痢脱肛，肠风崩带，皆取其酸涩。开音止渴。肺敛则音开，火降则渴止。古方有诃子清音汤。然苦多酸少，虽涩肠而泄气，气虚及嗽痢初起者忌服。同乌梅、倍子，则收敛；同陈皮、厚朴，则下气；得人参，治肺虚寒嗽；得陈皮、砂仁，治冷气腹胀；佐白术、莲子，治虚寒久泻；佐樗皮，治肠风便血；同蛇床、五味、山茱、续断、杜仲，治虚寒带下。从番舶来，番名诃黎勒，岭南亦有。六棱黑色，肉厚者良。酒蒸一伏时，去核取肉用，用肉则去核。生用清金行气，煨熟温胃固肠。海鱼放涎凝滑，船不能行，投诃子汤，寻化为水，其化痰可知。

【讲解】诃子以涩肠止泻、敛肺止咳为其主要功效。为使君子科落叶乔木植物诃子的成熟果实。别名诃黎勒，若去核用果肉，则处方名诃子肉。原产印度、缅甸等处，今我国云南、广东，广西等地亦产。生用炒用。

本品味苦酸涩，性平。入肺、大肠经。既能涩肠以止泻，又能敛肺以止咳，并能下气降火。适用于泄泻、久痢等邪气已衰而经久不止者，或因久泻而引起脱肛，以及肺虚咳嗽或痰火郁肺，久嗽失音等证。诃子还能下气消胀，如《本草求真》云：虽有收脱止泻之功，然苦味居多；服此反使气下泄，故书载能消痰降火…服此能调胃和中，并能消膨去胀，使中自和。

本品长于收敛，痰嗽泻痢初起，实邪尚盛者，忌服。

【临证应用】诃子治久泻、久痢、脱肛等证，可根据证候的寒热不同而适当选择配伍。若配黄连、木香、甘草，即诃子散，治久痢腹痛而有热者。若配干姜、罂粟壳、陈皮，即诃子皮散，以治虚寒久泻或脱肛之证。诃子配伍桔梗、甘草，如诃子汤，治失音不能言语者。配伍杏仁、通草、煨姜，如诃子饮，治久咳，语言不出之证。

【用量用法】 3 —10克，煎服。敛肺降火生用，涩肠止泻煨熟用。

赤石脂

〔原文〕甘而温，故益气生肌面调中；酸而涩，故收湿独行方：煅末，治小儿脐中汁出赤肿。止血而固下。《经疏》曰：大小肠下后虚脱，非涩剂无以固之。其他涩药轻浮，不能达下，惟赤石脂体重而涩，直入下焦阴分，故为久痢泄痢要药。张仲景桃花汤用之，加干姜粳米。疗肠癖泄痢，崩带遗精，痢痔溃疡。收口长肉，催生下胞。《经疏》曰：能去恶血，恶血化，则胞胎无阻。李东垣曰：胞胎不出，涩剂可以下之。又云：固肠胃有收敛之能，下胎衣无推荡之峻。细腻粘舌者良，赤入血分，白入气分。五色石脂，各入五脏。研粉，水飞用。恶芫花。畏大黄。

【讲解】赤石脂功专涩肠止泻，外用可生肌敛疮。为单斜晶系的多水高岭土。色红褐，块状，易碎。以细腻粘舌者良。

本品味甘酸涩，性温。归大肠、胃经。因其酸涩质重。故有固下涩肠止泻之效，可治泻痢不止，便血脱肛等证。又善止血，内服可以止崩漏带下，外用可止外伤出血。又可收湿生肌敛疮，外用于疮痍溃后久不收口。

【临证应用】赤石脂治泻痢日久，滑泄不禁，与禹余粮同用，即赤石脂禹余粮汤；治虚寒下痢，便脓血不止，以本品配干姜、粳米等，如桃花汤。治妇人漏下，可配侧柏叶、乌贼骨烧煅为末服，如赤石脂散。外用治溃疡不敛，即以本品与龙骨、炉甘石、血竭、乳香等同用，研细末，掺于疮口，如八宝丹。

【用量用法】10—20克，布包煎服。外用适量，研细末撒患处或调敷。以其性温，故有湿热积滞者忌服。《备要》云可催生下胞，故孕妇宜慎用。

禹余粮

〔原文〕甘平性涩，手足阳明大肠、胃。血分重剂。治咳逆下痢，血闭癥瘕。血崩，能固下，李先知曰：下焦有病，人难会，须用余粮赤石脂。又能催生。石中黄粉，生于池泽，无砂者良。牡丹为使。

【讲解】禹余粮功专收涩与赤石脂功效近似，亦以涩肠止泻为其主要功效。为斜方晶系褐铁矿石，系黄褐色不规则的块状，打碎呈赭褐色细末，含氧化铁粉块和粘土等。

本品甘涩性平，质重下降，入胃、大肠经。作用与赤石脂相似，也能涩肠止泻、收敛止血，用治久泻久痢、崩漏带下诸证。

【临证应用】禹余粮治肠滑不禁的久泻久痢，多与赤石脂同用，即赤石脂禹余粮汤。对脾虚所致的泄泻及老人虚泄，可配补骨脂、白术、甘草等伍用。妇人崩中漏下，配伏龙肝、乌贼骨、牡蛎等为末下。

【用量用法】10—20克，煎服。本品功专收涩，实证忌用。《本草纲目》记载有催生之功，故孕妇慎用。

石榴皮

〔原文〕酸涩而温，能涩肠，止泻痢下血，煨末服。崩带脱肛。泻痢至于脱肛者，以石榴皮，陈壁土加明矾少许，浓煎熏洗，再用五倍子炒研敷托而止之。浸水汁黑如墨，乌鬚方绿云油中用之。勿犯铁器。客座新闻云：一人患腹胀，夏成诊之曰：饮食如常，非水肿蛊胀，乃湿热生虫之象也。以石榴、椿树东引根皮、槟榔各五钱，空心服，腹大痛，泻虫长尺余，遂愈。

【讲解】石榴皮善能涩肠止泻。为石榴科落叶灌木或小乔木石榴的果皮。切块晒干，生用。

木品味酸涩，性温，入胃，大肠经。功专收涩，用治久泻、久痢、脱肛等证，并能收敛止血而用于崩中带下之证。兼能杀虫，可用治蛔虫、虫积腹痛。外用治牛皮癣。

此外，石榴根皮长于驱杀绦虫、蛔虫，但有毒，不可当石榴皮用。

【临证应用】石榴皮多用于久泻久痢、脱肛等证，如用炒砂糖煨服，治日久水泻；配伍黄连、黄柏、当归，治久痢不止，如黄连汤。配陈壁土、白矾浓煎熏洗，再加五倍子炒研敷托脱肛。单味服用或配伍槟榔，煎汤或研末服，可驱蛔虫。炒炭研末，油调涂，可治牛皮癣。

【用量用法】3—10克，煎汤或入丸散。外用适量，研末调敷或煎汤熏洗。

海螵蛸

〔原文〕咸走血，温和血，入肝肾血分。通血脉，祛寒湿，治血枯，《内经》：血枯治之以乌鲂骨。血瘕，血崩，血闭，腹痛环脐，阴蚀肿痛，烧末酒服。疔痢瘡虫，目翳泪出，眇耳出脓，性能燥脓收水，为末加麝少许掺入。厥阴少阴肝肾。经病。出东海，亦名墨鱼。腹中有墨，书字逾年乃灭，常吐黑水，自罩其身，人即于黑水处取之。取鱼骨卤浸炙黄用。恶附子、白芨、白芩。能淡盐。

【讲解】海螵蛸功专收敛，有止血止带固精作用。为乌鲂科动物曼氏无针乌鲂或金乌鲂的内贝壳。《本经》原名乌贼骨。生用为主。

本品味咸涩，性微温。入肝、肾经。咸能入血，微温而涩，有收敛止血之功，善治妇女肝肾不足、冲任不固之崩漏带下，为妇女崩带之要药。对于肺胃出血、便血及外伤出血，亦有疗效。本品能收敛，故为治疗男子遗精、滑精之辅助药。

海螵蛸又有制酸止痛之功，且可收敛生肌，用治胃及十二指肠溃疡病而见胃痛、泛吐酸水，或溃疡出血。

本品外用，能收湿敛疮，故用治皮肤湿疹、慢性溃疡久不愈合等证，疗效亦甚显著。

【临证应用】乌贼骨配伍茜草，棕炭，五味子等，治妇人崩漏下血，如张锡纯固冲汤。与白芨等分为末服，治肺胃出血，如乌芨散。若与益肾固精药，如山茱萸、菟丝子、沙苑子等同用，可治遗精。配伍白芷、血余炭，治妇女赤白带下，如白芷散。与贝母同用，有制酸止痛之效，用于胃痛吐酸，如乌贝散。与黄柏、青黛等研末外敷，治湿疹湿疹。单用乌贼骨研末外敷，既可止创伤出血，又可治溃疡多脓。与煅石膏、煅龙骨、枯矾、白芷、红升、冰片等共研细末，撒敷患处，治溃疡久不愈合者效更佳。

【用量用法】6—12克，煎服。如研末吞服，每次1.5—3克。外用适量，研末撒或调敷。以其性偏温燥，能伤阴助阳，故虚有热者不宜用。久服过服，有引起便秘的副作用，可适当配伍润肠药以除此弊。

芡实

〔原文〕甘涩。固肾益精，补脾去湿。治泄泻带浊，小便不禁，梦遗滑精，同金樱膏为丸，名水陆二仙丹。腰膝痠痛，吴子野曰：人之食芡，必枚啮而细嚼之，使华液流通，转相灌溉，其功胜于乳石也。经验后方：煮熟研膏；合粳米煮粥食，益精气。蒸熟捣粉用，涩精药或连壳用。李惟熙曰：菱寒而芡暖，菱花背日，芡花向日。

【讲解】芡实有补脾祛湿、益肾固精之效。为睡莲科一年生草本植物芡的成熟种仁。别名鸡头实。压碎去硬壳，取仁晒干，或再去掉红棕色内种皮。生用或炒用，捣碎入药。

本品味甘涩，性平。入脾、肾经。脾主运化，脾虚则运化失职，水湿下注，而为泄泻、带下。本品既能健脾以祛湿，又能收敛以固涩，对于脾虚有湿的泄泻、带下之证，有标本同治之义。肾主封藏，肾虚则封藏之职失司，下元不固，而见遗精、早泄、小便频数等证。芡实除补脾外，又能益肾，具有固精缩尿之义，以治肾虚精关不固之梦遗滑精，膀胱失约之小便失禁等证。

【临证应用】芡实配党参、白术、山药、莲子等药，可治脾虚泄泻，日久不止。配沙苑子、龙骨、牡蛎、莲子等，如金锁固精丸，以治遗精、滑精。配金樱子，名水陆二仙丹，以治遗精、尿频、白带过多。

芡实功效与山药相似，性质和平，不燥不腻，故二药常同用，可健脾去湿、益肾固精。但山药补益之力较强，芡实收敛之功较佳；山药尚能补肺，而芡实只用于脾肾。此为二药之异。

【用量用法】10—15克，煎服。

莲子

〔原文〕甘温而涩，脾之果也，脾者黄宫，故能交水火而媾心肾，安靖上下君相火邪，古方治心肾不交劳伤白浊，有莲子清心饮，补心肾有瑞莲丸。益十二经脉血气，涩精气，厚肠胃，除寒热。治脾泄久痢，白浊梦遗，女人崩带及诸血病。大便燥者勿服。去心皮，蒸熟焙干用。得茯苓、山药、白术、枸杞良。

黑而沉水者为石莲，清心除烦，开胃进食。专治噤口痢淋浊诸证。石莲入水则沉，入卤汁浮。煎盐人以之试卤，莲浮至顶，卤乃可煎，落田野中者，百年不坏，人得食之，髮黑不老。肆中石莲，产广中树上，其味大苦，不宜入药。

莲心为末，米饮下，疗产后血竭。

【讲解】莲子功能补脾止泻，养心安神，益肾固精。为睡莲科多年生水生草本植物莲的成熟种子。产于湖南（湘莲）、福建（建莲）、江苏（湖莲）、浙江及南方各地池沼湖塘中。除去果皮及心，晒干打碎生用。

本品味甘涩性平。入脾、肾、心经。甘平补益，涩主收敛，故有补脾止泻、益肾固精的功效，可用于脾虚久泻、食欲不振，及肾虚遗精、滑精之证。又能养心益肾而有交通心肾作用，用于虚烦惊悸、失眠之证。此外，莲子还可用于妇女崩漏、白带过多等证。

【临证应用】莲子配伍人参、白术、茯苓、山药，如参苓白术散，可补脾止泻以治脾虚久泻。配伍沙苑子、龙骨、牡蛎、莲鬚，如金锁固精丸，治遗精滑精。与麦冬、茯神、柏子仁等清心安神药同用，可交通心肾而治虚烦惊悸失眠。

【用量用法】6—15克，煎服。

附：石莲子 系莲之老熟果实落水下沉，坚硬如石，有灰黑色果壳者。剥去壳，将肉并心碾为细末，米饮调下。专治热毒噤口痢，有祛湿热、开胃止呕之功。用量5—10克。

莲子心为成熟种子的绿色胚芽。味苦性寒，主入心经。功能清心除烦，主治心火亢盛，烦躁不安，神昏之证，多与玄参心、 连心麦冬、竹叶卷心等配伍，如清宫汤。本品单用研末服，也可用治吐血、遗精。近年又用治高血压病，有降血压作用。用量1.5 —3克。

莲蕊鬚

〔原文〕甘温而涩。清心通肾，益血固精，乌鬚黑髮，止梦泄遗精，吐崩诸血。略与莲子同功。【讲解】莲蕊鬚功专清心固肾、涩精止血。为莲花中的花蕊。又称莲鬚。晒干生用。

本品味甘涩，性平。入心、肾经。功能清心固肾、涩精止血，多用于肾虚滑精、遗精、尿频、遗尿及吐血、崩漏等证。

【临证应用】莲蕊鬚常与沙苑子、芡实、龙骨、牡蛎同用，如金锁固精丸，可治遗精滑精、遗尿尿频，及吐血崩漏等证。

【用量用法】1—5克，煎服。

荷叶

〔原文〕苦平。其色青，其形仰，其中空，其象震。震仰盂。感少阳甲胆之气，烧饭合药，裨助脾胃而升发阳气，洁古枳术丸，用荷叶烧饭为丸。痘疮倒靨者用此发之。僵蚕等分为末，胡荽汤下。闻人规曰：胜于人牙龙脑。能散瘀血，留好血。治吐衄崩淋、损伤产瘀，熬香末服。一切血证。洗肾囊风。李东垣曰：雷头风证，头面疙瘩肿痛，憎寒恶热，状如伤寒，病在三阳，不可过用寒药重剂诛罚无过，宜清震汤治之，荷叶一枚，升麻、苍术各五钱，煎服。郑奠一曰：荷叶研末，酒服三钱，治遗精极验。

【讲解】荷叶鲜用可清解暑热，干用可升发清阳。为睡莲植物莲的叶。鲜用，或生用。

本品味苦性平。入心、肝、脾经。功能清热解暑，升发清阳，并能止血。用于感受暑热，头胀胸闷，呕吐泄泻，以及各种出血证。

【临证应用】荷叶清暑散热，治暑热烦渴，常与鲜金银花、西瓜翠衣、鲜扁豆、鲜竹叶心等煎汤内服，如清络饮。配升麻、苍朮，治雷头风。以生荷叶配生艾叶、生柏叶、生地黄、即四生丸，用治吐血、衄血。古人谓其能升发胆中清气，以达脾气，凡脾虚气陷，而为便泻不止者，可佐入培中补剂用。如张洁古枳术丸，以荷叶烧饭为丸，即取其能升发脾胃之气。

【用量用法】鲜者15—30克，干者3—10克，煎服。或入丸、散。

金樱子

〔原文〕酸涩。入脾、肺、肾三经，固精秘气。治梦遗泄精，和芡实为丸，名水陆丹。泄痢便数。朱丹溪曰：经络隧道，以通畅为平和，而味者以涩性为快，熬膏食之，自作不靖，咎将谁执？李时珍曰：无故而食以恣欲则不可；若精气不固者、服之何害？似榴而小，黄赤有刺，取半黄，熟则纯甘。去刺核用。熬膏亦良。《笔谈》云：熬膏则甘，全失涩味。

【讲解】金樱子有固精、缩尿、止带之功。为蔷薇科常绿攀缘灌木植物金樱子的成熟果实或除去瘦果的成熟花托（金樱子肉）。呈倒卵形，略似花瓶或石榴而小，外皮红黄色，上端存花萼如盘状，下端渐尖。去净核，晒干生用。

本品味酸涩性平。入肾、膀胱、大肠经。功专酸涩收敛，有固精、缩尿、止带之功。主治肾虚精关不固的遗精、滑精；膀胱不约之遗尿、尿频，以及妇女带下等证。尚兼有收敛固肠止泻之效，亦治脾虚久泻之证。然收敛之品，凡有实火实邪者忌用。

【临证应用】金樱子单用熬膏服，即金樱子膏，用治遗精、滑精、尿频等。若配芡实，名水陆二仙丹，治遗精、尿频、白浊、白带等。配益气健脾药党参、白术、山药等同用，有涩肠止泻之功，以疗泄泻下痢久不止者。此外，还可用于脱肛、子宫下垂、崩漏等，皆赖其收涩之功，此即所谓“涩可固脱”。

【用量用法】6—18克，煎服，或熬膏及制丸服。

覆盆子

〔原文〕甘酸微温。益肾脏而固精，补肝虚而明目，起阳痿，缩小便，寇氏曰：服之当覆其溺器，故名。泽肌肤、乌髭髮，榨汁涂髮不白。女子多孕。同蜜为膏，治肺气虚寒。李士材曰：强肾无燥热之偏，固精无凝涩之害，金玉之品也。状如覆盆，故名。去蒂，淘净捣饼，用时酒拌蒸。叶绞汁，滴目中，出目弦虫，除肤赤，收湿止泪。

【讲解】覆盆子具有益肾、固精、缩尿之功。为蔷薇科落叶灌木植物掌叶覆盆子的未成熟果实。晒干生用。

本品味甘酸、性微温。入肝、肾经。甘能补益，酸可收敛，性温而不燥烈，功能补肾阳而无伤阴之弊，固滑脱而无凝滞之害，有益下封藏之功。多用于肾虚不固，遗精、滑精、遗尿、尿频等证，也可用于肾虚阳痿及肝肾不足之目暗不明。然肾虚有火，小便短涩者忌用。

【临证应用】覆盆子治梦遗滑精，可配沙苑子、山茱萸、芡实等同用。治遗尿、尿频，多配桑螵蛸、益智仁、金樱子同用。若配枸杞子、菟丝子、五味子、车前子等，即五子衍宗丸，可治肾虚阳痿、精滑不固及不育等证。配熟地、枸杞子、女贞子，又可治肝肾虚亏所致目暗不明。

覆盆子叶味酸咸性平，无毒。可外用捣汁点目，治眼睑赤烂、多泪、视物昏花等。

【用量用法】3—10克，煎服。

桑螵蛸

〔原文〕甘咸，入肝、肾、命门，益精气而固肾。治虚损阴痿，梦遗白浊，血崩腰痛，伤中疝瘕。肝肾不足。通五淋，缩小便，能通故能缩。肾与膀胱相表里，肾得所养，气化则能出，故能通；肾气既固，则水道安常，故又能止也。寇宗奭治便数有桑螵蛸散：桑螵蛸、茯神、远志、菖蒲、人参、当归、龙骨、鳖甲醋炙，各一两，为末，卧时人参汤下二钱，能补心安神，亦治健忘。炙饲小儿止夜尿。螳螂卵也，桑树产者为好。房长寸许，有子如蛆，芒种后齐出，故仲夏螳螂生也。如用他树者，以桑皮佐之，桑皮善行水，能引达肾经。炙黄，或醋煮汤泡煨用。畏旋覆花。螳螂能出箭镞：螳螂一个，巴豆半个，研敷伤处，微痒且忍，极痒乃撼拔之，以黄连、贯众汤洗，石灰敷之。杨氏方：用蜣螂，镞出后，敷生肌散。螳螂、蜣螂，皆治惊风，令人罕用。蜣螂兼治腹痛便秘、下痢脱肛、疮疽虫痔。

【讲解】桑螵蛸功能补肾固涩，而有缩尿固精之功。螳螂科昆虫大刀螂和小刀螂，或巨斧螳螂的卵鞘。深秋至翌年春均可采收，除去树皮，置沸水中浸杀其卵，晒干入药。

本品甘咸涩平。入肝、肾经。味甘能补，咸以入肾，涩主收敛，为补肾助阳、缩尿固精之要品。用于肾虚阳衰引起的遗精、滑精、遗尿、尿频、白带过多等证，而尤以遗尿尿频最为常用。以其可固涩助阳，故凡阴虚火旺、膀胱有热而小便短数者不宜用。

【临证应用】桑螵蛸用于肾虚遗尿、小便频数及遗精滑泄，前者常与党参、龙骨、牡蛎等同用，如桑螵蛸散；后者多与五味子、菟丝子等同用，如菟丝子丸。与补肾助阳鹿茸、肉苁蓉、淫羊藿等同用，也可用于阳痿早泄。

【用量用法】3—10克，煎服。宜入丸、散剂。

椿樗白皮

〔原文〕苦燥湿，寒胜热，涩收敛。入血分而涩血，去肺胃之陈痰。治湿热为病，泄泻久痢，崩带肠风，梦遗便数，有断下之功。痢疾滞气未尽者勿遽用，勉强用，必变他证。去疳虫，樗皮尤良。李时珍曰：椿皮入血分而性涩，樗皮入气分而性利，凡血分受病不足者宜椿皮，气分受病有郁者宜樗皮。乾坤生意，治疮肿下药，用樗皮水研，服汁取利，是其验矣。昂按：樗皮止泻痢，终是涩剂。寇氏曰：一妇年四十余，耽饮无度，多食鱼蟹，积毒在脏，日夜二三十泻，便与脓血杂下，大肠连肛门甚痛，用止血痢药不效，用肠风药益甚。盖肠风有血无脓也，服热药，腹愈痛、血愈下；服冷药，注泻食腻；服温平药，则若不知，年余待毙。或教服人参散：樗皮、人参各一两为末，空心温酒或米饮下二钱遂愈。昂按：此方仍是作痢疾治。香者为椿，肌实而赤嫩，其茵可茹；臭者为樗，肌虚而白，主治略同。根东引者良。去粗皮，或醋炙蜜炙用。忌肉面。

【讲解】椿樗白皮功效相同，均能涩肠止泻、止带止血。为苦木科落叶乔木植物臭椿（樗）的根皮或树皮，又名椿皮、椿根皮、樗根皮、樗白皮。生用，或麸炒用。古时称臭椿皮为樗皮，香椿皮为椿皮。目前，大部分地区之商品药材多是臭椿皮，部分地区如四川、贵州等地则以楝科植物香椿的干皮和根皮入药用。其嫩枝苗作食品。

本品味苦涩，性寒。入大肠、胃、肝经。苦寒能清热燥湿，酸涩能收敛固涩，具有止带、止泻、止血之功，故凡赤白带下、月经过多、久泻久痢及便血等证，均可应用。

【临证应用】椿樗根皮适用于湿热所致的久泻久痢及妇女白带过多等证。如配伍诃子、母丁香，研末为丸，即诃黎勒丸，治休息痢。配伍滑石等，治湿气下利、便血、白带。配伍龟板、香附、白芍、黄芩等，如固经丸，治妇人崩漏不止。配伍黄柏、芍药、良姜，即樗树根丸，治湿热下注，赤白带下。椿樗白皮因有清热燥湿之功，故外洗，可治疥癣湿疮。

【用量用法】3—5克，煎服。外用适量，煎水洗或熬膏涂。

白果

〔原文〕甘苦而温，性涩而收。熟食温肺益气；色白属金，故入肺。定痰哮，敛端嗽，缩小便，止带浊；生食降痰解酒，消毒杀虫。花夜开，人不得见，性阴有小毒，故能消毒杀虫。多食则收令太过，令人壅气胀，小儿发惊动疳。食千枚者死。

白果浆，泽手面，浣油腻。李时珍曰：去痰浊之功，可以类推。

【讲解】白果有敛肺平喘、收涩止带之效。为银杏科落叶乔木银杏的成熟种子。别名银杏。生用，或蒸(煮)熟以后用。

本品味甘苦涩，性平，有小毒。入肺经。功专敛肺气，定喘止咳，并可减少痰量，用于喘咳、气逆、痰多之证甚效。又兼除湿与收涩两方面的作用，故又能止带，缩小便而治小便频数，以及白带白浊等证。但涩而壅气，外感咳嗽不宜用。

【临证应用】白果用于哮喘痰嗽常与麻黄、甘草同用，如鸭掌散；治肺热痰喘气促者，则多与黄芩、桑白皮等同用，如定喘汤。古方有白果、莲子、胡椒、乌骨鸡煮食，治下元虚衰、白带清稀者，现多与黄柏、芡实等同用，如易黄汤，治湿热带下色黄者。白果配草薢、益智仁，又可治白浊。

银杏叶，性味同白果。功能敛肺、平喘、止痛，用于肺虚咳喘及现代医学之高血脂、高血压、冠心病、心绞痛、脑血管痉挛等证。常用量3—6克。

【用量用法】6—10克。有毒。大量或生食易中毒，小儿尤应注意。

罂粟壳

〔原文〕酸涩微寒，敛肺涩肠而固肾。治久嗽泻痢，遗精脱肛，心腹筋骨诸痛。李东垣曰：收涩固气，能入肾，故治骨病尤宜。嗽痢初起者忌用。朱丹溪曰：此是收后药，要先除病根。一名丽春花，红黄紫白，艳丽可爱。凡使壳，洗去蒂及筋膜，取薄皮，醋炒或蜜炒用。性紧涩，不制多令人吐逆。得醋、乌梅、陈皮良。罂中有米极细，甘寒润燥，煮粥食，治反胃。加参尤佳。

【讲解】罂粟壳具有敛肺、涩肠、止痛之功。为罂粟科一年生或二年生草本植物罂粟的成熟蒴果的外壳。又名米壳、御米壳。干燥果壳略呈球形，内部空洞质轻。原产于欧洲南部，我国也有少量栽培。果实成熟时摘下晒干，去蒂及种子，用时醋炒或蜜炙用。

本品味酸涩，性平，有毒。归肺、大肠、肾经。功专收涩可敛肺止咳，涩肠止泻，固肾涩精，用治肺虚久咳，久泻久痢，遗精滑泄等证。此外，本品止痛功效亦颇显著，可治疗心腹筋骨诸痛

【临证应用】肺虚久咳，可单用，蜜炙研末服；虚劳喘咳自汗，又可与乌梅等配用。治久泻不止，《经验方》以它配伍乌梅肉、大枣肉水煎温服；久痢及血痢，以之配木香、黄连、生姜同用，如木香散。

治诸疼痛，可单用配入复方中用。

罂粟种子，略呈肾形，功同罂粟壳，主治反胃、泻痢、脱肛等证。现已不用。

【用量用法】3—10克。煎服。止咳宜蜜炙，止泻、止痛宜醋炒。

本品功专收涩，故咳嗽或腹泻初起忌用；也不宜多服久服。

刺猬皮

〔原文〕苦平。治肠风泻血，五痔， 烧末，油调敷，水服亦佳。 阴肿。脂滴耳中治聋，胆点痘后风眼。 似鼠而圆大，褐色，攒毛，外如栗房，煨黑存性用。

【讲解】刺猬皮具有收敛止血、固精缩尿的作用。为刺猬科动物刺猬的干燥外皮。捕后剥取其皮，摊开阴干。切成小块， 炒焦用。

本品味苦，性平。入胃、大肠、肾经。功能收敛止血、固精缩尿，主治便血、痔漏、遗精、遗尿等证。此外，因其味苦泄降，又有化瘀止痛之效。

【临证应用】刺猬皮治痔疾有专长，如《本草衍义》治五痔下血，以之配穿山甲、肉豆蔻，作散剂服；《疡医大全》谓皮丸治痔漏，以本品配槐角、当归研末，蜜丸服。治痔疮，也可以刺猬皮烧末，生油调涂。治便血，可配木贼，研末酒服，即刺猬散。

用于遗精、遗尿，可单用，炒研末服；也可配益智仁、龙骨等收敛固涩药同用。此外，借其化瘀止痛之功，又可单味研服治气滞血瘀引起的胃脘疼痛。

【用量用法】3 —10克，煎服。研末服每次1.5—3克。

没石子

〔原文〕苦温入肾，涩精固气，收阴汗，乌鬚髮。出大食诸番。颗小纹细者佳。炒研用，虫食成孔者拣去。忌铜铁器。

【讲解】没石子也是收敛固涩之品。为没石子蜂科昆虫没石子蜂的幼虫，寄生于壳斗科植物没石子树幼枝上所产生的虫瘿，以个大、体重、色灰者为佳，已蛀孔者品质较次。炒用，捣碎入药。

本品味苦性温，入肺、脾、肾经。具固气、涩精、敛肺、止血之功，主治大肠虚滑、泻痢不止、便血、遗精、阴汗、咳嗽、咯血、齿痛、创伤出血、疮疡久不收口等证。

【临证应用】没石子治泄泻下痢配诃黎勒。若与地榆、黄柏、黄连、石榴皮同用，可治小儿肠虚受热，下痢鲜血，或便赤汁、腹痛后重，昼夜不止。

【用量用法】6—12克，煎汤或入丸散。外用，研末撒或调敷。

小结

本章药物种类较多，但各有其特点。其中山茱萸、芡实、金樱子、覆盆子、桑螵蛸、刺猬皮等药，均有固肾、涩精、缩尿之效，以治遗精、滑精、遗尿、尿频之证；然山茱萸又长于滋补肝肾，兼有敛汗之功；芡实尚具健脾止泻之能；金樱子收涩之性较强，并能止带、止泻；覆盆子，桑螵蛸长于缩尿，兼能助阳；刺猬皮还可收敛止血，用于便血、痔漏。

五味子、五倍子、乌梅、诃子、罂粟壳均有敛肺止咳、涩肠止泻之效，治肺虚久咳、肠滑久泻之征。其中五味子还能生津敛汗、涩精止遗，具有安神之功；五倍子亦能止汗，外用则治疮癣肿毒、皮肤湿烂；乌梅并能生津止渴，又为安蛔治厥之良药，对蛔厥腹痛有较好的疗效；诃子生用能清肺热，可治久咳失音，煨用主涩肠止泻；罂粟壳并有止痛之效。

肉豆蔻、赤石脂、禹余粮、石榴皮均能涩肠止泻，以治久泻各病为主。其中肉豆蔻还能温中行气；赤石脂，禹余粮又能止大便下血；石榴皮则兼杀虫。

小麦功专养心除烦，以治脏躁，悲伤欲哭之证。浮小麦以止汗为功，主治自汗盗汗。乌贼骨专于收敛，有止血止带之功，以治崩漏带下、吐血便血及胃痛吞酸等证。椿樗白皮燥湿清热，可治赤白带下，并能止泻止血。白果有敛肺止咳喘之能，久嗽咳喘宜之，尚可止带浊。

莲子益脾肾，且固涩，用于脾虚久泻、肾虚滑精，还能交通心肾，以治惊悸失眠；莲蕊鬚清心固肾、涩精止血；莲子心性寒，以清心热为主，治温热病烦热神昏；莲房化瘀止血；荷叶能清暑利湿，用于暑热病证，且又升阳止血，治疗脾虚泄泻及多种出血证。

没石子临床较少应用，专主收敛固涩。

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
山茱萸	酸、微温	肝、肾	补益肝肾，收敛固涩	①肝肾不足，头晕目眩②遗精、遗尿③虚汗不止	5—10克，大剂量至30克	
五味子	酸、温	肺、肾	敛肺滋肾，生津敛汗，涩精止泻，宁心安神	①久咳虚喘②津伤口渴、自汗、盗汗③遗精滑精、久泻不止④心悸失眠多梦	2-6克 研末服每次1—3克	
五倍子	酸、涩、寒	肺、大肠、肾	敛肺降火，涩肠止泻，固精，止	①肺虚久咳，②久泻久痢，③遗精滑精，④自汗盗汗，	2—6克入丸散外用适量	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			汗， 止血	⑤崩漏 下血		
浮小麦	甘、 微寒	心	益 气， 除 热， 止汗	自汗、 盗汗、 骨蒸劳 热	15— 30克	小麦 养 心， 安 神， 治妇 女脏 躁。
乌梅	酸、 涩平	肝、 脾、 肺、 大肠	敛肺 涩 肠， 生津 驱 蛔， 外消 疮毒	①肺虚 久咳② 久泻久 痢，③ 虚热消 渴④蛔 厥腹痛 呕吐⑤ 赘肉外 突	3—10 克 大 剂量 30克 外用 适量	
肉豆蔻	辛、 温	脾、 胃、 大肠	涩肠 止 泻， 温中 行气	①久泻 不止② 脘腹寒 痛、食 少呕吐	3—10 克 入 丸散 为1.5 —3克	煨熟 可增 强温 中止 泻作 用。

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
诃子	苦、酸、涩、平	肺、大肠	涩肠止泻，敛肺止咳	①久泻久痢②久咳失音	3—10克	生用敛肺利咽，煨用涩肠止泻。
赤石脂	甘、酸、涩、温	大肠、胃	涩肠止泻止血；外用收涩生肌敛疮	①久泻久痢、便血、脱肛②疮疡溃破久不收口	10—20克外用适量	包煎
禹余粮	甘、涩、平	胃、大肠	涩肠止泻，收敛止血	①久泻久痢②崩漏带下	10—20克	孕妇忌用
石榴皮	酸、涩、温	胃、大肠	涩肠止泻，杀虫	①久泻久痢、脱肛②虫积腹痛 ③	3—10克外用适量	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				外用治 牛皮癬		
海螵蛸	咸、 涩、 微温	肝、 肾	收敛 止血， 固精 止带， 制酸 止痛， 收湿 敛疮	①崩 漏、肺 胃出 血、创 伤出血 ②遗 精、带 下③胃 痛泛酸 ④湿 疹、溃 疡多脓	6—12 克， 研末 服1.5 —3克 外用 适量	
芡实	甘、 涩平	脾、 肾	益肾 固精， 健脾 止泻， 祛湿 止带	①遗精 遗尿② 脾虚泄 泻、白 带	10— 15克	
莲子	甘、 涩平	脾、 肾、 心	健脾 止泻， 益肾 固精，	①脾虚 久泻② 遗精滑 精③惊 悸失眠	6—15 克	石莲 子， 主要 用于 噤口

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			养心 安神	④崩漏 带下		痢疾。
莲子心	苦、寒	心	清心 除烦， 降压	①温热 病烦热 神②高 血压病	1.5— 3克	
莲鬚	甘、 涩、 平	肾、 心	清心 固肾， 涩精 止血	①梦遗 滑精② 遗尿尿 频③吐 血崩漏	1—5 克	
荷叶	苦、平	心、 肝、 脾	清暑 利湿， 升阳 止血	①暑热 胸闷② 呕吐泄 泻③多 种出血	鲜用 15— 30 克， 干用3 —10 克	
金樱子	酸、 涩、 平	肾、 膀胱、 大肠	固精 缩尿， 止泻 止带	①遗精 滑精、 遗尿、 尿频② 久泻久 痢③白 带过多	6—18 克	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
覆盆子	甘、酸、微温	肝、肾	益肾固精缩尿，明目	①遗精遗尿、阳痿早泄②目暗不明	3—10克	
桑螵蛸	甘、咸、涩、平	肝、肾	补肾助阳，固精缩尿	遗精滑精、小便频数、阳痿早泄	3—10克	
椿樗白皮	苦、涩、寒	大肠、胃、肝	清热燥湿，涩肠，止带，止血，杀虫	①湿热泻痢、久泻久痢②崩漏带下③疥癣湿疮	3—5克	
白果	甘、苦、涩、平有小毒	肺	敛肺平喘，固涩止带	①肺气不敛，咳嗽气喘②白浊带下	6—10克	
栗罌	酸、涩、	肺、大	敛肺，	①肺虚久咳②	3—10克	止咳宜蜜

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
壳	平	肠、肾	涩肠，止痛	久泻久痢③心腹筋骨诸痛		炙，止泻止痛宜醋炒。
刺猬皮	苦、平	胃、大肠、肾	收敛止血，固精缩尿	①便血、痔漏②遗精、遗尿	3—10克 研末服 1.5—3克	
没石子	苦、温	肺、脾、肾	涩精，敛肺，止血	①泻痢不止、便血②创伤出血，疮疡久不收口	6—12克	

复习思考题

- 1、试述收涩药的定义和适应证。
- 2、分析比较下列药组的功效和主治的相同点和不同点：山茱萸与乌梅 五味子与五倍子 莲子与芡实 桑螵蛸与海螵蛸 金樱子与覆盆子
- 3、阐明诃子、肉豆蔻、赤石脂、罂粟壳的功效和适应证。

第十九章涌吐药

- 第十九章涌吐药

〔自学时数〕2学时

〔面授时数〕1学时

〔目的要求〕

- 1、了解涌吐药的概念、适用证、禁忌证。
- 2、掌握涌吐药中常用药（瓜蒂 常山 胆矾 藜芦）的功效、临床应用、注意事项，并比较其异同。
- 3、在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡以引起或促使呕吐为主要作用的药物，称为涌吐药或催吐药。

《内经》云：在上者涌之。是指在咽喉、胸脘等人体上部有毒物、宿食或痰涎等，均可应用吐法，以达到祛邪治病的目的。故凡误食毒物，停留胃中而尚未吸收，或宿食停滞不化，尚未入肠，脘部胀痛，或痰涎壅盛，阻碍吸收；以及癫痫发狂等证，均可使用涌吐药来治疗。

涌吐药作用强烈，大都具有毒性，副作用较大，且呕吐为剧烈的动作，可以影响内脏，尤其易损伤胃气。故使用时必须慎重，用之不当，反使病情恶化，能使患者产生不良后果。因此涌吐药只适用于气壮邪实之证，如体质虚弱或老人、小儿、妇女胎前产后，以及素患失血、头眩、心悸、劳嗽喘咳等证，均当忌用。

在使用涌吐药时，还当注意用量、用法和解救之法。一般服用涌吐药，可用小量渐增的方法，以防中毒或涌吐太过；且服用后宜多饮热开水，以助药力，或用洁净鸡翎扫喉探引助吐。如呕吐不止，当及时解救。张子和曾指出解救的方法说：吐至昏眩，慎勿惊疑，……如发头眩，可饮冰立解，如无冰时，新汲水亦可。又说：如藜芦吐者，不

止，以葱白汤解之，以石药吐者，不止，可甘草、贯众解之；诸草木吐者，可以麝香解之。

吐后当休息，不宜马上进食，俟肠胃功能恢复，再饮流质或易消化的食物，以养胃气。

瓜蒂

〔原文〕苦寒，阳明胃吐药，能吐风热痰涎，上膈宿食。吐去上焦之邪，经所谓其高者因而越之，在上者涌之，木郁达之是也。越以瓜蒂、淡豉之苦，涌以赤小豆之酸，吐去上焦有形之物，则木得舒畅，天地交而万物通矣。当吐而胃弱者，代以参芦。朱丹溪曰：吐中就有发散之义。张子和曰：诸汗法，古方多用之，惟以吐发汗，世罕知之，故予尝曰：吐法兼汗以此夫。昂按：汗吐下和，乃治疗之四法，仲景瓜蒂散、梔豉汤，并是吐药，子和治病，用吐尤多。丹溪治许白云大吐二十余日，治小便不通，亦用吐法，甚至用四物四君以引吐。成法具在，今人惟知汗下和，而吐法绝置不用，遇邪在上焦，及当吐者，不行涌越，致结塞而成坏证，轻病致重，重病致死者多矣！时医背弃古法，枉人性命，可痛也夫！治风眩头痛，懊憹不眠，癫痫喉痹，头目湿气，水肿黄疸，或合赤小豆煎，或吹鼻中，取出黄水。湿热诸病。上部无实邪者禁用。能损胃耗气。语曰：大吐亡阳，大下亡阴。凡取吐者，须天气清明，巳午以前，令病人隔夜勿食，卒病者不拘。《类编》云：一女子病胸喘不止，遇道人教取瓜蒂七枚为末，调服其汁，即吐痰如胶粘，三进而病如扫。

【讲解】瓜蒂内服可涌吐热痰、宿食；外用研末吹鼻，可解湿热。为葫芦科一年生草质藤本植物甜瓜的果蒂。在甜瓜盛产期，将尚未老熟的果实摘下，切取果蒂，阴干入药。以新而味苦者为佳，陈久者效减。

本品味苦性寒，有毒，入胃经。攻能涌吐热痰宿食，也可外用祛湿热。用于痰涎、宿食停聚胃中而宜于涌吐者，及湿热黄疸等。

【临证应用】痰热郁于胸中，而为癫痫发狂、喉痹喘息、烦躁不眠，或宿食停于胃中，而致脘腹胀痛等证，均可用本品催吐。如《伤寒论》方，以瓜蒂配赤小豆研末，香豉煎汤送服催吐，可治痰涎堵塞胸中或宿食停留胃脘之证。治湿热黄疸，古有一物瓜蒂散吹鼻，取黄水流出，以治诸黄之说。近人用瓜蒂5克，开水100毫升，浸泡十日过滤，经高压灭菌3—4小时后服用，成人每次服5毫升，日服2—3次，食后服，或用瓜蒂焙黄研末，每包0.1—1.5克，用时将一包分4—6份，晨起空腹时每隔20—30分钟，从两鼻孔各吸一等份，每隔5—7天用一包，四包为一疗程，治黄疸有效。

【用量用法】2.5—5克；入丸散0.3~1.0克。外用小量，研末搐鼻，待鼻中流出黄水即止。

体虚、失血及上部无实邪者忌服。若内服量大，易导致剧烈呕吐不止，可用麝香0.1—0.15克，开水冲服以解之。

常山

〔原文〕辛苦而寒有毒。能引吐行水，祛老痰积饮，痰有六：风痰、寒痰、湿痰、热痰、食痰、气痰也；饮有五：流于肺为支饮，于肝为悬饮，于心为伏饮，于经络为溢饮，于肠胃为痰饮也。常山力能吐之下之。专治诸症。然悍暴能损真气，弱者慎用。李时珍曰：常山、蜀漆，劫痰截疟，须在发散表邪及提出阳分之后用之。症有经疟、脏疟、风寒暑湿痰食瘴鬼之别，须分阴阳虚实，不可概论。常山、蜀漆，得甘草则吐；得大黄则利；得乌梅、穿山甲则入肝；得小麦、竹叶则入心；得秫米，麻黄则入肺；得龙骨、附子则入肾；得草果、槟榔则入脾。盖无痰不作疟，一物之功，亦在驱逐痰水而已。李士材曰：常山发吐，唯生用多用为然，与甘草同用亦必吐，若酒浸炒透，但用钱许，每见奇功，未见其或吐也。世人泥于雷敦老人久病忌服之说，使良药见疑，沉痾难起，抑何愚也！常山吐疟痰，瓜蒂吐热痰，乌附尖吐湿痰，莱菔子吐气痰，藜芦吐风痰。鸡骨者良。酒浸蒸或炒用。栝楼为使。忌葱茗。茎叶名蜀漆，功用略同，古方有蜀漆散，取其苗性轻扬，发散上焦邪热。甘草水拌蒸。

【讲解】常山功能涌吐痰饮、截疟。为虎耳草科落叶灌木植物黄常山的根。别名鸡骨常山。根圆柱形，弯曲扭转，表面黄棕色，质坚硬，味苦。以质坚实而重，形如鸡骨者为佳。切片，生用或酒炒。茎、叶名蜀漆，亦供药用。

本品辛苦而寒，有毒。归肺、心、肝三经。功能涌吐痰饮，力专截疟，为治疟疾的良药。然其副作用较大，服后往往出现恶心、呕吐，过去用作催吐药，现已少用。

【临证应用】常山为治疟疾要药。药理研究证明：常山所含的生物碱对各种类型的疟原虫都有良好抑制作用。临床常配草果、槟榔、青皮等伍用，如截疟七宝饮。用水酌加酒煎，于疟发前二小时服，可治疟疾久发不止。

蜀漆与常山功用略同，而涌吐之力前者为强，古有用其配他药治疟疾或涌吐痰涎的记载，然近世少用。

【用量用法】5——10克，生用对胃肠道有刺激，可引起呕吐，一般皆酒炒后使用，以减少副作用。此外，本品作用猛烈，能损正气，体虚

慎用。

胆矾

〔原文〕酸涩辛寒，入少阳胆经。性敛而能上行，涌吐风热痰涎，发散风木相火。治喉痹，醋调咽，吐痰涎立效。咳逆，痉病崩淋。能杀虫，治牙虫疮毒阴蚀，产铜坑中，乃铜之精液，故能入肝胆，治风木。磨铁作铜色者真。形似空青鸭嘴色为上。市人多以醋揉青矾伪之。畏桂、芫花、辛夷、白薇。

【讲解】胆矾催吐作用强烈，外用能收湿、蚀疮、去腐。系铜矿中自然生成的结晶或人工制造的含水硫酸铜。呈大小不一的半透明斜方形棱柱状结晶体，色淡蓝或深蓝，质脆易碎。容易与皂矾混淆，鉴别之法：以之磨于铁上而呈铜色者为真品。研末或煅后研末用。

本品酸辛而寒，有毒。功能催吐、收湿解毒、蚀疮去腐。适用于痰涎壅盛，阻塞咽喉，以及癫痫、食物中毒等证，亦可用于口疮牙疳、痔疮、疥癣等疾患。

【临证应用】胆矾用于涌吐风热痰涎及风痰癫痫、喉痹等，可单用，亦可配伍使用。如《谭氏小儿方》以之为末，温醋汤调下，可吐风痰；《济生方》以其配僵蚕为末，名二圣散，吹喉吐涎，以治喉痹；误食毒物，单用本品，温水化服、即能催吐。

外用可治风眼赤烂、口疮、牙疳等证。如《明目经验方》以之烧研，泡汤洗目，治风眼赤烂；《沈氏尊生书》以之同儿茶、胡黄连研末敷，治牙疳。

【用量用法】内服用于催吐，研末温水化服每次0.3——0.6克。外用适量。虚弱患者忌用。

藜芦

〔原文〕辛寒至苦有毒，入口即吐，善通顶，令人嚏，风痫证多用之。张子和曰：一妇病风痫，初一二年一作，后渐日作，甚至一日数作，求死而已。值岁大饥，采百草食，见野草若葱，采蒸饱食，觉不安，吐胶涎数日，约一二斗，汗出如洗，甚昏困，后遂轻健如常人。以所食葱访人，乃葱苗，即藜芦是矣。李时珍曰：和王妃年已七十，中风不省，牙关紧闭，先考太医吏目月池翁诊视，药不得入，不获已打去一齿，浓煎藜芦汤灌之，少顷噫气，遂吐痰而苏。药不瞑眩，厥疾不疗，诚然！**取根去头。用黄连为使。反细辛、芍药、诸参。恶大黄。畏葱白。**吐者服葱汤即止。

【讲解】藜芦功专涌吐风痰，兼可杀虫。为百合科多年生草本植物黑藜芦的根茎。晒干入药。

本品味苦而辛，性寒有毒，归肺、胃、肝三经。功能涌吐风痰、杀虫。服用藜芦后可立即引发喷嚏、呕吐，对中风、癫痫等证见痰涎壅盛者方可使用。用时去头，只用根茎，并须注意不可与细辛、芍药、人参、沙参、丹参、玄参等配伍使用。若服后呕吐不止，可饮葱汤以解，故曰畏葱白。

【临证应用】藜芦催吐作用较强，对中风痰壅、癫狂烦乱或误服毒物（尚未吸收）者，只可作为急救，偶一用之。单服或配伍瓜蒂、防风，如三圣散。

此外，借其杀虫之功，可研末油调外涂，治疥癣秃疮。近人用其灭蚊蝇及其幼虫，也作农药杀虫剂。兽医作催吐药用。

【用量用法】0.3——0.9克，只入丸散剂。外用研末，或油调涂擦。

本品毒性强烈，内服宜慎。体弱者及孕妇忌服。

小结

涌吐药以促使呕吐为主要作用。凡毒物、宿食或痰涎在人体上部者均可选用。本类药均有毒，且作用强烈，故只适用于体壮邪实之人。

涌吐药虽有催吐之共性，但每味药又有其特点。其中瓜蒂、胆矾、藜芦均可外用，瓜蒂研末吹鼻，以去湿热，可治湿热黄疸等证；胆矾外用解毒收湿，多用治眼、口、牙等热毒之证，用量稍大又可蚀疮去腐；藜芦外用杀虫止痒，用于一些皮肤病及杀蚊蝇、灭虱。常山则善能祛痰截疟，酒炒后用于各种疟疾有良效；蜀漆乃常山之嫩枝叶，涌吐之力胜于常山。

涌吐药功用归纳简表

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
瓜蒂	苦、寒有毒	胃	内服：涌吐热痰、宿食；外用：研末吹鼻去湿热；	①热痰、宿食 ②湿热黄疸	2.5—5克入丸散 0.3—1克	
常山	苦、辛、	肺、心、肝	涌吐痰	①疟疾	5—10克	截疟酒炒，涌吐生

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	寒、有毒		涎，截疟	@胸中痰饮		用。蜀漆功同常山，用量3—6克。
胆矾	酸、辛、寒、有毒	肝、胆	内服：涌吐风痰，毒物；外用：解毒收湿，蚀疮去腐	①风痰壅塞，喉痹、癫痫 ②风眼赤烂、口疮、牙疳 ③肿毒不破或胬肉疼痛	0.3—0.6克外用适量	
藜芦	辛、苦、寒、有毒	肺、胃、肝	内服：涌吐风痰；外	①痰涎壅盛之中风、癫痫	0.3—0.9克入丸散	近人有用于杀灭蚊蝇者

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			用： 杀虫 止痒	痢、 喉痹 ②疥 癣秃 疮	外用 适量	

复习思考题

- 1. 怎样掌握涌吐药的使用？
- 2. 常山、胆矾除涌吐外，还具有哪些效用？

第二十章 外用药及其他

• 第二十章 外用药及其他

〔自学时数〕4学时

〔面授时数〕1学时

〔目的要求〕

1. 了解外用药的概念、作用、适用证。
2. 熟悉外用药的制法、用法、注意事项。
3. 掌握外用药中常用药（雄黄 轻粉 明矾 木鳖 斑蝥 蟾酥 蛇床子）的功效、临证应用，并比较其异同。
4. 熟悉杀虫止痒、解毒、蚀疮去腐、拔毒生肌、收湿敛疮、外用发泡等概念。
5. 了解使用剧毒药必须做到注意用法（包括炮制）、严格控制剂量、谨慎用药，千万不可粗心大意。
6. 在自学本章全部内容的基础上，重点掌握小结内容。

凡以敷贴、涂搽、熏洗、点眼、吹喉、滴耳等外用为主要用药方法的一部分药物，称之为外用药。

本类药分别具有消肿解毒、排脓止痛、去腐生肌、收敛止血、杀虫止痒等作用，可用于疮疡肿毒、疥癣、虫蛇咬伤、外伤及五官科疾患等。由于上述疾患发生的部位及表现证候不同，故有前述多种用药形式和方法。其中有些药物也可根据证情需要，给予内服。

外用药大多具有不同程度的毒性，使用时应慎重，如作外用，须经过配制后用；有些剧毒药物，即使外用，亦不能过量或持续使用，且不宜在头部、五官涂布，以免局部刺激过强，而引起反应或吸收中毒；可内服的药也宜制成丸、散剂服，并须控制用量，防止发生中毒。

此外，有部分药物，不能恰当地归入前面各章，故列于本章之末介绍，所以本章名为“外用药及其他”。

雄黄

（原文）辛温有毒，得正阳之气。入肝经血分，搜肝强脾，散百节大风，杀百毒，辟鬼魅。治惊痫痰涎，头痛眩晕，暑疟癖痢，泄泻积聚。虞雍公道中冒暑，泄痢连月，梦至仙居，延之坐，壁中有词云：暑毒在脾，湿气连脚；不泄则痢，不痢则疟，独炼雄黄，蒸饼和药，甘草作汤，食之安乐，别作治疗，医家大错。如方服遂愈。又能化血为水，燥湿杀虫，治劳瘵疮疥蛇伤。赤似鸡冠，明彻不臭，重三五两者良。孕妇佩之，转女成男。醋浸，入莱菔汁煮，干用。生山阴者名雌黄，功用略同。劣者名熏黄，烧之则臭，只堪熏疮疥、杀虫虱。

【讲解】雄黄功专解毒，杀虫。为含砷的结晶矿石（二硫化砷）。为红黄色不透明固体。

商品规格有：雄精，品质最优，赤如鸡冠，明彻不臭。腰黄：色黄质轻，略透明，次于雄精。雄黄：色红胜于腰黄，而透明度次之。雌黄：色较暗黑，为最次。采挖后去杂质，研细或水飞用。切忌见火。煅炼后即分解成三氧化二砷，有剧毒。

本品性味辛苦温，有毒。入心、肝、胃经。具有杀虫，解毒的作用，故多用于痈疽疔疮，疥癣，虫毒蛇伤。亦可借其杀虫作用，治虫积腹痛，此外还有燥湿祛痰、定惊等功效。可用于哮喘，惊痫等证。

【临证应用】雄黄毒性强烈，长于解疮毒，用于各种恶疮，疥癣。如配乳香、没药、麝香同用为丸，即醒消丸，治痈疽肿硬疼痛；配白矾研末称二味拔毒散，治诸疮肿及疥癣。《山东医刊》介绍，以雄黄、生五灵脂各30克，共研细末，每次6克，日服4—8次，并用雄黄末60克，香油一两调涂患处，每日更换二、三次，治毒蛇咬伤。

此外，用本品配槟榔、牵牛等驱虫药，如牵牛丸，可用治蛔虫腹痛。治惊痫痰壅盛者，可与郁金、巴豆霜等为丸服，如雄黄解毒丸。

【用量用法】内服0.3—0.9克，入丸散。外用适量。孕妇忌用。雄黄能从皮肤吸收，故局部外用亦不能大面积涂擦及长期持续使用。

石硫黄

（原文）味酸有毒，大热纯阳，硫黄阳精极热，与大黄极寒，并号将军。补命门真火不足。性虽热而疏利大肠，与燥涩者不同。热药多祈秘，惟硫黄暖而能通；寒药多泄，惟黄连肥肠而止泻。若阳气暴绝，阴毒伤寒，久患寒泻，脾胃虚寒，性命欲垂尽者用之，亦救危急妙药也。治寒痹冷癖，足寒无力，老人虚秘，《局方》用半硫丸。妇人阴蚀，小儿慢惊。暖精壮阳，杀虫疗疮，辟鬼魅，化五金，又能干汞。王好古云：太白丹、来复丹，皆用硫黄，佐以硝石，至阳佐以至阴，与仲景白通汤佐以人尿、猪胆汁意同。所以治内伤生冷、外冒暑湿，霍乱诸病，能除扞格之寒。兼有伏阳，不得不尔，如无伏阳，只是阴虚，更不必以阴药佐之。《夷坚志》云：唐与正亦知医，能以意治病，吴巡检病不得洩，卧则微通，立则不能涓滴，遍用通药不效，唐问其平日自制黑锡丹常服，因悟曰：此必结砂时，硫飞去，铅不死，铅砂入膀胱，卧则偏重犹可洩，立则正塞水道，故不通。取金液丹三百粒，分十服，瞿麦汤下，铅得硫则化，水道遂通。家母舅童时亦病溺涩，服通淋药罔效，老医黄五聚视之曰：此乃外皮窍小，故溺时艰难，非淋证也。以牛骨作楔，塞于皮端，窍渐展开，勿药而愈。使重服通利药，得不更变他证乎？乃知医理非一端也。硫能化铅为水，修炼家尊之为金液丹。番舶者良。难得。取色黄坚如石者，以莱菔剜空，入硫合定，糠火煨熟，去其臭气；以紫背浮萍煮过，消其火毒；以皂荚汤淘其黑浆。一法绢袋盛，煮酒三日夜；一法入猪大肠烂煮三时用。畏细辛、诸血、醋。

土硫黄，辛热腥臭，止可入疮药，不可服饵。

【讲解】硫黄外用可杀虫止痒，内服可壮阳通便。为天然硫黄矿石的提炼加工品。也称硫黄。为黄色或黄绿色的结晶块状物，质重而酥脆易碎，断面呈蜂窝状，有光泽，具特殊臭味，遇火燃烧，发出青烟，臭更甚。内服时，将硫黄与豆腐同煮至豆腐呈黑色为度，除去豆腐，阴干，用时研末。这样毒性已减，内服安全。原文所述其他制法罕用。所谓番舶者良，是指海外进口品，尤以日本产者，质结实，有光泽，品质较佳。

本品酸温，有毒。入肾与大肠经。外用有杀虫止痒之功；内服有壮阳通便之效。适用于疥癣、湿疹、皮肤瘙痒等证。内服可补火壮阳，治

下元虚冷，冷秘，冷泄，寒喘，阳萎等证。《本经》谓：主妇人阴蚀。《药性本草》曰：除冷风顽痹等，近世皆少用之。

【临证应用】硫黄用于疥癣，皮肤瘙痒等证，可收杀虫止痒之效。如以硫黄一味研末，麻油调涂可治疥疮；治干湿癣，可以硫黄配风化石灰、铅丹、轻粉研末，生油调涂。对于肾阳不足，下元虚冷之证，则多内服，如硫黄配附子、肉桂、黑锡等，即黑锡丹，可治肾不纳气的寒喘；配鹿茸、补骨脂可治小便频数、阳痿、腰膝冷痛等证。此外，本品纯阳，温通而不燥涩，能疏利大肠而治脏寒之冷秘，以起温寒通便之功，常配半夏为丸如半硫丸。

【用量用法】外用适量，研末敷，或油调涂，或烧烟熏。内服1—8克，入丸散。孕妇及阴虚火旺者忌用。

砒石

〔原文〕辛苦而咸，大热大毒，砒霜尤烈。专能燥痰，可作吐药，疗风痰在胸膈，截疟除哮。外用蚀败肉，杀虫枯痔。出信州，故名信石，衡州次之，锡之苗也。故锡壶亦云有毒。生者名砒黄，炼者名砒霜。畏绿豆、冷水、羊血。

【讲解】砒石外用能蚀疮去腐，内服劫痰平喘。为砷矿中的砷华矿石的加工品。除极少部分来自天然砷矿的氧化物外，大多由砷矿石烧炼升华或使雄黄氧化升华而成。未经煅炼前称生砒，炼后称砒霜。商品有红砒、白砒两种。白砒为较纯的氧化砷；红砒尚含有少量硫化砷。用时研细。或与绿豆同煮减其毒性，研末用。原产信州（今江西上饶），故又称信石，后隐“信”为“人言”，所以也称人言。

本品味辛大热，有大毒。入肺、肝二经。外用可蚀疮去腐，内服可劫痰平喘。治痈疽、瘰癧、痔疮、牙疳等证，亦可治寒痰喘咳及疟疾。

【临证应用】砒石有强烈的腐蚀作用，能蚀烂去腐。如治瘰癧，以本品研末，合浓墨汁作丸如梧桐子大，用针破瘰，将药半丸，贴之自落，蚀尽为度；验方金枣散，用红砒、大枣去核，煅灰研末，外敷治走马牙疳；用红砒、枯矾、朱砂、乌梅肉，共研末敷，即枯痔散，治痔疮。

砒石对疟疾有可靠的截疟功效，但只能暂服，不可持续或大量服用。如《卫生宝鉴》一翦金方，以本品同醋煮硫黄、绿豆等分为末，作丸，空腹服，治疟疾。

用砒石治寒痰喘嗽，可配淡豆豉为丸，如紫金丹。

本品虽具剧烈毒性，然在临床应用上，对枯痔，寒喘以及以毒攻毒的作用，确有特殊的价值。

【用量用法】内服每次0.002—0.004克。入丸散用。外用适量，也不可过多。并不能持续服用，孕妇禁用，也不能作酒剂服用。《本草图解》曰：……得酒倾刻杀人，虽绿豆冷水亦难解矣。

水银

〔原文〕辛寒，阴毒。功专杀虫，治疮疥虬虱，性滑重，直入肉，头疮切不可用，恐入经络，令人筋骨拘挛。解金银铜锡毒，能杀五金。堕胎绝孕。从丹砂烧煅而出。畏磁石、砒霜。得铅则凝，得硫则结。并枣肉入唾研则碎，散失在地者，以花椒、茶末收。

【讲解】水银是以毒攻毒的解毒杀虫药。系由汞矿中取得后提炼而成的纯汞。也有从辰砂矿提得的。均为有银色光泽，极易流动之质重的液体。

本品性味辛寒，有毒。功能攻毒杀虫。主用于疥癣，恶疮肿毒等证。古时用于内服以镇逆降痰，止呕，潜阳，又可下胎。由于其毒性强烈，使用不安全，故近世只作外用，罕作内服药用。

【临证应用】水银外用，能以毒攻毒，治疥癣、恶疮。如古方单用水银擦白癫风痒，配胡粉同用治虫癣瘙痒，也可以油调制成软膏涂擦。又如三仙丹，即由水银配伍火硝，白矾升炼而成，为外科解毒提脓的要药。此外，水银及其制剂又为治梅毒要药。

【用量用法】外用适量，头疮不可用本品涂擦，以免吸收中毒。

轻粉

（原文）**辛冷**。李时珍曰：燥有毒。**杀虫治疮，劫痰消积**。能消涎积。十枣汤加大黄、牵牛、轻粉，名三化神佑散。**善入经络，瘰疬药多用之。不可过服常用**。李时珍曰：水银阴毒，用火煅丹砂而出，再加盐矾炼为轻粉，轻扬燥烈，走而不守，今人用治杨梅疮。虽能劫风痰湿热，从牙龈出，邪郁暂解，然毒气窜入经络，筋骨血液耗亡，筋失所养，变为筋挛骨痛，痈疽疔漏，遂成废瘤，贻害无穷。上下牙龈，属手足阳明肠胃经，毒气循经上行，至牙龈薄嫩之处而出。**土茯苓、黄连、黑铅、铁浆、陈酱，能制其毒。**

【讲解】轻粉外用可攻毒杀虫，内服可逐水通便。为水银、明矾、食盐等用升华法制成的汞化合物。呈片状、针状或结晶状的粉末，体轻质疏松，色白有光泽。别名：汞粉、水银粉、膩粉。避光保存，研细用。

本品辛寒，燥烈有毒。外用可杀虫攻毒，内服逐水通便。用治疥癣、梅毒、疮疡痈疽等证，也可用于水肿，大小便不利的实证。

【临证应用】轻粉治皮肤疥癣，可配吴茱萸、硫黄等研末，油调涂，如神捷散。治梅毒，以之配大风子肉，等分为末外涂。治疮疡溃烂，常用的生肌玉红膏，即以本品配血竭、当归、紫草、白蜡、麻油等制成膏药，贴患处用。对于水肿臃胀、二便不利之证，以轻粉配大黄、牵牛、甘遂、大戟、芫花等内服，如舟车丸。

【用量用法】内服0.1—0.2克，入丸散。外用适量，研末调涂或干撒。本品毒性强烈，内服不可过量，也不能持续服用，以防中毒。服散剂宜装胶囊中，服后要及时漱口，以免口腔糜烂。孕妇忌用。

铅

〔原文〕甘寒属肾，禀壬癸之气。水中之金，金丹之母，八石之祖。丹灶家必用之。安神解毒，坠痰杀虫，乌鬚，制为梳、以梳鬚。明目。

铅丹 即黄丹，用黑铅加硝黄、盐、矾炼成。咸寒沉重，味兼盐矾。内用坠痰去怯，消积杀虫，治惊疳疟痢；外用解热拔毒，去瘀长肉。熬膏必用之药。用水漂去盐硝砂石，微火炒紫色，摊地上，去火毒用。 **铅粉** 主治略同。亦名胡粉、锡粉。李时珍曰：铅粉亦可代铅丹熬膏，然未经盐矾火煅，又有豆粉、蛤粉杂之，只入气分不能入血分也。

【讲解】铅安神坠痰，并为丹剂的常用原料。铅丹、铅粉外用解毒生肌，内服截疟。

铅：甘寒、入肾。可安神明目、坠痰杀虫，并能乌鬚髮。现在临床较少应用。

铅丹：又名黄丹。为铅的氧化物。原药用或炒用。

本品辛，微寒。入心、肝经。外用有良好解毒防腐、止痒、收敛生肌等效。

铅粉：又名官粉、胡粉、锡粉。

本品辛寒，有毒。外用能敛疮止痒、解毒防腐，与铅丹功用相似。

【临证应用】铅丹在临床主要用于各种疮疖、黄水湿疮、溃疡久不收口及毒蛇咬伤等。除制散剂外，多与植物油加热合制成膏药，或以此为各种膏药的基础剂而配入其他解毒、活血、止痛、生肌药。铅膏药为外科必备之品，配方甚多，敷贴患处除有上述功效外，并能对疮面起保护作用。如《本草纲目》治黄水脓疮，即以本品同铅粉、松香、明矾熬膏贴敷。

内服能截疟，多配入复方，如《肘后方》与常山配伍，研末，蜜丸服；《仁存方》与青蒿共研制散剂服，均有较好疗效。

此外，古时亦作镇惊和降逆坠痰之剂，内服以治惊痫癫狂等证。因本品有毒，近世已少有用者。

铅粉临床外用能敛疮止痒、解毒防腐，功用与铅丹相似，多用于疥癣疮疡、多脓、湿痒诸证，常与枯矾、轻粉等合用。亦为制膏药的基础剂，与植物油化合可制成膏药。

【用量用法】铅丹，内服0.3—0.6克，入丸散。外用适量。不宜过量或持续内服，以防蓄积中毒。铅粉，内服量每次0.5—1.0克。

密陀僧

〔原文〕辛咸小毒，感银铅之气而结。坠痰镇惊，止血散肿，消积杀虫。疗肿毒，愈冻疮，用桐油调敷。解狐臭，油调搽腋，以馒头蒸热劈开，掺末夹腋下亦佳。染髭鬚。出银坑难得，今用者乃倾银炉底，入药煮一伏时。

【讲解】密陀僧外用敛疮止痒、解毒防腐。为粗制的氧化铅。以往取自提炼银、铅时沉积于炉底的黄色或红黄色粉末或鳞片，镶嵌着具有金属光泽的小块，光照则闪闪发光。水飞研末用。

【临证应用】本品味辛性平，有毒，入肝经。外用有类似铅丹和铅粉的除湿收敛和解毒防腐作用，并可研擦狐臭、汗斑。古亦用其内服以坠痰镇惊、消积杀虫。现多只作外用。

【用量用法】外用适量，研末油调敷。

硼砂

〔原文〕甘微咸凉，色白质轻，故除上焦胸膈之痰热，生津止嗽，治喉痹口齿诸病。初觉喉中肿痛，含化咽津，则不成痹。能柔五金而去垢腻，故治噎膈积块，结核胬肉，目翳骨鲮。咸能软坚，含之咽汁。出西番者，白如明矾；出南番者，黄如桃胶。能制汞哑铜。硼砂、硃砂，并可作金银焊。

【讲解】硼砂外用清热解毒，内服清肺化痰。为单斜晶系由矿石硼砂提炼出的结晶体，又名月石。呈白色透明或半透明块状或粉末状，入药生用，或煅用。

本品性凉，味甘、咸。归肺、胃经。外用可清热解毒，多用治咽喉肿痛及目赤肿痛诸证。内服能清肺化痰。治痰热壅滞，咳痰不利，但以外用为主，很少内服。

【临证应用】本品外用不仅能清热解毒，且有消肿防腐之效。治鹅口疮，用本品配雄黄、冰片、甘草，共为细末蜜水调涂，如四宝丹。治咽喉肿痛、牙痛、口舌生疮可与冰片、玄明粉、朱砂同用，研末吹撒患处，如冰硼散。治目赤肿痛、目生翳膜又可以本品水溶液洗眼。也可与炉甘石、冰片、玄明粉等配成点眼剂，如白龙丹。

用治痰火壅滞的咳痰不畅，可与贝母、瓜蒌等伍用。

【用量用法】外用适量，研细末撒或调敷。内服1—3克。

炉甘石

〔原文〕甘温，阳明胃经药，受金银之气。金胜木，燥胜湿，故止血消肿，收湿除烂，退赤去翳，为目疾要药。产金银坑中，金银之苗也。状如羊脑，松似石脂，能点赤铜为黄。今之黄铜，皆其所点也。煅红，童便淬七次，研粉，水飞用。

【讲解】炉甘石有明目退翳、收湿生肌之功。为天然菱锌矿石。表面白色不透明，体轻，粉质性脆。采挖后除去泥土杂石，制用，称制炉甘石，有火煅，醋淬，及火煅后用三黄汤（黄连、黄柏、大黄）淬等制法，晒干研末，水飞后用。

本品味甘性平。归肝、胃经。善能明目去翳、收湿生肌，专作外用。为治目赤翳障、烂弦风眼常用药。对溃疡不敛、皮肤湿疮之证，效亦较好。

【临证应用】炉甘石有明目退翳之功，以之与风化硝等分，化水点眼，可治目暴赤肿；也可同冰片、硼砂；玄明粉为末点眼，如白龙丹，治一切火热眼病及翳膜胬肉。治疮疡脓水淋漓、久不收口，用本品有收湿生肌、防腐敛疮之功。如《秘传经验方》以炉甘石一两、孩儿茶三钱为末，麻油调敷，治下疳阴疮；《仁斋直指方》用炉甘石一分、真蚌粉半分，研末扑之，治阴汗湿痒。

【用量用法】外用适量，水飞点眼，研末撒或调敷，不作内服。

明矾

〔原文〕酸咸而寒，性涩而收。燥湿退涎，化痰坠浊，解毒生津，除风杀虫，止血定痛，通大小便，蚀恶肉，生好肉，除瘤热在骨髓。髓为热所劫则空，故骨痿而齿浮。治惊痫黄疸、血痛喉痹、齿痛风眼、鼻中瘖肉、崩带脱肛、阴蚀阴挺、阴肉挺出，肝经之火。疗肿痈疽、瘰癧疥癣、虎犬蛇虫咬伤。李时珍曰：能吐风热痰涎，取其酸苦涌泄也；治诸血痛阴挺脱肛疮疡，取其酸涩而收也；治风眼痰饮泄痢崩带，取其收而燥湿也；治喉痹痛虫蛇伤，取其解毒也。多服损心肺伤骨。寇宗奭曰：劫水故也。书纸上，水不能濡，故知其性劫水也。李迅曰：凡发背，当服蜡矾丸以护膜，防毒气内攻。矾一两，黄蜡七钱，溶化和丸，每服十丸，渐加至二十丸，日服百丸则有力。此药护膜托里解毒化脓之功甚大，以白矾、芽茶捣末冷水服，解一切毒。取洁白光莹者煅用。又法以火煅地，洒水于上，取矾布地，以盘覆之，四面灰拥一日夜，矾飞盘上，扫收之，为矾精，未尽者更如前法，再以陈苦酒醋也。化之，名矾华，七日可用，百日弥佳。甘草为使。畏麻黄。恶牡砺。生用解毒，煅用生肌。

【讲解】明矾具有解毒杀虫，燥湿止痒，止血止泻，清热消痰的功效。为三方晶系明矾石的加工提炼品。一名白矾。无色透明，成八面体结晶块，外面被以白粉，受高热火煅则失去其结晶水，变为轻松似海绵之状，称枯矾。明矾、枯矾皆入药，常研末用。

本品酸寒。归肺、肝、脾、胃、大肠经。性专收涩，外用具有解毒杀虫、燥湿止痒之功；内服以止血、止泻、祛痰为能。外可治疮疡疥癣、湿疹瘙痒；内能疗吐衄下血、泻痢不止、癫痫发狂及湿热黄疸等证。

【临证应用】本品外用多煅成枯矾，具有极强的收敛燥湿功效，治疮疡疥癣等证。如以白矾、黄丹等分研末外敷，即二仙散，治疗疗肿恶疮；以枯矾、朱砂研末，即白矾散外敷舌上，治小儿鹅口疮；治黄水疮，可以枯矾、熟松香、黄丹等分研末，麻油调涂患处，治疥癣、湿疮又可与硫黄、雄黄等药外用。现有用明矾制成15%或18%注射液，注

入痔核，对各期内痔、混合痔均有效果。也有用明矾化为溶液外洗或配青黛、冰片等研末外用治中耳炎、湿疹。

若以明矾、黄蜡制成蜡矾丸，酒送内服，可治一切痈肿恶疮。

本品有收敛止血止泻的功效，治吐衄下血及外伤出血，可用本品配儿茶，研末内服。借本品清热化痰之效，又可治风痰痫病，如化痰丸，即以白矾、细茶研末，蜜丸服。如以白矾、郁金为丸，即白金丸，可治痰热内郁的癫狂之证。

此外，本品内服还可用于妇女带下，湿热黄疸等证。枯矾与乌贼骨、延胡索、蜂蜜配伍，制成“204”胃药，又可治胃及十二指肠溃疡。

【用量用法】内服1—3克。入丸散。外用适量。可研末撒，调敷或化水洗。内服多生用，外用多煅用。体虚胃弱及无湿热痰火者忌服。

皂矾

〔原文〕酸涌涩收，燥湿化痰，解毒杀虫之功，与白矾同，而力差缓。主治略同白矾，利小便，消食积，同健脾消食药为丸。散喉痹。

醋调咽汁。李时珍曰：胀满黄肿症痢痞疾方往往用之，其源则自仲景用矾石硝石治女劳黄疸方中变化而来。深青莹净者良，煅赤用。煅赤名绛矾，能入血分，伐肝木，燥脾湿。张三丰治肿满，有伐木丸，苍术二斤，米泔浸，黄酒面曲四两炒，绛矾一斤，醋拌晒干，入瓶，火煅为末，醋糊丸，酒下。或云皂矾乃铜之精液，用醋制以平肝，胜于针铁，不必忌盐，后亦不发，多服令人泻。

【讲解】皂矾功能解毒燥湿、杀虫补血。为硫酸盐类矿物水绿矾的矿石或化学合成品。又有青矾、绿矾之称。煅后色赤，故又称“绛矾”、“红矾”。

本品性味酸凉。归肝、脾经。功能燥湿化痰、解毒杀虫，并能补血消积。与明矾效用相似，外用以治疮毒、疥癣、牙疳、口疮，内服用于肠寄生虫病引起的贫血、萎黄病。

【临证应用】皂矾燥湿、杀虫、止痒，多用于湿疹、疥癣，可以研末外搽，或烧汤熏洗。《良方汇录》用绿矾、花椒、冰片、樟脑煅研末，治疥疮，湿者干搽，干者菜油调涂。古代文献中还有用皂矾配楝树子，研末外搽，治白秃头疮的记载。

绿矾有一定补血作用。临床又常与苍术、厚朴、红枣同用，如绛矾丸，治腹胀黄肿有效。也可与绿豆粉同用，加米饭为丸服，用治钩虫病。

【用量用法】内服0.5—1.5克，外用适量。煅用。注意服药期间应忌饮茶。孕妇禁用。

斑蝥

〔原文〕辛寒有毒。外用蚀死肌，敷疥癣恶疮；内服破石淋，拔瘰癧疔肿，杨登甫云：瘰癧之毒，莫不有根，大抵治以斑蝥、地胆为主，制度如法，能令其根从小便出，如粉片血块烂肉，此其验也。以木通、滑石、灯心辈导之。斑蝥捕得，屁射出，臭不可闻，故奔走下窍，直至精溺之处，能下败物。痛不可当，用须斟酌。下獬犬毒，九死一生之候，急用斑蝥七枚，去头翅足，糯米炒黄，为末酒服，空心下，取下小狗三十枚，如数少再服。又方：糯米一勺，斑蝥二十一枚，分三次，炒至青烟为度，去蝥，取米为粉，冷水入清油少许，空心下，取利下毒物，如不利再进，愈后忌闻钟鼓声，复发则不可治。服之肚痛急者，用靛汁或黄连水解之。溃肉，肌肉近之则烂，堕胎。豆叶上虫，黄黑斑纹。去头足，糯米炒熟，生用则吐泻。人亦有用米取气不取质者。畏巴豆、丹参。恶甘草、豆花。斑蝥、芫青、葛上亭长、地胆四虫，形色不同，功略相近。食芫花为芫青，青绿色尤毒，春生；食葛花为亭长，黑身赤头，夏生；食豆花为斑蝥，斑色秋生；冬入地为地胆，黑头赤尾。陶隐居云：乃一物而四时变化者。苏恭云：非也，皆极毒，须慎用。

【讲解】斑蝥外用攻毒蚀疮，内服可破血散结。为芫青科昆虫南方大斑蝥或黄黑小斑蝥的虫体。捕捉后闷死，晒干。用时去头、足、翅，生用；或用糯米同炒至黄黑色，去米，研末用。

本品辛寒，有毒。外用可攻毒蚀疮，治痈疽、瘰癧、顽癣；内服可破血散结，治经闭、癥瘕、狂犬咬伤。本品毒性剧烈，一般很少用于内服。

【临证应用】斑蝥对皮肤有剧烈的刺激作用，能引起发赤起泡，又能腐蚀恶肉死肌，故用其攻毒蚀疮。如治痈疽肿硬不破，用斑蝥研末，和蒜捣膏，以少许贴之，脓出去药即愈；治顽癣，可以斑蝥微炒为末，蜜调敷；治瘰癧瘰疮，以斑蝥与白砒、白矾、青黛等同用研末，干掺疮上用，如生肌干脓散。治狂犬咬伤，用斑蝥二十一枚，糯米一勺，分三次炒，去斑蝥，以米为粉，空腹冷水调服。现在研究，本品有促进毛发生长的作用，用酒浸泡后可擦斑秃。

此外，本品内服，用于经闭、癥瘕，可与桃仁、大黄等配伍。近人也用其治癌肿的病变，如提取斑蝥素，制成胶囊或片剂，或以原生药

配入多方治肝癌、食道癌、贲门癌等消化道癌。

【用量用法】内服0.03—0.06克，作丸、散服。本品毒性较大，用量过大，可引起血尿等证状，甚至造成死亡。斑蝥素30毫克即可致死。

外用适量，对皮肤有强烈刺激，能发赤起泡，若涂敷面积过大，经皮肤吸收，也可引起肾炎、膀胱炎、呕吐、头痛等证。孕妇忌用。

蟾蜍

〔原文〕蟾土精而应月魄，辛凉微毒，入阳明胃。发汗退热，除湿杀虫。治疮疽发背，未成者，用活蟾蜍系疮上，半日，蟾必昏愤，置水中救其命，再易一个，三易则毒散矣；势重者，剖蟾蜍合疮上，不久必臭不可闻。如此二三易，其肿自愈。小儿劳瘦疳疾。

蟾酥，辛温大毒，助阳气。治疗肿发背，小儿疳疾脑疳。即蟾蜍眉间白汁，能烂人肌肉，惟疔疳或合他药服一二厘，取其以毒攻毒。脑疳乳和滴鼻中，外科多用之。蟾蜍肪涂玉，刻之如蜡。肪音方，脂也。

【讲解】蟾蜍，清热解毒，利水消胀。蟾酥功专攻毒、清肿、止痛，并能开窍醒神。蟾蜍，为中华大蟾蜍或黑眶蟾蜍及其同属它种蟾蜍取过蟾酥后除去内脏或不去内脏的干燥全体。气腥味辛，有小毒。有消肿解毒、止痛、利水之功。蟾酥，为蟾蜍科动物中华大蟾蜍和黑眶蟾蜍的耳后腺所分泌的白色浆液、经收集加工而成的饼状干燥品。用时以碎块置酒或牛奶中溶化，然后风干或晒干研细。本品辛甘而温。有毒，为外科常用要药。不论内服或外用，都有较强的攻毒消肿和止痛作用。凡痈肿疔毒、咽喉肿痛等证，均有良效。又具有较好的开窍辟秽之功，对暑湿秽恶所致的吐泻腹痛、神志昏迷之证，有醒神回苏之效。但温散大毒，孕妇忌用。

【临证应用】蟾蜍，临床主要用于痈肿疔毒、咽喉肿痛、水肿、小便利、小儿疳疾等，临床不如蟾酥多用。

蟾酥用于痈肿疔毒、咽喉肿痛、齿痛等证，常与牛黄、麝香等药同用，如六神丸。内服、外用均有较好的疗效。用于中暑昏厥、呕吐泄泻、腹中绞痛等证，可与雄黄、麝香、苍术、丁香等配伍，如蟾酥丸，对痈肿或疔毒内攻所致昏愤呕吐，可开窍、护心、解毒。《本草正》方，治龋齿作痛，用少许蟾酥点之，止痛效果较为显著。

近研究，本品单用有强心利尿作用，装胶囊饭后冷开水送服，可治心力衰竭。

【用量用法】蟾蜍 研末服0.5—3克。孕妇忌用。

蟾酥 内服0.015—0.03克，入丸散。外用适量，研末调敷或入膏药内贴患处。注意外用不可入目。

附：蟾皮 系蟾蜍的皮。性味功效与蟾蜍相同。现或用于恶性肿瘤及喘咳痰多、痞积腹胀等。用量0.3—0.9克，入煎剂多炙用。或入丸散中用，每次吞服0.3—0.9克，治痈肿疮毒，亦可用鲜蟾皮外贴。

木鳖子

〔原文〕苦温微甘，有小毒。利大肠，治泻痢痞积、瘰癧疮痔、乳痈蚌毒，消肿追毒，生肌除黥，音旱，黑斑。专入外科。核扁如鳖，绿色。拣去油者。能毒狗。

【讲解】木鳖子功专泻热疗疮。为葫芦科多年生蔓生草质藤本植物木鳖子的种子。种子略呈扁平圆板状，中间稍隆起，表面灰褐色，形如鳖。去壳取仁用。

本品苦微甘，性寒，有小毒。归肝、脾经。具有泻热、消肿、散结、疗疮作用，主用于疗疮肿毒、瘰癧、痔肿等证，以外用为主，极少内服。

【临证应用】木鳖子用于疗疮肿毒、乳痈、痔疮肿痛，皆可研末用醋调涂；治瘰癧，亦可用木鳖仁二个研细，和鸡蛋白调匀，蒸熟，饭后服，每日一次，连服半月。治肿毒初起或脓成不溃，可与蓖麻仁、松香、铜绿等打膏用。

【用量用法】0.6—1.2克，不入煎剂。外用适量。

附：马钱子

马钱子为马钱科常绿乔木植物马钱及同科木质大藤本皮氏马钱（云南马钱）的成熟种子。又称番木鳖。主产于印度、越南、泰国；皮氏马钱在我国云南、海南岛有栽培。夏秋季摘取成熟果实，取出种子，洗净附着的果肉，晒干，经炮制后入药。现常用砂子炒烫成黄色并鼓起后，去净毛用；或煮沸，清水浸，刮去皮，切薄片用；或以麻油炸至膨胀而呈焦黄色，取出研用。以上均称“制马钱子”。

本品苦寒有毒，归肝、脾经。功能通络散结、消肿定痛，多用于痈疽肿毒、瘰癧痰核、跌打损伤及风湿痹痛等证。近时也用治消化道癌、皮肤癌等多种恶性肿瘤。马钱子治痈疽及跌打损伤，可配炮山甲、制僵蚕，研末米糊为丸，即青龙丸。亦可以本品配山豆根、青木香等分研末吹喉治喉痹。治瘰癧痰核、可与乳香、没药、地龙、麝香等配伍，如小金丹。因本品又有通络止痛之效，可与麻黄、苍术、僵蚕、乳香、没药等祛风通络药同用，以治风湿痹痛、拘挛麻木等证。近年来常以马钱子治面神经麻痹，用法为将本品润湿后切成薄片，排列在胶布上，贴于患侧面部，七至十天换药一次，至恢复正常为止。还可治小儿麻痹后遗症，以之配牛膝、木瓜、川断、淫羊藿、当归、肉苁蓉等研末为丸，有增强麻痹肌群的活力、恢复关节活动之效。

此外，本品用治肝癌、肺癌、皮肤癌等多种恶性肿瘤的报告逐渐多见。如用小金丹治乳腺癌；马钱子配全蝎、穿山甲、雄黄等，即新方神农丸，用于消化道癌、鼻咽癌、乳腺癌；本品配露蜂房、僵蚕等，如抗癌丸，治胃癌、肝癌、肺癌等等。

马钱子内服作丸散剂，用量0.3—0.9克。外用适量，研末吹喉或调涂。本品有毒，若服用过量，可引起肢体颤动、惊厥、呼吸困难，甚至昏迷等中毒证状。孕妇忌服。

血竭

〔原文〕甘咸。色赤入血分，补心包肝血不足，专除血痛，散瘀生新，为和血之圣药。治内伤血聚，金疮折跌，疮口不合，止痛生肌。性急，不可多使引脓。血竭单入血分，乳香、没药兼入气分，皆木脂也。出南番，色赤，以染透指甲者为真。假者是海母血，味大咸，有腥气。单碾用。同众药捣，则作尘飞。

【讲解】血竭外用止血生肌敛疮，内服活血散瘀止痛。为棕榈科常绿藤本植物麒麟竭及同属植物的果实和树干渗出的树脂。别名麒麟竭。主产于马来西亚、印度尼西亚、伊朗等地，我国广东、台湾亦有种植。捣碎研末，生用。

本品味甘咸，性平。入心、肝经。外用有止血生肌敛疮之效，以治溃疡不敛、外伤出血之证；内服能活血散瘀止痛，用于跌打损伤，瘀血肿痛。此外，因本品可活血散瘀止痛，故也可用于妇女瘀血经闭、痛经、产后瘀阻腹痛，以及一切瘀血阻滞，心腹刺痛等证。

【临证应用】血竭治外伤出血，可单用，或配伍蒲黄等分，研末外敷；治疮溃不敛，多与乳香、没药、儿茶相伍，研末外敷，如生肌散。若与乳香、没药、儿茶、冰片等配伍，如七厘散，内服或外敷，均有散瘀止痛功效，是治跌打损伤，瘀血肿痛之有效方剂。

【用量用法】外用适量，研末敷。内服每次1—1.5克，入丸散。

樟脑

〔原文〕辛热香窜，能于水中发火。置水中，焰益炽。通关利滞，除湿杀虫，置鞋中去脚气。《集要》云：和乌头为末，醋丸弹子大，置足心，微火烘之，汗出为效。熏衣篋，辟疰虫。以樟木切片，浸水煎成。升打得法，能乱冰片。

【讲解】樟脑外用有除湿杀虫、温散止痛之功，内服具辟秽开窍之效。为樟科常绿乔木植物樟的枝、干、根、叶，经用水蒸气蒸馏法提取挥发油，再用分馏法从挥发油中提取而得的结晶体。别名潮脑、脑子。樟树主产于我国台湾、长江以南及西南等地。

本品辛热有毒，入心经。外用除湿杀虫、温散止痛，可用治疥癣、牙痛、跌打损伤。樟脑辛香走窜，内服有类似冰片的芳香开窍、辟秽化浊、温散止痛等作用，用于神志昏迷或痧胀腹痛，对中恶所致的吐泻腹痛之证，效更显著。置箱柜中防虫蛀。

【临证应用】樟脑配伍硫黄、川椒、枯矾为末，麻油调外用，即樟脑散，治疥癣有脓者。配脂麻、花椒，研末涂之，可治小儿头癣。治牙痛，可配朱砂研末搽痛处。樟脑浸酒外涂，治跌打损伤，可奏散瘀止痛之效。若与没药、乳香研末内服，可治神志昏迷或痧胀腹痛。

【用量用法】外用适量，研末撒或调敷。内服0.1—0.2克，入散剂，或以酒溶化服。本品有毒，内服宜慎，并当控制剂量，以防中毒。孕妇忌服。

大风子

〔原文〕辛热有毒。取油治疮癣疥癩，有杀虫劫毒之力。朱丹溪曰：粗工治大风病，佐以大风油，殊不知此物性热，有燥痰之功而伤血，至有病将愈而先失明者。出南番。子中有仁，白色，久则油黄，不可用。入丸药，压去油。

【讲解】大风子功能祛风燥湿、攻毒杀虫。为大风子科常绿乔木泰国大枫子树的成熟种子。研末或炒炭用；取油用，即大风子油。我国产于台湾；印度、泰国、越南及印尼等国出产较多。

本品味辛性热，有毒。功能祛风燥湿、攻毒杀虫，用治麻风、梅毒、疥癣。但因辛热有毒，作用强烈，多只作外用。

【临证应用】大风子煨存性，加轻粉研末，麻油调敷，治麻风、梅毒。又如大风丹，用大风子肉配硫黄、雄黄、枯矾，研末油调涂，治疥癣诸疮。大风子油配伍苦参末，酒糊为服，可治大风诸癩。

【用量用法】外用适量，捣敷或煨存性研末调敷，内服一次量0.3—1克。本品毒烈，内服宜慎，阴虚血热者忌服。又因内服本品，易致恶心、呕吐及胸腹疼痛等不良反应，甚则损伤肝肾，故勿过量或持续服用。

蛇床子

（原文）辛苦而温。强阳益阴，补肾祛寒，祛风燥湿。治阴痿囊湿、女子阴痛阴痒、湿生虫，同矾煎汤洗。子脏虚寒、产门不闭、炒热熨之。肾命之病，及腰痠体痛、带下脱肛、喉痹齿痛、湿痹恶疮、杀虫止痒。风湿诸病。煎汤浴，止风痒。李时珍曰：肾命三焦气分之药，不独补助男子，而且有益妇人。世人舍此而求补药于远域，岂非贵耳贱目乎？似小茴而细，微炒，杀毒则不辣。以地黄汁拌蒸三遍佳。恶丹皮、贝母、巴豆。

【讲解】蛇床子内服温肾助阳，外用燥湿杀虫。为伞形科一年生草本植物蛇床的果实。呈椭圆形，似小茴香，而有特殊气味。晒干，生用。

本品味辛苦，性温，入肾经。辛温能散寒以助阳，苦燥可除湿以止痒。温肾壮阳，可治阳痿、宫冷不孕；散寒祛风燥湿，用于寒湿带下、湿痹腰痛。外用能燥湿杀虫止痒，以治阴部湿痒、湿疹、湿疮、疥癣。

【临证应用】蛇床子配五味子、菟丝子，如三子丸，可温肾壮阳，用治阳痿，宫冷不孕等证；配伍山萸肉、五味子、车前子、香附等，治寒湿带下；配桑寄生、杜仲、秦艽，治湿痹腰痛；蛇床子一味煎汤外洗，可治阴囊湿疹；若配白矾煎汤熏洗，可治妇人阴痒。又如《金匱要略》蛇床子散，以本品配白粉少许，研末为丸如枣大，绵裹纳阴中，可治妇人阴寒阴痒之证，近年来有用蛇床子15克水煎，灌洗阴道，或用本品制成栓剂，放入阴道，治滴虫性阴道炎，皆有良好效果。

【用量用法】内服3—10克，煎汤服，或入丸散。外用15—30克，水煎洗或研末敷，也可研末做成坐药（栓剂）。

木槿皮

〔原文〕苦凉。活血润燥，治肠风泻血，痢后热渴。作饮服，令人得睡。川产者治癣疮。癣疮有虫，用川槿皮肥皂水浸，时时搽之，或浸汁磨雄黄尤妙。用根皮。

【讲解】木槿皮功善清热杀虫止痒。为锦葵科落叶灌木植物木槿的根皮或茎皮。四川产者称川槿皮。切片晒干生用。

本品甘苦性凉，具有清热、燥湿、杀虫、止痒的作用。多外用，为治皮肤疥癣良药。内服可治带下、泻痢等证。

【临证应用】木槿皮为末，醋调敷治钱癣，木槿皮浸汁，磨雄黄擦之治癣疮。

【用量用法】外用适量，多酒浸搽擦，或煎水熏之。无湿热者不宜服。

丝瓜

〔原文〕甘平。苏颂曰冷。凉血解毒、除风化痰、通经络、行血脉、老者筋络贯穿，象人经络，故可借其气以引之。消浮肿、稀痘疮。出不快者，烧存性入朱砂蜜水调服。治肠风崩漏、疝痔痈疽，滑肠下乳。

【讲解】丝瓜不常作药用，药用以丝瓜络为主。丝瓜络善去风通络、解毒化痰。丝瓜络为葫芦科一年生攀缘草本植物丝瓜的果络。秋季摘取成熟果实，搓去外皮及果肉，剪去两端，去掉种子，切段生用。

本品甘平，功能祛风通络、解毒化痰，尤以通络见长。适用于风湿痹痛、筋脉拘挛、乳汁不通等证，痈疽疮肿、痰多咳嗽等也可以用。

【临证应用】丝瓜络治痹痛拘挛，常与桑枝、秦艽、海风藤等伍用；治胸胁疼痛，多与瓜蒌皮、桔梗、枳壳等宽胸理气药同用。《简便单方》以之烧存性研末酒服，可治妇女血脉壅滞、乳汁不通。

此外，治痈疽疮肿，可与银花、蒲公英等配伍；治痰多咳嗽，也可配他药使用。

【用量用法】10—15克。外用适量。

孩儿茶

〔原文〕苦涩。清上膈热、化痰生津、止血收湿、定痛生肌、涂金疮口疮、硼砂等分。阴疽痔肿。出南番，云是细茶末，纳竹筒、埋土中，日久取出，捣汁熬成块。小润泽者上，大而枯者次之。

【讲解】孩儿茶功能收湿敛疮、生肌止血。为豆科落叶乔木植物儿茶的枝干及心材煎汁浓缩而成。商品呈方形或不规则形状，有时可见龟裂纹，表面黄褐色或黑色，质脆易碎。断面有光泽，中心呈棕黑色。用时研细。主产于印度、缅甸、老挝等地，我国云南也有生产。

本品苦涩性凉，归肺经。具有收湿敛疮、生肌止血的作用。临床以外用为主，可治疮疡多脓或久不敛口，及外伤出血等证。

【临证应用】儿茶配煅龙骨、冰片、轻粉，即龙骨儿茶散，外用可治皮肤湿疮；治疮疡不敛，用腐尽生肌散，即以之与血竭、乳香、没药等配伍研末外用；本品配硼砂等分为末搽，治牙疳口疮。还可配煅龙骨、血竭、白芨等研末外敷，治外伤出血。

此外，古方有用其内服治肺热咳嗽、内出血等记载，现已渐少应用。

【用量用法】外用适量，研末撒或调敷。内服0.3—1克，入丸散。

阿魏

〔原文〕辛平。一曰温。入脾胃。消肉积，杀细虫，去臭气。谚云：黄芩无假，阿魏无真。刘纯云：阿魏无真却有真，臭而止臭是为珍。解蕈菜、自死牛马肉毒，治心腹冷痛疟痢，疟痢多由积滞而起。传尸疳劳疰虫。出西番，木脂熬成，极臭。试取少许，安铜器一宿，沾处白如银汞者真。人多以胡蒜白麝之。用钵研细，热酒器上熏过入药。

【讲解】阿魏以消积杀虫为主要功效。为伞形科多年生草本植物阿魏及其同属植物的新鲜根茎及根切伤后渗出的油胶树脂。分布于苏联中亚细亚地区及伊朗、阿富汗等国，我国新疆亦产。

本品味苦辛，性温，具强烈而持久的大蒜样臭气。入肝、脾、胃经。功专消积、杀虫，主治癥瘕痞块、虫积、肉积、心腹冷痛、疟疾、痢疾等证。《本草经疏》曰：阿魏，其气臭烈殊常，故善杀诸虫，专辟恶气。辛则走而不守，温则通而能行，故能消积、利诸窍、除秽恶也。

【临证应用】阿魏配伍白芥子，鳖甲、三棱、莪术等为丸内服，可治一切痞块癥瘕；又可制成膏药外敷。本品又有消肉积的作用，可配六神曲，山楂等以治肉食所伤的食积停滞。

【用量用法】内服1—1.5克，入丸散。外用适量，可熬制药膏或研末入膏药内贴。本品气味奇臭，不宜入汤剂。

露蜂房

〔原文〕甘平有毒。治惊痫瘕疝，附骨痃疽，根在脏腑。和蛇蛻、乱发烧灰酒服。按附骨疽不破。附骨成脓，故名。不知者误作贼风治。附骨疽痛处发热，四体乍热乍寒，小便赤，大便秘而无汗。泻热发散则消，贼风痛处不热，亦不发寒热，觉身冷，欲得热熨，则小宽，时有汗，宜风药治之。涂瘰癧成痿，音漏，炙研，猪脂和涂。止风虫牙痛，煎水含漱，时珍曰：阳明药也，取其以毒攻毒，兼杀虫之功耳。敷小儿重舌，烧灰酒和敷舌下，日数次。起阴痿，烧灰敷阴上，取悬于树受风露者，炙用。治痈肿醋调涂，洗疮煎用。

【讲解】露蜂房长于攻毒疗疮，兼能祛风止痛。为胡蜂科昆虫大黄蜂的蜂巢，或连蜂蛹在内的巢。原药酒洗生用或焙黄研末用。

本品味甘性平，有毒。有攻毒疗疮，消肿止痛，祛风除痹之功。多用于痃疽、瘰癧、疮癣、皮肤瘙痒以及风虫牙痛等证，可内服，亦可外用，均有效果。然内服甚少应用。

【临证应用】蜂房用于痃疽、乳痈，焙焦研末，每次3克，日服三次，连服三到六日，即见效。治痃疽溃烂，可煎汤冲洗疮口，或焙黄研末外涂。与黄芪、蛇蛻等药熬膏外贴，治瘰癧脓水不干，煎水漱口，可治风虫牙痛。配祛风药同用，能治风湿痹痛，风疹瘙痒。

【用量用法】外用适量，研末调敷或煎水冲洗。内服6—12克，煎服。

小结

本类药物以外用为主，具有杀虫、解毒、消肿止痛、化腐生肌、收敛止血等功效。主要用于痈疽疮疖、疥癣、虫蛇咬伤及耳目喉鼻等疾患。应用方法有：膏贴、涂擦、吹喉、滴鼻、点眼、薰洗、熨烫等。因大多外用药具有不同程度的毒性，所以，应慎重使用，防止中毒。

硫黄、雄黄为解毒杀虫药，用于疥癣恶疮。二药相比，硫黄止痒杀虫效佳，主治疥癣；雄黄解毒疗疮功强，主治痈疽恶疮。雄黄经配伍制成丸、散内服，用于虫积腹痛、疟疾、痢疾及痰涎壅盛之症，硫黄经配伍制成丸、散内服，用于阳虚之痰喘、阳痿及虚寒便秘。

砒石、水银均有剧毒，为解毒杀虫药，主治疥癣恶疮。二药相比，砒石兼有蚀疮去腐作用，为治恶疮腐肉不去要药；水银无此功效。二药相反，不可同用。砒石经配伍制成丸、散内服，可治疟疾、痰喘；水银今时已不用于内服。轻粉性味、功效与水银相似，轻粉内服有缓泻、利尿作用。

铅甘寒入肾，安神明目，坠痰杀虫。铅丹，又名黄丹，辛微寒，入心肝经、有解毒、止痒、生肌作用。可配制外贴膏药，用于疮痈肿毒久溃不敛；铅粉，又名宫粉、胡粉、锡粉，辛寒有毒，为外用药，与铅丹功效相似。密陀僧与铅丹、铅粉的作用相似。

硼砂、炉甘石解毒防腐，为眼科常用。二药相比，硼砂性凉，清热解毒，清肺化痰，外用主治口舌生疮、咽喉肿痛、目赤翳膜，内服主治肺热痰壅；炉甘石性平，收湿敛疮，专供外用，主治湿疮、湿疹多脓水而不收口者。

明矾、皂矾功效相似，均有解毒杀虫、燥湿化痰作用，外用主治疮疡湿疹、疥疮、口舌生疮、耳中流脓。明矾内服止血止泻，用于外伤出血、便血、崩漏及久泻不止诸症；皂矾内服补血消积，用于肠寄生虫病引起的贫血、萎黄病。

斑蝥、蟾蜍辛而有大毒，对皮肤有刺激作用。二药相比，斑蝥性寒，外用攻毒蚀疮，治痈疽、瘰癧、顽癣，内服破血散结，治经闭、癥

瘥、狂犬咬伤；蟾蜍性温，外用攻毒消肿止痛，治痈肿疔毒、咽喉肿痛，内服开窍辟秽，治吐泻腹痛、神志昏迷。

木鳖子通络散结，消肿止痛，治痈疽肿毒，跌打损伤，风湿痹痛，拘挛麻木等症。本药有小毒，以外用为主，极少内用，严格控制用量。

血竭外用止血生肌敛疮，治溃疡不敛，外伤出血，内服活血散瘀止痛，治跌打损伤，瘀血肿痛。

樟脑外用除湿杀虫、温散止痛，治疥癣、牙痛、跌打损伤；内服芳香开窍、辟秽化浊、温散止痛，治神志昏迷、吐泻腹痛。

大风子只作外用，祛风燥湿、攻毒杀虫，治麻风、梅毒、疥癣。

蛇床子外用燥湿杀虫止痒，治阴部湿痒、湿疹、湿疮、疥癣；内服温肾散寒除湿，治阳痿、宫冷不孕、带下、腰痛。

木槿皮清热、燥湿、杀虫、止痒，外用治疥癣；内服治带下、泻痢。

丝瓜多以丝瓜络入药，祛风通络，解毒化痰，以通络见长，治风湿痹痛、筋脉拘挛、乳汁不通。

孩儿茶以外用为主，收湿敛疮、生肌止血，治疮疡多脓或久不敛口，外伤出血。

阿魏消积杀虫，治癥瘕痞块、虫积、肉积、心腹冷痛、疟疾、痢疾。

露蜂房祛风除痹、消肿止痛，治痈疽、瘰癧、疮癣、皮肤瘙痒、风虫牙痛，内服、外用均可。

外用药及其他功用归纳简表

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
石硫黄	酸、温有毒	肾、大肠	杀虫止痒，壮	①疥癣、瘙痒 ②阳	1—3克入丸散	孕妇

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
			阳，通便	痿、虚寒便秘（内服）	外用适量	禁用
雄黄	辛、苦、温、有毒	心、肝、胃	解毒杀虫	①痈肿 疥癣、蛇毒 ②惊痫、疳积（内服）	0.3—0.9克 入丸散 外用适量	孕妇禁用
砒石	辛、大热、有大毒	肺、肝	蚀疮去腐，劫痰平喘，截疟	①痈疽、瘰癧、牙疳、痔疮 ②寒痰哮喘、疟疾	0.002—0.004克，入丸散外用适量	孕妇禁用
水银	辛、寒有毒		攻毒杀虫	疥癣恶疮	外用适量	孕妇禁用
轻粉	辛、寒有毒	脾、胃、肝、肾	攻毒杀虫，逐水通便	①疥癣、梅毒、疮疡 ②水	0.1—0.2克，入	孕妇禁用

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				肿臃 胀、顽 痰积饮	丸散外 用适量	
铅丹	辛、 微寒 有毒	心、 肝	解毒止 痒，收 敛生 肌，坠 痰截疳	疮疡溃 烂，癰 瘤、疔 疾	主作外 用，适 量	铅 粉功 效相 同
密陀僧	辛、 平有 毒	肝	收敛防 腐	疮溃不 敛、湿 疮湿疹	主外 用，适 量	
硼砂	甘、 咸、 凉	肺、 胃	清热解 毒，清 肺化痰	①口舌 生疮， 咽喉肿 痛、目 赤翳障 ②痰火 壅滞	外用适 量，内 服1—3 克	
炉甘石	甘、 平	肝、 胃	明目去 翳，收 湿敛 疮，生 肌	①目赤 翳障 ② 下疳湿 疮	外用适 量	
明矾	酸、 寒	肺、 肝、	解毒杀 虫，燥	①疮疡 疥癣、	1—3克 入丸散	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
		脾、胃、大肠	湿止痒，止血止泻，清热消痰	湿疹瘙痒 ②吐血衄下血、泻痢不止 ③癫痫发狂 ④黄疸		
皂矾	酸、凉	肝、脾	解毒燥湿，杀虫，补血	①疮毒疥癣 ②萎黄病、钩虫病	外用适量，0.5—1.5克	
斑蝥	辛、寒有毒		攻毒蚀疮，破血散结	①痈疽、疥癣、瘰疬、狂犬咬伤 ②经闭、癥瘕、肝癌、胃癌	外用适量0.03—0.06克，入丸散内服	孕妇忌用
蟾酥	辛、甘、温有毒		攻毒消肿止痛，辟秽开窍	①疮痈肿毒、咽喉肿痛 ②痧胀腹痛	外用适量0.015—0.03	孕妇忌用

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
				吐泻、昏厥	克入丸散内服	
蟾蜍	辛、凉微毒		清热解毒，利水消胀	①痈疽肿毒 ②疳积腹胀 ③肿瘤	内服0.5—3克外用适量	
马钱子	苦、寒有毒	肝、脾	通络散结，消肿定痛	①痈疽肿毒、跌打损伤 ②风湿痹痛，拘挛麻木 ③癌肿	外用适量内服用0.3—0.9克，入丸散	孕妇忌用
木鳖子	苦、微甘、寒	肝、脾	泻热疗疮，消肿散结	疗疮肿毒、瘰癧痔肿		
血竭	甘、咸、平	心、肝	生血生肌敛疮，活血散瘀止痛	①金疮出血 ②溃疡不敛 ③跌打损伤 ④经闭腹痛	外用适量1.0—1.5克入丸散内服	孕妇忌用

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
樟脑	辛、热有毒	心	除湿杀虫，温散止痛，开窍辟秽	①疥癣湿疮、跌打损伤 ②中恶神昏	外用适量0.1—0.2克入散服	
大风子	辛、热有毒		祛风燥湿，攻毒杀虫	麻风、梅毒、疥癣	外用适量0.3—1.0克内服	
蛇床子	辛、苦、温	肾	外用：燥湿杀虫止痒；内服：温肾壮阳散寒	①湿疹、湿疮、疥癣 ②阳痿、宫冷不孕、湿痹腰痛	外用量为15—30克内服3—10克	
木槿皮	甘、苦、凉		清热燥湿，杀虫止痒	皮肤疥癣	外用适量	
丝瓜络	甘、平		祛风通络，解毒化痰	①风湿痹痛 ②乳汁不通 ③痈疽疮肿 ④痰多咳嗽	内服10—15克外用适量	

药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
孩儿茶	苦、涩、凉	肺	收湿敛疮，生肌止血	湿疮流水、溃疡不敛、口疮、下疳	外用适量	
阿魏	苦、辛、温	肝、脾、胃	消积、杀虫	①癥瘕痞块 ②虫积食积	1—1.5克不入煎剂外用适量	
露蜂房	甘、平、有毒	胃	攻毒疗疮	①痈疽、瘰癧 ②痹痛、风疹	6—12克外用适量	

复习思考题

- 1、外用药分别具有哪些功效？主用于什么病证？使用时应注意哪些方面的问题？
- 2、阐述下列药物的功效和应用要点：铅丹、炉甘石、明矾、血竭、雄黄、硫黄、樟脑、木槿皮。
- 3、怎样掌握砒石、轻粉、斑蝥、蟾酥、马钱子等剧毒药的使用？

补充药物归纳表

类别	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
清热解毒药	穿心莲	苦、寒	肺、胃、大肠、小肠、	清热解毒、燥湿	①温病初起②肺热咳嗽③湿热泻痢	6—15克	

类别	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	蚤休	苦，微寒	肝	清热解毒 消肿止痛	①痈肿疮毒②毒蛇咬伤	10—15克	又名重楼七叶一枝花
	半边莲	辛，寒	心、肺、小肠	清热解毒 利水消肿	①毒蛇咬伤②水肿	15—30克	
	鱼腥草	辛，微寒	肺	清热解毒 消痈排脓	①肺痈咳嗽吐血②热毒疮疡	15—30克	又名蕺菜
	鸦胆子	苦，寒	大肠、肝	清热解毒、 治痢、截疟、 腐蚀赘疣	①原虫痢②疟疾③鸡眼、寻常疣	治痢10—30粒 截疟10—15粒	不入汤剂，内服胶囊或桂圆肉包吞服外用适量

类别	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	红藤	苦，平	大肠	清热 解毒 活血 止痛	①肠 痈腹 痛② 跌打 损伤	15 — 30 克	
	白花蛇舌草	微苦、甘，寒	胃、 大肠、 小肠	清热 解毒 利水 通淋	①痈 肿疮 毒② 热淋、 小便 涩痛	15 — 60 克	现代 试用于食管癌、胃癌、直肠癌等
清虚热药	银柴胡	甘，微寒	肝、胃	退虚热	阴虚发热	3— 10 克	
泻下药	番泻叶	甘、苦，寒	大肠	泻下 导滞	便秘	1.5 — 4.5 克	开水 泡服， 入汤剂后下

类别	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
祛风湿药	臭梧桐	辛、苦、甘，凉	肝	祛风湿	①风湿痹痛②高血压病	5—15克	
	寻骨风	辛、苦，平	肝	祛风湿，通经络	风湿痹痛	10—15克	
	海风藤	辛、苦，微温	肝	祛风湿、通经络	风湿痹痛	10—15克	

类别	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
祛风湿药	千年健	苦、辛、温	肝、肾	祛风湿、健筋骨	风湿痹痛	10—15克	
芳香化湿药	草果	辛，温	脾、胃	温中，燥湿，截疟	①寒湿中阻②疟疾	3—6克	

类别	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
利水渗湿药	金钱草	甘、淡，平	肝、胆、肾、膀胱	利水通淋 除湿退黄 解毒消肿	①热淋、砂淋、石淋 ②湿热黄疸 ③疮痈肿毒	30-60克	
	葫芦	甘、平	肺、小肠	利水消肿	水肿、腹水	15-30克	
理气药	娑罗子	甘，温	肝、胃	疏肝理气 宽中和胃	肝胃气滞 胸胁胀痛	3-10克	又名苏罗子
	绿萼梅	酸、涩，平	肝、胃	疏肝解郁 理气和胃	胸胁胀痛 ②梅核气	3-6克	
	九香虫	咸，温	脾、肝、肾	行气止痛， 温肾助阳	①胸胁脘腹胀痛 ②肾阳不足	3-6克	

类别	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
驱虫药	苦楝皮	苦，寒	脾、胃、肝	杀虫 疗癣	①蛔虫病、钩虫病、蛲虫病②头癣、疥疮	6-15克	外用 适量
	南瓜子	甘，平	胃、大肠	杀虫	绦虫病	60-120克	连壳研末 冷开水冲服
	鹤草芽	苦、涩，凉	肝、小肠、大肠	杀虫	绦虫病	30-50克	研末、温开水冲服

类别	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
止血药	紫珠	苦、涩，凉	肝、胃、肺	收敛止血 解毒疗疮	①各种出血证 ②烧伤、疮疡	10-15克	
	羊蹄	苦、涩，寒	心、肝、大肠	凉血止血 杀虫疗癣	①各种出血证 ②疥、癣	10-15克	外用适量

类别	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
活血祛瘀药	虎杖	苦、寒	肝、胆、肺	活血止痛 利湿解毒 化痰止咳	①痛经、经闭②黄疸、热淋③肺热咳嗽④毒蛇咬伤	10—30克	

类别	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
	蛭虫	咸、寒	肝	破血逐瘀续筋接骨	①经闭瘀痕②骨折损伤	3—10克	有小毒孕妇忌服又名地鳖虫
	水蛭	咸、苦，平	肝	破血逐瘀	经闭瘀痕	3—6克	有小毒孕妇忌服
	虻虫	苦，微寒	肝	破血逐瘀	经闭瘀痕	1—1.5克	有小毒孕妇忌服

类别	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
化痰止咳平喘药	黄药子	苦，寒	肺、肝	散结消癭 清热 解毒 凉血 止血	①癭瘤 ②疮疡 肿毒③ 吐血衄 血	10 — 15 克	
	洋金花	辛，温	心、肺、脾	止咳 平喘 止痛 镇痉	①咳喘 ②脘腹 冷痛③ 癫痫	0.3 — 0.6 克	有毒又名曼陀罗风茄花

类别	药名	性味	归经	功效	主治	用量	备注
平肝息风药	玳瑁	甘、咸、寒	心、肝	平肝 定惊 清热 解毒	①高热 痉厥② 疔疮肿 毒	3— 6克	作 丸 散 服
	豆衣	甘、平	肝	养血 平肝 滋阴 清热	①眩晕 头痛② 阴虚潮 热	6— 10 克	
	罗布麻	淡、涩，微寒	肝	平肝、 清热， 降压、 利尿	①高血 压病② 小便不 利	3— 10 克	
补益药	饴糖	甘、温	脾、胃、肺	补脾 益气 缓急 止痛 润肺 止咳	①劳倦 伤脾、 气短食 少②虚 寒腹痛 ③肺虚 咳嗽	30— 60 克	溶 化 服 或 熬 膏 或 为 丸 服

本书引用方剂索引

- 本书引用方剂索引

- 一画
- 二画
- 三画
- 四画
- 五画
- 六画
- 七画
- 八画
- 九画
- 十画
- 十一画
- 十二画
- 十三画
- 十四画
- 十五画
- 十六画
- 十七画以上

凡由单味药组成的方剂，在正文中已经写明，不再列入索引。

一画

一服散（《世医得效方》）

组成：乌梅 罌粟壳 半夏 杏仁 甘草 生姜 苏叶 阿胶

功效：敛肺止咳。

主治：肺虚久咳。

二画

二仙散（《卫生宝鉴》）

组成：白矾 黄丹

功效：消肿散结。

主治：疗肿恶疮。

二仙汤（上海《赤脚医生手册》）

组成：仙茅 仙灵脾 巴戟天 黄柏 知母 当归

功效：补肾调经。

主治：妇女月经不调见阴阳两虚者。亦治现代医学之妇女更年期高血压。

二冬膏（《张氏医通》）

组成：天冬 麦冬 蜂蜜

功效：润肺止咳。

主治：肺燥阴伤，虚劳咳嗽，干咳痰稠等证。

二母散（《医方考》）

组成：知母 贝母

功效：润肺化痰。

主治：肺热咳嗽或阴虚燥咳痰稠者。

二至丸（《证治准绳》）

组成：女贞子 旱莲草

功效：补肝肾，益阴血。

主治：肝肾阴虚，头晕目眩，失眠多梦，腰膝疫软，及阴虚出血，鬚髮早白等。

二妙散（《丹溪心法》）

组成：苍术 黄柏

功效：清热燥湿。

主治：湿热下注所致的下肢萎无力，或足膝红肿热痛，或湿热带下，或下部湿疮。

二陈汤（《和剂局方》）

组成：陈皮 白茯苓 甘草 生姜 乌梅

功效：燥湿化痰，和中理气。

主治：湿痰咳嗽。证见咳嗽痰多色白，胸膈胀满，恶心呕吐，头眩心悸，舌苔白润，脉滑等。

二姜丸（《和剂局方》）

组成：高良姜 干姜（炮黑）

功效：温中止痛。

主治：脘腹冷痛。

二甲复脉汤（《温病条辨》）

组成：生鳖甲 生牡蛎 干地黄 阿胶 麦冬 生白芍 麻仁 炙甘草

功效：滋阴息风。

主治：热病后期，阴伤，阴伤，虚风内动，脉沉数，舌干齿黑，手指蠕动，甚则痉厥。

十灰散（《十药神书》）

组成：大蓟 小蓟 茅根 侧柏叶 荷叶 山梔 茜草根 大黄 棕榈皮 牡丹皮

功效：凉血止血。

主治：各种出血证。

十枣汤（《伤寒论》）

组成：大戟 芫花 甘遂 大枣

功效：攻逐水饮。

主治：悬饮，胁下有水气及水肿腹胀，属于实证者。

十全大补汤（《和剂局方》）

组成：熟地 当归 川芎 白芍 人参 白术 茯苓 甘草 黄芪 肉桂 生姜 大枣。

功效：益气补血。

主治：诸虚不足。证见面色萎黄，脚膝无力，不进饮食，或喘咳，遗精，失血，以及妇女崩漏，经候不调，痈疽溃久不敛等。

丁香散（《沈氏尊生书》）

组成：丁香 砂仁 白术

功效：温中下气，健脾止泻。

主治：脾胃虚寒，吐泻食少者。

丁香柿蒂汤（《证因脉治》）

组成：丁香 柿蒂 党参 生姜

功效：温中散寒，下气降逆。

主治：胃气虚寒，呃逆不止，胸脘痞满，舌淡苔白，脉沉迟者。

七厘散（《良方集腋》）

组成：血竭 麝香 冰片 乳香 没药 红花 朱砂 儿茶

功效：活血散瘀，定痛止血。

主治：跌打损失，骨断筋折，瘀血作痛，或出血不止等证。

七味白术散（《小儿药证直诀》）

组成：党参 白术 茯苓 葛根 藿香 木香 炙甘草

功效：健脾止泻。

主治：脾虚身热腹泻。

七宝美髯丹（《邵应节方》）

组成：何首乌 牛膝 枸杞子 菟丝子 补骨脂 当归 茯苓

功效：补肝肾，乌鬚髮。

主治：肾虚遗精，腰痛膝软，鬚髮早白等证。

八正散（《和剂局方》）

组成：车前子 木通 瞿麦 篇蓄 栀子 大黄 滑石 甘草

功效：清热泻火，利水通淋。

主治：湿热下注，小腹急满，小便浑赤，溺时涩痛，淋漓不畅，甚或癃闭不通，咽干口燥，舌红苔黄，脉数实。

八宝丹（鲍相璈《验方新编》）

组成：龙骨 炉甘石 血竭 乳香 没药 赤石脂 冰片 轻粉

功效：生肌敛疮。

主治：溃疡不敛。

八珍汤（《正体类要》）

组成：人参 白术 白茯苓 甘草 熟地 当归 川芎 白芍 生姜 大枣

功效：补气益血。

主治：气血两虚。证见面色苍白或萎黄，头晕目眩，四肢倦怠，气短懒言，心悸怔忡，食欲不振，舌质淡，苔薄白，脉细弱或虚大无力。

八厘散（《医宗金鉴》）

组成：苏木 没药 乳香 自然铜 血竭 红花 番木鳖 丁香 麝香

功效：活血止痛，续骨疗伤。

主治：跌打损伤，瘀滞疼痛。

人参胡桃汤（《济生方》）

组成：人参 胡桃 生姜

功效：补肺肾，止喘咳。

主治：肺肾不足的喘急胸满，不能睡卧。

人参养荣汤（《和济局方》）

组成：人参 白术 茯苓 炙甘草 熟地 当归 白芍 黄芪 桂心 五味子 远志 陈皮

功效：益气补血。

主治：积劳虚损，气血衰少之证。

人参蛤蚧散（《卫生宝鉴》）

组成：人参 蛤蚧 杏仁 甘草 知母 桑白皮 茯苓 贝母

功效：补肺益肾、纳气平喘。

主治：久病体虚，兼有肺热之气喘咳嗽，痰中带血，或面目浮肿等。

九味羌活丸（《此事难知》）

组成：羌活 防风 苍术 细辛 川芎 白芷 生地 黄芩 甘草

功效：发汗祛湿，兼清里热。

主治：外感风寒湿邪。证见恶寒发热，无汗头痛，肢体痠疼，口苦微渴，舌苔白，脉浮。

三画

三才汤（《温病条辨》）

组成：天冬 生地 人参

功效：补气养阴。

主治：热病气阴两伤，舌干口渴，或津亏消渴。

三子丸（《千金方》）

组成：五味子 菟丝子 蛇床子

功效：温肾助阳。

主治：肾虚阳萎及女子不育等。

三仁汤（《温病条辨》）

组成：白蔻仁 生苡仁 杏仁 滑石 白通草 竹叶 厚朴 半夏

功效：宣畅气机，清利湿热。

主治：湿温病初起，邪在气分，未曾化燥，及暑温挟湿，头痛身重，面色淡黄，胸闷不饥，午后身热，舌白不渴，脉濡等。

三拗汤（《和剂局方》）

组成：麻黄 杏仁 甘草 生姜

功效：宣肺止咳。

主治：风寒外束，肺气壅遏，鼻塞声重，胸满气喘，咳嗽多痰。

三妙丸（《医学正传》）

组成：黄柏 苍术 牛膝

功效：清热燥湿。

主治：湿热下注，足膝肿痛，或两脚麻痺，或如火燎。

三棱丸（《六科准绳》）

组成：三棱 莪术 川穹 牛膝 延胡索 蒲黄 菴藺 牡丹皮 芫花 白芷
当归 干地龙 干姜 大黄

功效：祛瘀消癥。

主治：妇人经脉不通，气痛，带下，血瘀。

三棱煎（《选寄方》）

组成：三棱 莪术 青皮 半夏 麦芽

功效：祛瘀散癥，消食化痰。

主治：食积痰滞，癥瘕积聚。

三子养亲汤（《韩氏医通》）

组成：苏子 莱菔子 白芥子

功效：降气豁痰，消胀定喘。

主治：咳嗽痰多，喘满胸痞，不思饮食，苔腻微黄，脉滑大者。

三甲复脉汤（《温病条辨》）

组成：生龟板 生鳖甲 生牡蛎 阿胶 干地黄 麦冬 生白芍 炙甘草 麻仁

功效：滋阴息风。

主治：温热病后期，阴血亏损，肝风内动，手足心热，手指蠕动，瘛厥；或内伤杂病，阴虚阳亢，头晕固眩，耳鸣心悸等证。

三物备急丸（《金匱要略》）

组成：巴豆 干姜 大黄

功效：攻逐寒积。

主治：寒邪食积，阻结肠道，卒然心腹胀痛，痛如锥刺，矢气不通，甚至气急暴厥者。

下瘀血汤（《金匱要略》）

组成：大黄 桃仁 蟅虫（蜜丸）

功效：破血下瘀。

主治：产妇腹痛，有瘀血著脐下；或血瘀而致经水不利者。

大安丸（《丹溪心法》）

组成：山楂 神曲 莱菔子 半夏 陈皮 白术 茯苓 连翘

功效：补脾消食。

主治：食积而又有脾虚者。

大补阴丸（《丹溪心法》）

组成：熟地 龟板 知母 黄柏 猪脊髓 蜂蜜

功效：滋阴降火。

主治：肝肾阴虚，虚火上炎，证见骨蒸潮热，盗汗，咳嗽咯血，或烦热易饥，足膝疼热等。

大建中汤（《金匱要略》）

组成：蜀椒 人参 干姜 饴糖

功效：温中补虚，祛寒止痛。

主治：中阴衰弱，阴寒内盛，证见脘腹剧痛，呕不能食等。

大承气汤（《伤寒论》）

组成：大黄 芒硝 枳实 厚朴

功效：峻下热结。

主治：1. 阳明腑实证，潮热谵语，自汗出，不恶寒，大便不通，痞满燥实四者并见，苔黄或燥黑，脉象沉实者。2. 热结旁流，下利清水臭秽，脐腹疼痛，按之坚硬有块，口舌干燥，脉数而滑，或滑实有力。3. 热厥，痉病或发狂之属于里热实者。

大陷胸汤（《伤寒论》）

组成：大黄 芒硝 甘遂

功效：泻热逐水。

主治：水饮与热邪结聚所致的结胸证。

大黄牡丹汤（《金匮要略》）

组成：大黄 芒硝 牡丹皮 桃仁 冬瓜仁

功效：泻热破瘀 散结消肿。

主治：肠痈初起，证见少腹右侧疼痛拒按，或右足屈而不伸，恶寒发热等。

大黄附子汤（《金匮要略》）

组成：大黄 附子 细辛

功效：温经散寒，通便止痛。

主治：寒实积滞，腹痛便秘，畏寒肢冷，舌苔浊腻，脉沉弦而紧。

千金散（《寿世保元》）

组成：全蝎 天麻 胆星 直僵蚕 朱砂 冰片 牛黄 黄连 甘草

功效：息风止痉。

主治：小儿痰喘，急慢惊风发痉者。

千捶膏（《中国医学大辞典》）

组成：蓖麻肉 松香 杏仁霜 银朱 广丹 轻粉 茶油

功效：拔毒疗疮。

主治：一切痈疽发背、对口疮、疗疮、小儿热疔等。

川芎散（《卫生宝鉴》）

组成：川芎 菊花 石膏 白僵蚕

功效：祛风清热止痛。

主治：偏头风，或风热头痛。

川芎茶调散（《和剂局方》）

组成：川芎 白芷 防风 细辛 羌活 荆芥 薄荷 甘草 茶

功效：祛风止痛。

主治：外感风邪，头目昏重，偏正头痛，或肢体疼痛等。

小黄丸（《中国医学大辞典》引张洁古方）

组成：半夏 南星 黄芩

功效：清肺化痰。

主治：热痰咳嗽

小半夏汤（《金匱要略》）

组成：半夏 生姜

功效：温胃降逆止呕。

主治：胃寒或寒饮所致的呕吐

小青龙汤（《伤寒论》）

组成：麻黄 桂枝 细辛 干姜 五味子 半夏 芍药 甘草

功效：解表化痰，平喘止咳。

主治：外感风寒，内停水饮。证见恶寒发热，喘咳痰多而清稀等。

小承气汤（《伤寒论》）

组成：大黄 厚朴 枳实

功效：泻热通便。

主治：阳明腑证，热结便秘，腹痛胀满；或痢疾初起，腹痛胀满，里急后重者。

小建中汤（《伤寒论》）

组成：桂枝 芍药 生姜 大枣 甘草 饴糖

功效：温中补虚，缓急止痛。

主治：虚劳里急，腹中时痛，喜得温按，按之则痛减；或虚劳心中悸动，虚烦不宁，面色无华；或虚劳阳虚发热。

小活络丹（《和剂局方》）

组成：制川乌 制草乌 制天南星 地龙 乳香 没药

功效：温经活络，搜风祛痰。

主治：痹症，关节疼痛，屈伸不利。

小柴胡汤（《伤寒论》）

组成：柴胡 黄芩 半夏 人参 生姜 大枣 甘草

功效：和解少阳。

主治：1. 少阳证，寒热往来，胸胁苦满，不欲饮食，心烦喜呕，口苦，咽干，目眩，舌苔薄白或微黄腻，脉弦者；2. 妇女伤寒，热入血室；以及疟疾、黄疸等见少阳证者。

小陷胸汤（《伤寒论》）

组成：黄连 瓜蒌实 半夏

功效：清热化痰，开胸散结。

主治：痰热互结心下，胸脘痞满，按之则痛，口苦，舌苔黄，脉浮滑等证。

小蓟饮子（《济生方》）

组成：小蓟 蒲黄 藕节 生地 木通 滑石 淡竹叶 当归 山栀子 甘草

功效：凉血止血、利尿通淋。

主治：下焦热结所致的血淋、尿血等证。

己椒蒌黄丸（《金匮要略》）

组成：防己 椒目 大黄 葶苈子

功效：攻逐水饮、利水通便。

主治：肠间有水气，证见腹满，口舌干燥者；或水饮停聚所致的喘咳、肿满等证。

万应保赤丹（《经验方》）

组成：巴豆霜 胆星 神曲朱砂

功效：攻积导滞，化痰定惊。

主治：小儿痰食壅滞，疳疾，胃呆腹痛，大便酸臭等证。

四画

天麻丸（《普济方》）

组成：天麻 川芎

功效：平肝息风，祛风止痛。

主治：头晕欲倒，神昏多睡，偏正头痛，肩臂拘挛，肢节烦痛，皮肤瘙痒等证。

天王补心丹（《摄生秘剖》）

组成：生地 玄参 柏子仁 远志 桔梗 酸枣仁 五味子 当归身 天冬 麦冬 人参 丹参 白茯苓

功效：滋阴清热，养心安神。

主治：阴亏血少，证见虚烦心悸，睡眠不安，精神衰疲，梦遗健忘，不耐思虑等。

天台乌药散（《医学发明》）

组成：天台 乌药 茴香 木香 青皮 高良姜 槟榔 巴豆 川楝子

功效：散寒、行气、止痛。

主治：寒凝气滞的小肠疝气，少腹痛引睾丸。

天麻钩藤饮（《杂病证治新义》）

组成：天麻 钩藤 石决明 黄芩 山栀 川牛膝 杜仲 桑寄生 益母草 夜交藤 茯神

功效：平肝息风。

主治：肝阳上亢，肝风内动所致的头痛眩晕，耳鸣眼花，震颤失眠，甚或半身不遂等证。

木香槟榔丸（《儒门事亲》）

组成：木香 槟榔 青皮 陈皮 大黄 莪术 黄连 黄柏 香附子 黑牵牛

功效：行气导滞，泄热通便。

主治：积滞内停，脘腹胀满，大便秘结，或痢疾里急后重，舌苔厚腻而黄，脉实有力。

五仁丸（《世医得效方》）

组成：桃仁 杏仁 郁李仁 松子仁 柏子仁 陈皮

功效：润肠通便。

主治：肠燥便秘。

五皮饮（《麻科活人全书》）

组成：茯苓皮 大腹皮 生姜皮 五加皮 陈橘皮

功效：行水消肿。

主治：水肿。

五皮散（一名五皮饮。《华氏中藏经》）

组成：茯苓皮 桑白皮 大腹皮 陈橘皮 生姜皮

功效：健脾理气，行水消肿。

主治：水肿。

五汁饮（《温病条辨》）

组成：荸荠汁 鲜芦根汁 鲜藕汁 梨汁 麦冬汁

功效：生津止渴。

主治：温病口渴。

五苓散（《伤寒论》）

组成：茯苓 泽泻 猪苓 白术 桂枝

功效：化气利水。

主治：1. 外有表证，内有蓄水，头痛发热，渴欲饮水，或水入即吐，小便不利。2. 呕吐泄泻，烦渴引饮，小便不利。3. 小肿身重，小便不利。4. 痰饮，脐下动悸，吐涎沫而眩晕者。

五加皮散（《保婴撮要》）

组成：五加皮 川牛膝 木瓜

功效：补肝肾，强筋骨。

主治：小儿行迟。

五味子丸（《卫生家宝方》）

组成：五味子 罌粟壳 白饴

功效：敛肺止咳。

主治：肺虚久咳。

五子衍宗丸（《摄生众妙方》）

组成：枸杞子 覆盆子 五味子 车前子 菟丝子

功效：补肾益精。

主治：肾虚阳萎，遗精滑精及不育等证。

五味细辛汤（《鸡峰普济方》）

组成：五味子 细辛 干姜 白茯苓 甘草

功效：温肺化饮。

主治：肺经受寒，咳嗽不已。

五味消毒饮（《医宗金鉴》）

组成：蒲公英 野菊花 紫花地丁 紫背天葵子 金银花

功效：清热解毒。

主治：各种疔毒，痈疮，疖肿。

五虎追风散（《晋南、史恩家传方》）

组成：蝉蜕 天南星 天麻 僵蚕 朱砂 全蝎

功效：祛风痰，止抽搐。

主治：破伤风，牙关紧闭，角弓反张，脉弦等证。

不忘散（《证治准绳》）

组成：远志 人参 茯苓 茯神 菖蒲

功效：安神益智。

主治：心神不安，失眠健忘。

不换金正气散（《和剂局方》）

组成：藿香 苍术 厚朴 陈皮 半夏 甘草

功效：芳香化湿。

主治：湿阻中焦，兼有外感。证见脘腹胀满，食欲不振，恶心呕吐，泄泻，恶寒发热。

瓦楞子丸（《万氏家抄方》）

组成：瓦楞子 醋

功效：化瘀消癥。

主治：一切气血癥瘕。

止痉散（经验方，广州中医学院主编《方剂学》）

组成：全蝎 蜈蚣

功效：息风止痉

主治：急慢惊风，中风面瘫，破伤风等惊挛抽搐之证。

止嗽散（《医学心语》）

组成：百部 白前 紫菀 桔梗 陈皮 荆芥 甘草

功效：化痰止嗽，宣肺疏表。

主治：外感咳嗽，咯痰不畅，或有轻度恶寒头痛，舌苔白，脉浮缓。

内消散（《医宗金鉴》）

组成：银花 贝母 皂角刺 穿山甲 知母 天花粉 乳香 半夏 白芨

功效：清热解毒，消肿散结。

主治：痈疽发背，对口疔疮，乳痈，无名肿毒，一切恶疮。

牛郎丸（《普济方》）

组成：牵牛子 槟榔

功效：驱虫消积。

主治：蛔虫、绦虫等肠道寄生虫病。

牛黄散（《证治准绳》）

组成：牛黄 朱砂 蝎尾 钩藤 天竺黄 麝香

功效：清热化痰，息风止痉

主治：热甚惊厥抽搐。

牛蒡汤（《证治准绳》）

组成：薄荷 荆芥 牛蒡子 防风 大黄 甘草

功效：疏散风热，泻热止咳。

主治：风热壅滞，咽喉肿痛，及咳嗽咯痰不利等证。

牛膝汤（《千金方》）

组成：牛膝 当归 瞿麦 通草 滑石 冬葵子

功效：利水通淋。

主治：淋病尿血。

牛蒡子汤（《证治准绳》）

组成：牛蒡子 升麻 桔梗 玄参 犀角 黄芩 木通 甘草

功效：清热解毒。

主治：风热上壅，咽喉肿痛。

牛黄清心丸（《痘疹世医心法》）

组成：牛黄 黄连 黄芩 栀子 郁金 朱砂

功效：清热解毒，化痰开窍。

主治：邪热初陷心包，神昏谵语，高热烦躁，舌红脉数，以及小儿惊风，痰涎壅盛，烦躁不安，中风，痰火闭结，神昏语蹇等证。

牛黄解毒丸（《常用中成药》）

组成：牛黄 黄芩 生大黄 生石膏 胸黄 冰片 桔梗 甘草

功效：清热解毒，化痰利咽。

主治：热毒郁结所致的咽喉肿痛溃烂，牙龈肿痛，口舌生疮，痈疽疗毒等证。

手拈散（《医学心悟》）

组成：没药 延胡索 五灵脂 香附

功效：活血化瘀止痛。

主治：血瘀气滞之胃痛。

升麻葛根汤（《小儿药证直诀·阎氏小儿方论》）

组成：升麻 葛根 芍药 甘草

功效：解肌透疹。

主治：麻疹初发，或发而未透，发热恶风，喷嚏咳嗽，目赤流泪，舌红苔白，脉浮数。

化虫丸（《医方集解》）

组成：使君子 槟榔 鹤虱 苦楝根皮 芜荑 铅粉 枯矾

功效：驱虫止痛。

主治：诸虫积，证见腹痛时作，痛剧时呕吐清水，或吐蛔。

化血丹（《医学衷中参西录》）

组成：三七 花蕊石 血余炭

功效：止血化瘀。

主治：咳血、衄血及二便下血而有瘀滞者。

化斑汤（《温病条辨》）

组成：犀角 玄参 石膏 粳米 甘草 知母

功效：清热解毒，凉血化斑。

主治：温热病，热毒炽盛，气血两燔。证见神昏谵语，身热发斑。

乌贝散（《中药文献研究摘要》）

组成：乌贼骨 贝母

功效：制酸止痛。

主治：胃痛吐酸。

乌茛散（《中医方剂手册新编》）

组成：乌贼骨 白茛

功效：制酸止血。

主治：胃溃疡出血。

乌药汤（《济阴纲目》）

组成：乌药 香附 当归 木香 甘草

功效：行气止痛。

主治：妇女经行腹痛。

乌梅丸（《伤寒论》）

组成：乌梅 细辛 当归 附子 桂枝 蜀椒 干姜 黄连 黄柏 人参

功效：温脏安蛔。

主治：蛔厥，证见腹痛时作，手足厥逆，烦闷呕吐，吐蛔。又治久痢。

丹参饮（《医宗金鉴》）

组成：丹参 白檀香 砂仁

功效：活血行气止痛。

主治：血瘀气滞所致的心腹胃脘疼痛。

六一散（《伤寒标本》）

组成：滑石 甘草

功效：清暑利湿。

主治：感受暑湿，发热汗出，心烦口渴，小便不利，或呕吐泄泻，或下痢赤白，或小便黄赤涩痛等证。

六味汤（《咽喉秘集》）

组成：桔梗 僵蚕 荆芥穗 薄荷 防风 生甘草

功效：疏散风热，利咽止痛。

主治：风热壅盛所致的咽喉肿痛。

六味地黄汤（《小儿药证直诀》）

组成：熟地黄 山茱萸 牡丹皮 干山药 白茯苓 泽泻

功效：滋阴补肾。

主治：肾阴不足，证见腰膝痠软，头晕目眩，耳鸣耳聋，潮热盗汗，遗精，消渴等。

六神丸（《雷允上诵芬堂》）

组成：略。

功效：清热解毒，消肿止痛。

主治：喉痛，乳蛾，烂喉丹痧，咽喉红肿疼痛，以及口疮，痈肿，疗毒，一切无名肿毒等证。

火府丹（《本事方》）

组成：黄芩 生地 木通

功效：清热利水。

主治：心经蕴热，小便赤少，五淋涩痛。

巴戟丸（《和剂局方》）

组成：高良姜 肉桂 吴茱萸 紫金藤 青盐 巴戟天

功效：补肾止痛。

主治：肾阳不足，腰膝沉重，百节痠痛，四肢无力，及妇女子宫久冷，月经不调，或多或少，赤白带下。

开噤散（《医学心悟》）

组成：菖蒲 黄连 人参 石莲子 丹参 茯苓 陈仓米 荷叶蒂 陈皮 冬瓜仁

功效：补脾利湿。

主治：痢疾噤口不食。

水陆二仙丹（《仁存堂经验方》）

组成：芡实 金樱子

功效：补肾固精。

主治：遗精，白浊，尿频，白带过多。

孔圣枕中丹（《千金方》）

组成：败龟板 龙骨 菖蒲 远志

功效：滋阴平肝，镇心安神。

主治：健忘，神志不宁，夜寐多梦等。

五画

玉女煎（《景岳全书》）

组成：石膏 知母 熟地 麦冬 牛膝

功效：清胃滋阴

主治：胃热阴虚，证见头痛牙痛，齿松牙衄，口舌生疮，烦热口渴等。

玉屏风散（《世医得效方》）

组成：黄芪 白术 防风

功效：补气、固表、止汗。

主治：表虚自汗，以及体虚易于感冒者。

玉泉丸（《沈氏尊生书》）

组成：麦冬 花粉 人参 葛根 茯苓 乌梅 生黄芪 炙黄芪 甘草

功效：补气生津止渴。

主治：消渴证及热病伤津，口渴多饮。

玉泉散（《百代医宗》）

组成：葛根 花粉 五味子 生地 麦冬 甘草 糯米

功效：滋阴生津。

主治：消渴证烦渴多饮。

玉枢丹（又名紫金锭。《片玉心书》）

组成：山慈菇 五倍子 麝香 雄黄 朱砂 续随子霜 红芽大戟

功效：辟秽化浊，清热解毒，活血消肿。

主治：感受外邪，食物中毒等引起的恶心呕吐，腹痛泄泻。外敷痈疽、疔疮、肿核结毒、虫蛇咬伤等证。

玉壶丸（《和剂局方》）

组成：生半夏 生南星 天麻（生姜汤下）

功效：祛风痰，降逆止呕。

主治：风痰吐逆，头痛目眩及咳嗽痰盛，呕吐涎沫。

玉真散（《外科正宗》）

组成：防风 白芷 羌活 天麻 南星 白附子

功效：祛风止痉。

主治：破伤风。

玉液汤（《医学衷中参西录》）

组成：生黄芪 葛根 知母 天花粉 生山药 生鸡内金 五味子

功效：益气养阴。

主治：消渴。

艾附暖宫丸（《沈氏尊生书》）

组成：艾叶 香附 当归 川芎 白芍 生地 黄芪 川断 吴茱 肉桂

功效：益气补血，温经散寒，行气止痛。

主治：月经不调，经来腹痛，宫寒不孕，腰痠带下等证。

甘麦大枣汤（《金匱要略》）

组成：甘草 小麦 大枣

功效：养心安神，益胃和中。

主治：妇人脏躁，喜悲伤欲哭，象如神灵所作。

甘草附子汤（《金匮要略》）

组成：甘草 附子 桂枝 白术

功效：祛风湿，散寒止通。

主治：风湿相搏，骨节疼烦掣痛，不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者。

甘遂通结汤（《中西医结合治疗急腹症》）

组成：甘遂末（冲服） 大黄 厚朴 木香 桃仁 赤芍 生牛膝

功效：泻下通便、活血止痛。

主治：重型肠梗阻，肠腔积液较多者。

甘露消毒丹（《温病条辨》）

组成：滑石 黄芩 茵陈 石菖蒲 川贝母 木通 藿香 射干 连翘 薄荷 白豆蔻

功效：利湿化浊、清热解毒。

主治：湿温时疫，邪在气分，湿热并重之证。

左金丸（《丹溪心法》）

组成：黄连 吴茱萸

功效：清泻肝火，和胃降逆。

主治：肝经火旺，证见胁肋胀痛，呕吐吞酸等。

石斛夜光丸（《原机启微》）

组成：石斛 菊花 菟丝子 青葙子 枸杞子 生地黄 熟地黄 草决明 天门冬 人参 茯苓 五味子 麦冬 杏仁 干山药 牛膝 蒺藜 苡蓉 川芎 炙

甘草 枳壳 防风 黄连 乌犀角 羚羊角

功效：清肝，养阴，明目。

主治：神水宽大渐散，昏如雾露中行，渐睹空中有黑花，睹物成二体，久则光散不收，及内障神水淡绿色、淡白色者。

龙胆泻肝汤（《医方集解》）

组成：龙胆草 柴胡 黄芩 梔子 木通 泽泻 车前子 生地 当归尾 甘草

功效：泻肝胆实火，清利肝胆实热。

主治：1. 肝经实火，胁痛口苦，头晕目赤，耳聋耳肿。2. 肝经实热下注，阴肿，阴痒，淋浊带下等证。

平胃散（《和剂局方》）

组成：苍术 厚朴 陈皮 甘草 生姜 大枣

功效：燥湿健脾。

主治：湿浊中阻所致的脘腹胀满，不思饮食，体重倦怠，呕恶吞酸，大便溏薄，舌苔厚腻等。

甲乙归藏汤（《医醇膳义》）

组成：珍珠母 白芍 生地 龙齿 夜交藤 柴胡 薄荷 丹参 当归身 柏子仁 夜合花 沉香 红枣

功效：补血，养心，安神。

主治：肝阴不足、肝阳上亢所致的头晕目眩，耳鸣，烦躁失眠等证。

四生丸（《妇人良方》）

组成：生地黄 生柏叶 生荷叶 生艾叶

功效：凉血止血。

主治：血热妄行所致的吐血、衄血、咯血等。

四妙丸（《成方便读》）

组成：苍术 黄柏 苡仁 牛漆

功效：清热利湿。

主治：湿热下注，脚膝红肿，痿软无力等证。

四苓散（《明医指掌》）

组成：茯苓 泽泻 白术 猪苓

功效：健脾利水消肿。

主治：内伤饮食，有湿而见小便赤少，大便溏泄。亦可用于水肿小便不利。

四物汤（《和剂局方》）

组成：当归 川芎 熟地 白芍

功效：补血调经。

主治：营血虚滞，证见惊惕头晕，目眩耳鸣，唇爪无华，妇人月经量少，或经闭，痛经等。

四逆汤（《伤寒论》）

组成：附子 干姜 炙甘草

功效：回阳救逆，温中逐寒。

主治：少阴病，四肢厥逆，恶寒踡卧，吐利腹痛，下利清谷，神疲欲寐，脉沉微细。亦可用于亡阳证，冷汗自出，四肢厥逆，脉微欲绝。

四神丸（《内科摘要》）

组成：补骨脂 肉豆蔻 五味子 吴茱萸 生姜 大枣

功效：温肾暖脾，固肠止泻。

主治：脾肾虚寒之久泻，五更泄泻等。

四君子汤（《和剂局方》）

组成：人参 白术 茯苓 炙甘草

功效：补气、健脾、养胃。

主治：脾胃气虚，证见面色萎白，倦怠乏力，食少便溏等。

四妙勇安汤（《验方新编》）

组成：金银花 玄参 当归 甘草

功能：清热解毒，活血止痛。

主治：脱疽。

生化汤（《傅青主女科》）

组成：当归 川芎 桃仁 黑姜 炙甘草

功效：活血化瘀、温经止痛。

主治：产后恶露不行，少腹疼痛。

生脉散（《内外伤辨惑论》）

组成：人参 麦冬 五味子

功效：益气敛汗，养阴生津。

主治：热伤气阴，口渴多汗，体倦气短，脉弱者。亦治久咳伤肺，气阴两伤，干咳短气，自汗之证。

生姜泻心汤（《伤寒论》）

组成：半夏 黄芩 黄连 党参 炙甘草 生姜 大枣

功效：和胃降逆，宽胸散结。

主治：水热互结，胃中不和，心中痞硬，干噎食臭，腹中雷鸣，下痢等证。

生肌玉红膏（《外科正宗》）

组成：白芷 当归 血竭 白蜡 轻粉 甘草 紫草 麻油

功效：生肌敛口，活血解毒。

主治：痈疽发背，疮疡溃烂，及水火烫伤，久不收口。

失笑散（《和剂局方》）

组成：玉灵脂 蒲黄 醋

功效：活血祛瘀止痛。

主治：瘀血停滞所致的月经不调，少腹急痛，痛经，产后恶露不行，心腹疼痛。亦治瘀滞胸痛，脘腹疼痛。

仙灵脾散（《圣惠方》）

组成：仙灵脾 威灵仙 苍耳子 桂心 川芎

功效：祛风湿，活血止痛。

主治：行痹走注疼痛，或肢体麻木。

仙方活命饮（《校注妇人良方》）。

组成：金银花 甘草节 赤芍 穿山甲 皂角刺 白芷 贝母 防风 当归尾 天花粉 乳香 没药 陈皮

功效：清热解毒，消肿溃坚，活血止痛。

主治：疮痈肿毒初起，红肿焮痛。

白虎汤（《伤寒论》）

组成：石膏 知母 粳米 甘草

功效：清热泻火，生津止渴。

主治：伤寒阳明经热盛，或温病邪在气分，壮热，烦渴，脉洪大等实热亢盛之证。

白金丸（《本事方》）

组成：白矾 川郁金

功效：祛痰醒神。

主治：惊痫癫狂。

白通汤（《伤寒论》）

组成：附子 干姜 葱

功效：消阴通阳。

主治：少阴病，下利，脉微者。

白薇汤（《本事方》）

组成：白薇 人参 当归 甘草

功效：补气益血。

主治：产后血虚发热，昏厥。

白花蛇酒（《濒湖集简方》）

组成：白花蛇 全蝎 羌活 天麻 防风 独活 白芷 升麻 当归 五加皮 赤芍 甘草

功效：祛风通络止痛。

主治：诸风无新久，手足缓弱，口眼喎斜，语言蹇涩，或筋脉挛急，肌肉顽痹，皮肤瘙痒，骨节疼痛，或生恶疮、疥癩等疾。

白头翁汤（《伤寒论》）

组成：白头翁 黄连 黄柏 秦皮

功效：清热解毒，凉血止痢。

主治：湿热泻痢，热毒血痢，发热腹痛，下痢脓血，里急后重。

白蒺藜散（《张氏医通》）

组成：白蒺藜 菊花 蔓荆子 草决明 炙甘草 连翘 青箱子

功效：清肝明目。

主治：肝肾虚热生风，目赤多泪。

白僵蚕散（《证治准绳》）

组成：白僵蚕 荆芥 桑叶 木贼 甘草 细辛 旋复花

功效：祛风止痛。

主治：风热头痛，迎风流泪。

白芨枇杷丸（《证治准绳》）

组成：白芨 枇杷叶 藕节 阿胶 鲜生地汁

功效：滋阴润肺止血。

主治：阴虚内热，肺癆干咳，咯血等证。

白虎加人参汤（《伤寒论》）

组成：石膏 知母 粳米 甘草 人参

功效：清热泻火，益气生津。

主治：热病气津两伤，证见身热，烦渴不止，汗多，脉大无力。

瓜蒌薤白白酒汤（《金匱要略》）

组成：瓜蒌实 薤白 白酒

功效：通阳散结，止痛。

主治：胸痹喘息咳唾，胸背痛，短气，口脉脉而迟，关上小紧数者。

瓜蒌薤白半夏汤（《金匱要略》）

组成：瓜蒌 薤白 半夏 白酒

功效：通阳散结，降气化痰。

主治：胸痹不得卧，胸痛彻背者。

归脾汤（《济生方》）

组成：龙眼肉 酸枣仁 茯神 白术 炙甘草 黄芪 人参 木香 生姜 大枣 当归 远志

功效：健脾益气，补血养心。

主治：思虑过度，劳伤心脾，证见心悸怔忡，健忘失眠，及妇女月经超前，量多色淡，或淋漓不止等。

半硫丸（《和剂局方》）

组成：半夏 硫黄

功效：温肾逐寒，通阳泄浊。

主治：心腹痠癖冷气，及高年风秘、冷秘，或泄泻等。

半夏干姜散（《金匱要略》）

组成：半夏 干姜

功效：温胃止呕。

主治：胃寒停饮，干呕，吐逆，吐涎沫。

半夏厚朴汤（《金匱要略》）

组成：半夏 厚朴 苏叶 茯苓 生姜

功效：行气降逆，化痰散结。

主治：痰气郁结，咽中如有物梗阻的梅核气。亦治湿痰咳嗽或呕吐等证。

半夏秫米汤（《灵枢经》）

组成：半夏 秫米。

功效：和胃化痰。

主治：胃有痰浊，胃不和而卧不安之证。

半夏白术天麻汤（《医学心悟》）

组成：半夏 白术 天麻 橘红 甘草 生姜 大枣 茯苓

功效：健脾燥湿，化痰息风。

主治：风痰所致的头痛，眩晕等证。

半夏泻心汤（《伤寒论》）

组成：半夏 黄芩 黄连 干姜 党参 炙甘草 大枣

功效：和胃降逆，开结散痞。

主治：寒热互结，心下痞硬，但满不痛，肠鸣下利，呕恶，不思饮食等证。

加味地黄丸（《医宗金鉴》）

组成：鹿茸 五加皮 熟地 山药 山茱萸 茯苓 牡丹皮 泽泻 麝香

功效：补肾健骨。

主治：精血不足，筋骨无力，或小儿发育不良，骨软行迟，囟门不合等证。

加味逍遥散（《女科撮要》）

组成：丹皮 栀子 柴胡 白芍 当归 茯苓 白术 甘草 生姜 薄荷

功效：疏肝解郁，凉血调经

主治：肝气郁结，胁肋胀满，或头痛，月经不调，痛经等。

加减葳蕤汤（《重订通俗伤寒论》）

组成：生葳蕤 生葱白 淡豆豉 薄荷 桔梗 白薇 甘草 红枣

功效：养阴解表。

主治：阴虚之体感冒风热，证见发热咳嗽，痰稠难出，咽干口渴等。

六画

地榆丸（《证治准绳》）

组成：地榆 木香 黄连 乌梅 诃子肉 当归 阿胶

功效：清热燥湿，涩肠止泻。

主治：泻痢或血痢经久不愈。

地骨皮汤（《圣济总录》）

组成：地骨皮 知母 鳖甲 柴胡 秦艽 贝母 当归

功效：滋阴退热。

主治：虚劳，阴阳不和，早晚潮热。

芍药汤（《医学六书》）

组成：芍药 木香 槟榔 黄连 黄芩 当归 甘草 大黄 官桂

功效：清肠利气，和血治痢。

主治：湿热痢，证见腹痛，里急后重，便脓血，肛门灼热等。

芍药甘草汤（《伤寒论》）

组成：芍药 甘草

功效：缓急止痛。

主治：脘腹挛急作痛，或四肢挛拘作痛。

夺命丹（《外科全生集》）

组成：银花 黄连 蚤休 赤芍 甘草 细辛 蝉蜕 僵蚕 防风 泽兰 独活 羌活 青皮

功效：解毒消痈。

主治：痈肿疔毒。

百花膏（《济生方》）

组成：百合 款冬花 蜜

功效：润肺止咳。

主治：久咳不已，或痰中带血。

百合地黄汤（《金匱要略》）

组成：百合 生地

功效：养阴退热，宁心安神。

主治：热病后余热未清，虚烦惊悸，失眠多梦，神思恍惚等。

百合固金汤（《慎斋遗书》）

组成：百合 熟地 生地 玄参 贝母 桔梗 生甘草 麦冬 芍药 当归

功效：养阴清热，润肺化痰。

主治：肺肾亏损，虚火上炎，证见咽喉燥痛，咳嗽气喘，痰中带血等。

百合知母汤（《金匱要略》）

组成：百合 知母

功效：清心安神。

主治：热病后余热未清，虚烦惊悸，失眠多梦，神思恍惚，莫名所苦等。

托里黄芪汤（《圣济总录》）

组成：黄芪 当归 人参 桂心 茯苓 远志 麦冬 五味子

功效：补气益血，托毒生肌

主治：诸疮溃后，脓多内虚。

至宝丹（《和剂局方》）

组成：生乌犀屑 生玳瑁屑 琥珀 朱砂 雄黄 龙脑 麝香 牛黄 安息香
金箔 银箔

功效：清心开窍。

主治：中暑、中恶、中风以及温病因于痰浊内闭所致的神昏，以及小儿惊厥属于痰浊内闭者。

耳聋左慈丸（验方）

组成：熟地 山萸肉 山药 丹皮 茯苓 泽泻 磁石 柴胡

功效：滋阴潜阳。

主治：肾虚火升，耳鸣耳聋，头晕目眩等证。

当归散（《金匮要略》）

组成：白术 当归 芍药 川芎 黄芩

功效：养血安胎。

主治：妊娠小便不利之证。

当归六黄汤（《兰室秘藏》）

组成：当归 生地黄 熟地黄 黄连 黄柏 黄芩 黄芪

功效：养阴清热。

主治：阴虚有热，证见发热盗汗，五心烦热，面赤口干，舌红苔黄，脉数者。

当归龙荟丸（《医学六书》）

组成：当归 龙胆草 栀子 青黛 黄芩 黄连 黄柏 大黄 芦荟 木香 麝香（蜜丸生姜汤

下）

功效：清肝泻热

主治：肝胆实火之头晕头痛，目赤肿痛，烦躁易怒，及抽搐等。

当归红花饮（《麻科活人书》）

组成：当归 红花 牛蒡子 连翘 葛根 甘草 紫草 大青叶

功效：凉血透疹，清热解毒。

主治：麻遂夹斑，色不红活

当归补血汤（《内外伤辨惑论》）

组成：当归 黄芪

功效：补气生血。

主治：劳倦内伤、血虚气弱，证见肌热面赤，烦渴欲饮，脉洪大而虚，重按无力，以及妇女产后血虚发热、头痛，或疮疡溃后久不愈合者。

当归生姜羊肉汤（《金匱要略》）

组成：当归 生姜 羊肉

功效：温里止痛。

主治：寒疝腹中痛，及胁痛里急者。

肉苁蓉丸（《证治准绳》）

组成：肉苁蓉 熟地 菟丝子 五味子 山药

功效：补肾助阳。

主治：肾虚精亏，肾阳不足之阳萎、尿频等。

朱砂安神丸（《医学发明》）

组成：朱砂 黄连 炙甘草 当归 生地

功效：镇心安神，清热养血。

主治：心火亢盛，灼伤阴血所致的心神不安，胸中烦热，惊悸怔忡，失眠多梦等证。

竹叶石膏汤（《伤寒论》）

组成：竹叶 石膏 半夏 人参 麦冬 甘草 粳米

功效：清热生津，益气和胃。

主治：热病后余热未清，气阴两伤，烦热口渴，咽干唇燥，舌红少苔，脉虚数。

竹叶柳蒡汤（《先醒斋医学广笔记》）

组成：淡竹叶 桤柳 牛蒡子 蝉衣 荆芥穗 玄参 麦冬 薄荷叶 葛根 知母 甘草

功效：解毒透疹。

主治：痧疹透发不出，烦闷躁乱，喘咳及咽喉肿痛者。

舟车丸（《景岳全书》录刘河间方）

组成：大黄 黑牵牛 甘遂 轻粉 大戟 芫花 青皮 陈皮 木香 槟榔

功效：行气逐水。

主治：水肿水胀，形气俱实，大小便秘者。亦用于胸胁积液等证。

冰硼散（《外科正宗》）

组成：冰片 硼砂 玄明粉 朱砂

功效：清热解毒，消肿止痛。

主治：咽喉肿痛，口舌生疮。

安神定志丸（《医学心悟》）

组成：石菖蒲 远志 茯苓 龙齿 茯神 人参

功效：安神定志。

主治：惊恐不得卧，癫痫等证。

安宫牛黄丸（《温病条辨》）

组成：牛黄 麝香 犀角 黄芩 郁金 黄连 雄黄 山栀子 朱砂 梅片 珍珠 金箔

功效：清热解毒，开窍醒神。

主治：温热病，热邪内陷心包，痰热壅闭心窍所致的高热烦躁，神昏谵语，或舌蹇肢厥，以及中风窍闭，小儿惊厥属于痰热内闭者。

异功散（《小儿药证直诀》）

组成：人参 白术 茯苓 炙甘草 陈皮

功效：补气健脾，理气化湿。

主治：脾胃虚弱而兼气滞，证见饮食减少，消化不良，大便溏薄，胸脘痞闷不舒等。

导气汤（《医方简义》）

组成：川楝子 小茴香 淡吴茱萸 木香

功效：行气止痛。

主治：寒疝，以及偏坠，小肠疝痛。

导赤散（《小儿药证直诀》）

组成：木通 生地 甘草梢 竹叶

功效：清热利尿。

主治：心经有热，证见口舌生疮，心胸烦闷，渴欲饮冷，或心热移于小肠，小便短赤而涩，尿时刺痛等。

导痰汤（《济生方》）

组成：陈皮 茯苓 半夏 枳实 南星 生姜 甘草

功效：化痰消结。

主治：痰涎壅盛，胸膈留饮，证见咳嗽恶心，发热背寒，饮食少思，及中风痰盛，语涩眩晕等。

阳和汤（《外科全生集》）

组成：鹿角胶 肉桂 姜炭 熟地 麻黄 白芥子 甘草

功效：温阳补血，散寒通滞。

主治：一切阴疽、贴骨疽、流注、鹤膝风等属于阴寒之证。

阳起石丸（《济生方》）

组成：阳起石 鹿茸

功效：温肾助阳。

主治：虚寒之极，崩中不止，及宫冷、阳萎等。

防己黄芪汤（《金匮要略》）

组成：防己 黄芪 白术 生姜 甘草 大枣

功效：益气健脾，利水消肿。

主治：风水或风湿，证见汗出恶风，肢体面目浮肿，小便不利等。

如意金黄散（《外科正宗》）

组成：天花粉 黄柏 姜黄 白芷 紫厚朴 大黄 陈皮 甘草 苍术 南星

功效：清热解毒，消肿散结。

主治：外科一切顽恶肿毒，如痈疽、发背、疗肿、跌打损伤、湿痰流注、大头时肿、漆疮、火丹、风热天泡、肌肤赤肿、干湿脚气、乳痈、小儿丹毒等。

七画

寿胎丸（《医学衷中参西录》）

组成：川续断 桑寄生 菟丝子 阿胶

功效：补肾安胎

主治：补肾不足，滑胎。

远志丸（《济生方》）

组成：远志（甘草汤泡去骨） 茯神 朱砂 龙齿 人参 石菖蒲 白茯苓

功效：宁心安神

主治：因事有所大惊，梦寐不宁，登高涉险，神不守舍，心志恐惧，心肾不足，梦遗滑精。

杏苏散（《温病条辨》）

组成：杏仁 紫苏 陈皮 生姜 苦桔梗 茯苓 半夏 甘草 前胡 枳壳 大枣

功效：疏散风寒，宣肺化痰。

主治：外感凉燥，痰湿内阻。证见头微痛，恶寒无汗，咳嗽痰稀，鼻塞咽塞等。亦可用于外感风寒，发热恶寒，头痛鼻塞，咳嗽胸闷之证。

杜仲丸（《圣济总录》）

组成：杜仲 枣肉（糯米汤下）

功效：补肾安胎。

主治：妇人胞胎不安。

杞菊地黄丸（《医级》）

组成：枸杞子 菊花 熟地 山药 泽泻 丹皮 茯苓 山茱萸

功效：滋阴平肝明目

主治：肝肾。阴虚而眼花歧视，或枯涩疼痛者。

苇茎汤（《千金方》）

组成：苇茎 桃仁 冬瓜仁 苡仁

功效：清肺化痰，祛瘀排脓

主治：肺痈，证见咳吐腥臭黄痰脓血，胸中隐隐作痛，咳时尤甚。

苍耳散（《济生方》）

组成：苍耳子 辛夷 白芷 薄荷叶（用葱、茶清调服）

功效：发汗通窍，散风祛湿。

主治：鼻渊头痛，不闻香臭，时流浊涕等证。

苏合香丸（《和剂局方》）

组成：苏合香油（入安息香膏内） 麝香 丁香 白术 青木香 乌犀屑
香附子 朱砂 诃子 白檀香 安息香 沉香 荜茇 龙脑 熏陆香

功效：温中祛寒，行气解郁，开窍醒脑。

主治：寒邪或痰湿闭塞气机所致的闭证。如中风昏迷，痧胀昏厥，或时疫霍乱导致昏迷等。

苏子降气汤（《和剂局方》）

组成：苏子 厚朴 半夏 陈皮 前胡 肉桂 当归 炙甘草 生姜 大枣 薄荷

功效：降气化痰，止咳平喘。

主治：上实下虚，痰涎涌盛，咳喘上气，胸膈满闷等。

赤石脂散（《圣惠方》）

组成：赤石脂 侧柏叶 乌贼骨

功效：固涩止血。

主治：妇人漏下，数年不瘥。

赤石脂禹余粮汤（《伤寒论》）

组成：赤石脂 禹余粮

功效：涩肠止泻。

主治：泻痢日久，滑泻不禁。

更衣丸（《先醒斋医学广笔记》）

组成：芦荟 朱砂

组成：芦荟朱砂

功效：泻下通便，镇心安神。

主治：热结便秘而见烦躁易怒，失眠者。

吴茱萸汤（《伤寒论》）

组成：吴茱萸 生姜 人参 大枣

功效：温中补虚，降逆止呕。

主治：胃中虚寒，食谷欲呕，胃脘作痛，吞酸嘈杂；或厥阴头痛，干呕吐涎沫，或少阴病吐利，手足厥冷，烦躁欲死等。

牡蛎散（《和剂局方》）

组成：牡蛎 麻黄根 小麦黄芪

功效：固表止汗。

主治：表虚自汗或盗汗，心烦惊悸，短气倦怠。

何人饮（《景岳全书》）

组成：何首乌 人参 当归 陈皮 煨生姜

功效：补气血，治虚症。

主治：疟疾久发不止，气血两虚者。

何首乌散（《外科精要》）

组成：何首乌 防风 薄荷 苦参

功效：祛风止痒。

主治：遍身疮肿痒痛。

含化丸（《证治准绳》）

组成：海藻 昆布 海蛤 海带 瓦楞子 文蛤 诃子 五灵脂 猪胰

功效：软坚散结消瘿。

主治：瘰疬、痰核等证。

含巴绦矾丸（录自《血吸虫防治研究文集》）

组成：绦矾 巴豆

功效：逐水消肿。

主治：晚期血吸虫病肝硬化腹水。

谷精龙胆散（《证治准绳》）

组成：谷精草 荆芥 龙胆草 赤芍 生地 红花 木通 甘草 白茯苓 牛蒡子 灯芯

功效：清肝明目，疏风止痛。

主治：肝经风热，目赤肿痛，羞明多泪，及目生翳膜。

沉香四磨汤（《卫生家宝方》）

组成：沉香 乌药 木香 槟榔

功效：温中散寒，行气止痛。

主治：冷气攻冲，心腹作痛。

沙参麦冬汤（《温病条辨》）

组成：沙参 麦冬 花粉 桑叶 扁豆 玉竹 甘草

功效：清肺养胃，生津润燥。

主治：燥伤肺胃，津液亏损，而见咽干口渴，干咳少痰，舌红少苔等证。

羌活胜湿汤（《内外伤辨惑论》）

组成：羌活 独活 藁本 防风 甘草 川芎 蔓荆子

功效：祛风胜湿止痛。

主治：风湿在表，证见头痛头重，一身尽痛，难以转侧，恶寒微热，苔白脉浮等。

诃子汤（《宣明论方》）

组成：诃子 桔梗 甘草

功效：清肺利咽。

主治：失音不能言语者。

诃子皮散（《兰室秘藏》）

组成：诃子 罂粟壳 橘皮 干姜

功效：温里涩肠止泻。

主治：脱肛日久，复下赤白脓痢，作里急后重，白多赤少。

补骨脂丸（《本草纲目》）

组成：补骨脂 菟丝子 胡桃肉 沉香 乳香 没药

功效：补肾助阳。

主治：下元虚败，脚手沉重，阳萎。

补中益气汤（《脾胃论》）

组成：黄芪 人参 白术 当归 橘皮 升麻 柴胡 甘草

功效：调补脾胃，益气升阳。

主治：脾胃气虚，中气下陷，证见身热有汗，头痛恶寒，渴喜热饮，少气懒言，四肢乏力，及脱肛，子宫下垂，胃下垂，久泻久痢。

补阳还五汤（《医林改错》）

组成：黄芪 当归尾 川芎 赤芍 桃仁 红花 地龙

功效：补气活血，祛瘀通络。

主治：中风后，气虚血滞，证见半身不遂，口眼喎斜，语言蹇涩。

补肺阿胶汤（《小儿药证直诀》）

组成：阿胶 马兜铃 牛蒡子 炙甘草 杏仁 糯米

功效：养阴补肺，宁嗽止血。

主治：肺虚火盛，喘咳咽干痰少，或痰中带血。

良附丸（《良方集腋》）

组成：高良姜 香附 生姜汁

功效：行气解郁，散寒止痛。

主治：肝郁气滞，胃寒疼痛，胸闷不舒，喜温喜按者。

辛夷散（《济生方》）

组成：辛夷 细辛 藁本 升麻 川芎 木通 防风 羌活 白芷 甘草

功效：散寒，通鼻。

主治：鼻塞流涕，不闻香臭。

附子理中丸（《和剂局方》）

组成：附子 干姜 人参 白术 炙甘草

功效：温中散寒，助阳健脾。

主治：脉微肢厥，昏睡露睛，或寒中内脏之霍乱吐利、转筋、口噤、四肢强直等脾肾阳虚阴寒重证。

附桂理中丸（《三因方》）

组成：附子 肉桂 干姜 白术 人参 甘草

功效：温中散寒，助阳健脾。

主治：同附子理中丸。

鸡鸣散（《证治准绳》）

组成：木瓜 吴茱萸 陈皮 槟榔 苏叶 桔梗 生姜

功效：温宣降浊。

主治：湿性脚气，脚腿肿重，不可任地；筋脉弛缓，或麻痹冷痛，发热恶寒或挛急上冲，甚至胸闷泛恶者。2. 风湿流注，脚痛不可任地，筋脉浮肿者。

驱尿石汤（《北京中草药制剂选编》）

组成：王不留行 金钱草 海金沙 冬葵子 车前子 石韦 怀牛膝 泽泻 滑石 枳壳

功效：利水排石。

主治：泌尿系结石。

八画

青龙丸（《外科方外奇方》）

组成：番木鳖 炒甲片 白僵蚕

功效：消肿溃坚。

主治：一切疔疮肿毒，贴骨痈疽，颈项瘰癧，及乳串结核，痰气凝滞，硬结成毒小儿痘后痈疽等。

青皮丸（《沈氏尊生书》）

组成：青皮 山楂 神曲 麦芽 草果

功效：行气消积。

主治：食痛饱闷，噎气。

青娥丸（《和剂局方》）

组成：杜仲 补骨脂 胡桃

功效：补肾壮腰。

主治：肾虚腰痛脚弱，腰间重坠，起坐困难。

青州白丸子（《和剂局方》）

组成：天南星 半夏 川乌 白附子

功效：祛风痰。

主治：手足顽麻，半身不遂，口眼喎斜，痰涎壅盛，及小儿惊风，大人头风等证。

青蒿鳖甲汤（《温病条辨》）

组成：青蒿 鳖甲 细生地 知母 丹皮

功效：养阴透热。

主治：温病后期，邪热未尽，深伏阴分，阴液已伤。证见夜热早凉，热退无汗，舌红少苔，脉数等。亦可用于由于阴虚内热所致的潮热证。

苓桂术甘汤（《金匮要略》）

组成：茯苓 桂枝 白术 甘草

功效：健脾利湿，温化痰饮。

主治：脾虚不运，水湿停蓄，或停饮所致的头眩、心悸、咳嗽等。

苧根汤（《小品方》）

组成：苧麻根 干地黄 当归 阿胶 芍药 甘草

功效：止血安胎。

主治：胎动，腰腹痛下血。

虎潜丸（《丹溪心法》）

组成：熟地 白芍 知母 黄柏 龟板 锁阳 虎骨 干姜 陈皮

功效：滋阴补肾，强壮筋骨。

主治：肝肾阴亏，精血不足。症见筋骨痿软，腰膝酸楚，腿足瘦弱，步履乏力等。

又方（《全国中药成药处方集》）

组成：熟地 龟板 锁阳 虎骨 知母 黄柏 陈皮 白芍 当归 牛膝 羊肉

功效：滋阴补肾、强壮筋骨。

主治：同上《丹溪心法》之虎潜丸。

虎骨木瓜酒（《全国中药成药处方集》）

组成：虎骨 木瓜 川芎 川牛膝 当归 天麻 五加皮 红花续断 白茄根 玉竹 秦艽 防风 桑枝

功效：祛风止痛。

主治：风寒湿气，流注经络，证见筋脉拘挛，骨节痠痛，四肢麻木，口眼喎斜，山岚瘴气，历节风痛等。

昆布丸（《广济方》）

组成：昆布 海藻 海蛤 通草 羊靥

功效：消痰散结。

主治：气瘕，证见胸膈满塞，咽喉颈项渐粗。

易黄汤（《傅青主女科》）

组成：黄柏 芡实 山药 车前子 白果

功效：健脾益气，清热利湿。

主治：脾虚湿热带下。证见带下粘稠量多，色白兼黄，其气腥臭，头眩且重，乏力等。

固冲汤（《医学衷中参西录》）

组成：生黄芪 白术 茜草 龙骨 海螵蛸 牡蛎 山萸肉 五倍子 生杭芍 棕榈炭

功效：健脾益气，固冲摄血。

主治：冲脉不固，脾胃虚弱，证见血崩或月经过多，色淡质稀，心悸短气等。

固肠丸（《证治准绳》）

组成：乌梅肉 肉豆蔻 诃子肉 罂粟壳 苍术 人参 茯苓 木香

功效：脾虚下陷，久痢滑泄。

主治：久泻不止。

固经丸（《妇人大全良方》）

组成：枳根白皮 龟板 香附 白芍 黄芩 黄柏

功效：滋阴清热，固经止血。

主治：血虚有热，经水不止，崩漏紫黑成块。

知柏地黄丸（《医宗金鉴》）

组成：知母 黄柏 熟地 山茱萸 泽泻 茯苓 丹皮 山药

功效：滋阴降火。

主治：阴虚火旺，证见骨蒸潮热，盗汗梦遗等。

金刚丸（《张氏医通》）

组成：川萆薢 肉苁蓉 杜仲 菟丝子 鹿胎 紫河车 巴戟肉

功效：补身益精。

主治：肾虚骨痿，不能起动。

金沸草散（《类证活人书》）

组成：旋覆花 生姜 半夏 细辛 前胡 荆芥 赤芍 甘草 枣子

功效：发散风寒，宣肺止咳。

主治：伤寒，中脘有痰，令人壮热，项强筋急，时发寒热。

金铃子散（《圣惠方》）

组成：金铃子 延胡索

功效：疏肝泄热，行气止痛。

主治：肝气郁滞，气郁化火所致胸腹胁肋疼痛，或痛经，疝气痛，时发时止。

金锁固精丸（《医方集解》）

组成：沙苑蒺藜 芡实 连须 龙骨 牡蛎 莲子粉

功效：收涩固精。

主治：肾虚不固，证见遗精滑泄，神疲乏力，四肢痿软，腰痛耳鸣。

金箔镇心丸（《万病回春》）

组成：金箔 朱砂 琥珀 胆南星 天竺黄 牛黄 雄黄 珍珠 麝香

功效：镇心定惊。

主治：一切惊悸。

狗脊饮（验方）

组成：狗脊 杜仲 续断 川牛膝 桂枝 秦艽 桑枝 海风藤 宣木瓜 松节
当归身 虎骨胶 熟地

功效：补肝肾，祛风湿。

主治：气血亏虚，兼感风湿，证见手足麻木，行动不利等证。

肥儿丸（《医宗金鉴》）

组成：人参、白术 黄连 茯苓 胡黄连 使君子肉 神曲 麦芽 山楂肉
炙甘草 芦荟

功效：消痞积，化食滞。

主治：小儿痞积，腹痛，面色萎黄，消瘦。

炙甘草汤（《伤寒论》）

组成：炙甘草 人参 阿胶 麦冬 干地黄 桂枝 麻仁 生姜 大枣

功效：益心气，补心血，养心阴、通心阳。

主治：气虚血少，证见虚羸少气，心悸心慌，脉结代或虚数等。

河车大造丸（《中国医学大辞典》）

组成：熟地 龟板 黄柏 天冬 麦冬 紫河车 人参 杜仲 牛膝

功效：大补气血。

主治：虚损旁瘵，神志失守，内热水亏。

泻心汤（《伤寒论》）

组成：黄连 黄芩 大黄

功效：泻火解毒。

主治：心胃火炽，迫血妄行，以致吐衄便秘；或三焦积热，目赤口疮，牙龈肿痛；或外科痈肿属于热毒炽盛者。

泻白散（《小儿药证直诀》）

组成：桑白皮 地骨皮 炙甘草 粳米

功效：泻肺清热，平喘止咳。

主治：肺热咳嗽气喘。

定命散（《圣济总录》）

组成：白花蛇 乌梢蛇 蜈蚣

功效：祛风止痉。

主治：破伤风，颈项紧硬，身体强直。

定喘汤（《摄生众妙方》）

组成：黄芩 桑白皮 白果 麻黄 苏子 甘草 款冬花 杏仁 半夏

功效：宣肺平喘，清热化痰。

主治：痰热内蕴，痰多气急，痰黄质稠，咳嗽哮喘。

建汤（《医学衷中参西录》）

组成：生地黄 生牡蛎 生龙骨 怀牛膝 生赭石 生山药 生杭芍 柏子仁

功效：平肝潜阳。

主治：肝阳上亢引起的头痛眩晕，耳鸣目胀，心悸健忘，梦多失眠，脉弦硬而长等。

参附汤（《校注妇人良方》）

组成：人参 附子

功效：回阳、益气、救脱。

主治：元气大亏，阳气暴脱，证见手足厥逆，汗出，呼吸微弱脉微。

参苓白术散（《和剂局方》）

组成：人参 白术 茯苓 苡仁 砂仁 甘草 桔梗 山药 扁豆 陈皮 莲子肉 大枣

功效：补气健脾，和胃渗湿。

主治：脾胃气虚挟湿，证见四肢无力，形体虚羸，饮食不化，或吐或泻，胸脘痞塞，面色萎黄。

参茸固本丸（验方）

组成：人参 鹿茸 当归身 熟地 枸杞 白芍 小茴香 陈皮 白术 黄芪 牛膝 桂心 巴戟肉 菟丝子 肉苁蓉 山药 茯神 炙甘草

功效：补气助阳，强筋健骨。

主治：诸虚百损，五劳七伤，元气不足，证见畏寒肢冷，腰痛耳鸣，四肢发软，形体瘦弱，精神疲乏，阳萎早泄，宫冷不孕，小便频数等。

参赭镇气汤（《医学衷中参西录》）

组成：党参 山茱萸 苏子 山药 生赭石 生芡实 生龙骨 生牡蛎 生杭芍

功效：益气镇逆。

主治：阴阳两虚，喘逆迫促，有将脱之势。亦治肾虚不摄，冲气上逆，致胃气不降而作满闷。

驻景丸（《和剂局方》）

组成：菟丝子 熟地黄 车前子

功效：补肝肾，明目。

主治：肝肾亏虚，眼昏生翳。

九画

枯痔散（广州中医学院《外伤科学》）

组成：白砒 白矾 硼砂 雄黄 硫黄

功效：拔毒消痔。

主治：痔疮。

枳术丸（《脾胃论》引张洁古方）

组成：枳实 白术

功效：健脾胃，消痞满。

主治：脾胃虚弱，饮食停滞，证见脘腹痞满，不思饮食等。

枳实导滞丸（《内外伤辨惑论》）

组成：枳实 大黄 黄连 黄芩 神曲 白术 茯苓 泽泻

功效：消导积滞，清利湿热。

主治：积滞内阻，蕴湿生热，证见胸腹痞满，下痢，泄泻，腹痛后重，或大便秘结，小便短赤等。

枳实消痞丸（《兰室秘藏》）

组成：枳实 厚朴 白术 半夏曲 干生姜 炙甘草 白茯苓 麦芽 黄连 人参

功效：导滞消痞。

主治：脾胃虚弱，寒热互结所致的心下痞满，不欲饮食，体弱倦怠，或胸腹痞胀，食少不化，大便不畅者。

枳实薤白桂枝汤（《金匮要略》）

组成：枳实 薤白 桂枝 瓜蒌 厚朴

功效：通阳散结，消痞止痛。

主证：胸痹，气结在胸，证见心中痞满、气从胁下逆抢心者。

柏子仁丸（《本事方》）

组成：柏子仁 人参 牡蛎 白术 五味子 半夏曲 麻黄根 枣肉 净麸

功效：益阴敛汗。

主治：虚烦不眠，惊悸怔忡，盗汗。

柿蒂汤（《济生方》）

组成：柿蒂 生姜 丁香

功效：降逆止呃。

主治：胸满呃逆不止，属寒呃而胃气不虚者。

胡芦巴丸（《和剂局方》）

组成：吴茱萸 川楝子 巴戟天 茴香 川乌 胡芦巴

功效：温肾散寒止痛。

主治：小肠疝气，上下走痛。

解防败毒散（《摄生众妙方》）

组成：荆芥 防风 羌活 柴胡 前胡 川芎 枳壳 独活 茯苓 桔梗 甘草

功效：发汗解表，散风祛湿。

主治：外感风寒湿邪，以及时疫疟疾、痢疾、疮疡具风寒表证者。

茵陈蒿汤（《伤寒论》）

组成：茵陈蒿 栀子 大黄

功效：清热利湿。

主治：湿热黄疸。

茵陈五苓散（《金匱要略》）

组成：茵陈 茯苓 猪苓 泽泻 桂枝 白术

功效：利湿退黄。

主治：湿热黄疸，湿邪偏重，小便不利显著者。

茵陈四逆汤（《玉机微义》）

组成：茵陈 附子 干姜 炙甘草

功效：祛寒利湿。

主治：寒湿阴黄，证见手足逆冷，脉沉微细等。

茯菟丸（《和剂局方》）

组成：白茯苓 菟丝子 石莲子

功效：补肾固涩。

主治：肾虚遗精，白浊，或鸟有余沥。

荔枝散（《景岳全书》）

组成：荔枝核 木香

功效：行气止痛。

主治：心腹胃脘久痛，屡触屡发者。

牵正散（《杨氏家藏方》）

组成：白附子 僵蚕 全蝎

功效：祛风化痰。

主治：中风面瘫，口眼喎斜，甚或面部肌肉抽动。

骨碎补散（《圣惠方》）

组成：骨碎补 自然铜 虎胫膏 败龟板 没药 胡桃仁

功效：续骨疗伤。

主治：金疮伤筋断骨，痛不忍。

钩藤饮（《医宗金鉴》）

组成：钩藤 天麻 全蝎 人参 羚羊角 炙甘草

功效：息风止痉。

主治：小儿急惊，证见牙关紧闭，手足抽搐，惊悸壮热，眼目？视等。

香苏散（《和剂局方》）

组成：紫苏叶 香附子 炙甘草 陈皮

功效：发汗解表，理气和中。

主治：外感风寒、内有气滞，证见形寒身热，头痛无汗，胸脘痞闷，不思饮食等。

香连丸（《兵部手集方》）

组成：木香 黄连（与吴茱萸同炒，去吴茱萸）

功效：燥湿清热，行气化滞。

主治：湿热痢疾，脓血相兼，腹痛，里急后重等。

香参丸（《沈氏尊生书》）

组成：木香 苦参 甘草

功效：燥湿清热，行气化滞。

主治：湿热泻痢。

香桂散（《张氏医通》）

组成：麝香 肉桂

功效：祛瘀下胎。

主治：胎死腹中，或胞衣不下。

香橘散（《张氏医通》）

组成：小茴香 橘核 山楂肉

功效：理气止痛。

主治：睾丸偏坠胀痛。

香薷散（《和剂局方》）

组成：香薷 白扁豆 厚朴

功效：祛暑解表，和中化湿。

主治：暑久乘凉饮冷，外感于寒，内伤于湿，身热恶寒，头重头痛，无汗胸闷，或腹痛吐泻，舌苔白腻，脉浮等证。

香砂枳术丸（《摄生秘剖》）

组成：木香 砂仁 枳实 白术

功效：健脾，行气，消积

主治：脾虚食少，或有宿食不消，胸脘痞闷等证。

香砂六君子丸（《中国医学大辞典》）

组成：人参 白术 茯苓 炙甘草 陈皮 木香 砂仁 法半夏 生姜 大枣

功效：健脾化痰，和胃行气。

主治：中虚气滞，痰湿内阻，证见胸脘满闷，食难运化，呕恶，腹痛，肠鸣，泄泻。

香砂六君子（《中国医学大辞典》）

组成：人参 白术 茯苓 甘草 砂仁 木香 半夏 陈皮 生姜

功效：同上香砂六君子丸。

主治：气虚痰饮，呕恶痞闷，纳减消瘦，及脾胃不和，变生诸证。

复元活血汤（《医学发明》）

组成：大黄 红花 桃仁 当归 炮山甲 柴胡 瓜蒌根 甘草

功效：活血祛瘀，通络止痛。

主治：跌打损伤，瘀血留于胁下，痛不可忍者。

复方土茯苓汤（《中医临床经验资料汇编》）

组成：土茯苓 金银花 白鲜皮 甘草 威灵仙

功效：清热解毒。

主治：梅毒。

保和丸（《丹溪心法》）

组成：莱菔子 山楂 神曲 陈皮 半夏 茯苓 连翘

功效：消食和胃。

主治：食积停滞，证见脘腹痞满，腹胀时痛，暖腐吞酸，厌食恶心，或大便泄泻。

保赤丸（一九七七年版《中华人民共和国药典》）

组成：巴豆霜 六曲 天南星 朱砂

功效：温里消积。

主治：小儿冷积，停乳停食，腹部胀满，大便秘结，痰多惊悸不安。

禹功散（《儒门事亲》）

组成：黑牵牛 茴香 木香 生姜汁

功效：逐水消肿。

主治：停次肿满，阳水便秘，脉实。

独活寄生汤（《千金方》）

组成：独活 桑寄生 干地黄 杜仲 牛膝 细辛 秦艽 茯苓 桂心 防风 人参 甘草 当归 芍药

功效：补肝肾，祛风湿，止痹痛。

主治：痹证日久，肝肾两亏，气血不足，证见腰膝冷痛，肢节屈伸不利，软软无力，或麻木不仁，畏寒喜温等。

活络效灵丹（《医学衷中参西录》）

组成：丹参 乳香 没药 当归

功效：活血祛瘀止痛。

主治：气血凝滞所致的心腹疼痛，腿臂疼痛，及风湿痹痛，跌打损伤，癥瘕积聚及疮疡初起等。

宣痹汤（《温病条辨》）

组成：防己 苡仁 滑石 杏仁 连翘 山栀 半夏 晚蚕砂 赤小豆皮

功效：清利湿热。

主治：湿热痹证，证见寒战热炽，骨节烦疼，面目萎黄，小便短赤等。

宣郁通经汤（《傅青主女科》）

组成：白芍 黄芩 柴胡 当归 丹皮 黑山栀 香附 川郁金 生甘草

功效：疏肝解郁，活血行气。

主治：肝郁有热，经前腹痛。

养心汤（《证治准绳》）

组成：柏子仁 酸枣仁 五味子 茯苓 人参 黄芪 茯神 半夏曲 当归 川芎 远志 辣桂 甘草

功效：养心安神。

主治：心虚血少，惊惕不宁。

养脏汤（《和剂局方》）

组成：人参 白术 肉桂 白芍 木香 诃子 当归 肉豆蔻 炙甘草 罂粟壳（蜜炙）

功效：补虚温中，涩肠固脱

主治：泻痢日久，脾胃虚寒，滑脱不禁，甚至脱肛。

养阴清肺汤（《重楼玉钥》）

组成：生地 玄参 麦冬 白芍 丹皮 川贝 薄荷 甘草

功效：养阴清肺。

主治：阴虚火旺，咽喉肿痛，及骨蒸劳热，咳嗽咯血。

首乌延寿丹（《世补斋医书》）

组成：何首乌 女贞子 旱莲草 稀莩草 菟丝子 金樱子 杜仲 牛膝 桑叶 银花 生地 桑椹 黑脂麻

功效：养阴补血，乌鬚黑髮。

主治：阴虚血虚，腰膝酸软，眩晕目暗，耳鸣，失眠，鬚髮早白。

神应丸（《证治准绳》）

组成：威灵仙 桂心 当归

功效：祛风、活血、止痛。

主治：风湿或跌打损伤，腰痛如折，牵引背脊，俯仰艰难。

神消散（《证治准绳》）

组成：木贼 蝉衣 穀精草 黄芩 蛇蜕 苍术 炙甘草

功效：疏风，清热，明目

主治：风热目赤翳障。

冠心苏合丸（《中药知识手册》）

组成：苏合香 檀香 冰片 乳香 青木香

功效：行气，开窍，止痛。

主治：冠心病心绞痛。

厚朴麻黄汤（《金匱要略》）

组成：厚朴 麻黄 生石膏 杏仁 半夏 细辛 干姜 五味子

功效：宣肺散寒，化痰止咳。

主治：湿痰壅肺，胸满喘咳。

十画

珠黄散（《上海市药品标准》）

组成：珍珠 西黄

功效：清热解毒。

主治：咽喉肿痛，腐烂，牙疳，口疳，口舌破碎等证。

蚕矢汤（《霍乱论》）

组成：蚕沙 苡仁 黄连 陈吴萸 黄芩 大豆黄卷 陈木瓜 制半夏 通草 焦山栀

功效：清热燥湿，止吐泻。

主治：湿热内蕴，霍乱吐泻，证见腹痛转筋，口渴烦躁等。

秦艽鳖甲散（《卫生宝鉴》）

组成：秦艽 青蒿 鳖甲 知母 地骨皮 柴胡 当归 乌梅

功效：滋阴养血，清热除蒸。

主治：骨蒸壮热，肌肉消瘦，唇红颊赤，气粗，四肢困倦，夜有盗汗。

桂枝汤（《伤寒论》）

组成：桂枝 芍药 生姜 大枣 甘草

功效：解肌发表，调和营卫。

主治：外感风寒表虚证，证见发热头痛，汗出恶风，或鼻鸣干呕，舌苔薄白，脉浮缓等。

桂附八味丸（《金匱要略》）

组成：附子 肉桂 熟地 山茱萸 山药 茯苓 泽泻 牡丹皮

功效：温补肾阳。

主治：肾阳不足，腰膝痠痛，少腹拘急，水肿，小便不利；或阳萎，尿频遗尿，尺脉微弱，以及痰饮喘咳，或肾不纳气，喘急欲脱等。亦治消渴，脚气。

桂枝附子汤（《金匱要略》）

组成：桂枝 附子 生姜 甘草 大枣。

功效：温阳逐湿。

主治：风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧。

桂枝茯苓丸（《金匱要略》）

组成：桂枝 茯苓 桃仁 丹皮 芍药

功效：活血化瘀，缓消癥块。

主治：妇人小腹有癥块，及血癖经闭，痛经。

桔梗汤（《金匱要略》，即甘桔汤）

组成：桔梗 甘草

功效：宣肺利咽。

主治：肺痈，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥。亦治咽喉肿痛，咳嗽有痰等。

桃花汤（《伤寒论》）

组成：赤石脂 干姜 粳米

功效：温中涩肠。

主治：少阴病，下利便脓血。

桃花散（《全国中药成药处方集》）

组成：煅石膏 东丹 轻粉 冰片

功效：生肌敛疮。

主治：痈疽疮疡溃烂，脓水淋漓，久不收口者。

桃红四物汤（《医宗金鉴》）

组成：桃仁 红花 熟地 当归 川芎 白芍

功效：活血调经。

主治：瘀血阻滞引起的月经不调，及癥瘕。亦治损伤瘀痛等证。

都气丸（《医宗己任编》）

组成：熟地 山萸肉 山药 泽泻 丹皮 茯苓 五味子

功效：滋肾敛肺，止咳定喘。

主治：肾阴虚而喘，面赤呃逆者。

破故纸丸（《魏氏家藏方》）

组成：破故纸 茴香

功效：温肾散寒。

主治：肾气虚冷，小便无度。

真武汤（《伤寒论》）

组成：附子 白术 茯苓 生姜 芍药

功效：温阳利水。

主治：脾肾阳虚，水气内停，证见小便不利，肢体沉重疼痛，恶寒，腹痛下利，或肢体浮肿及大汗伤阳，寒水内动所致的心悸头眩，身体振振动摇等证。

柴胡疏肝散（《景岳全书》）

组成：柴胡 芍药 陈皮 香附 川楝子 枳壳 炙甘草

功效：疏肝行气，活血止痛

主治：肝气郁结，胁肋疼痛，寒热往来。

柴葛解肌汤（《伤寒六书》）

组成：柴胡 葛根 黄芩 石膏 芍药 甘草 羌活 白芷 桔梗 生姜 大枣

功效：解肌清热。

主治：感冒风寒，寒郁化热，证见恶寒渐轻，而身热增盛，头痛肢楚，目痛鼻干，心烦不眠，眼眶痛等。

逍遥散（《和剂局方》）

组成：柴胡 芍药 当归 白术 茯苓 生姜 甘草 薄荷

功效：疏肝解郁，健脾和营。

主治：肝郁血虚所致的两胁胀痛，头痛目眩，口干咽燥，神疲食少，或见往来寒热，或月经不调，乳房作胀等。

透脓散（《外科正宗》）

组成：生黄芪 当归 川芎 穿山甲 皂角刺

功效：补气益血，托里排脓。

主治：痈疽诸毒，内脓已成不溃者。

射干活（《幼幼新书》）

组成：射干 升麻 马勃 芒硝

功效：清热解毒，祛痰利咽。

主治：咽喉肿痛、饮食难下，兼有热痰壅盛者。

射干兜铃汤（《痧胀玉衡》）

组成：射干 桔梗 贝母 马兜铃 玄参 花粉 菊花 桑白皮 甘草 薄荷 银花

功效：清肺化痰止咳。

主治：肺热咳嗽，痰黄质稠。

射干麻黄汤（《金匱要略》）

组成：射干 麻黄 生姜 细辛 半夏 紫菀 冬花 五味子 大枣

功效：温肺化痰，止咳平喘。

主治：痰饮，咳而上气，喉中有水鸣声音。

胶艾汤（《金匱要略》）

组成：干地黄 当归 白芍 川芎 甘草 阿胶 艾叶

功效：补血调经，止血安胎。

主治：妇女冲任虚损所致的崩漏下血，月经过多，产后或小产损伤冲任，下血不止，或妊娠下血，腹中疼痛者。

凌霄化散（《证治准绳》）

组成：凌霄花 黄连 白矾 雄黄 羊蹄 天南星（生姜汁调药）

功效：活血祛风止痒。

主治：风湿热，诸癣久不愈。

凉惊丸（《中国医学大辞典》引钱乙方）

组成：龙胆草 青黛 龙脑 麝香 钩藤 黄连 牛黄 防风

功效：清热解毒，开窍豁痰。

主治：小儿惊风，发热痉挛等证。

消乳汤（《医学衷中参西录》）

组成：知母 穿山甲 瓜蒌 丹参 生明乳香 金银花 连翘 生明没药

功效：活血下乳，消痈肿。

主治：乳痈肺痛。

消癭丸（《医学心悟》）

组成：玄参 贝母 牡蛎

功效：清热化痰，软坚散结。

主治：瘰癧痰核。

消瘿汤(验方)

组成：海藻 牡蛎 黄药子 昆布 土贝母

功效：软坚消瘿。

主治：瘰癧结肿。

海浮散（《中国医学大辞典》引外科十法方）

组成：乳香 没药

功效：活血止痛。

主治：痈疽种毒溃后，腐肉已化，新肉渐生，或溃久不敛，气血凝滞者。

海金沙散（《医学发明》）

组成：海金沙 牵牛子 甘遂

功效：逐水消肿。

主治：脾湿太过，通身肿满，喘不得卧，腹胀如鼓。

润肠丸（《济生方》）

组成：肉苁蓉 沉香 麻子仁汁

功效：润肠通便。

主治：老人、虚人汗多便秘。

益胃汤（《温病条辨》）

组成：麦冬 细生地 冰糖 玉竹 沙参

功效：益胃生津。

主治：燥伤肺胃阴分，咽干口渴，舌干少苔，脉不数者。

益血润肠丸（《沈氏尊生书》）

组成：火麻仁 当归 熟地 杏仁 荆芥 枳壳 苡蓉 苏子 蜂蜜

功效：补血、润肠。

主治：老人、产妇及体弱者，因津枯血少所致的肠燥便秘。

调胃承气汤（《伤寒论》）

组成：大黄 芒硝 甘草

功效：泻下和胃。

主治：阳明燥热内结，证见恶热，口渴便秘，腹痛拒按等。亦治胃肠积热引起的发斑。口齿喉痛及疮疡等。

通关散（《丹溪心法附余》）

组成：细辛 猪牙皂

功效：豁痰开窍。

主治：中恶客忤或痰厥所致猝然口噤气塞，人事不省，牙关紧闭。痰涎壅盛属闭证、实证者。

通关丸（《兰室秘藏》）。又名滋肾丸

组成：黄柏 知母 肉桂

功效：清下焦湿热，助膀胱气化。

主治：湿热蕴结膀胱，尿闭不通，小腹胀满，尿道涩痛。

桑杏汤（《温病条辨》）

组成：桑叶 杏仁 象贝 沙参 香豉 栀皮 梨皮

功效：清宣凉润。

主治：外感燥热，头痛身热，口渴，干咳无痰，舌红，脉数等证。

桑菊饮（《温病条辨》）

组成：桑叶 菊花 杏仁 桔梗 连翘 薄荷 芦根 甘草

功效：疏风清热，宣肺止咳。

主治：外感风热及温病初起，证见发热头昏头痛，咳嗽及咽喉肿痛。

桑麻丸（《医级》。又名扶桑丸）

组成：嫩桑叶 黑胡麻子 白蜜

功效：补肾明目。

主治：肝阴不足，眼目昏花，咳久不愈，肌肤甲错，麻痹不仁。

桑嫫蛸散（《本草衍义》）

组成：桑嫫蛸 远志 菖蒲 龙骨 茯神 龟板 人参 当归

功效：补肾，固精，缩尿。

主治：心神恍惚，健忘，小便频数。

莪术丸（《验方》）

组成：莪术 三棱 香附 谷芽 青皮 槟榔 黑丑 丁香 萆澄茄

功效：活血、消积、止痛。

主治：积滞腹胀作痛，癥瘕。

十一画

理中汤（《伤寒论》）

组成：人参 白术 干姜 炙甘草

功效：温中散寒，补气健脾。

主治：脾胃虚寒，证见脘腹冷痛，泄泻，呕吐，腹满不食；或阳虚失血，及小儿慢惊，病后喜唾涎沫，以及胸痹等证由中焦虚寒而致者。

栀子鼓汤（《伤寒论》）

组成：栀子 淡豆豉

功效：清热透表止烦。

主治：外感热病，身热懊恼，虚烦不眠，胸脘痞闷等证。

栀子柏皮汤（《伤寒论》）

组成：生栀子 黄柏 甘草

功效：清热利湿。

主治：肝胆湿热郁结所致的黄疸，发热，小便短赤等证。

菖蒲郁金汤（《温病全书》）

组成：鲜石菖蒲 竹沥 炒山栀 竹叶 丹皮 连翘 广郁金 菊花 滑石 牛蒡子 姜汁 玉枢 丹末

功效：开窍醒神，清热化痰。

主治：湿温病，湿热酿痰，蒙蔽心包，证见身热不甚，胸脘痞闷，时或神昏谵语等。

藿分清饮（《丹溪心法》）

组成：川藿藓 益智仁 石菖蒲 乌药

功效：温肾利湿，分清去浊。

主治：膏淋白浊，证见小便频数，混浊不清，白如米泔，积如膏糊。

菟丝子丸（《世医得效方》）

组成：菟丝子 苁蓉 鹿茸 附子 桑螵蛸 五味子 牡蛎 鸡内金

功效：补肾助阳、固精缩尿。

主治：肾虚小便多，或小便不禁。

黄土汤（《金匮要略》）

组成：灶心黄土 干地黄 附子 阿胶 白术 黄芩 甘草

功效：温阳健脾，益阴止血。

主治：脾阳不足所致的大便下血，以及吐血，衄血，妇人血崩，血色黯淡，四肢不温等。

黄龙汤（《伤寒六书》）

组成：人参 当归 大黄 芒硝 厚朴 枳实 甘草

功效：泻热通便、补气养血。

主治：里实热结，而气血虚者。

黄连汤（《千金方》）

组成：黄连 黄柏 干姜 当归 阿胶 炙甘草 酸石榴皮

功效：清热燥湿、涩肠止痢。

主治：赤白痢，久痢不止。

黄芩汤（《伤寒论》）

组成：黄芩 芍药 甘草 大枣

功效：清热燥湿，缓急止痛。

主治：身热口苦，腹痛下痢，舌质红，脉弦数。

黄芪汤（《医部全录》）

组成：黄芪 生地 麦冬 瓜蒌根（天花粉） 茯苓 五味子 炙甘草

功效：补气生津止渴。

主治：消渴。

黄芩滑石汤（《温病条辨》）

组成：黄芩 滑石 通草 白蔻仁 猪苓 大腹皮 茯苓皮

功效：清热化湿。

主治：湿温邪在中焦，湿热并重，证见发热身痛，汗出热解，继而复热，渴不多饮，或竟不渴等。

黄连阿胶汤（《伤寒论》）

组成：黄连 黄芩 阿胶 白芍 鸡子黄

功效：滋阴降火，除烦安神。

主治：阴虚火旺，心中烦热，失眠；或热病后期，余热未清，阴液亏损，虚烦不得眠；以及心火亢盛，迫血妄行所致的吐、衄失血等证。

黄连解毒汤（《外台秘要》引崔氏方）

组成：黄连 黄芩 黄柏 栀子

功效：泻火解毒。

主治：三焦热盛，证见大热烦扰，口干咽燥，错语不眠，或吐衄发斑，以及外科痈肿疔毒等。

黄芪桂枝五物汤（《金匮要略》）

组成：黄芪 桂枝 白芍 生姜 大枣

功效：益气温经，活血利痹。

主治：血痹证，证见身体不仁，如风痹者。

黄连橘皮竹茹半夏汤（《温热经纬》）

组成：黄连 橘皮 半夏 竹茹

功效：清热燥湿，降逆止呕。

主治：胃热呕哕。

控涎丹（《三因方》）

组成：甘遂 大戟 白芥子（淡姜汤下）

功效：祛痰逐饮。

主治：悬饮、水肿；咳呛而痰涎壅盛者；瘰癧、痰核、阴疽等证。

救逆汤（《伤寒论》之桂枝去桂加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤的简称）

组成：桂枝 炙甘草 生姜 牡蛎 龙骨 大枣 蜀漆

功效：温阳救逆。

主治：伤寒脉浮，医者以火迫劫之，亡阳，惊狂，卧起不安者。

蛇床子散（《金匱要略》）

组成：蛇床子 白粉

功效：杀虫止痒。

主治：妇人阴痒带下。

银翘散（《温病条辨》）

组成：银花 连翘 薄荷 桔梗 荆芥穗 淡竹叶 生甘草 淡豆豉 牛蒡子 芦根

功效：辛凉透表，清热解毒。

主治：外感风热及温病初起，证见头痛，发热，微恶风寒，无汗或有汗不畅，口渴或兼见咳嗽咽喉肿痛，脉浮数等。

猪苓汤（《伤寒论》）

组成：泽泻 茯苓 猪苓 滑石 阿胶

功效：滋阴利水。

主治：水热互结，小便不利，发热口渴欲饮，或见心烦不眠，或兼咳嗽、呕吐等。亦治淋疾尿血。

旋覆代赭汤（《伤寒论》）

组成：旋覆花 半夏 生姜 人参 代赭石 甘草 大枣

功效：降逆化痰，益气和胃。

主治：胃气虚弱，痰浊内阻，胃气上逆而致心下痞硬，噎气不除，反胃呕吐，吐涎沫等。

麻黄汤（《伤寒论》）

组成：麻黄 桂枝 杏仁 甘草

功效：发汗解表，宣肺平喘。

主治：外感风寒表实证，证见恶寒发热，身疼头痛，无汗而喘，脉浮紧等。

麻子仁丸（《伤寒论》）

组成：麻子仁 大黄 厚朴 枳实 杏仁 芍药

功效：润肠通便，消痞除满。

主治：肠胃燥热，大便硬，小便数。

麻黄杏仁甘草石膏汤（《伤寒论》）

组成：麻黄 杏仁 甘草 石膏

功效：辛凉宣泄，清肺平喘。

主治：热邪壅肺而致喘咳者。

麻黄杏仁薏苡甘草汤（《金匮要略》）

组成：麻黄 杏仁 薏苡仁 甘草

功效：发汗祛湿。

主治：汗出当风，或久伤取冷所致风湿，证见一身尽疼，发热，日晡而剧者。

麻黄附子细辛汤（《伤寒论》）

组成：麻黄 细辛 附子

功效：助阳解表。

主治：阳虚外感，恶寒发热，脉反沉者。

清肠饮（《疡医大全》）

组成：银花 地榆 麦冬 玄参 薏苡仁 黄芩 当归 甘草

功效：清热解毒，排脓消痈。

主治：肠痈。

清肺汤（《医宗金鉴》）

组成：麦冬 天冬 知母 贝母 黄芩 桑皮 橘红 甘草

功效：清火润燥，止咳化痰。

主治：热痰咳嗽，痰不易咯，苔干白或黄燥。

清胃汤（《医宗金鉴》）

组成：石膏 黄连 生地 丹皮 黄芩 升麻

功效：清热泻火，解毒消肿。

主治：胃中实火上炎，牙缝出血，牙龈肿痛，口舌生疮等。

清骨散（《证治准绳》）

组成：银柴胡 胡黄连 地骨皮 青蒿 秦艽 知母 鳖甲 甘草

功效：清虚热，退骨蒸。

主治：虚劳骨蒸，或热日久不退，证见唇红颧赤，形瘦盗汗等。

清络饮（《温病条辨》）

组成：鲜银花 鲜扁豆花 丝瓜皮 鲜荷叶边 鲜竹叶心 西瓜翠衣

功效：解暑清肺。

主治：暑伤肺经气分之轻证，或暑温病经发汗后余邪未解，证见身热，口渴不甚，但头目不清，昏眩微胀等。

清宫汤（《温病条辨》）

组成：玄参心 连心麦冬 莲子心 连翘心 竹叶卷心 犀角尖

功效：清心热，养阴液。

主治：温热病，邪热初入营分，证见身热夜甚，口渴或不渴，时有谵语，心烦不眠；或斑疹隐隐，舌绛而干，脉细数等。

清气化痰丸（《医方考》）

组成：黄芩 胆南星 枳实 陈皮 杏仁 瓜蒌仁 茯苓 半夏（姜汁为丸）

功效：清热化痰，下气止咳。

主治：痰热内结，证见咳嗽痰黄，粘稠难咯，胸膈痞满，甚则气急呕恶等。

清热保津法附方（《时病论》）

组成：鲜生地 鲜石斛 天花粉 麦冬 连翘 参叶

功效：清热，养阴，生津。

主治：温热有汗，风热化火，热病伤津，温症舌苔变黑等。

清瘟败毒饮（《疫疹一得》）

组成：生石膏 小生地 鲜竹叶 栀子 桔梗 赤芍 犀角 丹皮 玄参 知母 黄连 黄芩 连翘 甘草

功效：清热解毒、凉血养阴。

主治：温热病，肺胃热毒壅盛，气血两燔，证见大热烦躁，渴饮干呕，头痛却劈，昏狂谵语；或有吐衄斑疹；或惊厥并见，舌绛唇焦，脉洪数等。

清燥救肺汤（《医门法律》）

组成：杏仁 石膏 麦冬 桑叶 人参 麻仁 阿胶 枇杷叶 甘草

功效：清燥润肺。

主治：温燥伤肺，证见头痛，身热，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，鼻燥，心烦口渴，舌干无苔等。

清暑益气汤（《脾胃论》）

组成：黄芩 党参 苍术 麦冬 葛根 六曲 泽泻 白术 黄柏 青皮 当归 陈皮 五味子 升麻 甘草 生姜 大枣

功效：清暑益气，保肺生津，健脾燥湿。

主治：体质素弱，感受暑湿，头痛身热，微感形寒，口渴自汗，食少腹胀，气短声微，小便黄赤，大便溏薄，脉虚，苔薄腻。

羚羊角散（《和剂局方》）

组成：羚羊角 决明子 黄芩 龙胆草 升麻 甘草 车前子 梔子仁

功效：清肝明目，泻火解毒。

主治：大人小儿一切风热毒。上攻眼目，暴发赤肿；或生疮疼痛，隐涩羞明。

羚角钩藤汤（《通俗伤寒论》）

组成：羚羊角 霜桑叶 双钩藤 滁菊花 鲜生地 京贝母 生白芍 生甘草 淡竹茹 茯神木

功效：凉肝息风，增液舒筋。

主治：热病邪传厥阴，壮热神昏，烦闷躁扰，手足搐搦，发为痉厥。

续断丸（《扶寿精方》）

组成：续断 杜仲 牛膝 萆薢 木瓜 破故纸

功效：补肝肾、强筋骨、祛湿除痹。

主治：腰痛并脚痠腿软。

续随子丸（《圣济总录》）

组成：续随子 轻粉 青黛（糯米饭粘合成丸）

功效：逐水消癥。

主治：积聚癥块及涎积等。

接骨散（新方）

组成：乳香 没药 自然铜 血竭 土鳖虫 续断 当归 红花 骨碎补 木香

功效：活血祛瘀，续骨疗伤。

主治：跌打损伤，筋伤骨折。

十二画

琥珀散（《灵苑方》）

组成：琥珀 当归 莪术 乌药

功效：活血通经，祛瘀止痛。

主治：妇人少腹疼痛，气急胸闷，经闭不通。

琼玉膏（《医方集解》录申氏方）

组成：地黄 茯苓 人参 白蜜

功效：补气养阴，润肺止咳。

主治：渚虚百损，虚劳干咳。

款冬花汤（《圣济总录》）

组成：款冬花 杏仁 贝母 知母 桑白皮 五味子 炙甘草

功效：润肺止咳。

主治：暴发咳嗽。

葛根汤（《伤寒论》）

组成：葛根 麻黄 甘草 芍药 桂枝 生姜 大枣

功效：发汗解肌。

主治：太阳病，项背强几几，无汗恶风者。

葛根芩连汤（《伤寒论》）

组成：葛根 黄芩 黄连 炙甘草

功效：解表清里。

主治：外感表未解，热邪入里，证见身热下利，胸脘烦热，口干作渴等。

葛花解酲汤（《脾胃论》）

组成：葛花 人参 橘皮 白蔻仁 青皮 木香 猪苓 白茯苓 神曲 泽泻 白术 干生姜 砂仁

功效：清化湿热，化痰醒酒。

主治：饮酒太过，呕吐痰逆，心神烦乱，胸膈痞塞，手足战摇，饮食减少，小便不利。

葱豉汤（《肘后备急方》）

组成：葱白（连鬚） 淡豆豉

功效：通阳解表。

主治：外感风寒轻证

葶苈大枣泻肺汤（《金匱要略》）

组成：葶苈子 大枣

功效：泻肺行水，下气平喘。

主治：痰涎壅盛，咳喘胸满。

篇榧驱蛲汤（新方）

组成：篇蓄 榧子 槟榔

功效：驱虫。

主治：蛔虫、蛲虫病。

越鞠丸（《丹溪心法》）

组成：苍术 香附 抚芎 神曲 梔子

功效：行气解郁。

主治：气、血、痰、火、湿、食等郁结所致的胸膈痞闷，脘腹胀痛，吞酸呕吐，饮食不化等证。

越婢汤（《金匱要略》）

组成：麻黄 生姜 石膏 炙甘草 大枣

功效：宣肺泄热，利水消肿。

主治：风水证，证见发热或无大热，汗出或无汗，恶风，或渴，一身悉肿，脉浮等。

紫金錠（《惠直堂经验方》）

组成：山慈姑 山文蛤 千金子 当门子 雄黄 红芽大戟 朱砂

功效：辟秽化浊，清热解毒，活血消肿。

主治：瘟疫瘧疟，神志不清；或误食毒物，呕吐恶心，腹痛，泄泻，以及痈疽发背，疔肿恶疮等。

紫菀汤（王海藏方）

组成：紫菀 知母 贝母 阿胶 茯苓 梧梗 人参 五味子 甘草

功效：润肺化痰止咳。

主治：肺癆咳吐痰血。

紫雪丹（《和剂局方》）

组成：犀角屑 羚羊角屑 石膏 寒水石 磁石 滑石 沉香 青禾香 玄参 升麻 甘草 朱砂 丁香 朴硝 硝石 麝香 黄金

功效：清热解毒，镇痉开窍。

主治：温热病，邪热内陷心包所致的高热烦躁，神昏谵语，痉厥，以及小儿高热惊厥等。

紫葳散（《沈氏尊生书》）

组成：紫葳 当归 红花 赤芍 延胡索 刘寄奴 白芷 牡丹皮 肉桂

功效：活血通经。

主治：血滞经闭，发热腹胀。

黑锡丹（《和剂局方》）

组成：附子 肉桂 黑锡 硫黄 阳起石 破故纸 葫芦巴 金铃子 茴香 沉香 木香 肉豆蔻

功效：温肾阳，散阴寒，降逆气，定虚喘。

主治：真元不足，上盛下虚，痰盛气喘，汗出肢厥，脉沉微；或寒疝腹痛，男子阳萎精冷，女子血海虚寒等。

稀涎散（《传家秘宝》）

组成：明矾 猪芽皂荚

功效：豁痰开窍。

主治：风涎潮于上膈，痹气不通。

舒筋汤（《妇人良方》）

组成：羌活 海桐皮 当归 芍药 姜黄 白术 甘草

功效：活血祛风，通痹止痛。

主治：风湿所伤，肩臂作痛，经络不利及腰下作痛。

猬皮散（《寿世保元》）

组成：刺猬皮 木贼

功效：止血。

主治：便血。

痛泻要方（《景岳全书》引刘草窗方）

组成：防风 白芍 白术 陈皮

功效：疏肝补脾。

主治：肝郁脾虚，证见肠鸣腹痛，大便泻泄，泻必腹痛。

温经汤（《金匱要略》）

组成：当归 芍药 吴茱萸 生姜 芍药 人参 桂枝 阿胶 丹皮 半夏 麦冬 甘草

功效：温经散寒，养血调经。

主治：冲任虚寒瘀血阻滞之月经不调，或前或后，或逾期不止，或一月再行；傍晚发热，手心发热，唇口干燥；或小腹冷痛；或久不受孕等。

温胆汤（《千金方》）

组成：半夏 陈皮 茯苓 枳实 竹茹 生姜 大枣 甘草

功效：清胆和胃，化痰止咳。

主治：痰热上扰，胆胃不和，虚烦不眠，痰多呕吐，晕眩惊悸等。

温脾汤（《千金方》）

组成：人参 附子 干姜 大黄 甘草

功效：温补脾阳，攻逐寒积。

主治：冷积便秘，或久痢赤白，腹痛，手足不温，脉沉弦等。

普济消毒饮（《医方集解》录李东垣方）

组成：黄芩 黄连 陈皮 柴胡 桔梗 连翘 玄参 马勃 板蓝根 僵蚕 升麻 甘草 牛蒡子 薄荷

功效：清热解毒，疏风散邪。

主治：大头瘟，证见恶寒发热，头面红肿焮痛，咽喉不利，舌燥口渴等。

犀黄丸（《外科全生集》）

组成：犀黄 乳香 没药 麝香 黄米饭

功效：活血消肿。

主治：乳癌，横痃，瘰疬，痰核，流注，痈毒等。

犀角大青汤（《伤寒活人书括》）

组成：犀角 大青叶 栀子 淡豆豉

功效：清热解毒，凉血消斑。

主治：热毒发斑。

犀角地黄汤（《千金方》）

组成：犀角 生地 丹皮 赤芍

功效：清热解毒，凉血消瘀。

主治：热甚动血，血热妄行所致的吐衄，尿血，便血，斑色紫黑，舌绛起刺，或蓄血发狂等。

疏凿饮子（《济生方》）

组成：泽泻 赤小豆 槟榔 羌活 秦艽 茯苓皮 商陆 椒目 木通 大腹皮 生姜皮

功效：通二便、发汗行水。

主治：遍身水肿，喘息口渴，二便不利者。

十三画

蒿芩清胆汤（《重订通俗伤寒论》）

组成：青蒿脑 淡竹叶 仙半夏 赤茯苓 青子芩 生枳壳 陈广皮 碧玉散

功效：清胆利湿，和胃化痰。

主治：少阳湿热痰浊证，证见寒热如疟，寒轻热重，口苦膈闷，吐酸苦水，或呕吐黄涎而粘，甚则干呕呃逆，胸胁胀痛等。

暖肝煎（《景岳全书》）

组成：肉桂 沉香 乌药 当归 枸杞 小茴香 茯苓 生姜

功效：温补肝肾，行气散寒。

主治：肝肾阴寒，小腹疼痛，疝气等。

十四画

酸枣仁汤（《金匱要略》）

组成：酸枣仁 知母 茯苓 川芎 甘草

功效：养血安神，清热除烦。

主治：虚劳虚损不得眠。

截疟七宝饮（《杨氏家藏方》）

组成：常山 草果 槟榔 厚朴 青皮 陈皮 炙甘草

功效：燥湿劫痰。

主治：疟疾数发不止，痰湿盛而体壮者。

磁朱丸（《千金方》）

组成：磁石 朱砂 六曲

功效：摄纳浮阳，镇心明目。

主治：心肾不交所致的心悸失眠，耳聋耳鸣，视物昏花。亦治癫痫。

缩泉丸（《校注妇人良方》）

组成：益智仁 山药 乌药

功效：温肾祛寒，涩缩小便。

主治：下元虚冷，小便频数，及小儿遗尿。

豨桐丸（《养生经验合集》）

组成：豨荑草 臭梧桐

功效：平肝息风。

主治：中风口眼喎斜，半身不遂等证。

腐尽生肌散（《医宗金鉴》）

组成：儿茶 血竭 乳香 没药 冰片 麝香 旱三七

功效：敛疮生肌、止血。

主治：疮溃不敛。

十五画

增液汤（《温病条辨》）

组成：生地 玄参 麦冬

功效：增液润燥。

主治：阳明温病，津液不足，大便秘结者。

增液承气汤（《温病条辨》）

组成：生地 玄参 麦冬 大英 芒硝

功效：滋阴增液，泄热通便。

主治：阳明温病，热结阴亏，燥屎不行，下之不通者。

檗树根丸（《摄生众妙方》）

组成：黄柏 芍药 良姜 檗根皮

功效：利湿热、止带浊。

主治：湿热下注，赤白带下，淋漓腥臭。

撮风散（《证治准绳》）

组成：蜈蚣 蝎梢 钩藤 直僵蚕 朱砂 麝香

功效：祛风，通窍，镇痉。

主治：小儿撮口，手足抽搐。

镇肝息风汤（《医学衷中参西录》）

组成：生赭石 生牡蛎 生龙骨 生杭芍 怀牛膝 生龟板 玄参 天冬 川楝子 茵陈 生麦芽 甘草

功效：镇肝息风。

主治：阴虚阳亢，肝风内动所致的弦晕头痛，目胀耳鸣，或肢体不利，口眼歪斜，或弦晕颠仆，昏不知人等。

镇惊丸（《医部全录》）

组成：珍珠 真琥珀 辰砂 青皮 雄黄 生甘草 青黛 芦荟 柴胡 真礞石 天麻 乳香 胆星 天竺黄

功效：息风镇惊。

主治：急、慢惊风。

十六画

橘皮汤（《金匱要略》）

组成：橘皮 生姜

功效：温中理气，降逆止呕。

主治：胃失和降，恶心呕哕。

醒脾汤（《古今医统》）

组成：天麻 僵蚕 全蝎 白附子 人参 白术 茯苓 木香 生姜 大枣 甘草

功效：补气健脾，息风止痉。

主治：小儿慢惊。

醒消丸（《外野全生集》）

组成：乳香 没药 麝香 雄精

功效：活血散瘀，消肿止痛。

主治：红肿痈毒。

薏苡附子败酱散（《金匱要略》）

组成：薏苡仁 附子 败酱草

功效：排脓消肿。

主治：肠痈脓已成者。

十七画以上

薤白丸（《僧深集方》）

组成：香薷 白术

功效：健脾除湿，利水消肿。

主治：暴雨、风水、气水，遍身皆肿。

礞石滚痰丸（《养生主论》）

组成：青礞石（与焰硝同煅） 沉香 黄芩 大黄

功效：降火泻热，逐痰镇惊。

主治：实热顽痰，咳喘胸痞，大便秘结，以及癫狂等证。

藿香正气散（《和剂局方》）

组成：藿香 紫苏 白芷 半夏曲 厚朴（姜汁炙） 大腹皮 茯苓 白术
陈皮 苦桔梗 生姜 大枣 炙甘草

功效：解表和中，理气化浊。

主治：外感风寒、内伤湿滞，证见发热恶寒，头痛，胸膈痞闷，脘腹疼痛，恶心呕吐，肠鸣腹泄，舌苔白腻等。

藿朴夏苓汤（《医原》）

组成：藿香 半夏 厚朴 赤苓 淡豆豉 杏仁 生苡仁 白蔻仁 猪苓 泽泻

功效：芳香化浊，理气渗湿。

主治：湿温病初期，证见身热不渴，肢体倦怠，胸闷口腻，舌苔白滑，脉濡缓者。

鳖甲煎丸（《金匱要略》）

组成：鳖甲 乌扇 桃仁 大黄 廔虫 丹皮 柴胡 黄芩 鼠妇 干姜 芍药
葶苈 石苇 厚朴 瞿麦 紫葳 阿胶 蜂蜜 赤硝 蜣螂 半夏 人参 桂枝

功效：破血逐瘀，软坚消癥。

主治：久疟，疟母，肝脾肿大，胁肋疼痛。

蟾酥丸（《绛囊撮要》）

组成：蟾酥 上西黄 真茅术 朱砂 明雄黄 麝香 丁香

功效：辟秽化浊。

主治：诸般痧证。

蠲痹散（《妇人良方》）

组成：香附子 荔枝核

功效：行气止痛。

主治：血气刺痛。

蠲痹汤（《百一选方》）

组成：羌活 防风 姜黄 当归 黄芪 赤芍 炙甘草

功效：益气和营，除风祛湿。

主治：风痹，证见项背拘急，肩肘臂痛，举动艰难等。

蠲痹汤（《医学心悟》）

组成：羌活 秦艽 当归 桂心 海风藤 独活 川芎 木香 乳香 桑枝 炙甘草

功效：祛风、除湿、止痛。

电子版录入与校对

录入：

录入内容	志愿者	完成时间
第五章、第二十章	小易	2019年12月12日
第三章、第八章、第九章、第十章、第十一章、第十六章、第十八章	江东东	2019年12月12日
第二章、第十九章、方剂索引	小何	2019年12月12日
第四章	朱明轩	2019年12月12日
药性总义、第一章	李文强	2019年12月12日
第十二章、第十三章、第十四章、第十五章、第十七章	罗金群	2019年12月12日
第七章	王岐伯	2019年12月12日
第六章	王莹莹	2019年12月12日

一校：

组长：句号

任务	负责人 昵称	实际完成日期
第一章	可	20220701
第二章	可	20220701
第三章	yzh	20220701
第四章	可	20220701
第五章	五湖四海	20220625
第六章	诚哥哥	20220701
第七章	高立超	20220701
第八章	灶心土	20220628
第九章	句号	20220701
第十章	康宁诊所	20220701
第十一章	。、灶心土	
第十二章	NYZH	20220701
第十三章	张志勇	20220701
第十四章	之缶	20220701
第十五章	瑞	20220701
第十六章	云中漫步	20220701

任务	负责人 昵称	实际完成日期
第十七章	木风	20220701
第十八章	紫色水晶灵	20220701
第十九章	紫色水晶灵	20220701
第二十章	紫色水晶灵	20220701
本草第一章部分原文未加粗 小字加small 第七章 第九章	可	20220701
小字加small 第十一章部分 第十二章部分 第十三章	初商	20220701

更多信息

如需了解光明中医的更多信息，请扫码下面的二维码。



或者访问备用地址：www.gmzyjc.com/a

目录

编者	20
导言	21
编者的话	23
本草备要序	25
增补本草备要原序	27
本草备要凡例	29
药性总义	32
〔原文〕	33
〔讲解〕	37
一、药性：	38
二、配伍：	44
三、禁忌：	46
四、炮制：	47
五、用量：	49
各论	52
第一章解表药	53
第一节辛温解表药	55
麻黄	56
桂枝	60
紫苏	63
荆芥	65
防风	67
羌活	69
白芷	71
藁本	73
细辛	74
辛夷	76
苍耳子	77
香薷	79
生姜	81
葱白	83

胡芩	85
赤桤柳	86
鸡苏	87
第二节辛凉解表药	88
薄荷	89
牛蒡子	91
桑叶	93
甘菊花	94
蝉蜕	96
淡豆豉	98
蔓荆子	99
葛根	100
柴胡	102
升麻	105
浮萍	107
木贼	108
小结	109
第二章 泻下药	131
第一节攻下药	133
大黄	134
朴硝 芒硝 元明粉	137
芦荟	139
第二节润下药	140
大麻仁	141
郁李仁	142
海松子	143
蜂蜜	144
蓖麻子	146
第三节峻下逐水药	147
甘遂	148
大戟	150
芫花	152
薤花	153
巴豆	154
牵牛子	157
商陆	159

续随子	160
泽漆	161
小结	162
第三章清热药	172
第一节清热泻火药	174
石膏	175
知母	178
桅子	180
芦根	182
天花粉	183
竹叶	184
夏枯草	185
决明子	186
穀精草	187
密蒙花	188
青箱子	189
夜明砂	190
熊胆	191
西瓜	192
第二节 清热燥湿药	193
黄芩	194
黄连	196
黄柏	199
龙胆草	201
苦参	203
白鲜皮	205
秦皮	206
第三节清热凉血药	207
犀角	208
生地黄	210
干地黄	211
玄参	213
牡丹皮	215
紫草	217
童便	218
人中黄	219

人中白	220
芸苔	221
第四节清热解毒药	222
金银花	223
连翘	225
蒲公英	226
紫花地丁	228
大青叶	229
青黛	231
败酱草	232
土茯苓	233
马勃	235
山豆根	236
射干	237
白头翁	238
马齿苋	239
白蔹	240
漏芦	241
山慈姑	242
绿豆	243
菱	244
橄榄	245
梨	246
甘蔗	247
茶	248
芭蕉根	249
枳椇子	250
第五节清虚热药	251
青蒿	252
白薇	254
地骨皮	256
胡黄连	258
小结	259
第四章芳香化湿药	294
藿香	295
苍术	297

厚朴	299
砂仁	301
白豆蔻	303
草豆蔻	304
附：草果	305
小结	306
第五章利水渗湿药	309
茯苓	310
附：茯神	312
猪苓	313
泽泻	314
薏苡仁	316
车前草 车前子	318
滑石	320
木通	322
通草	324
篇蓄	325
石苇	326
瞿麦	327
海金沙	328
萆薢	329
茵陈	331
地肤子	332
冬葵子	333
冬瓜	334
附：冬瓜皮	335
赤小豆	336
灯草	338
淡竹叶	339
鲤鱼	340
小结	341
第六章祛风湿药	348
独活	350
威灵仙	352
防己	354

秦艽	356
木瓜	358
五加皮	360
桑寄生	362
白花蛇	363
乌梢蛇	365
蛇蜕	366
虎骨	367
豨莶草	368
海桐皮	370
原蚕沙	371
松节	372
络石藤	374
桑枝	375
石南叶	376
天仙藤	377
小结	378
第七章 温里药	384
附子 附：乌头 天雄	386
草乌头	390
肉桂 桂心	391
干姜 附：黑姜	394
吴茱萸	396
高良姜	398
附：红豆蔻	399
川椒	400
附：椒目	402
丁香	403
附：母丁香	404
茴香	405
胡椒	407
附：荜澄茄	408
荜茇	409
小结	410
第八章 开窍药	415

麝香	416
牛黄	418
冰片	420
苏合香	422
石菖蒲	423
安息香	425
小结	426
第九章安神药	429
第一节重镇安神药	430
朱砂	431
磁石	433
龙骨	435
龙齿	437
牡蛎	438
紫石英	440
金	441
铁	442
珍珠	443
琥珀	445
第二节养心安神药	447
酸枣仁	448
柏子仁	450
远志	452
合欢皮	454
小结	455
第十章平肝息风药	467
羚羊角	468
石决明	470
贝子	471
代赭石	472
钩藤钩	473
天麻	474
蚯蚓	476
僵蚕	478
全蝎	480

蜈蚣	481
小结	483
第十一章理气药	488
陈皮	490
青皮	493
枳实、枳壳	495
香附	497
木香	499
乌药	502
佛手	504
香橼	505
沉香	506
檀香	507
紫檀	508
川楝子	509
荔枝核	511
薤白	512
大腹皮	513
甘松香	514
山柰	515
刀豆	516
柿干	517
梅花	519
小结	520
第十二章活血祛瘀药	526
芎藭	528
延胡索	530
郁金	531
姜黄	533
蓬莪术	534
荆三棱	535
丹参	536
益母草	538
泽兰	540
桃仁	543

红花	545
鸡血藤	547
乳香	548
没药	550
穿山甲	551
王不留行	553
皂角刺	554
苏木	555
刘寄奴	556
自然铜	557
牛膝	558
五灵脂	560
降真香	562
凌霄花	563
枫脂香	564
马鞭草	565
干漆	566
小 结	567
活血祛瘀药功用归纳简表	569
第十三章止血药	579
大小蓟	581
侧柏叶	582
槐实	583
地榆	585
白茅根	586
苎麻根	588
藕	589
仙鹤草	590
白芨	591
棕榈	593
血余炭	594
三七	596
茜草	598
蒲黄	599
艾叶	600
卷柏	602

伏龙肝	603
百草霜	604
花乳石	605
小结	606
止血药功用归纳简表	608
第十四章消食药	614
山楂	615
麦芽	617
穀芽	618
神曲	619
鸡内金	620
莱菔(莱菔子)	621
小结	623
消食药功用归纳简表	624
第十五章驱虫药	626
使君子	628
槟榔	629
雷丸	631
鹤虱	632
芜荑	633
榧实	634
贯众	635
大蒜	636
小结	638
第十六章化痰止咳平喘药	642
第一节温化寒痰药	644
半夏	645
天南星	649
白附子	651
白芥子	653
旋覆花	655
白前	656
皂角 肥皂荚	657
第二节清化热痰药	659
前胡	660

桔梗	661
贝母	663
瓜蒌	665
竹茹	667
竹沥	668
荆沥	669
天竺黄	670
礞石	671
浮海石	672
海蛤壳	673
瓦楞子	674
海藻	675
昆布	676
胖大海	677
荸荠	678
薤白	679
胡桐泪	680
第三节止咳平喘药	681
杏仁	682
紫菀	684
款冬花	685
百部	687
桑白皮	688
葶苈子	689
马兜铃	690
枇杷叶	691
小结	692
第十七章补益药	711
第一节补气药	713
人参 人参芦	714
党参	718
西洋参	719
太子参	720
黄芪	721
白术	724
山药	726

白扁豆	728
甘草	729
大枣	732
第二节补阳药	733
鹿茸	734
巴戟天	737
肉苁蓉	738
锁阳	739
淫羊藿	740
仙茅	741
菟丝子	742
蒺藜子	744
破故纸	746
益智仁	747
杜仲	748
续断	750
狗脊	751
骨碎补	752
葫芦巴	753
冬虫夏草	754
蛤蚧	755
胡桃	756
紫河车	758
海狗肾	760
韭菜 韭子	761
阳起石	762
海马	763
羊肉	764
第三节补血药	766
熟地黄	767
何首乌	769
当归	772
白芍药 赤芍药	775
阿胶	778
黄明胶	780
龙眼肉	781

第四节补阴药	782
沙参	783
麦门冬	784
天门冬	786
石斛	788
菱蕤	789
黄精	791
百合	792
枸杞子 枸杞叶	793
旱莲草	794
女贞子	795
桑椹	796
楮实	797
落花生	798
龟版	799
鳖甲	801
胡麻	803
乌骨鸡	805
黑大豆	806
小结	807
补益药功用归纳简表	812
第十八章收敛药	849
山茱萸	851
五味子	852
五倍子	854
小麦	856
乌梅	858
肉豆蔻	860
诃子	861
赤石脂	863
禹余粮	864
石榴皮	865
海螵蛸	866
芡实	867
莲子	868
莲蕊鬚	870

荷叶	871
金樱子	872
覆盆子	873
桑螵蛸	874
椿樗白皮	875
白果	876
罂粟壳	877
刺猬皮	878
没石子	879
小结	880
第十九章涌吐药	888
瓜蒂	890
常山	892
胆矾	894
藜芦	895
小结	896
第二十章外用药及其他	899
雄黄	901
石硫黄	902
砒石	904
水银	905
轻粉	906
铅	907
密陀僧	909
硼砂	910
炉甘石	911
明矾	912
皂矾	914
斑蝥	915
蟾蜍	917
木鳖子	919
附：马钱子	920
血竭	921
樟脑	922
大风子	923

蛇床子	924
木槿皮	925
丝瓜	926
孩儿茶	927
阿魏	928
露蜂房	929
小结	930
补充药物归纳表	938
本书引用方剂索引	950
电子版录入与校对	1041
更多信息	1044