

Вариант 0.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(3; 5; 0; -1; 1)$, $\mathbf{a}_2(-9; -2; 3; 4; 2)$, $\mathbf{a}_3(-2; 1; 1; 1; 1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-4; -2; -5)$, $\mathbf{e}_2(-3; -1; -7)$, $\mathbf{e}_3(2; 1; 2)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-5; -1; -19)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-5; -1; -2)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(1; 2; -2; 2)$, $\mathbf{a}_2(1; 3; -2; 1)$, $\mathbf{a}_3(2; 1; -1; 1)$, $\mathbf{a}_4(1; 1; -1; 1)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-8; -10; 9; -8)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = (\mathbf{a}, \mathbf{x})\mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(-5; -2; -5)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -13 & 11 \\ -2 & 9 & -7 \\ -3 & 13 & -10 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & -2 & -2 \\ 4 & 1 & -2 \\ 14 & -4 & -4 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 - 3x_2^2 + 8x_2x_3 - 24x_3^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-9x^2 - 6xy - 2xz - y^2 + 6yz - 9z^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $2x^2 - 4xy - y^2 = 2$.

Вариант 1.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(1; -2; 1; 0; 1)$, $\mathbf{a}_2(1; 1; -2; -1; -1)$, $\mathbf{a}_3(-3; 3; 0; 1; -1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(3; -1; 1)$, $\mathbf{e}_2(-3; 2; -1)$, $\mathbf{e}_3(2; -1; 1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-9; 8; -4)$, в новом базисе $\mathbf{c}(3; 1; -3)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(2; -2; -1; 3)$, $\mathbf{a}_2(-2; 3; 2; -4)$, $\mathbf{a}_3(-1; 1; 1; -2)$, $\mathbf{a}_4(-1; 2; 1; -2)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-1; -3; -1; 0)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве $\mathcal{P}_2[t]$ многочленов степени не выше второй задан соотношением $A(f(t)) = 2\frac{d^2}{dt^2}f(t) - 6\frac{d}{dt}f(t) + 4f(t)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{1, t, t^2\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -2 & -8 & -4 \\ 10 & 10 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ 5 & 6 & 6 \\ -4 & -8 & -7 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-2x^2 - 4xy - 4xz - 4y^2 + 8yz - 21z^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-8x_1x_2 - 4x_1x_3 - 6x_2^2 + 2x_2x_3 - 2x_3^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $3x^2 + 4xy + 6y^2 = 3$.

Вариант 2.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-4; -1; 1; 3; -7)$, $\mathbf{a}_2(-1; 2; 1; 0; 2)$, $\mathbf{a}_3(2; -1; -1; -1; 1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(2; -1; 3)$, $\mathbf{e}_2(-1; 2; -5)$, $\mathbf{e}_3(2; 0; 1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-2; 5; -14)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-6; -1; 0)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-1; -1; 1; 3)$, $\mathbf{a}_2(1; 1; 1; -1)$, $\mathbf{a}_3(2; 1; 2; -1)$, $\mathbf{a}_4(1; 2; 2; -1)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-4; 1; 0; 3)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = [\mathbf{a} \times \mathbf{x}]$, где $\mathbf{a}(6; -6; 2)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -4 & -9 & 4 \\ -3 & -6 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & -4 & -2 \\ -4 & 0 & -8 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x^2 + 2xy + 4xz - 2y^2 + 2yz - 14z^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-8x_1x_2 + 4x_1x_3 - 6x_2^2 + 8x_2x_3 - 7x_3^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $4x^2 + 6xy - 4y^2 = 5$.

Вариант 3.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-1; 3; -1; -4; 2)$, $\mathbf{a}_2(1; -1; 0; 1; -1)$, $\mathbf{a}_3(-2; -4; 3; 7; -1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(3; -4; -5)$, $\mathbf{e}_2(1; -1; -1)$, $\mathbf{e}_3(-3; 0; -2)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(21; -14; -11)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-5; 0; 0)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-1; 1; 1; 1)$, $\mathbf{a}_2(-2; 3; 2; 3)$, $\mathbf{a}_3(-2; 1; 3; 2)$, $\mathbf{a}_4(-3; 1; 5; 3)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(7; 1; -14; -6)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве $\mathcal{P}_2[t]$ многочленов степени не выше второй задан соотношением $A(f(t)) = (3t - 2)\frac{d}{dt}f(t) - 4f(t)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{t^2, t, 1\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -11 & -5 & -9 \\ 14 & 7 & 12 \\ -4 & -4 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -12 & 0 & 6 \\ -15 & -2 & 9 \\ -15 & -2 & 9 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-2x^2 - 4xy - 4xz - 5y^2 + 2yz - 9z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $2x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 - x_2^2 + 4x_2x_3 + 2x_3^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $8x^2 - 4xy + 5y^2 = 2$.

Вариант 4.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(0; 1; -1; 2; 1)$, $\mathbf{a}_2(-1; 8; -6; 9; 2)$, $\mathbf{a}_3(-1; 1; 1; -5; -5)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(7; 5; 1)$, $\mathbf{e}_2(2; 1; 0)$, $\mathbf{e}_3(8; 6; 1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(22; 13; 2)$, в новом базисе $\mathbf{c}(3; -2; 3)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-1; -1; 1; 1)$, $\mathbf{a}_2(4; 2; -1; -3)$, $\mathbf{a}_3(-2; -1; 1; 2)$, $\mathbf{a}_4(-2; -2; 1; 1)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-2; 0; 0; 2)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. В базисе $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ вектор \mathbf{x} имеет координаты $\mathbf{x} = (a; b; c)$. Оператор A переводит вектор \mathbf{x} в вектор $A(\mathbf{x}) = (-5a - 4b - 9c; -9a - 5b - 7c; a - 9b - 8c)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в этом базисе.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -9 & 8 & -4 \\ -6 & 4 & -4 \\ 6 & -6 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 2 \\ -1 & -5 & -2 \\ 0 & -1 & -4 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-3x^2 - 6xy + 12xz - 7y^2 + 4yz - 19z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $x_1^2 + 6x_1x_2 - 2x_1x_3 - 7x_2^2 + 6x_2x_3 + x_3^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $-x^2 + 4xy + 2y^2 = 3$.

Вариант 5.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(1; 1; 2; -5; -5)$, $\mathbf{a}_2(1; -1; 0; -3; -1)$, $\mathbf{a}_3(-2; 1; -1; 7; 4)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-4; -5; 0)$, $\mathbf{e}_2(-3; -5; 1)$, $\mathbf{e}_3(1; 4; -2)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(14; 6; 8)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-5; 6; -3)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(3; -2; -2; 2)$, $\mathbf{a}_2(-2; 1; 2; -1)$, $\mathbf{a}_3(3; -2; -3; 1)$, $\mathbf{a}_4(4; -3; -4; 1)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(9; -8; -10; 0)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве $\mathcal{P}_2[t]$ многочленов степени не выше второй задан соотношением $A(f(t)) = (t+5)\frac{d}{dt}f(t) + 4f(t)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{t^2, t, 1\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -11 & -2 \\ 10 & -6 & 10 \\ -6 & 6 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ -10 & 5 & 4 \\ 0 & 2 & 7 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x^2 - 2xy + 2xz - 3y^2 - 2yz - 4z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 8x_2x_3 + 15x_3^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $5x^2 - 2xy + 5y^2 = 6$.

Вариант 6.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-2; 3; 4; 5; -1)$, $\mathbf{a}_2(-1; 4; 7; 4; -1)$, $\mathbf{a}_3(0; -5; -10; -3; 1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(1; 2; 1)$, $\mathbf{e}_2(4; 1; 1)$, $\mathbf{e}_3(0; -2; -1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-4; -10; -6)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-1; -5; -4)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-3; 2; 2; 3)$, $\mathbf{a}_2(-3; 1; 1; 3)$, $\mathbf{a}_3(-3; 2; 3; 2)$, $\mathbf{a}_4(-2; 1; 1; 2)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-2; 4; 6; 0)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве $\mathcal{P}_2[t]$ многочленов степени не выше второй задан соотношением $A(f(t)) = 5\frac{d^2}{dt^2}f(t) + 4\frac{d}{dt}f(t) + 6f(t)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{1, t, t^2\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -5 & -7 \\ 4 & -3 & -8 \\ -2 & 3 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -10 & -9 & 5 \\ -4 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-3x^2 - 6xy + 6xz - 5y^2 + 18yz - 24z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-2x_1^2 - 8x_1x_2 + 6x_1x_3 + 4x_2^2 - 12x_2x_3 + 10x_3^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $-6x^2 + 5xy + 6y^2 = 13$.

Вариант 7.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-1; 1; -1; 0; 2)$, $\mathbf{a}_2(-4; 5; -2; 1; 7)$, $\mathbf{a}_3(0; 1; 2; 1; -1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(3; 1; 1)$, $\mathbf{e}_2(8; 3; 3)$, $\mathbf{e}_3(4; 1; 2)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(0; -4; 4)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-6; 4; 0)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-1; 2; 2; 3)$, $\mathbf{a}_2(2; -3; -2; -5)$, $\mathbf{a}_3(1; -2; 1; -3)$, $\mathbf{a}_4(-1; 2; 1; 3)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(4; -5; -6; -9)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \text{Пр}_\mathbf{b} \mathbf{x}$, где $\mathbf{a}(1; -2; -2)$, $\mathbf{b}(-4; -6; 5)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -5 & -5 & -1 \\ 7 & 7 & 1 \\ 11 & 5 & -5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -10 & 1 & 15 \\ 9 & 2 & -10 \\ -8 & 0 & 11 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-3x^2 + 12xy + 6xz - 14y^2 - 8yz - 8z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-3x^2 + 8xy - 2xz - 9y^2 + 4yz - 7z^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $4x^2 + 4xy + 7y^2 = 8$.

Вариант 8.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(1; 1; -7; -3; -2)$, $\mathbf{a}_2(3; -2; -1; 1; -1)$, $\mathbf{a}_3(0; 1; -4; -2; -1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-6; 6; 5)$, $\mathbf{e}_2(-2; 5; 6)$, $\mathbf{e}_3(3; -4; -4)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(23; -7; 4)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-1; -4; -5)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(3; -1; -1; -1)$, $\mathbf{a}_2(-1; 1; 1; -1)$, $\mathbf{a}_3(-2; 2; 3; -3)$, $\mathbf{a}_4(-4; 1; 2; 1)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-10; 5; 9; -4)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \text{Пр}_{\mathbf{b}} \mathbf{x}$, где $\mathbf{a}(-4; 3; -3)$, $\mathbf{b}(-4; 2; 4)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 0 \\ -4 & -2 & 8 \\ 7 & -4 & -4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 8 & 9 & -5 \\ -4 & -2 & 2 \\ 10 & 15 & -7 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-3x^2 + 6xy + 12xz - 7y^2 - 4yz - 19z^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $x_1^2 - 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + x_2^2 + 2x_2x_3$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $3x^2 - 2xy + 3y^2 = 2$.

Вариант 9.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-1; -3; 1; -1; -3)$, $\mathbf{a}_2(-1; 3; -5; 2; 0)$, $\mathbf{a}_3(2; -4; 8; -3; 1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(3; 1; 1)$, $\mathbf{e}_2(2; 2; 1)$, $\mathbf{e}_3(8; 3; 3)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-19; -3; -7)$, в новом базисе $\mathbf{c}(1; 6; 1)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(3; -2; 2; 3)$, $\mathbf{a}_2(-1; 1; -1; -1)$, $\mathbf{a}_3(-4; 2; -1; -3)$, $\mathbf{a}_4(2; -1; 1; 2)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(4; -4; 6; 6)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \text{Пр}_{\mathbf{b}} \mathbf{x}$, где $\mathbf{a}(-3; -4; 3)$, $\mathbf{b}(-4; 1; 3)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -6 & 4 & -4 \\ -3 & 2 & -2 \\ 6 & -4 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -8 & 6 & 8 \\ 3 & -5 & -4 \\ -6 & 8 & 7 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-3x^2 + 6xy - 6xz - 5y^2 + 2yz - 9z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-8x_1^2 - 6x_1x_2 - 12x_1x_3 - 4x_2x_3 - 3x_3^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $7x^2 - 4xy + 7y^2 = 5$.

Вариант 10.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-2; -1; 1; 5; -3)$, $\mathbf{a}_2(0; -5; 1; -1; 1)$, $\mathbf{a}_3(-1; 2; 0; 3; -2)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(1; 1; 0)$, $\mathbf{e}_2(1; 2; -1)$, $\mathbf{e}_3(-2; 0; -1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-14; 4; -10)$, в новом базисе $\mathbf{c}(4; 5; 0)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(1; -1; -1; 2)$, $\mathbf{a}_2(-1; 2; 2; -4)$, $\mathbf{a}_3(2; 1; 2; -3)$, $\mathbf{a}_4(-1; -1; -2; 3)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(0; 1; 3; -4)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \text{Пр}_{\mathbf{b}} \mathbf{x}$, где $\mathbf{a}(2; 6; 1)$, $\mathbf{b}(1; 5; 1)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -13 & 10 & 6 \\ -9 & 4 & 3 \\ 4 & -2 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 & -6 & 8 \\ 7 & -5 & 6 \\ 1 & -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-2x^2 - 4xy + 8xz - 6y^2 - 15z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $3x_1^2 - 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 6x_2^2 + 4x_2x_3 + 3x_3^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $6x^2 - 8xy + 6y^2 = 1$.

Вариант 11.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(3; 0; 2; -1; 4)$, $\mathbf{a}_2(3; 9; -1; -4; 7)$, $\mathbf{a}_3(-1; 1; -1; 0; -1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-2; 0; -3)$, $\mathbf{e}_2(2; -1; 4)$, $\mathbf{e}_3(1; 1; 1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(0; 4; -1)$, в новом базисе $\mathbf{c}(0; 3; 1)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(1; 1; 2; -1)$, $\mathbf{a}_2(1; 2; 3; -2)$, $\mathbf{a}_3(1; 1; 3; -3)$, $\mathbf{a}_4(2; 3; 3; 1)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(2; 5; 6; -3)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = [\mathbf{x} \times \mathbf{a}]$, где $\mathbf{a}(-4; 2; 5)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 5 & 7 \\ -3 & 8 & 12 \\ 2 & -6 & -9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 6 \\ -2 & 4 & 6 \\ 1 & -3 & -5 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 3x_2^2 + 10x_2x_3 - 20x_3^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $7x^2 + 8xy + 8xz + y^2 + 4yz + 8z^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $4x^2 + 6xy - 4y^2 = 5$.

Вариант 12.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(9; -3; 7; -1; 6)$, $\mathbf{a}_2(-2; 1; -1; 0; -1)$, $\mathbf{a}_3(-5; 1; -5; 1; -4)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-1; 1; -3)$, $\mathbf{e}_2(-8; 6; -1)$, $\mathbf{e}_3(-4; 3; 0)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-8; 7; -10)$, в новом базисе $\mathbf{c}(0; -3; -3)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(1; -2; 1; -4)$, $\mathbf{a}_2(-1; 3; -1; 5)$, $\mathbf{a}_3(-1; 2; 2; 1)$, $\mathbf{a}_4(-1; 2; 1; 2)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-3; 8; 8; 3)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве $\mathcal{P}_2[t]$ многочленов степени не выше второй задан соотношением $A(f(t)) = 3\frac{d^2}{dt^2}f(t) + 4\frac{d}{dt}f(t) - 3f(t)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{1, t, t^2\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 15 & -6 & -2 \\ 12 & 13 & 17 \\ -4 & -17 & -19 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 8 & 12 & 0 \\ -6 & -10 & -1 \\ 6 & 8 & -1 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x_1^2 + 6x_1x_2 + 2x_1x_3 - 10x_2^2 - 4x_2x_3 - 3x_3^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $7x_1^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2^2 + 2x_2x_3 + 4x_3^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $-x^2 + 8xy + 5y^2 = 21$.

Вариант 13.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(5; 2; 10; -1; -3)$, $\mathbf{a}_2(-5; -1; -10; 1; 3)$, $\mathbf{a}_3(-4; 0; -9; 1; 4)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(3; 0; 5)$, $\mathbf{e}_2(-1; -1; -1)$, $\mathbf{e}_3(3; 7; 0)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(12; 15; 9)$, в новом базисе $\mathbf{c}(5; 4; -3)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(2; -1; -1; -3)$, $\mathbf{a}_2(3; -1; -1; -4)$, $\mathbf{a}_3(-3; 1; 2; 3)$, $\mathbf{a}_4(-4; -1; 3; -1)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-8; -3; 6; -4)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. В базисе $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ вектор \mathbf{x} имеет координаты $\mathbf{x} = (x_1; x_2; x_3)$. Оператор A переводит вектор \mathbf{x} в вектор $A(\mathbf{x}) = (-x_1 + 2x_2 - 9x_3; 2x_1 - 2x_2 + 5x_3; -3x_1 + 9x_2 + 7x_3)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в этом базисе.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 7 & 1 \\ -12 & -9 & 0 \\ 12 & 6 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -15 & 4 & -14 \\ -8 & 3 & -7 \\ 16 & -4 & 15 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-2x_1^2 + 8x_1x_2 + 4x_1x_3 - 11x_2^2 + 4x_2x_3 - 16x_3^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $4x_1^2 - 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + x_2^2 - 4x_2x_3 + 4x_3^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $-x^2 - 6xy + 7y^2 = 7$.

Вариант 14.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(1; 1; 2; 1; 0)$, $\mathbf{a}_2(0; 3; 5; 4; -1)$, $\mathbf{a}_3(-3; 3; 4; 5; -2)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(2; -5; -5)$, $\mathbf{e}_2(1; -2; -2)$, $\mathbf{e}_3(2; -6; -5)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(5; -19; -13)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-3; -4; 4)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(1; -1; 1; -1)$, $\mathbf{a}_2(2; -2; 1; -2)$, $\mathbf{a}_3(1; -1; -2; -1)$, $\mathbf{a}_4(-2; 3; -1; 4)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(3; -5; 8; -7)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве $\mathcal{P}_2[t]$ многочленов степени не выше второй задан соотношением $A(f(t)) = 2\frac{d^2}{dt^2}f(t) - \frac{d}{dt}f(t) + 2f(t)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{t^2, t, 1\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -9 \\ -3 & -8 & 9 \\ -12 & -16 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -4 \\ -15 & 0 & 0 \\ -7 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-2x^2 + 8xy + 12xz - 9y^2 - 20yz - 23z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $x_1^2 + 2x_1x_3 + x_2^2 - 4x_2x_3 - 3x_3^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $8x^2 - 4xy + 5y^2 = 6$.

Вариант 15.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(0; 2; 5; -1; -1)$, $\mathbf{a}_2(-2; 4; 1; -5; -1)$, $\mathbf{a}_3(1; -1; 2; 2; 0)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(3; 5; -7)$, $\mathbf{e}_2(1; 4; -4)$, $\mathbf{e}_3(-2; 2; 1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-2; 20; -11)$, в новом базисе $\mathbf{c}(6; 2; 1)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-1; -1; -1; 2)$, $\mathbf{a}_2(2; 1; 1; -3)$, $\mathbf{a}_3(-3; -1; 2; 1)$, $\mathbf{a}_4(3; 1; -1; -2)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(0; 1; 2; -2)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \text{Пр}_{\mathbf{b}} \mathbf{x}$, где $\mathbf{a}(-2; -5; -6)$, $\mathbf{b}(-4; 3; 4)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -15 & 7 & -6 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & -6 & 15 \\ -3 & -5 & 15 \\ -2 & -4 & 11 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x^2 + 4xy - 2xz - 5y^2 + 2yz - 3z^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-3x_1^2 - 4x_1x_3 - 3x_2^2 - 4x_2x_3 - 10x_3^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $-2x^2 - 8xy - 2y^2 = 3$.

Вариант 16.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(0; -2; -7; 1; 1)$, $\mathbf{a}_2(1; 3; 10; -1; -2)$, $\mathbf{a}_3(-1; 1; 4; -1; 0)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-3; -2; -5)$, $\mathbf{e}_2(2; 1; 5)$, $\mathbf{e}_3(-4; -3; -4)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(14; 11; 7)$, в новом базисе $\mathbf{c}(2; 1; 0)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(1; 1; 2; 3)$, $\mathbf{a}_2(1; 2; 3; 4)$, $\mathbf{a}_3(-1; -2; -2; -2)$, $\mathbf{a}_4(-1; -1; -1; -1)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(3; 5; 10; 15)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \text{Пр}_{\mathbf{b}} \mathbf{x}$, где $\mathbf{a}(-3; 2; -2)$, $\mathbf{b}(2; 6; -2)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -3 & 5 \\ 16 & -8 & 14 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -6 & -4 & -2 \\ 4 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x_1^2 + 6x_1x_2 - 2x_1x_3 - 10x_2^2 + 4x_2x_3 - 4x_3^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-4x^2 + 8xy - 2xz + 2y^2 - 4yz$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $5x^2 + 8xy - y^2 = 2$.

Вариант 17.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-10; -4; -1; 7; 5)$, $\mathbf{a}_2(3; 1; 1; -2; -2)$, $\mathbf{a}_3(-1; 0; -1; -1; 2)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-4; -5; 6)$, $\mathbf{e}_2(1; 3; -4)$, $\mathbf{e}_3(1; -2; 3)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-14; -15; 17)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-3; 5; 2)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(1; -1; 2; 2)$, $\mathbf{a}_2(-1; 2; -4; -2)$, $\mathbf{a}_3(2; -2; 5; 3)$, $\mathbf{a}_4(-2; 1; -2; -4)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(3; -3; 8; 4)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = [\mathbf{a} \times \mathbf{x}]$, где $\mathbf{a}(-5; -1; -4)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 6 & 2 \\ -15 & 14 & 3 \\ 6 & -6 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 5 & -10 & 11 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x^2 + 4xy + 6xz - 6y^2 - 4yz - 19z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-4x^2 + 2xy + 4xz - 4y^2 + 4yz - z^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $7x^2 - 2xy + 7y^2 = 8$.

Вариант 18.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(1; 1; -1; 2; 0)$, $\mathbf{a}_2(-1; 4; 3; -7; -1)$, $\mathbf{a}_3(1; 6; 1; -3; -1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(5; 4; -2)$, $\mathbf{e}_2(6; 3; -2)$, $\mathbf{e}_3(0; 4; -1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(15; 7; -5)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-3; -6; 0)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(1; -1; -1; 1)$, $\mathbf{a}_2(-1; 3; 3; -3)$, $\mathbf{a}_3(3; -2; -1; 3)$, $\mathbf{a}_4(1; -2; -2; 2)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-5; 1; 0; -2)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. В базисе $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ вектор \mathbf{x} имеет координаты $\mathbf{x} = (x_1; x_2; x_3)$. Оператор A переводит вектор \mathbf{x} в вектор $A(\mathbf{x}) = (x_1 + 7x_2 - 8x_3; -9x_1 - 2x_2 + 5x_3; 9x_1 + 7x_2 + 6x_3)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в этом базисе.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 13 & -1 & -6 \\ 14 & 1 & -8 \\ 16 & -1 & -7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -18 & -2 & -6 \\ 12 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-2x_1^2 + 8x_1x_2 - 4x_1x_3 - 10x_2^2 + 16x_2x_3 - 13x_3^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $14x_1^2 - 16x_1x_2 + 8x_1x_3 + 2x_2^2 - 4x_2x_3 - x_3^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $7x^2 + 2xy + 7y^2 = 12$.

Вариант 19.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-2; -1; 0; 2; -1)$, $\mathbf{a}_2(-5; -1; 3; -1; 2)$, $\mathbf{a}_3(3; 1; -1; -1; 0)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-1; 2; -2)$, $\mathbf{e}_2(-1; 1; -1)$, $\mathbf{e}_3(-1; 5; -4)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-6; 16; -15)$, в новом базисе $\mathbf{c}(5; 0; -3)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(2; -1; 3; -1)$, $\mathbf{a}_2(-1; 1; -2; 1)$, $\mathbf{a}_3(-1; 1; -1; 2)$, $\mathbf{a}_4(2; -2; 1; -5)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(6; -5; 3; -13)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = (\mathbf{a}, \mathbf{x})\mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(6; -2; 3)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -5 \\ -12 & 0 & 18 \\ 4 & -2 & -11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -6 & -10 & -13 \\ -5 & 0 & -6 \\ 15 & 6 & 20 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-4x^2 + 8xy - 8xz - 8y^2 - 11z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-3x_1^2 + 6x_1x_3 - 3x_2^2 + 2x_2x_3 - 12x_3^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $-2x^2 + 6xy - 2y^2 = 3$.

Вариант 20.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(1; 4; 2; -3; 1)$, $\mathbf{a}_2(1; 8; 6; 5; -3)$, $\mathbf{a}_3(0; -1; -1; -2; 1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(3; 1; 1)$, $\mathbf{e}_2(7; 3; 2)$, $\mathbf{e}_3(6; 3; 2)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(4; 2; 3)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-1; -2; 6)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(2; -2; -1; -1)$, $\mathbf{a}_2(3; -3; -1; -1)$, $\mathbf{a}_3(-1; 3; 1; 3)$, $\mathbf{a}_4(3; -4; -1; -2)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-9; 8; 2; 1)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве $\mathcal{P}_2[t]$ многочленов степени не выше второй задан соотношением $A(f(t)) = 3\frac{d^2}{dt^2}f(t) + 2\frac{d}{dt}f(t) + 2f(t)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{t^2, t, 1\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -6 & -20 & -4 \\ 6 & 16 & 2 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -6 & 3 & 3 \\ -3 & -2 & 4 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-4x_1^2 + 8x_1x_2 - 8x_1x_3 - 7x_2^2 + 20x_2x_3 - 18x_3^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-14x^2 - 8xy + 8xz + y^2 + 2yz + z^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $-3x^2 - 6xy + 5y^2 = 8$.

Вариант 21.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-3; 0; -2; 1; -1)$, $\mathbf{a}_2(-5; -2; -4; 7; -1)$, $\mathbf{a}_3(2; -1; 1; 2; 1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(4; 1; -6)$, $\mathbf{e}_2(-2; 1; 5)$, $\mathbf{e}_3(-1; 0; 2)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-11; -11; 6)$, в новом базисе $\mathbf{c}(1; 0; 1)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(1; 1; 1; -1)$, $\mathbf{a}_2(-1; 2; -1; 4)$, $\mathbf{a}_3(1; -1; 2; -3)$, $\mathbf{a}_4(-1; 1; -1; 3)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(0; 1; 3; 1)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве $\mathcal{P}_2[t]$ многочленов степени не выше второй задан соотношением $A(f(t)) = -4\frac{d^2}{dt^2}f(t) - 3\frac{d}{dt}f(t) + f(t)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{1, t, t^2\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -4 & 4 \\ 4 & -11 & 8 \\ 4 & -8 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -17 & -7 & 16 \\ 19 & 11 & -17 \\ -16 & -5 & 15 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-2x^2 + 8xy - 4xz - 10y^2 + 20yz - 21z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-10x_1^2 - 6x_1x_2 - 6x_1x_3 - 2x_2^2 - 2x_2x_3 - 2x_3^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $2x^2 - 4xy + 5y^2 = 2$.

Вариант 22.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(5; 1; 0; -4; -2)$, $\mathbf{a}_2(2; 3; 3; -2; -1)$, $\mathbf{a}_3(-5; -6; -5; 5; 2)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(5; 0; -2)$, $\mathbf{e}_2(-7; 1; 2)$, $\mathbf{e}_3(-4; 1; 1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-20; 5; 4)$, в новом базисе $\mathbf{c}(5; -6; 6)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-1; -1; 2; 3)$, $\mathbf{a}_2(2; 2; -3; -5)$, $\mathbf{a}_3(-1; 1; -1; -2)$, $\mathbf{a}_4(2; 1; -2; -3)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(3; 3; -6; -9)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = [\mathbf{x} \times \mathbf{a}]$, где $\mathbf{a}(2; -6; 1)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 8 & 9 \\ -8 & -12 & -9 \\ 4 & 8 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 6 & -4 \\ -12 & -3 & -4 \\ -12 & -6 & -2 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-2x^2 + 8xy - 4xz - 9y^2 + 12yz - 8z^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $3x^2 - 8xy + 4xz + 3y^2 - 4yz$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $10x^2 + 8xy + 10y^2 = 7$.

Вариант 23.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(1; 0; 1; 3; -3)$, $\mathbf{a}_2(-1; 1; 1; -1; -2)$, $\mathbf{a}_3(5; -3; -1; 9; 0)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-5; 6; 3)$, $\mathbf{e}_2(5; -6; -2)$, $\mathbf{e}_3(6; -7; -1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-18; 22; 13)$, в новом базисе $\mathbf{c}(0; -3; -2)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(2; 1; -1; 2)$, $\mathbf{a}_2(1; 1; -1; 2)$, $\mathbf{a}_3(-3; -1; 2; -3)$, $\mathbf{a}_4(-3; -1; 3; -4)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(13; 4; -9; 13)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = (\mathbf{x}, \mathbf{a})\mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-4; 6; 4)$, $\mathbf{b}(3; 2; -2)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 2 \\ 3 & -4 & 1 \\ -9 & 6 & -5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -5 & -3 & -6 \\ 2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-4x^2 - 8xy - 8xz - 6y^2 + 4yz - 25z^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-x^2 + 4xy - 4xz - 4y^2 - 2yz - 4z^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $5x^2 - 4xy + 2y^2 = 10$.

Вариант 24.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(3; -1; 3; 4; -1)$, $\mathbf{a}_2(-2; 1; -3; -4; 1)$, $\mathbf{a}_3(-4; 2; -8; -9; 3)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(1; 3; 1)$, $\mathbf{e}_2(-6; 1; -1)$, $\mathbf{e}_3(-4; 3; 0)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-14; 7; -1)$, в новом базисе $\mathbf{c}(6; 4; 0)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-1; -2; -2; 1)$, $\mathbf{a}_2(-1; -1; -1; 1)$, $\mathbf{a}_3(-1; 3; 4; 2)$, $\mathbf{a}_4(1; 3; 3; -1)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-5; -14; -15; 4)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве $\mathcal{P}_2[t]$ многочленов степени не выше второй задан соотношением $A(f(t)) = (t+4)\frac{d}{dt}f(t) - 6f(t)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{1, t, t^2\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -7 & 0 & -2 \\ 6 & -4 & 4 \\ 6 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -7 & -11 & 14 \\ -7 & -9 & 13 \\ -10 & -14 & 19 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x^2 - 2xy + 6xz - 3y^2 + 10yz - 13z^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-6x_1^2 - 2x_1x_3 - 6x_2^2 + 4x_2x_3 - 2x_3^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $5x^2 + 6xy - 3y^2 = 10$.

Вариант 25.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(3; 7; 1; 1; -2)$, $\mathbf{a}_2(-1; 1; -1; 1; 0)$, $\mathbf{a}_3(2; 3; 1; 0; -1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-1; 0; -2)$, $\mathbf{e}_2(-1; -1; 2)$, $\mathbf{e}_3(-1; -1; 3)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-9; -2; -5)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-3; -4; -5)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-1; 4; -2; 3)$, $\mathbf{a}_2(-1; 3; -1; 1)$, $\mathbf{a}_3(1; -2; 1; -1)$, $\mathbf{a}_4(-2; 4; -3; 4)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-7; 11; -6; 5)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = (\mathbf{a}, \mathbf{x})\mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-2; 3; 5)$, $\mathbf{b}(6; 3; 1)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 6 & 4 \\ -3 & -3 & 0 \\ -3 & -9 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -14 \\ 3 & 0 & 10 \\ 2 & -1 & 8 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-4x_1^2 - 8x_1x_2 + 8x_1x_3 - 7x_2^2 + 20x_2x_3 - 20x_3^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-2x^2 + 6xz - 2y^2 - 4yz + 10z^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $-2x^2 + 4xy + y^2 = 6$.

Вариант 26.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-2; -5; -1; -1; 1)$, $\mathbf{a}_2(3; 9; -2; 0; -2)$, $\mathbf{a}_3(1; 1; 4; 2; 0)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(4; 0; 7)$, $\mathbf{e}_2(1; -2; -1)$, $\mathbf{e}_3(3; -3; 1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(1; -5; -5)$, в новом базисе $\mathbf{c}(4; 2; 0)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-2; 3; -2; 2)$, $\mathbf{a}_2(-1; 1; -1; 1)$, $\mathbf{a}_3(-3; 4; -2; 4)$, $\mathbf{a}_4(-3; 2; -4; 2)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(5; -10; 1; -9)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. В базисе $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ вектор \mathbf{x} имеет координаты $\mathbf{x} = (a; b; c)$. Оператор A переводит вектор \mathbf{x} в вектор $A(\mathbf{x}) = (-6a + 9b + 7c; -7a + 5b + 3c; 5b - 4c)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в этом базисе.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & -1 \\ 16 & 0 & 8 \\ -6 & 6 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & -15 & -3 \\ 1 & -1 & -1 \\ -1 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-2x^2 - 4xy + 12xz - 3y^2 + 10yz - 20z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $2x^2 + 4xy + 4xz - y^2 - 8yz - z^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $2x^2 - 4xy + 5y^2 = 1$.

Вариант 27.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(1; -2; -1; 1; 0)$, $\mathbf{a}_2(3; -3; 3; -4; 1)$, $\mathbf{a}_3(-5; 7; -1; 2; -1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(1; 1; -1)$, $\mathbf{e}_2(-2; 1; 3)$, $\mathbf{e}_3(0; 2; 1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(0; -5; -2)$, в новом базисе $\mathbf{c}(0; -6; 6)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-1; -1; 1; -3)$, $\mathbf{a}_2(-1; 2; -1; 2)$, $\mathbf{a}_3(-2; -1; 1; -4)$, $\mathbf{a}_4(2; 2; -1; 5)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(2; 1; -1; 4)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = (\mathbf{x}, \mathbf{a})\mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-1; -3; 2)$, $\mathbf{b}(4; 3; 5)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 19 & 10 \\ -4 & 17 & 7 \\ 4 & -13 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 16 & 7 & -6 \\ -14 & -5 & 6 \\ 4 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x^2 + 4xy + 4xz - 6y^2 + 4yz - 23z^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $2x^2 + 8xy - 4xz + 2y^2 - 4yz - z^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $5x^2 + 4xy + 8y^2 = 2$.

Вариант 28.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-1; -1; 0; -1; 2)$, $\mathbf{a}_2(0; 1; -1; -1; 1)$, $\mathbf{a}_3(-3; -4; 1; -2; 5)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-1; -2; 1)$, $\mathbf{e}_2(-2; 2; 1)$, $\mathbf{e}_3(-2; 1; 1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-2; 5; 1)$, в новом базисе $\mathbf{c}(0; -2; 3)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(2; -1; 1; 1)$, $\mathbf{a}_2(-1; 2; -2; -2)$, $\mathbf{a}_3(1; -2; 3; 1)$, $\mathbf{a}_4(1; -1; 1; 1)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(7; -5; 8; 2)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. В базисе $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ вектор \mathbf{x} имеет координаты $\mathbf{x} = (x_1; x_2; x_3)$. Оператор A переводит вектор \mathbf{x} в вектор $A(\mathbf{x}) = (-6x_1 - 2x_2 - 8x_3; -8x_1 - 7x_2 - 8x_3; -9x_1 + 9x_2 + 7x_3)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в этом базисе.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -13 & -6 & 15 \\ 4 & 1 & -5 \\ -8 & -4 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 2 & -12 \\ -4 & -1 & 12 \\ 8 & 4 & -11 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-2x_1^2 + 12x_1x_2 + 4x_1x_3 - 20x_2^2 - 8x_2x_3 - 7x_3^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-3x_1^2 - 8x_1x_2 - 2x_1x_3 - 18x_2^2 - 8x_2x_3 - 3x_3^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $4x^2 + 8xy - 2y^2 = 3$.

Вариант 29.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(3; -5; 3; 1; -2)$, $\mathbf{a}_2(1; -1; -1; 1; 0)$, $\mathbf{a}_3(1; -2; 2; 0; -1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-1; -2; 0)$, $\mathbf{e}_2(-2; 5; -5)$, $\mathbf{e}_3(1; 0; 1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(11; -5; 15)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-5; -2; 2)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-1; 1; -4; 2)$, $\mathbf{a}_2(-1; 1; -1; 2)$, $\mathbf{a}_3(1; -2; 1; -3)$, $\mathbf{a}_4(1; -1; 6; -2)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(4; -6; 10; -10)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. В базисе $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ вектор \mathbf{x} имеет координаты $\mathbf{x} = (x_1; x_2; x_3)$. Оператор A переводит вектор \mathbf{x} в вектор $A(\mathbf{x}) = (-9x_1 + 4x_2 + 3x_3; -6x_1 - 9x_2 - 9x_3; -9x_1 + x_3)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в этом базисе.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & -1 \\ -7 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -12 \\ -4 & 0 & 14 \\ 2 & -2 & -11 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x^2 + 4xy - 2xz - 5y^2 + 6yz - 3z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-2x_1^2 - 2x_1x_2 - 4x_1x_3 - 2x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $8x^2 + 4xy + 5y^2 = 4$.

Вариант 30.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-1; -7; 0; -2; -1)$, $\mathbf{a}_2(2; 2; -3; 1; -1)$, $\mathbf{a}_3(0; 4; 1; 1; 1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-1; -6; -5)$, $\mathbf{e}_2(0; 2; 1)$, $\mathbf{e}_3(1; -5; -1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-10; 4; -15)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-6; -1; -6)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(3; -2; 2; 2)$, $\mathbf{a}_2(-4; 3; -3; -2)$, $\mathbf{a}_3(-3; 3; -2; -1)$, $\mathbf{a}_4(-2; 1; -1; -2)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-10; 9; -8; -3)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = (\mathbf{a}, \mathbf{x})\mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(-4; -4; 6)$, $\mathbf{b}(2; -6; 2)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -4 & -6 \\ 3 & 0 & 2 \\ 9 & 4 & 13 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ -5 & 4 & -7 \\ -6 & 2 & -7 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x_1^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 3x_2^2 + 2x_2x_3 - 5x_3^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $8xy + 2xz - 6y^2 - 4yz - 4z^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $-x^2 + 4xy + 2y^2 = 9$.

Вариант 31.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-3; 2; 0; -1; 3)$, $\mathbf{a}_2(-2; -1; 1; 1; 4)$, $\mathbf{a}_3(-8; 4; 1; -4; 8)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(2; -1; 3)$, $\mathbf{e}_2(1; -2; 2)$, $\mathbf{e}_3(0; -7; 2)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-7; -18; -4)$, в новом базисе $\mathbf{c}(3; 0; -3)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-1; 2; -2; 2)$, $\mathbf{a}_2(1; -1; 1; -1)$, $\mathbf{a}_3(3; -4; 3; -2)$, $\mathbf{a}_4(2; -3; 3; -3)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-7; 10; -7; 4)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = [\mathbf{a} \times \mathbf{x}]$, где $\mathbf{a}(1; -1; -3)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} 12 & -3 & -18 \\ 2 & -1 & -4 \\ 5 & -1 & -7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 1 & -5 & -1 \\ -5 & 2 & -5 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-2x^2 + 8xy + 4xz - 10y^2 - 4yz - 7z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $10x^2 + 12xy - 6xz + 5y^2 - 4yz + 2z^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $3x^2 - 4xy + 6y^2 = 2$.

Вариант 32.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(8; -1; 2; -3; -5)$, $\mathbf{a}_2(1; 0; 1; -2; -2)$, $\mathbf{a}_3(-6; 1; 0; -1; 1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-2; -1; 2)$, $\mathbf{e}_2(3; 2; 2)$, $\mathbf{e}_3(3; 2; 1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(18; 13; 17)$, в новом базисе $\mathbf{c}(5; 5; 0)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(1; 1; 1; 1)$, $\mathbf{a}_2(1; 2; 1; 1)$, $\mathbf{a}_3(2; 5; 3; 1)$, $\mathbf{a}_4(-3; -2; -1; -5)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(5; -4; -4; 14)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. В базисе $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ вектор \mathbf{x} имеет координаты $\mathbf{x} = (x_1; x_2; x_3)$. Оператор A переводит вектор \mathbf{x} в вектор $A(\mathbf{x}) = (-5x_1 + 9x_2 - 3x_3; -x_1 + 4x_2 - 7x_3; -4x_1 + 9x_2 + 2x_3)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в этом базисе.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -8 & 10 & 3 \\ -3 & 3 & 2 \\ 5 & -11 & -7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 5 & 8 \\ -2 & 14 & 4 \\ -2 & -8 & 5 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-2x^2 + 8xy - 4xz - 10y^2 + 12yz - 5z^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $4x^2 + 4xy - 8xz + 7y^2 + 4yz + 4z^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $7x^2 - 10xy + 7y^2 = 2$.

Вариант 33.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-4; -3; -3; 4; -1)$, $\mathbf{a}_2(6; 2; 7; -2; 1)$, $\mathbf{a}_3(-5; -2; -6; 3; -1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(1; 1; 0)$, $\mathbf{e}_2(-1; -2; -1)$, $\mathbf{e}_3(-2; -3; -2)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(1; -1; -7)$, в новом базисе $\mathbf{c}(0; 6; -3)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(1; -1; 1; -2)$, $\mathbf{a}_2(2; -1; 2; -4)$, $\mathbf{a}_3(-3; 1; -2; 5)$, $\mathbf{a}_4(1; 3; 2; -3)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-2; 4; 1; 1)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = (\mathbf{a}, \mathbf{x})\mathbf{a}$, где $\mathbf{a}(-2; 5; -1)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -13 & 15 & -8 \\ -7 & 13 & -8 \\ 20 & -12 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 12 \\ -4 & 9 & 10 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x^2 - 2xy + 2xz - 3y^2 + 10yz - 11z^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $-x_1^2 + 12x_1x_3 - x_2^2 - 8x_2x_3 + 8x_3^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $-4x^2 - 8xy + 2y^2 = 3$.

Вариант 34.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(9; 3; -3; 4; 2)$, $\mathbf{a}_2(-4; -1; 2; -1; -1)$, $\mathbf{a}_3(7; 4; 1; 7; 1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(7; 1; -3)$, $\mathbf{e}_2(-4; 3; -5)$, $\mathbf{e}_3(-6; 0; 1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-12; 0; 2)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-5; 3; -1)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-1; 3; 3; -1)$, $\mathbf{a}_2(-1; 2; 2; -1)$, $\mathbf{a}_3(-3; 2; 3; -4)$, $\mathbf{a}_4(-3; 2; 2; -3)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-6; -2; 0; -8)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве $\mathcal{P}_2[t]$ многочленов степени не выше второй задан соотношением $A(f(t)) = -\frac{d^2}{dt^2}f(t) + 4\frac{d}{dt}f(t) + 2f(t)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{1, t, t^2\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 9 & 5 & -6 \\ 6 & 8 & -7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -4 \\ 1 & 10 & 3 \\ 0 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x_1^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 3x_2^2 - 2x_2x_3 - 5x_3^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $x_1^2 + 8x_1x_2 + 4x_1x_3 - 14x_2^2 - 16x_2x_3 - 2x_3^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $2x^2 - 8xy - 4y^2 = 3$.

Вариант 35.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(0; 1; 1; -2; -1)$, $\mathbf{a}_2(1; 2; 0; -5; -4)$, $\mathbf{a}_3(2; -5; -9; 8; 1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(1; 1; -2)$, $\mathbf{e}_2(1; -1; -3)$, $\mathbf{e}_3(-2; 1; 5)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-1; -1; 2)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-6; -3; 6)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-3; 4; -3; -1)$, $\mathbf{a}_2(-3; 1; -3; 2)$, $\mathbf{a}_3(1; -3; 2; 1)$, $\mathbf{a}_4(2; -4; 3; 1)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-8; 4; -10; 6)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = (\mathbf{x}, \mathbf{a})\mathbf{b}$, где $\mathbf{a}(2; 3; 4)$, $\mathbf{b}(5; -2; 2)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 16 & 8 \\ -5 & 17 & 6 \\ 6 & -16 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 6 & -3 \\ -3 & 0 & -9 \\ -2 & 0 & -6 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-2x^2 + 8xy + 4xz - 12y^2 - 16yz - 9z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $5x^2 - 8xy - 4xz - y^2 - 8yz - 2z^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $7x^2 - 4xy + 4y^2 = 12$.

Вариант 36.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(5; -2; -1; 1; 3)$, $\mathbf{a}_2(-1; 1; 0; -1; -1)$, $\mathbf{a}_3(-2; 5; -1; -6; -4)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(1; -3; 1)$, $\mathbf{e}_2(-1; -6; 1)$, $\mathbf{e}_3(-1; -2; 0)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(9; -8; 5)$, в новом базисе $\mathbf{c}(2; -3; -1)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(1; -2; -4; -3)$, $\mathbf{a}_2(1; -1; -3; -1)$, $\mathbf{a}_3(-4; 1; 2; -2)$, $\mathbf{a}_4(3; -2; -4; -1)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(4; 2; 7; 8)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \text{Пр}_{\mathbf{b}} \mathbf{x}$, где $\mathbf{a}(-6; 1; 1)$, $\mathbf{b}(3; 4; -4)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -14 & -4 & -8 \\ -4 & -2 & -2 \\ 12 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 7 & -3 \\ -5 & -9 & 4 \\ -10 & -11 & 2 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-4x_1^2 + 8x_1x_2 - 8x_1x_3 - 7x_2^2 + 2x_2x_3 - 11x_3^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $2x_1^2 - 8x_1x_3 + 2x_2^2 - 8x_2x_3 + 6x_3^2$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $5x^2 + 6xy + 5y^2 = 1$.

Вариант 37.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-4; -8; -3; 1; -1)$, $\mathbf{a}_2(-1; 6; 2; -2; 5)$, $\mathbf{a}_3(-1; 3; 1; -1; 3)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(1; 1; 0)$, $\mathbf{e}_2(-6; -5; 2)$, $\mathbf{e}_3(3; 2; -1)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-20; -19; 7)$, в новом базисе $\mathbf{c}(0; -2; -3)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(-1; 2; 2; 3)$, $\mathbf{a}_2(-1; 1; 1; 1)$, $\mathbf{a}_3(2; 1; 2; 6)$, $\mathbf{a}_4(3; -2; -1; 1)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(13; -9; -6; 1)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве $\mathcal{P}_2[t]$ многочленов степени не выше второй задан соотношением $A(f(t)) = -2 \frac{d^2}{dt^2} f(t) + 5 \frac{d}{dt} f(t) + f(t)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{1, t, t^2\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -5 & -5 & -10 \\ 9 & 1 & 4 \\ -4 & -5 & -11 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 9 & -2 & -10 \\ -6 & 0 & 6 \\ 12 & -4 & -14 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x^2 + 2xy + 6xz - 3y^2 - 2yz - 13z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $8x^2 - 12xy + 6xz + 3y^2 - 4yz$ к диагональному виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $5x^2 + 2xy + 5y^2 = 3$.

Вариант 38.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-5; 1; 4; -1; -3)$, $\mathbf{a}_2(-2; 4; 1; 5; 0)$, $\mathbf{a}_3(1; 1; -1; 2; 1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(0; -1; 1)$, $\mathbf{e}_2(1; 3; -4)$, $\mathbf{e}_3(5; -1; -3)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-22; 14; 3)$, в новом базисе $\mathbf{c}(-2; -3; 3)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(1; -1; -1; 1)$, $\mathbf{a}_2(-1; 2; 1; -2)$, $\mathbf{a}_3(2; -2; -3; 3)$, $\mathbf{a}_4(1; -1; -2; 2)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-4; 2; 9; -7)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \text{Пр}_{\mathbf{b}} \mathbf{x}$, где $\mathbf{a}(4; 1; -3)$, $\mathbf{b}(5; -3; -2)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -8 & -6 & 2 \\ 6 & -1 & 0 \\ 12 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 5 \\ -4 & 10 & -14 \\ -4 & 8 & -12 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-2x^2 + 4xy + 12xz - 4y^2 - 16yz - 21z^2$ к диагональному виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $4x_1^2 - 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 4x_2^2 + 4x_2x_3 + 7x_3^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $9x^2 + 10xy + 9y^2 = 8$.

Вариант 39.

- 1*. Найти нетривиальную линейную комбинацию векторов $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, равную ноль-вектору (если она существует). Сделать вывод относительно их линейной зависимости или независимости. $\mathbf{a}_1(-2; -3; -1; 2; -1)$, $\mathbf{a}_2(-1; 1; 1; -1; 0)$, $\mathbf{a}_3(0; -5; -3; 4; -1)$.
2. Доказать, что векторы $\mathbf{e}_1(-3; -1; -2)$, $\mathbf{e}_2(1; -2; 2)$, $\mathbf{e}_3(7; 2; 5)$ образуют базис в \mathbb{R}^3 . Найти координаты вектора \mathbf{b} в этом базисе и вектора \mathbf{c} в исходном, если в исходном базисе $\mathbf{b}(-2; 6; -5)$, в новом базисе $\mathbf{c}(0; 3; -2)$.
3. Построить ортонормированный базис в линейной оболочке системы векторов $\mathbf{a}_1(2; 1; 3; 4)$, $\mathbf{a}_2(1; 1; 2; 3)$, $\mathbf{a}_3(1; 1; 3; 3)$, $\mathbf{a}_4(1; 1; 4; 3)$. Найти координаты вектора $\mathbf{b}(-4; -2; -3; -8)$ в построенном ортонормированном базисе, если \mathbf{b} принадлежит $\langle \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_4 \rangle$.
4. Оператор A в пространстве \mathcal{V} задан соотношением $A(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \cdot \text{Пр}_{\mathbf{b}} \mathbf{x}$, где $\mathbf{a}(4; 3; 6)$, $\mathbf{b}(2; 5; 5)$. Доказать линейность оператора A и найти его матрицу в базисе $\{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$.
- 5*. Найти собственные значения и собственные векторы операторов A и B . Если возможно, привести матрицу оператора (A или B или обоих) к диагональному виду и записать матрицу перехода.

$$A = \begin{pmatrix} -7 & -3 & -5 \\ -2 & -3 & -1 \\ 20 & 15 & 13 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & -6 & -1 \\ 6 & -5 & -1 \\ -12 & 18 & 6 \end{pmatrix}.$$

6. Привести квадратичную форму $-x^2 + 2xy + 6xz - 2y^2 - 2yz - 14z^2$ к каноническому виду методом Лагранжа и указать новый базис. Записать матрицу перехода к новому базису.
7. Привести квадратичную форму $x_1^2 - 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + x_2^2 - 4x_2x_3 - 2x_3^2$ к каноническому виду ортогональным преобразованием. Записать матрицу преобразования.
8. Построить кривую $-x^2 + 4xy - y^2 = 2$.