

المعالجة الوظيفية العضلية "المايو فنكشنال"

المعالجة الوظيفية العضلية هي برنامج يتكون من عددٍ من التمرينات والتي تساعدك على التوقف عن العادات الفموية والوجهية التي تؤثر سلباً على صحتك وتغير في شكلك. إذ يقوم البرنامج العلاجي بإعادة تشكيل عضلات الوجه والفك والفم بحيث تبدأ بالعمل بانسجام وتوافق، ويغرس البرنامج عادات جديدة وإيجابية للحرص على التغيير الحتمي والدائم.

ما هي الاضطرابات العضلية والوظيفية للوجه و الفم (أو.إم.دي)؟

هو عددٌ من الاعتلالات التي تصيب عضلات الوجه والفم ووظائفها، إذ يؤثر هذا النوع من الإضطراب، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الرضاعة والنمو الهيكلي للوجه والمضغ والبلع والكلام وإطباق الأسنان وحركة المفصل الصدغي الفكي والنظافة الفموية وعلى ثبات فعالية علاج تقويم الأسنان وجماليات الوجه وغيرها.

ما هي الأسباب وراء حدوث اضطراب ال (أو.إم.دي) ؟

يصعبُ تحديدُ سببٍ واحد وراء حدوث هذا الإضطراب، فقد يكون حدوثه نتيجة لعامل أو أكثر من العوامل التالية:

- عادات فموية سيئة كمص الإبهام أو الإصبع أو اللهاية لفترات زمنية طويلة.
- ضيق في مجرى الهواء بسبب تضخم اللوزتين أو اللحمية أو الإصابة بالحساسية أو انسداد الأنف المزمن.
- عامل وراثي.
- التشوهات الهيكلية أو الفسيولوجية مثل اللجام اللساني القصير (عقدة اللسان) أو أن يكون اللسان كبير بشكل غير طبيعي (ماكروغلوسيا).
- وضعية الفم المفتوح المزمنة.
- تشوهات عصبية أو نمائية.
- ما هو العمر المناسب للبدء بمرحلة العلاج؟

يساعدُ البرنامج العلاجي للـ (أو.إم.دي) في :

- إيقاف عادة دَسْر اللسان.
- البدء بالتنفيس من خلال الأنف بدلاً من الفم.
- ترك عادات سيئة عديدة كمص الإبهام أو قضم الأظافر أو مضغ الشفاه أو الخدود من الداخل.
- إعادة تدريب عضلات الوجه واللسان لاستعادة الأداء الوظيفي السيكلولوجي.
- دعم وضعية العنق والرأس.
- منع أو تصحيح متلازمة الوجه الطويل.
- إيجاد بيئة فموية متناغمة.

- تحديد بعض المشكلات كمشاكل النطق وتوقف التنفس المؤقت أثناء النوم والشخير والهضم والضغط على الأسنان واضطراب المفصل الصدغي الفكي.

كيف يمكن أن يؤثر اضطراب ال (أو.إم.دي) على نمط الحياة اليومية؟

يمكن أن يؤثر اضطراب ال (أو.إم.دي) بحيث يؤدي لخلل في العض-إذ يصبح تراصف الأسنان العلوية والسفلية غير صحيح وهذا ما يُدعى بسوء الإطباق. وقد تؤدي هذه المشكلة لصعوبات في العض والمضغ والبلع وهضم الطعام أيضاً. وإن كنت ترغب بمعرفة المزيد عن حالة (دسر اللسان) تواصل معنا اليوم.

ما هي بعض الأعراض المرتبطة بال (أو.إم.دي) ؟

- إطباق شفتيك غير متوازي.
- بقاء لسانك بشكل مستمرٍ مقابل أسنانك أو وولوجه بينها.
- لديك مشكلة في التنفس من خلال أنفك.
- تعاني بشكل مستمرٍ من الصداع أو ألم في الفك أو الوجه أو الرقبة.
- لديك عادة مضغ أو مص أو العض بشفتيك على الأشياء كالأظفار أو الشعر.
- أنت تعاني من الشخير أو عدم الراحة أثناء نومك أو توقف مؤقت للتنفس أثناء النوم.
- تجد صعوبة بالأكل بشكل مرتب وهادئ.
- تجد صعوبة في بلع حيوب الدواء.
- لديك مشاكل في الكلام.
- وجهك أقرب إلى الشكل الممدود.

يُعتبر علاج الإضطراب الوظيفي العضلي مناسباً للجميع في عمر الرابعة فما فوق، ويكون العلاج حول سن السابعة أو الثامنة هو الوقت الأمثل لفعل ذلك بما أن العادات الفموية تكون متأصلة بشكل أقل في هذا السن.

ما هو دسر اللسان؟

(ويسمى أيضاً البلع العكسي أو البلع غير الناضج)، وهو اسمٌ شائعٌ لحالة عدم التوازن العضلي الفموي الوجهي، وهو نمط سلوكي إنساني يكون اللسان فيه متقدماً بين القواطع الأمامية أثناء البلع، والكلام، وعندما يكون اللسان في وضع الراحة. كذلك هي حالة ضغط مقدمة أو أطراف اللسان على الأسنان أو الولوج بينها.

ما هي أسباب حدوث دسر اللسان؟

قد يكون سبب حدوث هذه الحالة هو الضغط المتواصل للسان أثناء وضع الراحة أو الدفع غير الصحيح للسان بعيداً عن الباطن العلوي للخم فقد يؤدي ذلك لدفع الأسنان بعيداً عن أماكنها. وقد يؤدي الضغط لاحقاً لمنع الأسنان من البزوغ (أي خروج الأسنان من اللثة). ويعتمد البلع الصحيح على علاقة وحركة متناغمة بين عضلات الوجه واللسان والحلق.

ما هو قصور الشفاه؟

هو عدم القدرة على إبقاء الشفاه مطبقة على بعضها أو وضع الفم بشكل مريح مغلقاً، وإظهار ضغطٍ من قبل العضلات حول الوجه عند محاولة إغلاق الشفاه. قد يحدث قصور الشفاه نتيجة التغيرات الناتجة عن النمو في الوجه وبزوغ الأسنان وانتظامها والتنفس والبلع وحركة مفصل الفك.

مص الإبهام أو استخدام اللهايات

كعديد من الآباء فقد تكونون قلقين من عادة مص الإبهام لدى أطفالكم أو الإصبع أو استخدام اللهايات. قد تتساءلون عن مدى الضرر التي تلحقه وفي أي عمر يجب أن تتوقف هذه العادة أو ماذا يمكن أن يحدث إذا لم يتوقف طفلك عن فعل هذا. تبدو عادة مص الإبهام أو الإصبع أو اللهاية بريئة، إذ يجدها الأطفال والرضع مهدئة، وتعتبر هذه العادة طبيعية جداً والكثير من الصغار يتوقفون عن فعلها حال بلوغهم سن الثانية إلى الخامسة من العمر. غير أن بعض الأطفال قد يستمرون في فعل هذه العادة لسنواتٍ لاحقةٍ من حياتهم، ويؤدي ذلك لمشاكل غير مرضية في الأسنان وقد تؤثر تلك العادة أيضاً على ثقتهم بأنفسهم بشكل كبير، وتضم المشاكل في صحة الأسنان ما يلي:

- أسنان معوجة أو غير مستوية.
- فك غير مستوي ومتصالب.
- فك علوي ضيق.
- خلل في الكلام.
- اضطرابات وظيفية-فموية العضلية الوظيفية (أو.إم.دي) كالإختلال في المضغ ونمط البلع (دسر اللسان) وهي الوضعية الغير طبيعية للسان.

كيف تستطيع المساعدة للتخلص من عادة مص الإبهام؟

تقترح لوري سميث (طبيبة أسنان مسجلة) برنامجاً علاجياً لمدة 4 أسابيع يساعد مرضاك على إبقاء إبهامهم في مكانه الطبيعي (أي بعيداً عن أفواههم).

لهيات الصغار

قد يكون تأثير اللهايات بنفس تأثير مصّ الإبهام أو الإصبع على الأسنان لكن تعتبر عادة مص اللهاية سهلةً من حيث إمكانية إيقافها، فمن غير الشائع بين الأطفال بعد سن الثانية استخدام اللهاية أو عبوة الشرب.

عبوات الشرب للأطفال

يلجأ الأطفال إلى المص عند الولادة، ومع الوقت يطورون أنماط جديدة للبلع أكثر نضجاً، وللمساعدة في ذلك يُفضّل إعطائهم عبوات الشرب بين سن 6-8 أشهر. وهنا بالأسفل بعض المعلومات العامة عن عبوات الشرب:

- تساعد عبوات الشرب ذات الغطاء المغلق على بروز وضعيات اللسان.
- إنّ استخدام عبوات الشرب لمدة طويلة أظهر ارتباطاً وثيقاً مع ظهور مشاكلٍ في النطق وأمراض الأسنان والفم والأنف.
- يُعتبر السن المناسب للتوقف عن استخدام عبوات الشرب للأطفال والبدء باستخدام كاسات مفتوحة هو في عُمر الثانية.