

ما هي الاضطرابات العضلية / الاضطرابات الوظيفية للوجه والفم (OMD)؟

الاضطرابات العضلية هي اضطراب في مجمع العضلات الوجهية التي تشمل الفم واللسان والشفنتين، وعضلات الوجه نفسها. يمكن أن تحدث الاضطرابات العضلية نتيجة لعادة مص الإبهام أو الأصابع الأخرى، وضععية الفم المفتوح، أو وضععية اللسان التي تكون للأمام غالباً ما يشار إليها باسم "دفع اللسان". مع مرور الوقت، وجود الاضطرابات العضلية يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى سوء إطباق الأسنان، مثل العضة المفتوحة، أو تسبب تغييرات سلبية تؤثر على نمو الوجه. يمكن للاضطرابات العضلية أن تضعف استقرار تصحيح تقويم الأسنان، مما يؤدي إلى حدوث إنتكاس بعد تقويم الأسنان. ومن الممكن أيضاً أن يؤدي إلى إجهاد على الأسنان الأخرى، مما يتسبب في صعوبات في المضغ، والتي قد تؤثر بشكل تلقائي على عملية الهضم. أظهرت البحوث وجود نسبة عالية من مشاكل الكلام في الأفراد الذين يعانون من الاضطرابات العضلية و الوظيفية للوجه و الفم.

هل العلاج فعال؟

أظهرت معظم المؤلفات العلمية الأخيرة أن العلاج لاضطرابات العضلات الفموية الوجهية يمكن أن يكون فعال بنسبة 80-90% في تصحيح وظائف البلع ووظائف وضععية الراحة. ويظهر أيضاً أن هذه التصحيحات يتم الاحتفاظ بها لسنوات بعد انتهاء العلاج بنجاح. يجب أن يتم تقييم مرضى الاضطراب الفموي الوجهي فرداً فرداً لاكتشاف كل العوامل التي قد تكون مشتركة. أخصائي الاضطرابات الوجهية الفموية المدرب مهنيّاً سوف يتخذ قراراً ما إذا كان المريض سيستفيد من العلاج أم لا. تعدد التخصصات هو أمر حيوي لنجاح العلاج ويشمل: أطباء الأسنان، تقويم الأسنان أخصائي التغذية والحساسية، والأطباء الفنيين في حالات الطوارئ الطبية.

ربطة اللسان

يعتبر في كثير من الأحيان عامل مسبب آخر في تطوير الاضطرابات الفموية الوجهية. ويوافق العديد من المتخصصين على أن اللسان المقيد يمكن أن يكون له تأثيراً في الأسنان والكلام والهيكل العظمي (تشكيل الفك والحنك).

بسبب التخصص في العلم الفموي الوجهي، يعمل فني حالات الطوارئ الطب بشكل وثيق مع مجموعة متنوعة من المتخصصين في الرعاية الصحية لمعالجة المشاكل التي قد تنشأ. وهي تشمل: أطباء الأطفال، وأخصائيي أمراض الأذن والحنجرة، وأخصائيي الحساسية، وأخصائيي طب الأسنان، وجراحين الوجه، وتقويم الأسنان، والمعالجين الفيزيائيين، وأخصائيي تقويم العمود الفقري. دور العلم الفموي الوجهي في تطوير الجمجمة والقضايا الصحية على المدى الطويل.

الحركات الواعية وغير الواعية للغم وعضلات الوجه يمكن أن:

•تؤثر على شكلك
تغيير شكل فمك

.يمكن أن يكون لها علاقة بصعوبات التغذية أو الانحرافات التأثير على انتظام عضلة الاسنان.
تسبب الألم أو اختلال وظيفي في المفصل الفكي الصدغي . تطور مشاكل وضعيات الرأس والرقبة
تؤثر على أنماط الكلام النامية
تؤثر على أنماط النوم

القضاء على الاضطراب الفموي الوجهي يمكن أن يساعد في

.التخفيف من الإنداد بشكل المناسب

.توفير الاستقرار في عضلات الفم لتخطيط العلاج بتقويم الأسنان وتصحيحها

استقرار مفصل الفك السفلي الصدغي
تطوير أنماط التنفس الصحي
الحد من آثار اضطرابات الكلام لحرف الراء واللدغ

ما الذي يسبب الاضطرابات الوجهية الفموية؟

في حين أنه غالبا ما يكون من الصعب تحديد سبب واحد لتلك الاضطرابات، فإنه يمكن في كثير من الأحيان أن يكون هناك سبب واحد أو أكثر من المشاكل التالية:

عادات الفم الغير لائقة بما في ذلك مص الإبهام، أو اللهاية لمدة طويلة تقيد مجرى الهواء بسبب وجود لوزتين الكبيرتين، لحمية، حساسية، أو انسداد الأنف المزمن

الوراثة العائلية

التشوهات الهيكلية أو الفسيولوجية مثل اللسان المربوط أو اللسان الكبير بشكل غير طبيعي

(ماكروغلوسيا)

وضعية الفم المفتوح المتكرر أو التشوهات في النمو

الآثار الشائعة لوضعيات الاضطرابات الفموية الوجهية:

• وضع اللسان الأمامي

هذا هو النوع الأكثر شيوعا لوضعية اللسان، وغالبا ما يشار إليها باسم "دفع اللسان الشفاه الأمامية لا تغلق والطفل غالبا ما يكون فمه مفتوحا واللسان خارج من وراء الشفاه.

وضع اللسان الثنائي الأمامي

الأسنان الوحيدة التي تلمس هي الأضراس والعضة مفتوحة تماما على كلا الجانبين بما في ذلك الأسنان الأمامية.

وضع اللسان الثنائي

يتم إغلاق العضة الأمامية. ومع ذلك، قد تكون الأسنان الخلفية مفتوحة على كلا الجانبين. هذا هو التوجه الأكثر صعوبة للتصحيح.

ما هو العمر الذي ينبغي أن يبدأ العلاج به؟

العمر هو عامل مهم جدا لأخذه بعين الاعتبار عند النظر في علاج الاضطرابات الفموية الوجهية. قد يساعد التعرف المبكر والعلاج السريع لدى الصغار الذين تقل أعمارهم عن 4 سنين في التخلص من عادات مص الإبهام أو أي إصبع والمساعدة في تحسين نمو الأسنان أو القضاء على أي مشكلة في الكلام المرتبطة بتلك الاضطرابات الطفل في عمر 8 إلى 9 سنوات يكفي للخضوع للتدريب الكامل.