

معالجة الاضطرابات العضلية والوظيفية للوجه والفم

المعالجة العضلية الوظيفية هي برنامج متكامل من التمارين التي تساعد في إيقاف العادات الخاطئة المتعلقة بالوجه والفكين و التي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي و كبير على المظهر العام وصحة الشخص. تسعى هذه التمارين إلى استعادة التناسق بين الفم، الفكين و الوجه عن طريق إدراج عادات صحية و سليمة يتم تعليمها و ممارستها كجزء من نظام حياة صحي.

ما هي الاضطرابات العضلية والوظيفية للوجه والفم؟
هي اضطرابات في العضلات والوظائف المتعلقة بالوجه والفم على وجه الخصوص. تؤثر هذه الاضطرابات بشكل مباشر أو غير مباشر على كل من الأطفال و البالغين. حيث تؤثر بشكل سلبي على الرضاعة الطبيعية، تطور ونمو عظام الوجه المضغ البلع، التحدث إطباق الأسنان، حركة مفصل الفك، نظافة الفم، المعالجة التقويمية للأسنان جمال الوجه و غيرها.

ما هي أسباب الاضطرابات العضلية والوظيفية للوجه والفم؟
عادة ما نجد صعوبة في تحديد مسبب واحد رئيسي لحدوث مثل هذه الاضطرابات، بالغالب تنتج المشكلة عن وجود مجموعة من الأسباب التي من أهمها:

-

عادات فموية غير سليمة مثل مص الإبهام أو مص إحدى الأصابع، أو اسخدام مصاصة الرضع لفترة زمنية طويلة.
انسداد مجرى التنفس بشكل جزئي بسبب تضخم في اللوزتين أو اللحمية، وجود حساسية، أو انسداد

مزمن للأنف.
عوامل وراثية

مشاكل خلقية؛ كقصر اللسان أو طوله بشكل مرضي
إبقاء الفم مفتوح بشكل مزمن و دائم
مشاكل في الجهاز العصبي أو مشاكل في النمو

<https://youtu.be/ZLZMfz-PdN4>

يوضح هذا الفيديو كيف يمكن لعضلات الوجه أن تؤثر في شكل و وظيفة الأسنان والفكين، كما يوضح مشكلة البلع العكسي التي نعتبر إحدى أهم أسباب الاضطرابات العضلية والوظيفية للوجه والفم إن البلع العكسي يحدث عند استخدام الفك السفلي و مقدمة اللسان في عملية البلع، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في شكل الأسنان، الوجه و الرقبة. إن الطريقة المثلى للبلع هي إطباق الشفاه و الأسنان وإبقاء الفم مغلقاً، ثم توجيه مقدمة اللسان لتلمس أعلى سقف الحلق باتجاه حافة الأسنان، كما يجب فرد باقي اللسان ليلامس سقف الحلق و دفع مؤخرة اللسان إلى الخلف لتنتقل اللقمة إلى البلعوم دون اللجوء لتحريك الفم أو اللسان.

دور المعالجة العضلية والوظيفية

تساعد المعالجة العضلية و الوظيفية للوجه و الفكين في علاج العديد من الاضطرابات من خلال:

وقف عادة دفع اللسان
البدء بالتنفس من خلال الأنف بدلاً من الفم

التوقف عن عادات مص الإبهام، قرض الأظافر بالأسنان، مضغ باطن الخد و الشفاه و غيرها
إعادة تمرين عضلات الوجه و عضلة اللسان لاستعادة وظائفهم بشكل سليم و طبيعي

دعم وضعية الرأس الرقبة الجسم
الوقاية أو معالجة متلازمة امتداد الوجه

بناء تناغم للبيئة الفموية في تعديل جميع السلوكيات الخاطئة المتعلقة بالفم و الفكين تحديد و معالجة مشاكل النطق، انقطاع التنفس أثناء النوم، الشخير، مشاكل الهضم، حك الأسنان و مشاكل مفصل الفك.

كيف يمكن للاضطرابات العضلية والوظيفية للوجه و الفم أن تؤثر على الحياة اليومية؟
قد تؤدي مثل هذه الاضطرابات إلى سوء في القضم بسبب سوء الإطباق بين الأسنان العلوية والسفلية. كما تؤدي إلى صعوبات في مضغ الطعام، بلعه و هضمه.

أهم أعراض هذه الاضطرابات

عدم القدرة على إطباق الشفتين في وضعية الراحة
-يرتخي اللسان بشكل تلقائي باتجاه الأسنان أو بين الأسنان العلوية و السفلية - صعوبة التنفس من خلال الأنف و الاعتماد على التنفس من الفم حدوث صداع و آلام في الفك الوجه و الرقبة بشكل متكرر - الاعتقاد على عض ومص الشفاه، الأظافر، الشعر أو غيرها من المواد - المعاناة من الشخير و عدم الارتياح و قد ينقطع التنفس خلال النوم - إيجاد صعوبة في الأكل بهدوء دون إصدار صوت أو الاتساخ - إيجاد صعوبة في بلع أقراص الأدوية

-اضطرابات في التحدث

-حدوث بروز أو امتداد في الوجه من منطقة الفم و الفكين

تعتبر المعالجة العضلية و الوظيفية للوجه و الفكين مناسبة لأي شخص فوق سن الأربع سنوات. كما تعد معالجة الأطفال في سن السابعة أو الثامنة مثالية لتعديل السلوكيات الخاطئة بحيث يكون أسهل في حدوث التغيير من عمر أكبر لضمان نمو صحي للأسنان الدائمة.

ما هو الدفع اللساني؟

الدفع اللساني (يعرف أيضاً بالبلع العكسي) هو اضطراب في عضلات الفم و الوجه، عند قيام الشخص بدفع اللسان باتجاه الأنبياب الأمامية عند بلع الطعام و التحدث أو عندما يكون اللسان في وضعية الراحة. كما تضغط مقدمة اللسان و أطرافه على الأسنان و يفرش اللسان بين الأسنان.

لماذا يحدث الدفع اللساني؟

إن الضغط المستمر من اللسان باتجاه الأسنان بعيداً عن سقف الحلق، سواءً في وضعية الراحة أو عند البلع، قد يدفع الأسنان للانزياح إلى الأمام و تغيير أماكنهم البلع بالطريقة الصحيحة يعتمد بشكل كلي على عضلات الوجه، اللسان و الحلق.

ما هو عجز الشفاه؟

هو عدم قدرة الشفتين على الإطباق معاً لإغلاق الفم بشكل كامل عندما يكون الشخص مرتاحاً أو مسترخياً، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور التواء حول الفم عند محاولة إطباق الشفاه. يؤدي هذا العجز إلى حدوث تغيرات في شكل الوجه الأسنان و استقامتها التنفس، البلع و خلل في وظيفة مفصل الفك.

مص الإبهام و استخدام مصاصة الرضع

جميع الآباء يكونوا قلقين بشأن اعتياد الطفل على مص الإبهام، الإصبع أو استخدام مصاصة الرضع إن كانت هذه السلوكيات تلحق

الضرر بالطفل في المستقبل، و إلى أي عمر يجب أن يتوقف الطفل عن ذلك و ما الذي سيحدث إن استمر طفلهم بممارسة هذه السلوكيات لفترة زمنية طويلة. يمارس الطفل هذه السلوكيات على اعتبارها مسكن مريح له خاصة في عمر السنتين إلى خمس سنوات. لكن نجد أحياناً أن الطفل اعتاد على هذا السلوك و لا يستطيع التوقف عنه حتى بعد بلوغه الخمس سنوات الأمر الذي يؤدي بشكل كبير صحة و سلامة الأسنان، كما أنه يؤدي إلى شعور الطفل بالضعف و عدم الثقة بنفسه. إن الأضرار الملتحقة بالأسنان نتيجة لاستمرار ممارسة هذه السلوكيات تتوضح بما يلي:

اعوجاج الأسنان

التهابات اللثة

انحراف الفكين

تضييق في الفك العلوي

صعوبات في النطق

الاضطرابات العضلية والوظيفية للوجه و الفم كحدوث مشاكل في المضغ و البلع العكسي) و صعوبة المحافظة

على وضعية اللسان السليمة.

كيف يمكن المساعدة في التغلب على مشكلة مص الإبهام؟
يجب اتباع برنامج خاص لمدة أربعة أسابيع يساعد الطفل في إبقاء إبهامه بعيداً عن الفم.

مصاصة الرضع (اللهاة)

تُحدث نفس المشاكل و الاضطرابات التي يحدثها مص الإبهام، لكن يمكن التخلص منها بشكل أسهل. لا ينصح بأن يستمر الطفل باستخدام المصاصة أو الأكواب الخاصة بالرضع بعد أن يبلغ السنتين من عمره.

الأكواب المزودة بمصاصة خاصة للأطفال

يتطور نمط البلع عند الأطفال بشكل تدريجي ليصبحوا قادرين على الاستغناء عن الرضاعة. تستخدم هذه الأكواب لتساعد الأطفال في تعلم طريقة الشرب و البلع و يمكن البدء في استخدامها عند عمر ٦-٨ شهور. ينصح بأن يتوقف الطفل عن استخدامها عند بلوغه لسن الثانية حيث يصبح بمقدوره الشرب باستخدام الأكواب المفتوحة العادية إن الاستمرار في استخدام الأكواب المزودة بمصاصة لفترة طويلة يؤدي إلى حدوث نتوء في اللسان مشاكل في تطور النطق و يحدث التهابات في الأسنان والفم.