Задание 1. Волна от сферической полости

Исходные данные, начальные и граничные условия

$$R = 1 \text{ м}, \quad P_0 = 10^8 \text{ Па}, \quad E = 5{,}4 \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$\mu = 2 \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad \rho = 1800 \text{ кг/м}^3, \quad t_* = 0{,}01 \text{ с}.$$

Неизвестное u(r, t) — радиальное перемещение; r ≥ R.

$$\text{Начальные условия}: \quad u(r, 0^-) = u_t(r, 0^-) = 0,$$

$$\text{Граничные условия}: \quad \sigma_{rr}(R, t) = -P_0 H(t), \quad u(r, t) \to 0 \ (r \to \infty),$$

$$H(t) = 0 \ (t < 0), \qquad H(t) = 1 \ (t > 0).$$

1. Перемещение и деформации

При сферической симметрии перемещение направлено по радиусу. Деформация — относительное изменение длины:

$$r \mapsto r + u(r, t),$$

$$\varepsilon_{rr} = \lim_{\Delta r \to 0} \frac{u(r+\Delta r, t) - u(r, t)}{\Delta r} = u_r,$$

$$\varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{\varphi\varphi} = \frac{2\pi(r+u) - 2\pi r}{2\pi r} = \frac{u}{r}.$$

2. Закон Гука и упругие постоянные

Исходный закон линейной изотропной упругости: нормальное напряжение зависит от изменения объёма и деформации в данном направлении.

$$e = \varepsilon_{rr} + \varepsilon_{\theta\theta} + \varepsilon_{\varphi\varphi} = u_r + 2u/r,$$

$$\sigma_{rr} = \lambda e + 2\mu\varepsilon_{rr} = (\lambda + 2\mu)u_r + 2\lambda u/r,$$

$$\sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = \lambda e + 2\mu\varepsilon_{\theta\theta}$$

$$= \lambda u_r + 2(\lambda + \mu)u/r.$$

Связь постоянных получаем из определений E и ν при одноосном растяжении:

$$\sigma_{xx} = S, \quad \sigma_{yy} = \sigma_{zz} = 0, \quad \varepsilon_{xx} = S/E, \quad \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\nu S/E,$$

$$e = (1 - 2\nu)S/E, \qquad 0 = \lambda(1 - 2\nu)S/E - 2\mu\nu S/E,$$

$$0 = \lambda(1 - 2\nu) - 2\mu\nu \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1 - 2\nu},$$

$$S = \lambda(1 - 2\nu)S/E + 2\mu S/E \quad \Longrightarrow \quad E = \lambda(1 - 2\nu) + 2\mu,$$

$$E = 2\mu\nu + 2\mu = 2\mu(1 + \nu).$$

$$E = 2\mu(1 + \nu) \quad \Longrightarrow \quad \nu = \frac{E}{2\mu} - 1 = \frac{5{,}4}{4} - 1 = 0{,}35,$$

$$\lambda = \frac{2\mu\nu}{1 - 2\nu} = \frac{4 \cdot 10^9 \cdot 0{,}35}{0{,}3} = \frac{14}{3} \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$K=\lambda+2\mu=\tfrac{26}{3}\cdot 10^9\ \text{Па},\qquad C_p=\sqrt{K/\rho}\approx 2194{,}27\ \text{м/с}.$$

3. Второй закон Ньютона для малого сферического сектора

Берём слой толщины dr. Для малого участка с угловыми размерами dα, dβ имеем $d\Omega \approx d\alpha\cdot d\beta$. Две противоположные боковые силы дают радиальную проекцию:

$$dS_\theta \approx r\,d\beta\,dr,\qquad \sin(d\alpha/2)\approx d\alpha/2,$$

$$dF_r^{(\theta)} \approx -2\sigma_{\theta\theta} dS_\theta \sin(d\alpha/2) = -\sigma_{\theta\theta} r\,dr\,d\Omega,$$

$$dF_r^{(\varphi)} \approx -\sigma_{\varphi\varphi} r\,dr\,d\Omega.$$

Складываем силы на радиальных и боковых гранях:

$$dm=\rho r^2\,dr\,d\Omega,$$

$$dF_r^{(r)}=[(r+dr)^2\sigma_{rr}(r+dr)-r^2\sigma_{rr}(r)]\,d\Omega,$$

$$dF_r^{(\text{бок})}=-r(\sigma_{\theta\theta}+\sigma_{\varphi\varphi})\,dr\,d\Omega,$$

$$dm\,u_{tt}=dF_r^{(r)}+dF_r^{(\text{бок})}.$$

$$\rho r^2 u_{tt}=\tfrac{\partial(r^2\sigma_{rr})}{\partial r}-r(\sigma_{\theta\theta}+\sigma_{\varphi\varphi}),$$

$$\rho u_{tt}=\partial_r\sigma_{rr}+\tfrac{2}{r}(\sigma_{rr}-\sigma_{\theta\theta}).$$

Подставляем напряжения и раскрываем производные:

$$\partial_r\sigma_{rr}=Ku_{rr}+2\lambda\left(\tfrac{u_r}{r}-\tfrac{u}{r^2}\right),$$

$$\sigma_{rr}-\sigma_{\theta\theta}=2\mu(u_r-\tfrac{u}{r}),$$

$$\rho u_{tt}=Ku_{rr}+(2\lambda+4\mu)\left(\tfrac{u_r}{r}-\tfrac{u}{r^2}\right),$$

$$2\lambda+4\mu=2K\quad\Longrightarrow\quad u_{tt}=C_p^2\left(u_{rr}+\tfrac{2u_r}{r}-\tfrac{2u}{r^2}\right).$$

4. Сведение к одномерной волне

Введём первообразную по r: $u = \Phi_r$. Это позволяет собрать пространственный оператор в одну производную.

$$u=\Phi_r,\qquad \partial_r\left(\Phi_{rr}+\tfrac{2\Phi_r}{r}\right)=u_{rr}+\tfrac{2u_r}{r}-\tfrac{2u}{r^2},$$

$$\partial_r\left[\Phi_{tt}-C_p^2\left(\Phi_{rr}+\tfrac{2\Phi_r}{r}\right)\right]=0,$$

$$\Phi_{tt}-C_p^2\left(\Phi_{rr}+\tfrac{2\Phi_r}{r}\right)=f(t).$$

Добавление функции только от t не меняет u. Убираем f(t):

$$\widetilde{\Phi}=\Phi+g(t),\quad g''=-f,\quad \widetilde{\Phi}_r=\Phi_r,$$

$$\widetilde{\Phi}_{tt}-C_p^2\left(\widetilde{\Phi}_{rr}+\tfrac{2\widetilde{\Phi}_r}{r}\right)=0.$$

Далее обозначаем $\tilde{\Phi}$ через Φ и вводим $\Psi = r\Phi$:

$$\Psi = r\Phi, \qquad \Psi_{tt} = r\Phi_{tt}, \qquad \Psi_{rr} = r\Phi_{rr} + 2\Phi_r,$$

$$\Psi_{tt} = C_p^2 \Psi_{rr}.$$

Для этого уравнения меняем координаты:

$$\xi = r - C_p t, \quad \eta = r + C_p t, \quad \partial_r = \partial_\xi + \partial_\eta,$$

$$\partial_t = -C_p \partial_\xi + C_p \partial_\eta,$$

$$\partial_{tt} - C_p^2 \partial_{rr} = -4C_p^2 \partial_{\xi\eta},$$

$$\Psi_{\xi\eta} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Psi = F(\xi) + G(\eta).$$

$F(r - C_p t)$ движется к большим r; $G(r + C_p t)$ — к меньшим r. Источник находится в полости, приходящей из бесконечности волны нет: $G = 0$.

$$s = t - \frac{r-R}{C_p}, \quad r - C_p t = R - C_p s, \quad B(s) = -F(R - C_p s),$$

$$\Psi = -B(s), \qquad \Phi = -\frac{B(s)}{r},$$

$$s_r = -1/C_p, \qquad u = \Phi_r = \frac{B'(s)}{C_p r} + \frac{B(s)}{r^2},$$

$$u_r = -\frac{B''}{C_p^2 r} - \frac{2B'}{C_p r^2} - \frac{2B}{r^3}.$$

5. Давление на границе даёт ОДУ

$$\sigma_{rr} = K u_r + \frac{2\lambda}{r} u$$

$$= -\frac{K}{C_p^2 r} B'' + \frac{2(\lambda - K)}{C_p r^2} B' + \frac{2(\lambda - K)}{r^3} B,$$

$$K/C_p^2 = \rho, \quad \lambda - K = -2\mu,$$

$$\sigma_{rr} = -\frac{\rho}{r} B'' - \frac{4\mu}{C_p r^2} B' - \frac{4\mu}{r^3} B.$$

На поверхности $r = R$ имеем $s = t$ и $\sigma_{rr} = -P_0$ при $t > 0$:

$$-\frac{\rho}{R} B'' - \frac{4\mu}{C_p R^2} B' - \frac{4\mu}{R^3} B = -P_0,$$

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0 R}{\rho}, \qquad a = \frac{4\mu}{\rho C_p R}, \quad b = \frac{4\mu}{\rho R^2}.$$

При $s < 0$ волна ещё не пришла: $B = B' = 0$. Непрерывность u на фронте $s = 0$ для всех положений фронта даёт:

$$\frac{B'(0)}{C_p r} + \frac{B(0)}{r^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{r}{C_p} B'(0) + B(0) = 0,$$

$$B(0) = B'(0) = 0.$$

6. Решение задачи Коши для B

$$B'' + aB' + bB = F_0, \quad F_0 = \frac{P_0 R}{\rho}, \quad B(0) = B'(0) = 0,$$

$$B = B_\infty + B_h, \quad bB_\infty = F_0, \quad B_\infty = \frac{P_0 R^3}{4\mu},$$

$$B_h = e^{ks} \quad \Longrightarrow \quad k^2 + ak + b = 0,$$

$$\left(k + \tfrac{a}{2}\right)^2 = -(b - a^2/4) = -\omega^2, \quad \omega = \sqrt{b - a^2/4},$$

$$k_{1,2} = -a/2 \pm i\omega,$$

$$e^{(-a/2 \pm i\omega)s} = e^{-as/2}(\cos\omega s \pm i\sin\omega s),$$

$$B = B_\infty + e^{-as/2}(C_1\cos\omega s + C_2\sin\omega s).$$

$$B(0) = B_\infty + C_1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad C_1 = -B_\infty,$$

$$B'(0) = -\tfrac{a}{2}C_1 + \omega C_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad C_2 = -\frac{aB_\infty}{2\omega},$$

$$B = B_\infty\left[1 - e^{-as/2}\left(\cos\omega s + \tfrac{a}{2\omega}\sin\omega s\right)\right].$$

Дифференцирование и сокращение коэффициента при cos:

$$B' = B_\infty e^{-as/2}\left[\tfrac{a}{2}\left(\cos\omega s + \tfrac{a}{2\omega}\sin\omega s\right) + \omega\sin\omega s - \tfrac{a}{2}\cos\omega s\right],$$

$$B' = B_\infty e^{-as/2}\left(\omega + \frac{a^2}{4\omega}\right)\sin\omega s,$$

$$\omega^2 + a^2/4 = b, \quad B_\infty b = F_0 \quad \Longrightarrow \quad B' = \frac{P_0 R}{\rho\omega}e^{-as/2}\sin\omega s.$$

Аналитический ответ

$$u(r,t) = \frac{P_0 R}{\rho C_p \omega r}e^{-as/2}\sin\omega s$$

$$+\frac{P_0 R^3}{4\mu r^2}\left[1 - e^{-as/2}\left(\cos\omega s + \tfrac{a}{2\omega}\sin\omega s\right)\right] \quad (s \ge 0),$$

$$u(r,t) = 0 \quad (s < 0), \qquad s = t - \frac{r - R}{C_p}.$$

Постоянное давление остаётся включённым; индекс ∞ означает предел по времени.

$$B_\infty = 0{,}0125 \text{ м}^3, \quad \lim_{t\to\infty} u(r,t) = \frac{P_0 R^3}{4\mu r^2},$$

$$\lim_{r\to\infty} u(r,t) = 0, \qquad r_\text{ф}(t_*) = R + C_p t_* \approx 22{,}9427 \text{ м}.$$

Задание 2. Уравнение Бюргерса с начальным скачком

Исходные данные и начальное условие

$$u_t + (u^2/2)_x = \nu u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

$$u_0(x) = 1 \ (x \le 0), \qquad u_0(x) = 0 \ (x > 0),$$

$$\nu = 0;\ 0{,}02;\ 0{,}1, \qquad t_* = 2, \qquad 0 \le x \le 4.$$

1. Невязкий случай: характеристики

$$\nu = 0: \quad u_t + u u_x = 0,$$

$$\frac{d}{dt} u(x(t), t) = u_t + x'(t) u_x, \qquad x'(t) = u,$$

$$\frac{du}{dt} = 0 \implies u = u_0(\xi), \quad x = \xi + t u_0(\xi),$$

$$\xi < 0: \quad u = 1, \quad x = \xi + t; \qquad \xi > 0: \quad u = 0, \quad x = \xi.$$

Левые характеристики догоняют правые. Вместо многозначного пересечения ищем движущийся скачок x = x_s(t).

2. Скорость скачка из сохранения

$$u_t + F(u)_x = 0, \quad F(u) = u^2/2, \quad u_L = 1, \quad u_R = 0,$$

$$\frac{d}{dt} \int_a^b u \, dx = -\int_a^b F(u)_x \, dx = F(u_L) - F(u_R),$$

$$\int_a^b u \, dx = u_L (x_s - a) + u_R (b - x_s) \quad (a < x_s < b),$$

$$x_s'(u_L - u_R) = F(u_L) - F(u_R),$$

$$x_s' = \frac{1/2 - 0}{1 - 0} = \frac{1}{2}, \qquad x_s(0) = 0 \implies x_s(t) = t/2.$$

$$F'(u_L) = 1 > 1/2 > 0 = F'(u_R).$$

Ответ при ν = 0

$$u(x, t) = 1 \ (x < t/2), \qquad u(x, t) = 0 \ (x > t/2), \qquad x_s(2) = 1.$$

Значение ровно на скачке выбирается отдельно; на интегралы и решение вне скачка оно не влияет.

3. Вязкий случай: замена, убирающая нелинейность

$$u_t + u u_x = \nu u_{xx}, \quad \nu > 0, \qquad u = \psi_x,$$

$$\partial_x \left(\psi_t + \frac{\psi_x^2}{2} - \nu \psi_{xx} \right) = 0,$$

$$\psi_t + \frac{\psi_x^2}{2} - \nu \psi_{xx} = a(t).$$

Заменой ψ на ψ−∫a(t)dt убираем a(t); производная ψ_x = u не меняется. Теперь выбираем φ так, чтобы квадрат ψ_x сократился:

$$\varphi = e^{-\psi/(2\nu)}, \quad \varphi_t = -\frac{\psi_t}{2\nu}\varphi,$$

$$\varphi_x = -\frac{\psi_x}{2\nu}\varphi, \quad \varphi_{xx} = \left(\frac{\psi_x^2}{4\nu^2} - \frac{\psi_{xx}}{2\nu}\right)\varphi,$$

$$\psi_t = \nu\psi_{xx} - \frac{\psi_x^2}{2} \quad \Longrightarrow \quad \varphi_t = \nu\varphi_{xx},$$

$$u = \psi_x = -2\nu\frac{\varphi_x}{\varphi},$$

$$\psi(x,0) = \int_0^x u_0(\eta)\,d\eta, \qquad \varphi_0(x) = \exp\left[-\frac{1}{2\nu}\int_0^x u_0(\eta)\,d\eta\right].$$

4. Гауссово решение уравнения теплопроводности

Ищем нормированный профиль с шириной, пропорциональной √t:

$$K(x,t) = t^{-1/2} g(z), \qquad z = \frac{x}{2\sqrt{\nu t}},$$

$$K_t = t^{-3/2}\left(-\frac{g}{2} - \frac{zg'}{2}\right), \qquad \nu K_{xx} = \frac{1}{4}t^{-3/2}g'',$$

$$K_t = \nu K_{xx} \quad \Longrightarrow \quad g'' + 2zg' + 2g = 0,$$

$$(g' + 2zg)' = 0, \qquad g' + 2zg = C.$$

Ищем чётный профиль g. Тогда g′+2zg нечётно, поэтому постоянная C = 0:

$$g' + 2zg = 0 \quad \Longrightarrow \quad g'/g = -2z \quad \Longrightarrow \quad g = Ae^{-z^2}.$$

Нормировку находим по гауссову интегралу:

$$J = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2}\,dz, \quad J^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2}\,dx\,dy,$$

$$J^2 = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} e^{-r^2} r\,dr = 2\pi\cdot\frac{1}{2} = \pi, \quad J = \sqrt{\pi},$$

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} K\,dx = 2\sqrt{\nu}A\sqrt{\pi} \quad \Longrightarrow \quad A = \frac{1}{2\sqrt{\pi\nu}},$$

$$K(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\nu t}} e^{-x^2/(4\nu t)}.$$

Складываем сдвинутые профили с весами φ₀(ξ). Уравнение линейно, поэтому сумма также является решением:

$$\varphi(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} K(x-\xi,t)\varphi_0(\xi)\,d\xi,$$

$$\varphi_t = \int K_t\varphi_0\,d\xi = \nu\int K_{xx}\varphi_0\,d\xi = \nu\varphi_{xx}.$$

Проверка начального условия заменой ξ = x + 2√(νt)z:

$$\varphi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2}\varphi_0(x + 2\sqrt{\nu t}\,z)\,dz,$$

$$t \to 0^+: \quad \varphi(x,t) \to \frac{\varphi_0(x)}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2}\,dz = \varphi_0(x).$$

5. Возвращение к u: интегральная формула

$$I(\xi)=\int_0^{\xi}u_0(\eta)\,d\eta,\qquad w(\xi)=e^{-I(\xi)/(2\nu)-(x-\xi)^2/(4\nu t)},$$

$$\varphi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{4\pi\nu t}}\int_{-\infty}^{\infty}w(\xi)\,d\xi,$$

$$\varphi_x=\frac{1}{\sqrt{4\pi\nu t}}\int_{-\infty}^{\infty}-\frac{x-\xi}{2\nu t}w(\xi)\,d\xi,$$

$$u=-2\nu\frac{\varphi_x}{\varphi}=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x-\xi}{t}w(\xi)\,d\xi}{\int_{-\infty}^{\infty}w(\xi)\,d\xi}=\frac{N}{D}.$$

6. Подстановка начального скачка

$$I(\xi)=\int_0^{\xi}u_0(\eta)\,d\eta=\xi\ (\xi\le 0),\qquad I(\xi)=0\ (\xi>0),$$

$$w(\xi)=\exp\left[-\frac{I(\xi)}{2\nu}-\frac{(x-\xi)^2}{4\nu t}\right],$$

$$D=D_-+D_+,\quad D_-=\int_{-\infty}^{0}w\,d\xi,\quad D_+=\int_0^{\infty}w\,d\xi.$$

Для отрицательной половины выделяем полный квадрат:

$$-\frac{\xi}{2\nu}-\frac{(x-\xi)^2}{4\nu t}=-\frac{\xi^2-2(x-t)\xi+x^2}{4\nu t},$$

$$\xi^2-2(x-t)\xi+x^2=(\xi-x+t)^2+2xt-t^2,$$

$$-\frac{\xi}{2\nu}-\frac{(x-\xi)^2}{4\nu t}=\frac{t-2x}{4\nu}-\frac{(\xi-x+t)^2}{4\nu t}.$$

$$D_-=e^{(t-2x)/(4\nu)}\int_{-\infty}^{0}e^{-(\xi-x+t)^2/(4\nu t)}\,d\xi,$$

$$\eta=\frac{x-t-\xi}{2\sqrt{\nu t}},\quad d\xi=-2\sqrt{\nu t}\,d\eta,$$

$$\xi=-\infty\Rightarrow\eta=+\infty,\qquad \xi=0\Rightarrow\eta=\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}},$$

$$D_-=2\sqrt{\nu t}\,e^{(t-2x)/(4\nu)}\int_{(x-t)/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty}e^{-\eta^2}\,d\eta.$$

$$D_+=\int_0^{\infty}e^{-(\xi-x)^2/(4\nu t)}\,d\xi,\quad \eta=\frac{\xi-x}{2\sqrt{\nu t}},$$

$$D_+=2\sqrt{\nu t}\int_{-x/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty}e^{-\eta^2}\,d\eta.$$

7. Сокращение числителя

$$w_\xi=\left[-\frac{u_0(\xi)}{2\nu}+\frac{x-\xi}{2\nu t}\right]w,$$

$$\frac{x-\xi}{t}w=u_0(\xi)w+2\nu w_\xi,\qquad w(\pm\infty)=0,$$

$$N_-=\int_{-\infty}^{0}\frac{x-\xi}{t}w\,d\xi=D_-+2\nu[w]_{-\infty}^{0}=D_-+2\nu w(0),$$

$$N_+=\int_0^{\infty}\frac{x-\xi}{t}w\,d\xi=2\nu[w]_0^{\infty}=-2\nu w(0),$$

$$N = N_- + N_+ = D_- \quad \Longrightarrow \quad u = \frac{D_-}{D_- + D_+}.$$

Общий множитель $2\sqrt{(\nu t)}$ сокращается. Обозначаем оставшиеся выражения через d_- и d_+:

Ответ при ν > 0

$$u(x,t) = \frac{d_-}{d_- + d_+}, \qquad t > 0,$$

$$d_- = e^{(t-2x)/(4\nu)} \int_{(x-t)/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty} e^{-\eta^2}\, d\eta,$$

$$d_+ = \int_{-x/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty} e^{-\eta^2}\, d\eta.$$

Последние интегралы — точная запись ответа; через элементарные функции они не выражаются.

При $t \to 0$ начальное условие восстанавливается в точках $x \neq 0$. Значение в самом начальном скачке на интегралы не влияет.

Задание 3. Равновесие упругой пластинки

Исходные данные

$$0 \le x \le 2, \quad 0 \le y \le 1, \qquad \nu = 0{,}3,$$

$$\mathbf{u} = (u(x,y), v(x,y), 0), \qquad q(y) = y(1-y).$$

Координаты и перемещения разделены на ширину пластинки; напряжения — на λ + 2μ. Все величины далее безразмерны.

Граничные условия

$$x = 0: \quad u = v = 0,$$

$$y = 0,\ 1: \quad \bar{\sigma}_{yy} = \bar{\sigma}_{xy} = 0,$$

$$x = 2: \quad \bar{\sigma}_{xx} = 0, \qquad \bar{\sigma}_{xy} = q(y).$$

Слева — закрепление, сверху и снизу — свободные стороны. Справа действует поперечная нагрузка. Задача не зависит от времени.

1. Деформации через изменение длин и углов

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad v_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad u_{xy} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}.$$

Отрезок длины dx, направленный вдоль x:

$$\Delta u = u(x+dx, y) - u(x,y) = u_x\, dx + o(dx),$$

$$\Delta v = v(x+dx, y) - v(x,y) = v_x\, dx + o(dx),$$

$$ds_x = dx\sqrt{(1+u_x)^2 + v_x^2},$$

$$\sqrt{1+z} = 1 + z/2 + O(z^2),$$

$$ds_x \approx (1+u_x)dx \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon_{xx} = \frac{ds_x - dx}{dx} \approx u_x.$$

Аналогично для отрезка вдоль y; в линейной модели:

$$ds_y = dy\sqrt{u_y^2 + (1+v_y)^2} \approx (1+v_y)dy,$$

$$\varepsilon_{xx} = u_x, \qquad \varepsilon_{yy} = v_y, \qquad \varepsilon_{zz} = 0.$$

θ — угол между деформированными направлениями x и y:

$$\mathbf{a} = (1+u_x, v_x), \qquad \mathbf{b} = (u_y, 1+v_y),$$

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}|\,|\mathbf{b}|} \approx u_y + v_x,$$

$$\theta = \pi/2 - \gamma, \qquad \cos\theta = \sin\gamma \approx \gamma,$$

$$\gamma \approx u_y + v_x, \qquad \varepsilon_{xy} = \frac{\gamma}{2} = \frac{u_y + v_x}{2}.$$

2. Закон Гука и безразмерные коэффициенты

Исходный закон линейной упругости:

$$\sigma_{xx} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) + 2\mu\varepsilon_{xx},$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) + 2\mu\varepsilon_{yy},$$

$$\sigma_{xy} = 2\mu\varepsilon_{xy}.$$

Подставляем найденные деформации:

$$\sigma_{xx} = \lambda(u_x + v_y) + 2\mu u_x = (\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y,$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(u_x + v_y) + 2\mu v_y = \lambda u_x + (\lambda + 2\mu)v_y,$$

$$\sigma_{xy} = 2\mu\frac{u_y + v_x}{2} = \mu(u_y + v_x).$$

Связь λ, μ, ν получена из одноосного растяжения в задании 1:

$$\bar{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}, \qquad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1 - 2\nu},$$

$$\lambda + 2\mu = \frac{2\mu\nu + 2\mu(1 - 2\nu)}{1 - 2\nu} = \frac{2\mu(1 - \nu)}{1 - 2\nu},$$

$$A = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{1 - 2\nu}{2(1 - \nu)} = \frac{0{,}4}{1{,}4} = \frac{2}{7},$$

$$C = \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} = \frac{\nu}{1 - \nu} = \frac{0{,}3}{0{,}7} = \frac{3}{7},$$

$$B = A + C = \frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}.$$

$$\bar{\sigma}_{xx} = u_x + Cv_y, \qquad \bar{\sigma}_{yy} = v_y + Cu_x,$$

$$\bar{\sigma}_{xy} = A(u_y + v_x).$$

3. Баланс сил малого прямоугольника

Для элемента dx·dy сумма сил равна нулю:

$$[\bar{\sigma}_{xx}(x + dx, y) - \bar{\sigma}_{xx}(x, y)]\,dy$$

$$+ [\bar{\sigma}_{xy}(x, y + dy) - \bar{\sigma}_{xy}(x, y)]\,dx = 0,$$

$$\frac{\bar{\sigma}_{xx}(x + dx, y) - \bar{\sigma}_{xx}(x, y)}{dx}$$

$$+ \frac{\bar{\sigma}_{xy}(x, y + dy) - \bar{\sigma}_{xy}(x, y)}{dy} = 0.$$

$$dx, dy \to 0: \quad \partial_x\bar{\sigma}_{xx} + \partial_y\bar{\sigma}_{xy} = 0,$$

$$[\bar{\sigma}_{xy}(x + dx, y) - \bar{\sigma}_{xy}(x, y)]\,dy$$

$$+ [\bar{\sigma}_{yy}(x, y + dy) - \bar{\sigma}_{yy}(x, y)]\,dx = 0,$$

$$\frac{\bar{\sigma}_{xy}(x + dx, y) - \bar{\sigma}_{xy}(x, y)}{dx}$$

$$+ \frac{\bar{\sigma}_{yy}(x, y + dy) - \bar{\sigma}_{yy}(x, y)}{dy} = 0,$$

$$dx, dy \to 0: \quad \partial_x\bar{\sigma}_{xy} + \partial_y\bar{\sigma}_{yy} = 0.$$

В первое равенство подставляем напряжения:

$$\partial_x(u_x + Cv_y) + \partial_y[A(u_y + v_x)] = 0,$$

$$u_{xx} + Cv_{yx} + Au_{yy} + Av_{xy} = 0,$$

$$v_{yx} = v_{xy} \quad \Longrightarrow \quad u_{xx} + Au_{yy} + (A + C)v_{xy} = 0,$$

$$u_{xx} + \tfrac{2}{7}u_{yy} + \tfrac{5}{7}v_{xy} = 0.$$

Во второе равенство:

$$\partial_x[A(u_y + v_x)] + \partial_y(v_y + Cu_x) = 0,$$

$$Au_{yx} + Av_{xx} + v_{yy} + Cu_{xy} = 0,$$

$$u_{yx} = u_{xy} \quad \Longrightarrow \quad v_{yy} + Av_{xx} + (A + C)u_{xy} = 0,$$

$$v_{yy} + \tfrac{2}{7}v_{xx} + \tfrac{5}{7}u_{xy} = 0.$$

4. Граничные условия через внешнюю нормаль

$$n = (n_x, n_y), \qquad t_x = \bar{\sigma}_{xx}n_x + \bar{\sigma}_{xy}n_y,$$

$$t_y = \bar{\sigma}_{xy}n_x + \bar{\sigma}_{yy}n_y.$$

Свободные горизонтальные стороны:

$$y = 0: \; n = (0, -1), \quad (t_x, t_y) = (-\bar{\sigma}_{xy}, -\bar{\sigma}_{yy}) = (0, 0),$$

$$y = 1: \; n = (0, 1), \quad (t_x, t_y) = (\bar{\sigma}_{xy}, \bar{\sigma}_{yy}) = (0, 0),$$

$$A(u_y + v_x) = 0, \quad v_y + Cu_x = 0,$$

$$A = \tfrac{2}{7} \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad u_y + v_x = 0, \quad v_y + \tfrac{3}{7}u_x = 0.$$

Правая сторона:

$$x = 2: \; n = (1, 0), \quad (t_x, t_y) = (\bar{\sigma}_{xx}, \bar{\sigma}_{xy}) = (0, q),$$

$$u_x + Cv_y = 0, \qquad A(u_y + v_x) = y(1 - y),$$

$$u_x + \tfrac{3}{7}v_y = 0, \qquad u_y + v_x = \tfrac{7}{2}y(1 - y).$$

Краевая задача для перемещений

$$u_{xx} + \tfrac{2}{7}u_{yy} + \tfrac{5}{7}v_{xy} = 0, \qquad v_{yy} + \tfrac{2}{7}v_{xx} + \tfrac{5}{7}u_{xy} = 0,$$

$$u(0, y) = v(0, y) = 0,$$

$$y = 0, 1: \quad u_y + v_x = 0, \quad v_y + \tfrac{3}{7}u_x = 0,$$

$$x = 2: \quad u_x + \tfrac{3}{7}v_y = 0, \quad u_y + v_x = \tfrac{7}{2}y(1 - y).$$

Получены уравнения и граничные условия для u и v. Формулы для самих перемещений не найдены.

Суммарная сила и момент

$$F_y = \int_0^1 q(y)\,dy = \int_0^1 (y - y^2)\,dy = \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{6},$$

$$M_0 = \int_0^1 2q(y)\,dy = 2F_y = \frac{1}{3}.$$

На заделке n = (−1,0). Поэтому усилия и момент реакции относительно (0,0):

$$t_x = -\bar{\sigma}_{xx}, \qquad t_y = -\bar{\sigma}_{xy},$$

$$R_x = \int_0^1 t_x\,dy = -\int_0^1 \bar{\sigma}_{xx}(0,y)\,dy = 0,$$

$$R_y = \int_0^1 t_y\,dy = -\int_0^1 \bar{\sigma}_{xy}(0,y)\,dy = -F_y = -\frac{1}{6},$$

$$M_R = \int_0^1 (0 \cdot t_y - y t_x)\,dy = \int_0^1 y\bar{\sigma}_{xx}(0,y)\,dy = -\frac{1}{3}.$$

Задание 4. Канонический вид. Уравнения Гельмгольца и Пуассона

4.1. Исходное уравнение

$$\sum_{i,j=1}^{5} a_{ij}u_{x_ix_j} + \sum_{i=1}^{5} b_i u_{x_i} - u = x_1^2 - 3x_5, \qquad A = A^T.$$

Десятичную A считаем округлением дробной A_0; вектор b сохраняем как задано.

$$A_0 = N/210, \qquad \max_{i,j} |a_{ij} - (A_0)_{ij}| < 7 \cdot 10^{-16}.$$

$$N = \begin{bmatrix} 325 & -24 & 190 & -48 & 155 \\ -24 & 24 & 48 & 48 & -120 \\ 190 & 48 & 40 & 96 & -310 \\ -48 & 48 & 96 & 96 & -240 \\ 155 & -120 & -310 & -240 & 565 \end{bmatrix}$$

$$b_1 = 1{,}470526299866703, \quad b_2 = -1{,}881907599231525,$$

$$b_3 = -0{,}704984621975347, \quad b_4 = 0{,}708320756536520,$$

$$b_5 = 2{,}880495543856732.$$

Линейная замена и правило цепочки

$$y_k = \sum_i \alpha_{ki} x_i, \quad u(x) = v(y), \quad \frac{\partial y_k}{\partial x_i} = \alpha_{ki},$$

$$u_{x_i} = \sum_k v_{y_k} \alpha_{ki},$$

$$u_{x_ix_j} = \sum_k \alpha_{ki} \sum_l v_{y_ky_l} \alpha_{lj},$$

$$\sum_{i,j} a_{ij} u_{x_ix_j} = \sum_{k,l} \left(\sum_{i,j} \alpha_{ki} a_{ij} \alpha_{lj} \right) v_{y_ky_l},$$

$$B = \alpha A_0 \alpha^T, \qquad \gamma = \alpha b,$$

$$\sum_{k,l} B_{kl} v_{y_ky_l} + \sum_k \gamma_k v_{y_k} - v = x_1(y)^2 - 3x_5(y).$$

Нужно выбрать α так, чтобы B стала диагональной.

Собственные векторы при λ = 0

Обозначим через E_1, …, E_5 левые части пяти строк Nr. Проверяем комбинации строк:

$$E_4 = 2E_2, \qquad 5E_5 = -E_1 - 30E_2 + 2E_3,$$

$$4E_1 - 30E_2 + 17E_3 = 1050(5r_1 - r_5),$$

$$-24E_1 + 55E_2 + 48E_3 = 4200(r_2 + 2r_4 - 6r_5),$$

$$34E_1 + 120E_2 - 43E_3 = 2100(5r_3 + 2r_5).$$

$$Nr=0 \iff r_1=r_5/5,\quad r_2=-2r_4+6r_5,\quad r_3=-2r_5/5,$$

$$r_4=1,\ r_5=0:\qquad r^{(2)}=(0;-2;0;1;0)^T,$$

$$(r^{(2)})^T r=-2r_2+r_4=5r_4-12r_5=0,$$

$$r_5=5,\ r_4=12:\qquad r^{(3)}=(1;6;-2;12;5)^T,$$

$$Nr^{(2)}=Nr^{(3)}=0,\qquad (r^{(2)})^T r^{(3)}=-12+12=0.$$

Остальные направления

У симметричной матрицы собственные векторы для разных собственных значений перпендикулярны:

$$A_0 p=\lambda p,\quad A_0 r=\mu r,\quad A_0^T=A_0,$$

$$\lambda p^T r=(A_0 p)^T r=p^T A_0 r=\mu p^T r,\quad \lambda\neq\mu \implies p^T r=0.$$

Поэтому остальные направления ищем перпендикулярно двум найденным:

$$-2r_2+r_4=0,\qquad r_1+6r_2-2r_3+12r_4+5r_5=0,$$

$$r_4=2r_2,\qquad r_1+30r_2-2r_3+5r_5=0.$$

Сначала положим $r_2 = r_5 = 0$ и $r_3 = 1$:

$$p=(2;0;1;0;0)^T,\qquad Np=(840;0;420;0;0)^T=420p.$$

В оставшемся пространстве вектор r перпендикулярен p:

$$2r_1+r_3=0 \implies r_3=-2r_1,\quad r_5=-r_1-6r_2,$$

$$r=r_1 a+r_2 d,\quad a=(1;0;-2;0;-1)^T,\quad d=(0;1;0;2;-6)^T,$$

$$Na=(-210;0;420;0;210)^T=-210a,$$

$$Nd=(-1050;840;2100;1680;-3990)^T=-1050a+840d,$$

$$N(a-d)=840(a-d).$$

$$r^{(1)}=a,\quad r^{(4)}=p,\quad r^{(5)}=a-d=(1;-1;-2;-2;5)^T,$$

$$\lambda_1=-1,\quad \lambda_2=\lambda_3=0,\quad \lambda_4=2,\quad \lambda_5=4.$$

Получены пять ненулевых взаимно перпендикулярных векторов: это базис. Поэтому других собственных значений нет.

$$\det(\lambda I-A_0)=\prod_{i=1}^{5}(\lambda-\lambda_i)=\lambda^2(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-4).$$

Нормировка и масштаб координат

$$(\|r^{(1)}\|^2;\ldots;\|r^{(5)}\|^2)=(6;5;210;5;35),$$

$$q_i=r^{(i)}/\|r^{(i)}\|,\qquad q_k^T q_l=0\ (k\neq l),\quad q_k^T q_k=1,$$

$$s_i=\sqrt{|\lambda_i|}\ (\lambda_i\neq 0),\qquad s_i=1\ (\lambda_i=0),$$

$$\alpha_{ij} = q_{i,j}/s_i, \qquad y_i = q_i^T x/s_i,$$

$$B_{kl} = \frac{q_k^T A_0 q_l}{s_k s_l} = \frac{\lambda_l q_k^T q_l}{s_k s_l},$$

$$B_{kk} = \lambda_k/s_k^2, \quad B_{kl} = 0\ (k \neq l), \quad B = \mathrm{diag}(-1, 0, 0, 1, 1).$$

$$y_1 = \frac{x_1 - 2x_3 - x_5}{\sqrt{6}}, \qquad y_2 = \frac{-2x_2 + x_4}{\sqrt{5}},$$

$$y_3 = \frac{x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 12x_4 + 5x_5}{\sqrt{210}},$$

$$y_4 = \frac{2x_1 + x_3}{\sqrt{10}}, \qquad y_5 = \frac{x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 + 5x_5}{2\sqrt{35}}.$$

Первые производные и правая часть

$$\gamma_1 = \frac{b_1 - 2b_3 - b_5}{\sqrt{6}} \approx 0, \qquad \gamma_2 = \frac{-2b_2 + b_4}{\sqrt{5}} \approx 2,$$

$$\gamma_3 = \frac{b_1 + 6b_2 - 2b_3 + 12b_4 + 5b_5}{\sqrt{210}} \approx 1,$$

$$\gamma_4 = \frac{2b_1 + b_3}{\sqrt{10}} \approx \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \gamma_5 = \frac{b_1 - b_2 - 2b_3 - 2b_4 + 5b_5}{2\sqrt{35}} \approx \frac{3}{2}.$$

В сумме сохраняем точные выражения γ_i через заданные b_i, включая малое γ_1.

$$q_i^T x = s_i y_i, \qquad x = \sum_i q_i (q_i^T x) = \sum_i s_i q_i y_i,$$

$$x_1 = \frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{y_3}{\sqrt{210}} + 2\sqrt{\frac{2}{5}}\, y_4 + \frac{2y_5}{\sqrt{35}},$$

$$x_5 = -\frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{5y_3}{\sqrt{210}} + \frac{10y_5}{\sqrt{35}}.$$

Ответ 4.1: канонический вид для A_0

$$-v_{y_1 y_1} + v_{y_4 y_4} + v_{y_5 y_5} + \sum_{i=1}^{5} \gamma_i v_{y_i} - v$$

$$= \left(\frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{y_3}{\sqrt{210}} + 2\sqrt{\frac{2}{5}}\, y_4 + \frac{2y_5}{\sqrt{35}} \right)^2$$

$$- 3\left(-\frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{5y_3}{\sqrt{210}} + \frac{10y_5}{\sqrt{35}} \right).$$

Здесь требуется преобразовать уравнение; определить v без дополнительных условий нельзя.

4.2. Уравнения Гельмгольца и Пуассона

$$\Omega = (0,2)\times(0,1), \quad \Delta u + cu = f_c, \quad c = 1; -1; 0,$$

$$f_1 = y(x^3 + 6x + y^2 + 6), \quad f_{-1} = -y(x^3 - 6x + y^2 - 6),$$

$$f_0 = 6y(x+1), \quad f_c = 6y(x+1) + cy(x^3 + y^2),$$

$$u(x,0) = 0, \quad u(x,1) = x^3 + 1,$$

$$u_x(0,y) = 0, \qquad u_x(2,y) = 12y.$$

Точное решение

Подбираем многочлен u по виду правой части:

$$f_c = 6xy + 6y + c(x^3 y + y^3), \qquad u = ax^3 y + by^3,$$

$$u_{xx} = 6axy, \quad u_{yy} = 6by,$$

$$\Delta u + cu = 6axy + 6by + c(ax^3 y + by^3),$$

$$6a = 6, \quad 6b = 6 \implies a = b = 1.$$

$$u = x^3 y + y^3, \quad u_x = 3x^2 y, \quad u_y = x^3 + 3y^2,$$

$$u(x,0) = 0, \qquad u(x,1) = x^3 + 1,$$

$$u_x(0,y) = 0, \qquad u_x(2,y) = 12y.$$

Точное решение 4.2

$$u(x,y) = y(x^3 + y^2) \qquad (c = 1; -1; 0).$$

4.3. Граничное интегральное уравнение

$$M_1=(1{,}1;0{,}3),\quad M_2=(1{,}1;-0{,}3),\quad M_3=(1{,}1;1),$$

$$P=(x,y),\quad M=(a,b),\quad r=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2},$$

$$S=\partial\Omega,\quad n-\text{внешняя нормаль},\quad q=\partial_n u.$$

Формула Грина связывает значение u в точке с интегралами по области и её границе. Для неё найдём V(r), удовлетворяющую (Δ + c)V = 0 при r > 0.

Лапласиан радиальной функции

$$r_x=\tfrac{x-a}{r},\quad r_y=\tfrac{y-b}{r},\quad r_x^2+r_y^2=1,$$

$$r_{xx}=\tfrac{1}{r}-\tfrac{(x-a)^2}{r^3},\quad r_{yy}=\tfrac{1}{r}-\tfrac{(y-b)^2}{r^3},$$

$$r_{xx}+r_{yy}=\tfrac{2}{r}-\tfrac{r^2}{r^3}=\tfrac{1}{r},$$

$$V_{xx}=V''r_x^2+V'r_{xx},\quad V_{yy}=V''r_y^2+V'r_{yy},$$

$$\Delta V=V''+V'/r,\qquad V''+V'/r+cV=0.$$

Случай c = 0

Выбираем 2πrV′→−1: тогда полный малый круг даёт в формуле Грина ровно u(M).

$$(rV')'=0\implies rV'=C_1,$$

$$V=C_1\ln r+C_2,\qquad 2\pi rV'=2\pi C_1.$$

$$\lim_{r\to0}2\pi rV'=-1\implies V_0=-\tfrac{\ln r}{2\pi}.$$

Случаи c = ±1: строим решения рядами

$$F(r)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k r^{2k},\quad a_0=1,$$

$$F''+F'/r=\sum_{k=0}^{\infty}4(k+1)^2a_{k+1}r^{2k},$$

$$4(k+1)^2a_{k+1}+ca_k=0,$$

$$a_{k+1}=-\tfrac{c}{4(k+1)^2}a_k\implies a_k=\tfrac{(-c)^k}{4^k(k!)^2},$$

$$F_c(r)=\sum_{k=0}^{\infty}\tfrac{(-c)^k(r/2)^{2k}}{(k!)^2}.$$

Чтобы получить нужный логарифм, ищем второе решение в виде:

$$V_c=-\tfrac{F_c\ln r}{2\pi}+B_c,\qquad B_c=\sum_{k=0}^{\infty}b_k r^{2k},$$

$$(F\ln r)'=F'\ln r+F/r,$$

$$(F\ln r)'' = F''\ln r + 2F'/r - F/r^2,$$

$$(\Delta + c)(F\ln r) = 2F'/r,$$

$$(\Delta + c)B_c = F_c'/(\pi r),$$

$$4(k+1)^2 b_{k+1} + cb_k = \tfrac{2(k+1)}{\pi} a_{k+1},$$

$$\tfrac{b_{k+1}}{a_{k+1}} - \tfrac{b_k}{a_k} = \tfrac{1}{2\pi(k+1)}.$$

$$H_0 = 0, \quad H_k = \sum_{j=1}^{k} \tfrac{1}{j}, \quad b_k = a_k\left(b_0 + \tfrac{H_k}{2\pi}\right),$$

$$\gamma_E = \lim_{n\to\infty}(H_n - \ln n), \qquad b_0 = \tfrac{\ln 2 - \gamma_E}{2\pi},$$

$$V_c(r) = \tfrac{1}{2\pi}\left[(\ln 2 - \gamma_E - \ln r)F_c(r) + \sum_{k=1}^{\infty} H_k a_k r^{2k}\right].$$

Выбор b_0 фиксирует стандартные обозначения функций Бесселя:

$$F_1 = J_0, \quad F_{-1} = I_0, \qquad V_1 = -\tfrac{1}{4}Y_0, \quad V_{-1} = \tfrac{K_0}{2\pi},$$

$$F_c = 1 + O(r^2), \quad V_c = -\tfrac{\ln r}{2\pi} + O(1), \quad 2\pi r V_c' \to -1.$$

Добавление к V гладкого решения того же однородного уравнения не меняет итоговую формулу Грина; важен коэффициент логарифма.

Формула Грина из правила произведения

$$\operatorname{div}(u\nabla V - V\nabla u)$$

$$= \nabla u\cdot\nabla V + u\Delta V - \nabla V\cdot\nabla u - V\Delta u = u\Delta V - V\Delta u,$$

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \operatorname{div}(u\nabla V - V\nabla u)\, d\Omega$$

$$= \int_{\partial\Omega_\varepsilon} (u\nabla V - V\nabla u)\cdot n\, ds,$$

$$\int_{\Omega_\varepsilon} (u\Delta V - V\Delta u)\, d\Omega = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} (uV_n - Vq)\, ds.$$

$$\Delta V = -cV, \quad \Delta u = f_c - cu,$$

$$u\Delta V - V\Delta u = -cuV - V(f_c - cu) = -Vf_c.$$

Исключаем маленький круг около M

$$\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus B_\varepsilon(M), \quad S_\varepsilon = S \setminus B_\varepsilon(M),$$

$$\partial\Omega_\varepsilon = S_\varepsilon \cup C_\varepsilon,$$

$$n|_{C_\varepsilon} = -\tfrac{P-M}{r}, \quad V_n = -V' \sim \tfrac{1}{2\pi\varepsilon}, \quad ds = \varepsilon\, d\vartheta,$$

$$\int_{C_\varepsilon} uV_n\, ds \to \int_0^{\theta u(M)} \tfrac{}{2\pi}\, d\vartheta = \tfrac{\theta}{2\pi}u(M),$$

$$\left|\int_{C_\varepsilon} Vq\,ds\right| \le C\varepsilon(1+|\ln\varepsilon|)\to 0,$$

$$-\int_\Omega Vf_c\,d\Omega = \int_S (uV_n - Vq)\,ds + \frac{\theta}{2\pi}u(M).$$

При ε→0 интеграл по Sε переходит в интеграл по S. Угол θ равен 2π внутри и π на прямой стороне. Для M вне области круг не вырезаем.

Ответ 4.3

$$\alpha u(M) = \int_S (V_c q - uV_n)\,ds - \int_\Omega V_c f_c\,d\Omega,$$

$$\alpha(M_1)=1, \qquad \alpha(M_2)=0, \qquad \alpha(M_3)=\tfrac{1}{2}.$$

Нормальная производная и точные граничные данные

$$\nabla V = V_c'(r)\tfrac{P-M}{r}, \qquad V_n = V_c'(r)\tfrac{(P-M)\cdot n}{r},$$

$$V_0' = -\tfrac{1}{2\pi r}, \qquad Y_1 = -Y_0', \quad K_1 = -K_0',$$

$$V_1' = \tfrac{1}{4}Y_1(r), \qquad V_{-1}' = -\tfrac{K_1(r)}{2\pi}.$$

$$\nabla u = (3x^2y,\ x^3+3y^2), \qquad q = \nabla u\cdot n,$$

$$y=0: \quad n=(0,-1), \quad u=0, \quad q=-x^3,$$

$$y=1: \quad n=(0,1), \quad u=x^3+1, \quad q=x^3+3,$$

$$x=0: \quad n=(-1,0), \quad u=y^3, \quad q=0,$$

$$x=2: \quad n=(1,0), \quad u=y(8+y^2), \quad q=12y,$$

$$\alpha u(M_1) = 0{,}3(1{,}1^3+0{,}3^2) = 0{,}4263,$$

$$\alpha u(M_2)=0, \qquad \alpha u(M_3)=\tfrac{1}{2}(1{,}1^3+1)=1{,}1655.$$