①

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \veebar q$	$(p \wedge q) \to (p \vee q)$
V	V	V	V	F	V
V	F	F	V	V	V
F	V	F	V	V	V
F	F	F	F	F	V

②

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

a) $A + 2B - C$

$2B = 2A \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad 2B = \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix}$

$A + 2B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 2 & 4 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 3 & 3 & 10 \\ 1 & 6 & -2 \end{bmatrix}$

$A + 2B - C = \begin{bmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 3 & 3 & 10 \\ 1 & 6 & -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -4 & -3 \\ 3 & 2 & 11 \\ -2 & 6 & -4 \end{bmatrix}$

b) $2A^T$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

$2A^T = 2A \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -2 & 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 6 & -2 \\ 0 & 2 & 4 \\ -4 & 8 & 0 \end{bmatrix}$

c) $B \times C$

$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

$BXC = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x1+(-1)x0+0x3, & 2x2+(-1)x1+0x0, & 2x1+(-1)x(-1)+0x2 \\ 0x1+1x0+3x3, & 0x2+1x1+3x0, & 0x1+1x(-1)+3x2 \\ 1x1+2x0+(-1)x3, & 1x2+2x1+(-1)x0, & 1x1+2x(-1)+(-1)x2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$

$\begin{bmatrix} 2+0+0, & 4-1+0, & 2+1+0 \\ 0+0+9, & 0+1+3, & 0-1+6 \\ 1+0-3, & 2+2+0, & 1-2-2 \end{bmatrix} \Leftrightarrow$

$h(x) = x^2 - 2x + 3$

$h(-2) = 4 + 4 + 3 = 11$

$h(-1) = 1 + 2 + 3 = 6$

$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 9 & 1 & 5 \\ -2 & 4 & -2 \end{bmatrix}$

③

$B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

$\det(B) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$2 \times 1 \times (-1) = -2 \qquad -1 \times 0 \times 2 = 0$

$-1 \times 0 \times 1 = 0 \qquad 2 \times 3 \times 2 = 12$

$0 \times 0 \times 2 = 0 \qquad 0 \times 3 \times 1 = 0$

$-2 \times 1 \times 0 =$

$-1 \times 0 =$

$-2 - 0 = -2$

$-12 + 0 = -12$

b)

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 4 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \det(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

$1 \times 1 \times 0 = 0 \qquad 0 \times 3 \times 0 = 0$

$0 \times 4 \times (-1) = 0 \qquad -1 \times 1 \times 2 = -8$

$-2 \times 3 \times 2 = -12 \qquad -2 \times 1 \times (-1) = 2$

$-1 \times 1 \times 0 = -12 \qquad 0 \times 2 \times 1 = 0$

$-12 + 0 = -2 - 2$

A^{-1}:

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 10 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 10 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -22 & 7 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 10 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{7}{22} & \frac{2}{22} & -\frac{1}{22} \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{8}{22} & \frac{4}{22} & -\frac{2}{22} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{22} & \frac{3}{22} & \frac{10}{22} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{7}{22} & -\frac{2}{22} & -\frac{1}{22} \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{8}{22} & \frac{4}{22} & -\frac{2}{22} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{22} & \frac{3}{22} & \frac{10}{22} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{7}{22} & -\frac{2}{22} & -\frac{1}{22} \end{bmatrix}$

$A^{-1} = \frac{1}{22} \times \begin{bmatrix} 8 & 4 & -2 \\ -1 & 3 & 10 \\ -7 & -2 & -1 \end{bmatrix}$

$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \det(C) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 2 & 3 & 0 \end{bmatrix}$

$1 \times 1 \times 2 = 2 \qquad 2 \times (-1) \times 3 = -6$

$2 \times (-1) \times 0 = 0 \qquad 1 \times 0 \times 1 = 0$

$1 \times 0 \times 3 = 0 \qquad 1 \times 1 \times 3 = 3$

$2 + 0 + 0 = 2 \qquad -6 + 0 + 3 = -3$

C^{-1}:

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -1 & -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & -3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{7} & -\frac{6}{7} & -\frac{1}{7} \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{7} & \frac{1}{7} & -\frac{1}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{7} & -\frac{6}{7} & -\frac{1}{7} \end{bmatrix}$

$C^{-1} = -\frac{1}{7} \times \begin{bmatrix} -1 & -2 & -3 \\ -4 & -1 & 1 \\ -3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$

④

$\begin{cases} x - y + z = 3 \\ x + y - z = 0 \\ 2x - y + z = 8 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix} \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 8 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{17}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array}\right]$

$L_2 \leftrightarrow L_1$

$L_2 = L_2 - 2 \times L_1$

$L_3 = L_3 - 2 \times L_1$

$L_3 = L_3 - \frac{3}{2} \times L_2$

$L_3 = L_3 + \frac{1}{2} \times L_2$

$\begin{cases} x - y + z = 3 \\ y - z = 0 \\ z = 7 \end{cases}$

$z = 7$

$y - 7 = 0 \quad y = 7$

$x - 7 + 7 = 3 \quad x = 3$

$x = 3$

$y = \frac{17}{2}$

$-\frac{1}{2} \times (-1) + \frac{1}{2} \times 7 = \frac{8}{2} = 4$

$-\frac{1}{2} \times 3 + \frac{1}{2} \times \frac{17}{2} = -\frac{3}{2} + \frac{17}{4} = \frac{11}{4}$

$-\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times 7 = \frac{6}{2} = 3$

$-\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times \frac{17}{2} = \frac{17}{4}$

$-\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 7 = \frac{7}{2}$

$-\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times 3 = \frac{2}{2} = 1$

$-\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 = 0$

$-\frac{1}{2} \times 1 + \frac{1}{2} \times 0 = -\frac{1}{2}$

$-\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$

$-\frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 = 0$

⑤

$T(1,0) = |2x-1| \quad T(0,1) = (2,4)$

$a \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{matrix} 4 \\ 9 \end{matrix}$

$2a = 4$

$a = 2$

$4a + 2b = 9$

$8 + 2b = 9$

$2b = 1$

$b = \frac{1}{2}$

$T(1,1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

a) Linear

b) Linear

$T(x,y) = (x+3x, -x+4y, 2x+0x)$

$= (4x, -x+4y, 2x)$

$T(x,y) = \begin{pmatrix} 4x \\ -x+4y \\ 2x \end{pmatrix}$

⑥

$v_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad v_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$2x + 2y = 1$

$x + y = 0$

$x = 1$

$y = -1$

$2x + 2y = 0$

$x + y = 2$

$x = 3$

$y = -1$

$\det \neq 0 = \top$