

Mathematik II für ET

1. Übungsblatt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. Priska Jahnke
Dr. Sergiy Nesenenko
Florian Steinberg

SS2013
19.04.2013

Gruppenübung

Aufgabe G1 (Gaußscher Algorithmus)

Sei $a \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ und $b \in \mathbb{R}$. Dann beschreibt die Menge $E = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid a^T x = b\}$ eine Ebene im \mathbb{R}^3 .

- (a) Berechnen Sie den Schnittpunkt der Ebenen E_1, E_2 und E_3 , die durch die Vektoren $a_1 = (-1, 2, 3)^T$, $a_2 = (3, -2, 1)^T$, $a_3 = (2, 4, -8)^T$ und die Skalare $b_1 = 7$, $b_2 = 1$, $b_3 = 8$ gegeben sind.
- (b) Finden Sie Beispiele von drei Ebenen, die keinen bzw. mehr als einen Schnittpunkt haben.

Aufgabe G2 (Lineare Abbildungen)

Zeigen Sie welche der folgenden Abbildungen eine lineare Abbildung beschreiben.

- (a) $p : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, x \mapsto p(x)$, für beliebige Polynome p über \mathbb{C} .

(b) $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, v \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ v_1 - v_2 \\ 2v_2 \end{pmatrix}, v \in \mathbb{R}^2$.

- (c) $\tau : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, u \mapsto \alpha u$ mit $\alpha \in \mathbb{R}$ fest.

(d) $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, v \mapsto \begin{pmatrix} v_1 \cdot v_2 \\ v_1 + 2v_2 \\ 3v_1 \end{pmatrix}, v \in \mathbb{R}^2$.

Bestimmen Sie Kern und Bild der linearen Abbildungen!

Aufgabe G3 (Berechnung von Determinanten)

Gegeben sei die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 3 & -1 & 6 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

Berechnen Sie die Determinante $\det(A)$

- (a) mittels der Entwicklung nach Zeilen oder Spalten
- (b) mittels elementarer Umformungen zu einer oberen Dreiecksmatrix.

Hausübung

Aufgabe H1 (Gaußscher Algorithmus)

(6 Punkte)

Für welche Werte des Parameters $k \in \mathbb{R}$ besitzt das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} x - 3z &= -3 \\ x + 2y + kz &= 1 \\ 2x + ky - z &= -2 \end{aligned}$$

- (i) keine, (ii) genau eine, (iii) mehrere Lösungen? Bestimmen Sie gegebenenfalls alle Lösungen in Abhängigkeit von k .

Aufgabe H2 (Geradenschnitte und Hessesche Normalform)

(6 Punkte)

Gegeben seien die beiden Geraden

$$g_1 : \vec{r}_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 16 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{mit } \lambda \in \mathbb{R},$$

$$g_2 : \vec{r}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ 15 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{mit } \mu \in \mathbb{R}.$$

- a) Berechnen Sie den Schnittpunkt der beiden Geraden.
- b) Wie groß ist der Schnittwinkel der beiden Geraden?
- c) Geben Sie die Hessesche Normalform der Ebene an, die durch $(0, 8, 15)^T$ und die beiden Richtungsvektoren von g_1 und g_2 gegeben ist.

Aufgabe H3 (Vandermonde-Matrix)

(6 Punkte)

Beweisen Sie die folgende Gleichung für $a, b, c \in \mathbb{R}$:

$$\det V = \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{pmatrix} = (a - b)(a - c)(c - b).$$