

Mathematik II für Informatik

12. Übungsblatt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. Thomas Streicher
Alexander Dietz, Anton Freund
Lucas Schöbel-Kröhn

SoSe 2018

Übung: 28./29. Juni 2018
Abgabe: 5./6. Juli 2018

Gruppenübung

Aufgabe G1 (Anfangswertproblem zu gegebener Lösung)

Betrachten Sie die durch $y(t) = t \cdot \sin(t) + 1$ gegebene Funktion $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Geben Sie zwei verschiedene Funktionen $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ an, sodass y das Anfangswertproblem

$$\begin{cases} y''(t) = F(t, y(t), y'(t)), \\ y(0) = 1, \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

löst.

Aufgabe G2 (Homogene lineare Differentialgleichungen)

Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung

$$y'(t) = \cos(t) \cdot y(t).$$

Verwenden Sie dazu Trennung der Variablen. Bestimmen Sie die spezielle Lösung für den Anfangswert $y(\pi/2) = e$.

Aufgabe G3 (Lineare Systeme und Differentialgleichungen höherer Ordnung)

Wir betrachten das System

$$\begin{cases} y_1'(t) = y_2(t), \\ y_2'(t) = y_1(t) \end{cases}$$

von linearen Differentialgleichungen erster Ordnung.

- Schreiben Sie das gegebene Gleichungssystem in Matrixschreibweise.
- Bestimmen Sie die allgemeine Lösung des gegebenen Systems von Differentialgleichungen.
- Verwenden Sie Ihr Ergebnis, um die allgemeine Lösung der Differentialgleichung $y''(t) = y(t)$ zu bestimmen.

Hausübung

Aufgabe H1 (Inhomogene lineare Differentialgleichungen)

(12 Punkte)

Gegeben sei die lineare Differentialgleichung

$$y'(t) = \frac{3}{1+t} \cdot y(t) + 3 \cdot (1+t), \quad t > -1.$$

- Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen Differentialgleichung durch Trennung der Variablen.
- Ermitteln Sie eine partikuläre Lösung der inhomogenen Differentialgleichung durch Variation der Konstanten.
- Wie lautet die allgemeine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung?

Aufgabe H2 (Lösen einer Differentialgleichung durch Substitution)
Bestimmen Sie eine Lösung des Anfangswertproblems

(12 Punkte)

$$\begin{cases} y'(t) = \left(\frac{y(t)}{t} \right)^2, \\ y(1) = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

Betrachten Sie dazu die Substitution $u(t) = \frac{y(t)}{t}$ und argumentieren Sie mit Trennung der Variablen.
Tipp: Es gilt $\int \frac{1}{u(u-1)} du = \ln\left(\frac{1-u}{u}\right) + c$.

Aufgabe H3 (System linearer Differentialgleichungen)
Wir betrachten das System

(12 Punkte)

$$\begin{cases} y_1'(t) = y_2(t) + y_3(t), \\ y_2'(t) = y_1(t) + y_3(t), \\ y_3'(t) = y_1(t) + y_2(t) \end{cases}$$

von linearen Differentialgleichungen erster Ordnung.

- (a) Schreiben Sie das gegebene Gleichungssystem in Matrixschreibweise.
- (b) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung des gegebenen Systems von Differentialgleichungen, indem Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren der Matrix aus Teilaufgabe (a) ermitteln.
- (c) Bestimmen Sie diejenige Lösung, die die Anfangsbedingung

$$\begin{cases} y_1(0) = 0, \\ y_2(0) = 4, \\ y_3(0) = 1 \end{cases}$$

erfüllt.