

Mathematik II für Informatik

1. Übungsblatt (mit Lösungshinweisen)



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. Thomas Streicher
Alexander Dietz, Anton Freund
Lucas Schöbel-Kröhn

SoSe 2018

Übung: 12./13. April 2018
Abgabe: 19./20. April 2018

Gruppenübung

Aufgabe G1

Es seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Folgen in \mathbb{R} . Entscheiden Sie für die folgenden vier Aussagen jeweils, ob sie allgemein gültig sind. Geben Sie jeweils einen Beweis, bzw. ein Gegenbeispiel an.

- (a) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent, so ist $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent.
- (b) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent, so ist $(a_n \cdot b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent.
- (c) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent, so ist $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent.
- (d) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent, so ist $(a_n \cdot b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent.

Lösungshinweise:

- (a) *Behauptung:* $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent $\implies (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent.

Beweis:

Annahme: $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist konvergent.

Da $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert, ist auch die Folge $(-a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent. Das bedeutet aber nach Annahme, dass die Folge $(a_n + b_n + (-a_n))_{n \in \mathbb{N}} = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent ist, im Widerspruch zur Voraussetzung. Also muss $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent sein.

- (b) Die Aussage ist *falsch*.

Gegenbeispiel: Wir setzen $a_0 = b_0 = 1$, und $a_n = 1/n$ und $b_n = n$ für $n \geq 1$. Dann ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ bekanntermaßen konvergent und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent, denn diese Folge ist offensichtlich nicht beschränkt. Wir erhalten dann als Produktfolge $a_n \cdot b_n = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$, also offensichtlich eine konvergente Folge.

- (c) Die Aussage ist *falsch*.

Gegenbeispiel: Wir setzen $a_n = (-1)^n$ und $b_n = (-1)^{n+1}$ für jedes $n \in \mathbb{N}$. Dann ist die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ bekanntermaßen divergent und für $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ erhält man Divergenz in gleicher Weise wie für $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Aber es ist

$$a_n + b_n = (-1)^n + (-1) \cdot (-1)^n = (-1)^n - (-1)^n = 0$$

für alle $n \in \mathbb{N}$, also ist die Summenfolge $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent.

- (d) Die Aussage ist *falsch*.

Gegenbeispiel: Wir setzen dieses Mal $a_n = b_n = (-1)^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann sind die Folgen $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent, aber es ist $a_n \cdot b_n = (-1)^n \cdot (-1)^n = (-1)^{2n} = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$, also ist die Produktfolge $(a_n \cdot b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent.

Aufgabe G2

- (a) Geben Sie zu jeder Kombination der Eigenschaften *konvergent*, *monoton*, *beschränkt* eine reelle Folge an, welche genau diese Kombination an Eigenschaften trägt. Falls eine Kombination nicht möglich sein sollte, begründen Sie, warum dem so ist.
- (b) Gibt es konvergente Folgen mit mehreren Häufungspunkten oder divergente Folgen ohne Häufungspunkte?
- (c) Gibt es konvergente Folgen ohne Häufungspunkte oder divergente Folgen mit genau einem Häufungspunkt?
- (d) Geben Sie eine Folge an, die alle natürlichen Zahlen bis 100 als Häufungspunkte hat. Konvergiert sie?

Lösungshinweise:

- (a) Konvergente Folgen sind beschränkt. Folgen, die monoton und beschränkt sind, müssen auch konvergent sein. Es bleiben also noch fünf mögliche Fälle:
konvergent, monoton, beschränkt: $a_n = 0$
konvergent, nicht monoton, beschränkt: $b_n = (-1)^n/n$
divergent, monoton, unbeschränkt: $c_n = n$
divergent, nicht monoton, beschränkt: $d_n = (-1)^n$
divergent, nicht monoton, unbeschränkt: $e_n = (-1)^n \cdot n$
- (b) Konvergente Folgen haben genau einen Häufungspunkt, können also nicht mehrere haben. Ein Beispiel für eine divergente Folge ohne Häufungspunkte ist $c_n = n$.
- (c) Konvergente Folgen müssen genau ihren Grenzwert als Häufungspunkt haben. Divergente Folgen mit genau einem Häufungspunkt sind möglich, etwa $f_n = (1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, \dots)$ mit dem Häufungspunkt 1.
- (d) Wir nehmen zum Beispiel

$$g_n = (0, 1, 2, \dots, 100, 0, 1, 2, \dots, 100, 0, 1, 2, \dots) \quad \text{bzw.} \quad g_n = n \mod 101.$$

In (b) haben wir gezeigt, dass eine Folge mit mehr als einem Häufungspunkt nicht konvergieren kann.


Aufgabe G3

Wir betrachten den Raum $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$, wobei $\|(x, y)^T\|_2 := \sqrt{x^2 + y^2}$ die euklidische Norm bezeichne, sowie die Folgen

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = \begin{pmatrix} n^{-1} \\ n^{-2} \end{pmatrix}, \quad (b_n)_{n \in \mathbb{N}} = \begin{pmatrix} n \\ n^{-1} \end{pmatrix}, \quad (c_n)_{n \in \mathbb{N}} = \begin{pmatrix} (-1)^n \\ (-1)^{n+1} \end{pmatrix}.$$

- (a) Skizzieren Sie jeweils die ersten fünf Folgenglieder.
- (b) Welche der Folgen sind konvergent, welche divergent? Beweisen Sie Ihre Vermutung.
- (c) Wir betrachten die gleichen Folgen, aber im Raum $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$, wobei $\|(x, y)^T\|_\infty := \max(|x|, |y|)$ die Maximumsnorm bezeichne. Untersuchen Sie die Konvergenz der Folgen erneut.

Lösungshinweise:



(b) Die erste Folge konvergiert nach dem Sandwichsatz gegen $(0,0)^T$, da

$$0 \leq \|a_n - (0,0)^T\|_2 = \sqrt{n^{-2} + n^{-4}} \leq \sqrt{n^{-2} + n^{-2}} = \sqrt{2}n^{-1} \rightarrow 0$$

gilt.

Die zweite Folge konvergiert nicht, da

$$\|b_n\|_2 = \sqrt{n^2 + n^{-2}} \geq \sqrt{n^2} = n$$

über alle Grenzen wächst.

Die dritte Folge konvergiert nicht, da die beiden Teilfolgen

$$c_{2n} = (1, -1)^T \quad \text{und} \quad c_{2n+1} = (-1, 1)^T$$

konstant sind und damit gegen die beiden unterschiedlichen Grenzwerte $(1, -1)^T$ und $(-1, 1)^T$ konvergieren.

- (c) Es ist $\|a_n\|_\infty = n^{-1}$, somit ist die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt. Da sie nur einen Häufungspunkt besitzt, konvergiert sie nach Aufgabe G2. Da $\|b_n\|_\infty = n$ ist, ist die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ unbeschränkt und damit divergent. Die Folge $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ist wegen $\|c_n\|_\infty = 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$ zwar beschränkt, allerdings besitzt sie zwei Häufungspunkte (vgl. Aufgabenteil (b)) und kann somit nicht konvergieren, wie wir in Aufgabe G2 gesehen haben.

Aufgabe G4

Seien $x > 0$ und $a_0 > 0$ reelle Zahlen. Wir definieren nun rekursiv eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ via

$$a_{n+1} := \frac{1}{2} \cdot \left(a_n + \frac{x}{a_n} \right).$$

- (a) Zeigen Sie induktiv, dass die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ positiv, d.h. $a_n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, ist.
(b) Zeigen Sie, dass für $n \geq 1$ gilt: $a_n \geq \sqrt{x}$.
(c) Zeigen Sie, dass die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ positiv ist und monoton fällt.
(d) Zeigen Sie, dass die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen \sqrt{x} konvergiert.

Lösungshinweise:

- (a) Nach Voraussetzung ist $a_0 > 0$. Sei nun $n \in \mathbb{N}$ beliebig. Angenommen es ist $a_n > 0$. Da $x > 0$ nach Voraussetzung positiv ist, gilt auch $\frac{x}{a_n} > 0$. Die Summe zweier positiver Elemente ist wieder positiv, ebenso das Produkt zweier positiver Zahlen. Somit gilt:

$$a_{n+1} = \underbrace{\frac{1}{2}}_{>0} \cdot \underbrace{\left(\underbrace{a_n}_{>0} + \underbrace{\frac{x}{a_n}}_{>0} \right)}_{>0} > 0.$$

- (b) Diese Aussage folgt aus der Gleichung

$$\begin{aligned} a_n^2 - x &= \frac{1}{4} \left(a_{n-1} + \frac{x}{a_{n-1}} \right)^2 - x \\ &= \frac{1}{4} \left(a_{n-1}^2 + 2x + \left(\frac{x}{a_{n-1}} \right)^2 \right) - x \\ &= \frac{1}{4} \left(a_{n-1} - \frac{x}{a_{n-1}} \right)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

Da a_n nach (a) positiv ist, ist dies äquivalent zu $a_n \geq \sqrt{x}$.

- (c) Positivität haben wir bereits in (a) gezeigt. Um die Monotonie zu zeigen, nutzen wir Aufgabenteil (b). Denn damit folgt die Monotonie aus der Gleichung

$$a_n - a_{n+1} = \frac{1}{2a_n}(a_n^2 - x) \geq 0,$$

also $a_n \geq a_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

- (d) Nach Teil (b) und (c) ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine streng monoton fallende Folge, welche durch \sqrt{x} nach unten beschränkt ist, also ist sie konvergent. Wir bezeichnen den Grenzwert mit a , also $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. Nach Definition bedeutet dies, dass für jedes $\varepsilon > 0$ ein $n_0 \in \mathbb{N}$ existiert, sodass für alle $n > n_0$ gilt:

$$|a_n - a| < \varepsilon.$$

Insbesondere ist dann aber auch $n + 1 > n > n_0$, also gilt auch für alle $n > n_0$:

$$|a_{n+1} - a| < \varepsilon,$$

also konvergiert auch die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen a .

Um nun den Grenzwert a zu berechnen, nutzen wir die Rekursionformel und die Tatsache, dass $(a_{n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ den gleichen Grenzwert wie $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ hat. Mit den Grenzwertsätzen für Folgen erhalten wir also die Gleichung

$$a = \frac{1}{2}\left(a + \frac{x}{a}\right) \iff a^2 = x.$$

Da $a > 0$ gilt folgt also $a = \sqrt{x}$.

Hausübung

Aufgabe H1

(12 Punkte)

- (a) Untersuchen Sie die Folge

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{3n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-3}$$

auf Konvergenz und bestimmen Sie (wenn möglich) den Grenzwert.

Hinweis: Es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1}.$$

- (b) Bestimmen Sie den Grenzwert der Folge

$$b_n = \frac{2}{(x^2)^n + 2}$$

in Abhängigkeit von $x \in \mathbb{R}$.

- (c) Untersuchen Sie die Folge

$$c_n = n^{-2} + \frac{10}{n} + n^{-3n} + \frac{n}{100}$$

auf Konvergenz und bestimmen Sie (wenn möglich) den Grenzwert.

- (d) Beweisen Sie den Hinweis aus (a).

Aufgabe H2

(12 Punkte)

Die Folge x_n sei rekursiv definiert durch

$$x_0 = 0 \text{ und } x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + 1 \text{ für } n \in \mathbb{N}.$$

- (a) Berechnen Sie x_3 .
(b) Sei $n > 2$. Geben Sie eine Formel für x_n an, die lediglich von x_{n-2} abhängt.
(c) Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion für alle $0 < n \in \mathbb{N}$ die Formel

$$x_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

- (d) Untersuchen Sie die Folge x_n auf Konvergenz und geben Sie gegebenenfalls den Grenzwert an.

Aufgabe H3

(12 Punkte)

- (a) Zeigen Sie, dass die Folge

$$a_n := \left(\begin{pmatrix} \frac{n}{n^2+1} \\ \frac{8n}{2n^2+2} \\ \frac{5}{n^3+n} \end{pmatrix} \right), \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

in $V = \mathbb{R}^3$ mit der 1-Norm eine Nullfolge ist.

Gilt diese Aussage ebenfalls bezüglich der 2-Norm?

- (b) Seien $(a_n), (b_n)$ Folgen in \mathbb{R}^n und $a, b \in \mathbb{R}^n$. Beweisen Sie folgende Grenzwertsätze im \mathbb{R}^n :
- Ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, so gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n\| = \|a\|$.
 - Ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, so gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$.
 - Ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, so gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha a_n) = \alpha a$ für alle $\alpha \in \mathbb{R}$.