# Formale Grundlagen der Informatik II 3. Übungsblatt



Fachbereich Mathematik Prof. Dr. Martin Ziegler Alexander Kreuzer Carsten Rösnick

SS 2011 15.06.11

# **Minitest Lösung**

Betrachten Sie die Formeln in der Tabelle.

- Welche Formel ist in KNF, welche in DNF?
- Welche Formel/Formeln sind äquivalent zu der Formel

$$\varphi = r \wedge (s \vee t) \vee \neg s$$

und sind damit eine DNF bzw. KNF von  $\varphi$ ?

	KNF	DNF	$\equiv \varphi$
$r \wedge t$	$\boxtimes$	$\boxtimes$	
$(r \lor s) \land (r \lor t)$			
$r \vee \neg s$	$\boxtimes$	$\boxtimes$	
$r \vee (s \wedge (r \vee q))$			
$\neg r \lor (\neg s \land \neg t)$		$\boxtimes$	

Begründung: Für die Einteilung in DNF und KNF siehe Skript 3.2.

Zu der Äquivalenz mit  $\varphi$ : Es gilt

$$r \wedge (s \vee t) \vee \neg s \stackrel{(1)}{\equiv} \neg s \vee (r \wedge s) \vee (r \wedge t) \stackrel{(1)}{\equiv} ((\neg s \vee r) \wedge \overbrace{(\neg s \vee s)}) \vee (r \wedge t) \equiv r \vee (r \wedge t) \vee \neg s \stackrel{(2)}{\equiv} r \vee \neg s$$

mit (1) Distributivgesetz und (2) Absorption.

# Gruppenübung

### Aufgabe G1

Finden Sie mittels Beweissuche im Sequenzenkalkül  $\mathcal{SK}$  für folgende Formeln bzw. Sequenzen entweder eine Herleitung oder eine nicht-erfüllende Belegung.

(a) 
$$\vdash (p \land q) \lor \neg (q \lor r) \lor r \lor \neg p$$

(b) 
$$p, q \lor r \vdash (p \land q) \lor (p \land r)$$

(c) 
$$\vdash \neg(\neg(p \land q) \land r) \lor (q \land r)$$

### Aufgabe G2

(a) Weisen Sie semantisch die Korrektheit der folgenden Sequenzenregel nach:

$$\frac{\varGamma \vdash (\varphi \to \psi) \to \varphi, \varDelta}{\varGamma \vdash \varphi, \varDelta}$$

(b) Leiten Sie die folgende Sequenz in SK ab:

$$\vdash ((\varphi \to \psi) \to \varphi) \to \varphi$$


Aufgabe G3

Sei  $\mathcal{R}=(\mathbb{R},+^{\mathbb{R}},-^{\mathbb{R}},\cdot^{\mathbb{R}},<^{\mathbb{R}},0,1)$ . Eine Formel  $\varphi(x,y)$  definiert in  $\mathcal{R}$  die Relation

$$\varphi := \{ (a, b) \in \mathbb{R}^2 : \mathcal{R} \models \varphi[a, b] \}.$$

Geben Sie Formeln an, die die folgenden Relationen in  $\mathbb{R}^2$  definieren:

- (a) Einen Kreis mit Radius 2 um den Ursprung.
- (b) Eine Gerade durch den Ursprung mit Steigung 2/3.
- (c) Die Strecke, welche vom Punkt (1,2) bis zum Kreis aus (i) führt und senkrecht auf diesem steht.
- (d) Einen Smiley.



## Hausübung

Aufgabe H1 (6 Punkte)

- (a) Zeigen Sie, dass folgende Regeln korrekt sind. (i)  $\frac{\Gamma \vdash \emptyset}{\Gamma \vdash \varphi}$  (ex falso quodlibet)
- (ii)  $\frac{\Gamma, \varphi \lor \psi \vdash \chi}{\Gamma \ \varphi \vdash \gamma}$
- (b) Geben Sie eine "direkte Simulation" von Regel (ii) in  $\mathcal{SK}^+$  an.
- (Extra) Begründen Sie, warum Regel (ii) in SK nicht direkt simulierbar ist. D.h. zeigen Sie, dass es keinen  $\mathcal{SK}$  Ableitungsbaum mit Wurzel  $\Gamma, \varphi \vdash \chi$  gibt, dessen Blätter nur mit Axiomen oder  $\Gamma, \varphi \lor \psi \vdash \chi$ beschriftet sind.

*Hinweis:* Betrachten Sie hierfür die Länge der Formeln von Prämisse und Konklusion der  $\mathcal{SK}$  Regeln.

### Aufgabe H2

Wir definieren folgende partielle Ordnung auf aussagenlogischen  $\mathcal{V}_n$ -Interpretationen:

$$\mathfrak{I} \leq \mathfrak{I}'$$
 :gdw.  $\mathfrak{I}(p) \leq \mathfrak{I}'(p)$  für alle Variablen  $p \in \mathcal{V}_n$ 

Eine AL<sub>n</sub>-Formel  $\varphi$  heißt monoton, wenn für alle Interpretationen  $\mathfrak{I} \leq \mathfrak{I}'$  gilt:

$$\varphi^{\Im} \leq \varphi^{\Im'}$$
.

Beweisen Sie per Induktion über den Formelaufbau, dass jede aussagenlogische Formel  $\varphi$ , in der kein Negationszeichen vorkommt, monoton ist.

Bemerkung: Jede monotone Formel ist äquivalent zu einer Formel ohne Negationszeichen.