

Mathematik II für Informatik

1. Übungsblatt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. Thomas Streicher
Alexander Dietz, Anton Freund
Lucas Schöbel-Kröhn

SoSe 2018

Übung: 12./13. April 2018
Abgabe: 19./20. April 2018

Gruppenübung

Aufgabe G1

Es seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Folgen in \mathbb{R} . Entscheiden Sie für die folgenden vier Aussagen jeweils, ob sie allgemein gültig sind. Geben Sie jeweils einen Beweis, bzw. ein Gegenbeispiel an.

- (a) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent, so ist $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent.
- (b) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergent und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent, so ist $(a_n \cdot b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent.
- (c) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent, so ist $(a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent.
- (d) Ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent, so ist $(a_n \cdot b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent.

Aufgabe G2

- (a) Geben Sie zu jeder Kombination der Eigenschaften *konvergent*, *monoton*, *beschränkt* eine reelle Folge an, welche genau diese Kombination an Eigenschaften trägt. Falls eine Kombination nicht möglich sein sollte, begründen Sie, warum dem so ist.
- (b) Gibt es konvergente Folgen mit mehreren Häufungspunkten oder divergente Folgen ohne Häufungspunkte?
- (c) Gibt es konvergente Folgen ohne Häufungspunkte oder divergente Folgen mit genau einem Häufungspunkt?
- (d) Geben Sie eine Folge an, die alle natürlichen Zahlen bis 100 als Häufungspunkte hat. Konvergiert sie?

Aufgabe G3

Wir betrachten den Raum $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$, wobei $\|(x, y)^T\|_2 := \sqrt{x^2 + y^2}$ die euklidische Norm bezeichne, sowie die Folgen

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = \begin{pmatrix} n^{-1} \\ n^{-2} \end{pmatrix}, \quad (b_n)_{n \in \mathbb{N}} = \begin{pmatrix} n \\ n^{-1} \end{pmatrix}, \quad (c_n)_{n \in \mathbb{N}} = \begin{pmatrix} (-1)^n \\ (-1)^{n+1} \end{pmatrix}.$$

- (a) Skizzieren Sie jeweils die ersten fünf Folgenglieder.
- (b) Welche der Folgen sind konvergent, welche divergent? Beweisen Sie Ihre Vermutung.
- (c) Wir betrachten die gleichen Folgen, aber im Raum $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$, wobei $\|(x, y)^T\|_\infty := \max(|x|, |y|)$ die Maximumsnorm bezeichne. Untersuchen Sie die Konvergenz der Folgen erneut.

Aufgabe G4

Seien $x > 0$ und $a_0 > 0$ reelle Zahlen. Wir definieren nun rekursiv eine Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ via

$$a_{n+1} := \frac{1}{2} \cdot \left(a_n + \frac{x}{a_n} \right).$$

-
- (a) Zeigen Sie induktiv, dass die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ positiv, d.h. $a_n > 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$, ist.
 - (b) Zeigen Sie, dass für $n \geq 1$ gilt: $a_n \geq \sqrt{x}$.
 - (c) Zeigen Sie, dass die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ positiv ist und monoton fällt.
 - (d) Zeigen Sie, dass die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen \sqrt{x} konvergiert.

Hausübung

Aufgabe H1

(12 Punkte)

- (a) Untersuchen Sie die Folge

$$a_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{3n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n-3}$$

auf Konvergenz und bestimmen Sie (wenn möglich) den Grenzwert.

Hinweis: Es gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1}.$$

- (b) Bestimmen Sie den Grenzwert der Folge

$$b_n = \frac{2}{(x^2)^n + 2}$$

in Abhängigkeit von $x \in \mathbb{R}$.

- (c) Untersuchen Sie die Folge

$$c_n = n^{-2} + \frac{10}{n} + n^{-3n} + \frac{n}{100}$$

auf Konvergenz und bestimmen Sie (wenn möglich) den Grenzwert.

- (d) Beweisen Sie den Hinweis aus (a).

Aufgabe H2

(12 Punkte)

Die Folge x_n sei rekursiv definiert durch

$$x_0 = 0 \text{ und } x_{n+1} = \frac{1}{2}x_n + 1 \text{ für } n \in \mathbb{N}.$$

- (a) Berechnen Sie x_3 .
(b) Sei $n > 2$. Geben Sie eine Formel für x_n an, die lediglich von x_{n-2} abhängt.
(c) Zeigen Sie mittels vollständiger Induktion für alle $0 < n \in \mathbb{N}$ die Formel

$$x_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

- (d) Untersuchen Sie die Folge x_n auf Konvergenz und geben Sie gegebenenfalls den Grenzwert an.

Aufgabe H3

(12 Punkte)

- (a) Zeigen Sie, dass die Folge

$$a_n := \left(\begin{pmatrix} \frac{n}{n^2+1} \\ \frac{8n}{2n^2+2} \\ \frac{5}{n^3+n} \end{pmatrix} \right), \quad n \in \mathbb{N}^*,$$

in $V = \mathbb{R}^3$ mit der 1-Norm eine Nullfolge ist.

Gilt diese Aussage ebenfalls bezüglich der 2-Norm?

- (b) Seien $(a_n), (b_n)$ Folgen in \mathbb{R}^n und $a, b \in \mathbb{R}^n$. Beweisen Sie folgende Grenzwertsätze im \mathbb{R}^n :
- Ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, so gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n\| = \|a\|$.
 - Ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, so gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$.
 - Ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, so gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha a_n) = \alpha a$ für alle $\alpha \in \mathbb{R}$.