

Aussagenlogik & Prädikatenlogik (FGdI II)

6. Übungsblatt



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT





Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. Martin Otto
Felix Canavoi, Kord Eickmeyer

SoSe 2016
29. Juni 2016

Gruppenübung

Aufgabe G6.1 (Warm-up)

(a) Betrachten Sie die folgenden ungerichteten Graphen $G = (V, E)$:



In welchen dieser Graphen gelten welche der nachfolgenden FO-Sätze?

- (i) $\forall x \forall y (\neg x = y \leftrightarrow Exy)$
 - (ii) $\exists x \exists y \exists z (\neg x = y \wedge \neg y = z \wedge \neg x = z \wedge Exy \wedge Eyz \wedge \neg Ezx)$
 - (iii) $\exists x \exists y (\neg x = y) \wedge \forall x \forall y (\neg x = y \rightarrow \neg Exy)$
 - (iv) $\exists x \forall y (x = y)$
- (b) Welche der folgenden Aussagen sind richtig?
- (i) Für jede im Sequenzkalkül SK ableitbare Sequenz $\Gamma \vdash \Delta$ gilt $\Gamma \models \delta$ für jedes $\delta \in \Delta$.
 - (ii) Für jede im Sequenzkalkül SK ableitbare Sequenz $\Gamma \vdash \Delta$ gilt $\Gamma \models \delta$ für ein $\delta \in \Delta$.
 - (iii) Für jede im Sequenzkalkül SK ableitbare Sequenz $\Gamma \vdash \Delta$ gilt $\Gamma \models \bigvee \Delta$.
 - (iv) Falls $\Phi \models \varphi$ für eine Satzmenge $\Phi \subseteq FO_0(S)$ und eine Formel $\varphi \in FO_0(S)$ gilt, dann ist die Sequenz $\Gamma \vdash \varphi$ für jedes endliche $\Gamma \subseteq \Phi$ in SK ableitbar.
 - (v) Falls $\Phi \vdash \varphi$ in SK für eine Satzmenge $\Phi \subseteq FO_0(S)$ und einen Satz $\varphi \in FO_0(S)$ ableitbar ist, dann gilt $\Phi \models \varphi$.

Aufgabe G6.2 (Sequenzkalkül)

(a) Betrachten Sie die aus der Vorlesung bekannte Regel ($\forall R$):

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, \varphi(c/x)}{\Gamma \vdash \Delta, \forall \varphi(x)}$$

falls c nicht in $\Gamma, \Delta, \varphi(x)$

Zeigen Sie anhand von Beispielen, warum diese Regel nicht mehr korrekt ist, falls c in Γ, Δ oder $\varphi(x)$ vorkommen darf.

(b) Beweisen Sie die Korrektheit der folgenden Regel:

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, \forall x R x f x}{\Gamma \vdash \Delta, \forall x \exists y R x y}$$

(c) Im Sequenzkalkül der Aussagenlogik liefert jeder Ableitungsbaum, in dem ein Blatt mit einer nicht allgemeingültigen Sequenz beschriftet ist, bereits einen Nachweis, dass die Sequenz in der Wurzel nicht allgemeingültig ist. Zeigen Sie, dass diese Eigenschaft für den Sequenzkalkül der Logik erster Stufe nicht gilt.

Aufgabe G6.3 (Ableitungen)

Leiten Sie die folgenden Sequenzen in SK ab.

- (a) $\forall x \forall y f x = f y \vdash \exists x f x = x$
- (b) $\forall x \forall y \forall z ((R x y \wedge R y z) \rightarrow R x z) \wedge \forall x \neg R x x \vdash \forall x \forall y (R x y \rightarrow \neg R y x)$

Könnte man die entsprechenden Folgerungsbeziehungen auch mittels GI-Resolution nachweisen? Wenn ja, wie?

Hinweise zur Hausübung

Bitte geben Sie Ihre Lösungen zu dieser Hausübung in der **Übung am 13.07.2016** ab (Name, Nummer der Übungsgruppe und Matrikelnummer nicht vergessen). Wir unterstützen ausdrücklich das gemeinsame Arbeiten und Diskutieren in Gruppen, die gefundenen Lösungen sollte aber jeder selbst ausformulieren. Es darf also pro Abgabe nur ein Name auf dem Blatt stehen.

Aufgabe H6.1 (Ableitungen)

(12 Punkte)

Leiten Sie die folgenden Sequenzen in \mathcal{SK} ab:

- (a) $\forall x fxx = x \vdash \forall x (Px \vee \neg Pfx)$.
- (b) $\exists y \forall x Rxy \vdash \forall x \exists y Rxy$.
- (c) $\forall x (\varphi \vee \psi) \vdash \forall x \varphi \vee \psi$, vorausgesetzt, dass $x \notin \text{frei}(\psi)$.

Aufgabe H6.2 (Regeln)

(12 Punkte)

Beweisen oder widerlegen Sie die Korrektheit der folgenden Regeln für den Sequenzenkalkül der Logik erster Stufe:

(a)

$$\frac{\Gamma, \exists x \varphi(x) \vdash \Delta, \exists x \psi(x) \quad \Gamma, \exists x \psi(x) \vdash \Delta, \vartheta}{\Gamma, \varphi(c) \vdash \Delta, \vartheta}$$

(b)

$$\frac{\Gamma, \exists x \psi(x) \vdash c = d \quad \Gamma, \psi(c) \vdash \vartheta}{\Gamma \vdash \neg \psi(d), \vartheta}$$

(c)

$$\frac{\Gamma \vdash \Delta, \exists x \psi(x)}{\Gamma \vdash \Delta, \psi(c)}$$

Aufgabe H6.3 (Kompaktheit)

(12 Punkte)

Zeigen Sie, dass es über der Signatur $\{<\}$ keine Satzmenge $\Phi \subseteq \text{FO}_0(\{<\})$ gibt, für die gilt

$$\mathfrak{A} = (A, <^{\mathfrak{A}}) \models \Phi \iff \mathfrak{A} \text{ ist isomorph zu } (\mathbb{N}, <^{\mathbb{N}}),$$

wobei $<^{\mathbb{N}}$ die natürliche Ordnung auf \mathbb{N} ist.

Extra: Diskutieren Sie, was dies für die Beweisbarkeit von FO-Aussagen $\varphi(n)$ über natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ durch vollständige Induktion bedeuten könnte.