

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ - ΚΟΙΛΙΑΣ - ΠΥΕΛΟΥ

PATIENT NAME		
HIS ID	002001029 4	GESY REGISTRY NO: 545383 GESY REFERRAL NO: 8432125, 6614154,
EXAMINATION DATE	<i>05-08-2020</i> (12:18)	8432126, 8432127, 8432115
DATE OF BIRTH		EXAM CODE: 71250, CY043, 72192, 74150, CY058

Λόγος της εξέτασης: Μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα δεξιού πνεύμονα χαμηλής διαφοροποίησης. Χημειοθεραπεία. Επανέλεγχος.

Συσχετισμός των ευρημάτων με προηγηθέν PET-CT στις 20/5/2020 και αξονική τομογραφία θώρακος στις 8/5/2020.

Η εξέταση έγινε με πολυτομική σάρωση με πολυτομικό αξονικό τομογράφο, πριν και μετά την ενδοφλέβια έγχυση ιωδιούχου σκιαγραφικής ουσίας, σε αρτηριακή και φλεβική φάση. Χορηγήθηκε επίσης γαστρογραφίνη από του στόματος.

EYPHMATA

Συγκριτικά με τους προηγηθέντες απεικονιστικούς ελέγχους, παρατηρείται:

- -Σημαντικού βαθμού ελάττωση του μεγέθους της πρωτοπαθούς εξεργασίας στον δεξιό πνεύμονα με εμφάνιση εσωτερικής ρήξης.
- -Μεγάλου βαθμού ελάττωση όσον αφορά την έκταση της λεμφαδενοπάθειας στο μεσοθωράκιο (προαγγειακά, παρατραχειακά, υποτροπιδικά) και στις πνευμονικές -πύλες.
- -Σχεδόν πλήρης απεικονιστική υποχώρηση της παθολογικής λεμφαδενοπάθειας στις κατώτερες σφαγιτιδικές αλύσους / υπερκλείδιες τραχηλικές χώρες αμφοτεροπλεύρως.
- -Μεγάλου βαθμού ελάττωση των διαστάσεων της δευτεροπαθούς εντόπισης στο έξω σκέλος του αριστερού επινεφριδίου.
- -Σχεδόν πλήρης απεικονιστική υποχώρηση των δευτεροπαθών εντοπίσεων στον δεξιό νεφρό.
- -Μεγάλου βαθμού ανταπόκριση όσον αφορά τους παθολογικά διογκωμένους οπισθοπεριτοναϊκούς παρααορτικούς λεμφαδένες οι οποίοι πλέον απεικονίζονται με φυσιολογικές διαστάσεις.

Φυσιολογικά ευρήματα από τον αριστερό πνεύμονα χωρίς να διακρίνονται εστιακές αλλοιώσεις.

Δεν παρατηρείται περικαρδιακή ή πλευριτική συλλογή.

Σημειώνονται οριακού μεγέθους λεμφαδένες στις μασχαλιαίες χώρες, ιδία δεξιά.

Δεν διακρίνονται παθολογικά ευρήματα από τον έλεγχο του ήπατος, του σπληνός, του δεξιού επινεφριδίου και του αριστερού νεφρού.

Δεν διακρίνονται παθολογικά διογκωμένοι λεμφαδένες στο μεσεντέριο και στην πύελο. Απουσία ασκιτικής συλλογής.

Δεν διακρίνονται οστεολυτικές δευτεροπαθείς εντοπίσεις.

Όζος αριστερού λοβού του θυρεοειδούς αδένα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Σημαντικού βαθμού ανταπόκριση στην θεραπεία ως περιγράφεται ανωτέρω. Συνιστάται κλινικός συσχετισμός και επανέλεγχος.

Dr. Michalis Michaelides Diagnostic Radiology Consultant

(The report has been electronically signed)