



ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΞΑ
Λέλας Καραγιάννη 3, Λεμεσός τκ.3020
Τηλ.25717900

Ονοματεπώνυμο:
Αρ. ΓΕΣΥ:
Ημ. Γέννησης:
Αρ. παραπεμπτικού:

Ημερομηνία: 11/5/2020

Ημερομηνία εξέτασης: 08/05/20

ΑΨΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ Ε.Ε.Σ. 71250

Μια πολύ μεγάλη κεντρική μάζα πυκνότητας μαλακών μορίων με διαστάσεις 8.97 X 5.6 εκ. εις το άνω τμήμα του (ΔΕ) κάτω λοβού.

Περιβρογχίζει τον βρόγχο intermedius και προκαλεί στένωση του έσω τμήματος του βρόγχου μέσου λοβού και στένωση ως απόφραξη του κορυφαίου τμήματος του βρόγχου του (ΔΕ) κάτω λοβού.

Επεκτεινόμενη προς την περιφέρεια του πνεύμονα ελαττώνεται βαθμιαίως σε μέγεθος για να καταλήξει εφαιπτόμενη στον υπεζωκότα δια βάσεως μόλις 10 χιλ.

Πολλαπλοί και έκδηλα διογκωμένοι λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο. Αναλυτικά οι ομάδες των λεμφαδένων που επηρεάζονται:

- ➔ Προαγγειακοί
- ➔ Προτραχειακοί
- ➔ Τροπιδικοί
- ➔ Υποτροπιδικοί
- ➔ Πυλαίοι αμφω

Ατελεκτασία έξω και έσω τμήματος μέσου λοβού.

Υπο-υπεζωκοτικός όζος στο πρόσθιο τμήμα άνω λοβού 7.31 χιλ.

Οζίδιο 2.6 χιλ. στο έσω τμήμα μέσου λοβού

Οζίδιο 3.3 χιλ. στο οπίσθιο βασικό τμήμα Α.Κ.Λ.

‘Μ’ εστία στο (ΑΡ) επινεφρίδιο 3.7 X 2 εκ.

Τα απεικονιζόμενα τμήματα, ήπατος, σπληνός, νεφρών ελεύθερα ευρημάτων.

Φυσιολογική απεικόνιση παγκρέατος.

Οι οστικές δομές ελεύθερες λυτικών ή βλαστικών βλαβών.

Συμπέρασμα: Τα ως άνω ευρήματα συνηγορούν υπέρ Ca (ΔΕ) πνεύμονα. Συνιστάται περαιτέρω έλεγχος (βρογχοσκόπηση και βιοψία).


ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ



ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΞΑ
Λέλας Καραγιάννη 3, Λεμεσός τκ.3020
Τηλ.25717900

Ονοματεπώνυμο:
Αρ. ΓΕΣΥ:
Ημ. Γέννησης:
Αρ. παραπεμπτικού:

Ημερομηνία: 11/5/2020

Ημερομηνία εξέτασης: 08/05/20

ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Σ. 70490

Πολλαπλοί διογκωμένοι υπερκλείδιοι λεμφαδένες αμφω με διάμετρο έως 16 χιλ.

Οπίσθιοι τραχηλικοί λεμφαδένες αμφω με διάμετρο έως 6.5 χιλ.

Μικροί υπογνάθιοι λεμφαδένες αμφω,.

Κύστη εκ κατακρατήσεως στο (ΑΡ) ιγμόρειο.


ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ