

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΞΑ

Λέλας Καραγιάννη 3, Λεμεσός τκ.3020, Τηλ.25717900

Ονοματεπώνυμο:

Ημερομηνία: 4/11/2021

Αρ. ΓΕΣΥ:

Ημ. Γέννησης:

Αρ.Ταυτοτ:

Αρ. παραπεμπτικού:

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ- DEXA 77080

ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Ο.Μ.Σ.Σ.

Η μέση οστική πυκνότητα (BMD) στην περιοχή L1-L4 είναι 0.830 g/sq.cm.

Η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει 79 % της οστικής πυκνότητας σε σχέση με νεαρά ενήλικα άτομα (20-40 ετών) του ίδιου φύλου (T- score -2.0).

Σε σύγκριση με άτομα της ίδιας ηλικίας, φύλου, ύψους και βάρους η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει το 88 %(Z-score -1.0).

ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Η μέση οστική πυκνότητα (BMD) στην περιοχή του αυχένα του αριστερού μηριαίου είναι 0.706 g/sq.cm.

Η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει το 83 % της οστικής πυκνότητας σε σχέση με νεαρά ενήλικα άτομα (20-40 ετών) του ιδίου φύλου (T-score -1.3).

Σε σύγκριση με άτομα ίδιας ηλικίας, φύλου, ύψους και βάρους η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει το 95 % (Z-score -0.3).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα κριτήρια της WHO η μέση οστική πυκνότητα στην οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης ελέγχεται στη ζώνη της οστεοπενίας. Η οστική πυκνότητα στον αυχένα του αριστερού μηριαίου ελέγχεται στη ζώνη της οστεοπενίας.

META TEIDIAS ATPOS AKTINOAOFOS ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΝΑΠΙΩΤΑ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ