*NIBD

SSK9.



	F-NUD-109	Merchanical Inch
· Wear war war war war war war war war war w	ПАРАПЕМПТІКО	
	ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΡΕΤ/СΤ	

Ημερομηνία γέννησης Τηλέφωνο επικοινωνίας	Ονοματεπώνυμο
Γηλέφωνο επικοινωνίας	Ημερομηνία γέννησης
	Τηλέφωνο επικοινωνίας

Κάλυψη κόστους:

Έγκριση από δημόσιο τομέα	
Ασφαλιστική κάλυψη	
Απ' ευθείας διακανονισμός	

Διάγνωση: 🕕	C PHLL 897x5, Gan LE OTEVWEN Brod XOU LIFEOU
9. 800 8 AT	odpazu Lopudaiou Opolxou (AE) KATU Oo BLI - EdaTTOLIEN
1 bajaby	LE WITERUKOTO -TILDAVES ESTIES DE ETEPO JOBO
Theoliova.	Sigkwitterer LNS LEGO OW pakiou & TPAKADIKO i augu
Λόγος εξέτασης:	U-TILO avn perdotantin cotia (AP) ettivedpision

Επιθυμητή εξέταση για:

¹⁸ F-FDG (Γλυκόζη)	1	¹⁸ F-FMISO (Υποξία)	¹⁸ F-DOPA
¹⁸ F -PSMA (Προστάτης)		¹⁸ F-NaF (Οστά)	¹⁸ F-FET/FLT (Εγκέφαλος)
¹⁸ F -FCh (Παραθυροειδής)			

Ιστορικό - Προηγούμενη θεραπεία σχετιζόμενη με την παρούσα νόσο:

	Χρονική περίοδος	Λεπτομέρειες
Χειρουργική επέμβαση		
Χημειοθεραπεία/Ακτινοθεραπεία		
Ακτινοθεραπεία		
Αντιορμονική θεραπεία		
Αντιβιοτική θεραπεία		

Άλλες παθήσεις ή ιδιαιτερότητες:

Φλεγμονές/Λοιμώξεις	
Διαβήτης	
Υπερθυρεοειδισμός	
Νεφρική ανεπάρκεια	
Αλλεργία σε ιωδιούχο σκιαγραφικό μέσο	



ΚΩΔΙΚΟΣ * CODE	EKΔOΣH * VERSION	HMEPOMHNIA* DATE	ANAΘΕΩΡΗΣΗ * REVIEW	TMHMA* DEPARTMENT
F-NUD-109	01	07/01/2019		ПҮРНПІКН

Πρόσφατ	ες απεικον	ιστικές εξετάσεις (να δοθούν σε CD):	
NAI	OXI		
	εριοχή του τητες:	σώματος;	-

Πληροφορίες εξέτασης:

- Η εξέταση αντενδείκνυται σε εγκύους.
- Για την εξέταση ¹⁸F-FDG είναι απαραίτητο ο ασθενής να παραμείνει νηστικός έξι ώρες πριν την εξέταση (επιτρέπονται νερό και ροφήματα χωρίς ζάχαρη και γλυκαντικές ουσίες).

Ημερομηνία

Dr. Eleni Demetriou MD, MSc General Surgeon

Θεράπων/Παραπέμπων Ιατρός