1 Nikis Avenue, 4108 Agios Athanasios, Limassol, Cyprus



## ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ - ΚΟΙΛΙΑΣ - ΠΥΕΛΟΥ

PATIENT NAME		7	
HIS ID	0020010294	GESY REGISTRY NO	
EXAMINATION DATE	11-10-2022(13:43)	GESY REFERRAL NO: 48377478 EXAM CODE: CY130 EXAM DESCRIPTION: Computed tomography chest/abdomen/pelvis without contrast	
DATE OF BIRTH			
POLICE ID			

Κλινική ένδειξη: Ιστορικό Ca πνεύμονα. Χημειοθεραπεία. Ακτινοθεραπεία. Επανέλεγχος και σύγκριση με προηγούμενη αξονική τομογραφία θώρακα-κοιλίας - πυέλου από 12/05/2022.

Η εξέταση διενεργήθηκε πριν και μετά από ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού σε αρτηριακή και φλεβική φάση καθώς και μετά από λήψη γαστρογραφίνης εκ του στόματος.

#### **EYPHMATA**

#### ΘΩΡΑΚΑΣ

Στο πνευμονικό παρέγχυμα δεξιά παρατηρείται περαιτέρω μικρή μείωση του μεγέθους της πρωτοπαθούς εξεργασίας παρά την πνευμονική πύλη συγκριτικά με τον προηγούμενο έλεγχο.

Αμετάβλητη η εικόνα των πλέον διάχυτων, μετακτινικού τύπου αλλοιώσεων κεντρικά στον δεξιό πνεύμονα.

Επανελέγχεται μικροοζίδιο 5χιλ. στην ΔΕ πνευμονική κορυφή, χωρίς διαφοροποίηση.

Χωρίς ανάδειξη αξιόλογων ευρημάτων στον αριστερό πνεύμονα.

Απουσία πλευριτικής συλλογής ΑΡ. Νέο εύρημα η ΔΕ πλευριτική συλογή μεγ. πάχους 10-15χιλ., με επέκταση στο περιφερικό τμήμα της μείζονος μεσολόβιας σχισμής. Οριακής διαμέτρου λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο ιδίως υποτροπιδικά και στη δεξιά πνευμονική πύλη χωρίς

Οριακής διαμέτρου λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο ιδίως υποτροπιδικά και στη δεξιά πνευμονική πύλη χωρίς ουσιαστική μεταβολή συγκριτικά με την τελευταία εξέταση.

Απουσία σημείων λεμφαδενοπάθειας στις μασχαλιαίες χώρες.

Μικρότερη διάμετρο 15χιλ. έναντι 18χιλ. , εμφανίζει κυστικόμορφη εξεργασία στο έξω τμήμα του δεξιού μαστού.

## ΚΟΙΛΙΑΣ-ΠΥΕΛΟΥ

Εικόνα διάχυτης στεάτωσης του ηπατικού παρεγχύματος - νέο εύρημα.

Δεν παρατηρούνται εστιακές αλλοιώσεις ύποπτες για μεταστάσεις στα συμπαγή όργανα της άνω κοιλίας. Απουσία ασκιτικής συλλογής.

Οριακής διαμέτρου λεμφαδένας ελέγχεται στο επίπεδο της καρδιοοισοφαγικής συμβολής. Δεν παρατηρούνται έτεροι παθολογικά διογκωμένοι λεμφαδένες παραορτικά, στο μεσεντέριο, στην πύελο ή στις βουβωνικές χώρες. Χωρίς ανάδειξη νέων ευρημάτων στα όργανα κοιλίας και πυέλου συγκριτικά με την τελευταία αξονική τομογραφία.

Από τον έλεγχο των απεικονιζόμενων οστικών δομών, δεν παρατηρούνται εστιακές αλλοιώσεις ύποπτες για μεταστάσεις.

# ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Στο πνευμονικό παρέγχυμα δεξιά παρατηρείται περαιτέρω μικρή μείωση του μεγέθους της πρωτοπαθούς εξεργασίας.

Χωρίς ουσιαστική μεταβολή της εικόνας ήπιας λεμφαδενοπάθειας μεσοθωρακίου και δεξιάς πνευμονικής πύλης. Εικόνα διάχυτης στεάτωσης του ηπατικού παρεγχύματος - νέο εύρημα.

Οριακής διαμέτρου λεμφαδένας ελέγχεται στο επίπεδο της καρδιοοισοφαγικής συμβολής.

Χωρίς ανάδειξη δευτεροπαθών/μεταστατικών εστιών στις λοιπές δομές του θώρακα, ενδοκοιλιακά, στην πύελο ή στις οστικές δομές.

Dr. Alexandros Tzeferakos

Diagnostic Radiology Consultant

(The report has been electronically signed), 22-10-2022 13:40