
SẢN ĐỒ WHO (nguyên bản 1994)

Họ tên: ..... **Tuổi:** ..... **PARA:** ..... **Số nhập viện:** .....

Ngày nhập viện: ..... **Giờ nhập viện:** ..... **Ối vỡ lúc:** ..... **Thời gian vỡ ối: ..... giờ**



Ối: C còn · T vỡ, trong · X vỡ, có phân su · K vỡ, không còn nước ối **Biến dạng đầu:** 0 · + · ++ · +++

Cơn co (tô số ô = số cơn/10 phút): chấm = <20 giây · gạch chéo = 20–40 giây · tô đen = >40 giây

Nhịp ghi (WHO 1994): tim thai, cơn co, mạch mỗi 30 phút · mở CTC (X), độ lọt (O), huyết áp mỗi 4 giờ · nhiệt độ mỗi 2 giờ


Vào pha hoạt động: tịnh tiến điểm X lên đường báo động (giữ nguyên tung độ), các ghi chép sau đó tính từ điểm mới.

Mẫu dựng lại theo WHO 1994 "Preventing prolonged labour: the partograph" và handout sản đồ Bộ môn Phụ Sản ĐHYD TPHCM 2020. Ô nhỏ = 30 phút.

SẢN ĐỒ WHO – BẢN RÚT GỌN (không pha tiềm thời, bắt đầu 4 cm)

Họ tên: ..... **Tuổi:** ..... **PARA:** ..... **Số nhập viện:** .....

Ngày nhập viện: ..... **Giờ nhập viện:** ..... **Ối vỡ lúc:** ..... **Thời gian vỡ ối: ..... giờ**



Ối: C còn · T vỡ, trong · X vỡ, có phân su · K vỡ, không còn nước ối **Biến dạng đầu:** 0 · + · ++ · +++

Cơn co (tô số ô = số cơn/10 phút): chấm = <20 giây · gạch chéo = 20–40 giây · tô đen = >40 giây

Nhịp ghi (WHO 1994): tim thai, cơn co, mạch mỗi 30 phút · mở CTC (X), độ lọt (O), huyết áp mỗi 4 giờ · nhiệt độ mỗi 2 giờ

Bản rút gọn: điểm X đầu tiên ghi ngay trên đường báo động, tung độ = độ mở CTC lúc khám (≥ 4 cm).

Mẫu dựng lại theo WHO 1994 "Preventing prolonged labour: the partograph" và handout sản đồ Bộ môn Phụ Sản ĐHYD TPHCM 2020. Ô nhỏ = 30 phút.