

§ 1.4 事件的独立性

引例 袋子中装有5只白球，3只黑球，分别有放回与无放回的抽取，每次抽一只。

A 表示第一次抽取的是白球；

B 表示第二次抽取的是白球。

有放回

$$P(\underbrace{B} | \underbrace{A}) = \frac{5}{8} = \underbrace{P(B)}$$

不有放回

$$P(\underbrace{B} | \underbrace{A}) = \frac{4}{7} \neq \underbrace{P(B) = \frac{5}{8}}$$

由此可得到什么结论？

一般地，如果 $\underline{P(B|A)} = \underline{P(B)}$ ，则称 A对B没有影响

□ 若A对B没有影响，B对A有没有影响？

若 $P(B|A) = P(B)$,

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) \cancel{P(B|A)}}{\cancel{P(B)}} \\ = \underline{P(A)}$$

⇒ B对A也没有影响

— A, B 彼此不影响

定义 设 A 、 B 为两个事件，若

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称事件 A 与 B **相互独立**

\leftrightarrow 若 $P(A) > 0, P(B) > 0$,

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = P(B)$$

性质： \square Ω 和 \emptyset 与任何事件相互独立 \leftrightarrow A, B 彼此互不影响

思考 如果事件 A 与任何事件都相互独立，事件 A 有什么性质？

$$P(AA) = P(A)P(A) \Rightarrow P(A) = 0 \text{ 或 } 1$$

□ 如果事件 A, B 相互独立, 则 A, \bar{B} ; \bar{A}, B ; \bar{A}, \bar{B} 也都相互独立

□ 当 A 与 B 相互独立 \iff $P(B|A) = P(B|\bar{A}) = P(B)$ 证明?

□ 若 $P(A) > 0, P(B) > 0$,

互不相容 $\xRightarrow{AB=\emptyset}$ 不相互独立

相互独立的判断:

< ① 由定义
② 由题意 — 彼此没有影响

例 甲、乙两人（独立）同时向同一目标射击一次，甲的命中率为0.8，乙的命中率为0.6，已知目标上只有一个弹孔，求目标是被甲击中的概率。

解 $A = \text{"甲击中"}, B = \text{"乙击中"}$

由题意 A, B 独立

$$P(A\bar{B} | A\bar{B} \cup \bar{A}B) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\underbrace{A\bar{B}} \cup \underbrace{\bar{A}B})}$$

$$= \frac{0.8 \times 0.4}{0.8 \times 0.4 + 0.2 \times 0.6} = \left(\frac{8}{11} \right) \quad \#$$



定义 三事件 A, B, C 相互独立是指下面的关系式同时成立：

$$\left\{ \begin{array}{l} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \end{array} \right. \quad (1)$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \quad (2)$$

思考1： 若 A, B, C 相互独立，我们可以得到什么结论？

思考2： “两两独立” 与 “相互独立” 间的关系？


例 随机地掷两枚骰子，令

$A =$ “第一枚点数为奇数”，

$B =$ “第二枚点数为奇数”，

$C =$ “两枚点数和为奇数”，

试判断 A ， B ， C 的独立性。



思考：如何定义 n 个随机事件的独立性？

定义 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立是指下面的关系式同时成立:

$$P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j), \quad 1 \leq i < j \leq n$$

$$P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k), \quad 1 \leq i < j < k \leq n$$

.....

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n)$$

◆事件独立性的判别:

例 已知事件 A, B, C, D 相互独立, 证明事件 $\bar{A}D$ 与 $B \cup C$ 也相互独立

你能得到什么结论?


□结论

若 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立，将这 n 个事件任意分成 k 组，同一个事件不能同时属于两个不同的组，则对每组的事件进行求和、积、差、对立等运算所得到的 k 个事件也相互独立

例 已知电路系统如图所示。设每个元件正常工作(如果不正常工作, 电路在此处断开)的概率为 p , 且它们之间是相互独立的, 求此电路从左到右是通路的概率。

方法一 A ="L到R通路"



A_i ="元件 i 正常工作", $i = 1, \dots, 5$



方法二

$A = \text{“L到R通路”}$

$A_i = \text{“元件} i \text{正常工作”}, i = 1, \dots, 5$



作业 习题一

24, 26, 27

补充题

设 $0 < P(A) < 1$, 利用相互独立的定义证明:

$$A \text{ 与 } B \text{ 相互独立} \Leftrightarrow P(B|A) = P(B|\bar{A})$$