

Požadavky ke zkoušce z Diskrétní matematiky

Karel Velička

07-01-2023

Definice, věty, důkazy

Obsah

1	Definice	1
1.1	Úvod	1
1.1.1	Operace s čísly	1
1.1.2	Množinové operace	1
1.1.3	Mohutnost	1
1.1.4	Uspořádané k-tice a Kartézský součin	1
1.2	Relace	1
1.2.1	Relace mezi množinami, relace na množině	1
1.2.2	Operace s relacemi	1
1.2.3	Funkce (zobrazení) a jejich druhy	1
1.2.4	Vlastnosti relací	2
1.2.5	Ekvivalence, ekvivalenční třída, rozklad množiny	2
1.3	Uspořádání	2
1.3.1	Uspořádání	2
1.3.2	Hasseův diagram a bezprostředního předchůdce	2
1.3.3	Prvky	2
1.3.4	Řetězce	2
1.3.5	Parametry alpha a omega	2
1.4	Kombinatorické počítání	3
1.4.1	Klesající mocnina	3
1.4.2	Charakteristická funkce podmnožiny	3
1.4.3	Notace pro množinu všech k-prvkových podmnožin	3
1.4.4	Kombinační číslo a Pascalův trojúhelník	3
1.5	Grafy	3
1.5.1	Graf, vrchol, hrana	3
1.5.2	Standardní grafy	3
1.5.3	Bipartitní a Úplně bipartitní graf	3
1.5.4	Isomorfismus grafů	4
1.5.5	Stupeň vrcholu, Regulární graf a Skóre grafu	4
1.5.6	Podgraf, indukovaný podgraf	4
1.5.7	Cesta, kružnice, sled a tah v grafu	4
1.5.8	Souvislý graf, relace dosažitelnosti, komponenty souvislosti	4
1.5.9	Matice sousednosti	4
1.5.10	Vzdálenost v grafu (grafová metrika)	4
1.5.11	Grafové operace: přidání/odebrání vrcholu/hrany, dělení hrany, kontrakce hrany	5
1.5.12	Otevřený a uzavřený eulerovský tah	5
1.5.13	Orientovaný graf, podkladový graf, vstupní a výstupní stupeň, vyváženost vrcholu	5
1.5.14	Silná a slabá souvislost orientovaných grafů	5
1.6	Stromy	5
1.6.1	Stromy, les, list	5
1.6.2	Kostra grafu	5
1.7	Rovinné kreslení grafů	5
1.7.1	Rovinné nakreslení grafu a jeho stěny (neformálně)	5
1.7.2	Rovinný graf a topologický graf	5
1.7.3	Stereografická projekce	6
1.8	Barvení grafů	6

1.8.1	Obarvení grafu k barvami a barevnost	6
1.9	Pravděpodobnost	6
1.9.1	Pravděpodobnostní prostor diskrétní, konečný, klasický	6
1.9.2	Jev elementární, jev složený, pravděpodobnost jevu	6
1.9.3	Podmíněná pravděpodobnost	6
1.9.4	Jevy nezávislé a po k nezávislé	6
1.9.5	Náhodná veličina	6
1.9.6	Střední hodnota	6
1.9.7	Indikátor náhodného jevu	6
1.9.8	Markovova nerovnost	7
2	Věty a důkazy	8
2.1	Úvod	8
2.2	Relace	8
2.2.1	Vztah mezi ekvivalencemi a rozklady	8
2.3	Uspořádání	8
2.3.1	Konečná neprázdná uspořádaná množina má minimální a maximální prvek	8
2.3.2	O Dlouhém a Širokém	9
2.3.3	Erdősovo-Szekeresovo lemma o monotónních podposloupnostech	9
2.4	Kombinatorické počítání	9
2.4.1	Počet funkcí mezi množinami	9
2.4.2	Počet prostých funkcí mezi množinami	9
2.4.3	Počet všech podmnožin	9
2.4.4	Počet podmnožin sudé a liché velikosti	10
2.4.5	Počet permutací na množině	10
2.4.6	Počet uspořádaných k-tic bez opakování a k-prvkových podmnožin	10
2.4.7	Základní vlastnosti kombinačních čísel	10
2.4.8	Binomická věta	11
2.4.9	Princip inkluze a exkluze	11
2.4.10	Odhad faktoriálu	12
2.4.11	Odhad kombinačního čísla	12
2.4.12	Odhad prostředního kombinačního čísla	12
2.5	Grafy	13
2.5.1	Vztah mezi součtem stupňů a počtem hran, princip sudosti	13
2.5.2	Věta o skóre	13
2.5.3	Dosažitelnost sledem je totéž jako dosažitelnost cestou	13
2.5.4	Počet sledů délky k lze získat z k-té mocniny matice sousednosti	13
2.5.5	Trojúhelníková nerovnost pro vzdálenost	13
2.5.6	Věta o existenci uzavřeného eulerovského tahu	14
2.5.7	Uzavřené eulerovské tahy v orientovaných grafech	14
2.6	Stromy	14
2.6.1	Lemma o koncovém vrcholu	14
2.6.2	Je-li l list grafu G, pak G je strom, právě když $G-l$ je strom.	14
2.6.3	Pět ekvivalentních charakteristik stromu	15
2.6.4	Graf má kostru, právě když je souvislý.	15
2.7	Rovinné kreslení grafů	16
2.7.1	Hranice stěny je nakreslením uzavřeného sledu (bez důkazu).	16
2.7.2	Graf jde nakreslit do roviny, právě když jde nakreslit na sféru.	16
2.7.3	Kuratowského věta (bez důkazu)	16
2.7.4	Eulerova formule pro souvislé rovinné grafy ($v+f=e+2$)	16
2.7.5	Maximální rovinný graf je triangulace.	16
2.7.6	Maximální počet hran rovinného grafu	17
2.7.7	V rovinném grafu existuje vrchol stupně nejvýše 5.	17
2.7.8	Počet hran a vrchol nízkého stupně v rovinných grafech bez trojúhelníků	17
2.8	Barvení grafů	17
2.8.1	Graf má barevnost nejvýše 2, graf je bipartitní, graf neobsahuje lichou kružnici.	17
2.8.2	Barevnost je větší nebo rovna než klikovost	17
2.8.3	Barevnost je menší nebo rovna než maximální stupeň + 1	17
2.8.4	Věta o 5 barvách	18
2.8.5	Věta o 4 barvách (bez důkazu)	18
2.9	Pravděpodobnost	19
2.9.1	Věta o úplné pravděpodobnosti	19

2.9.2	Bayesova věta	19
2.9.3	Věta o linearitě střední hodnoty	19
3	Příklady	20
3.1	Úvod	20
3.1.1	Technika důkazu indukcí a sporem	20
3.2	Relace	20
3.2.1	Příklady relací	20
3.3	Uspořádání	20
3.3.1	Příklady uspořádání	20
3.4	Kombinatorické počítání	20
3.4.1	Problém šatnářky: počet permutací bez pevného bodu	20
3.5	Grafy	21
3.6	Stromy	21
3.7	Rovinné kreslení grafů	21
3.7.1	K_5 a $K_{3,3}$ nejsou rovinné.	21
3.7.2	Vnější stěnu lze zvolit.	21
3.7.3	Klasifikace platónských těles pomocí rovinných grafů	22
3.8	Barvení grafů	23
3.8.1	Převod barvení mapy na barvení grafu pomocí duality	23
3.8.2	Barevnost úplných grafů, cest a kružnic	23
3.8.3	Princip barvení indukcí: stromy jsou 2-obarvitelné, rovinné grafy 6-obarvitelné	23
3.9	Pravděpodobnost	23
3.9.1	Jev se také dá popsat logickou formulí.	23
3.9.2	Bertrandův paradox s kartičkami	23
3.9.3	Jevy, které jsou po 2 nezávislé, ale po 3 už ne	24
3.9.4	Součin pravděpodobnostních prostorů, projekce	24
3.9.5	Logické formule s náhodnými veličinami dávají jevy.	24
3.9.6	Použití indikátorů k výpočtu střední hodnoty	24
3.9.7	Velikost řezu v grafu: střední hodnota, existuje velký řez, pravděpodobnostní algoritmus	24

Notace: $[n] = \{1, \dots, n\}$; $[n_k] = \{k, \dots, n\}$

1 Definice

1.1 Úvod

1.1.1 Operace s čísly

- **Suma:** $\sum_{i=1}^n a_i = a_1 + \dots + a_n$
- **Produkt:** $\prod_{i=1}^n a_i = a_1 \cdot \dots \cdot a_n$
- **Horní celá část:** $\lceil x \rceil$ je nejbližší vyšší celé číslo k x
- **Dolní celá část:** $\lfloor x \rfloor$ je nejbližší nižší celé číslo k x

1.1.2 Množinové operace

- **Rovnost:** $A = B \iff (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$
- **Inkluze:** $A \subseteq B \iff (x \in A) \implies (x \in B)$
- **Sjednocení:** $A \cup B \iff (x \in A) \vee (x \in B)$
- **Průnik:** $A \cap B \iff (x \in A) \wedge (x \in B)$
- **Rozdíl:** $A \setminus B \iff (x \in A) \wedge (x \notin B)$
- **Symetrická difference:** $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \iff (x \in A) \oplus (x \in B)$
- **Potence (množina podmnožin):** $\mathcal{P}(A) = 2^A = \{B \mid B \subseteq A\}$... množina všech podmnožin

1.1.3 Mohutnost

$|M|$ je počet prvků v množině M .

1.1.4 Uspořádané k-tice a Kartézský součin

- **Uspořádané k -tice:** $(x, y) = \{\{x\}, \{x, y\}\}$
- **Kartézský součin:** $A \times B := \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$

1.2 Relace

1.2.1 Relace mezi množinami, relace na množině

- **Relace mezi množinami:** Relace $R \subseteq X \times Y$ je podmnožina kartézského součinu dvou množin X a Y .
- **Relace na množině:** Relace R na X je podmnožina kartézského součinu dvou identických množin, tj. $X = Y \implies R \subseteq X \times X$.

1.2.2 Operace s relacemi

- **Inverze:** Pro relaci R definujeme inverzní relaci R^{-1} předpisem $R^{-1} = \{(y, x) \mid (x, y) \in R\}$
- **Skládání relace:** Nechť máme relace $R \subseteq X \times Y$ a $S \subseteq Y \times Z$, potom složená relace, kde $T \subseteq X \times Z$, je $T = R \circ S := \{(x, z) \mid \exists y : xRy \wedge ySz\}$

1.2.3 Funkce (zobrazení) a jejich druhy

Funkce (zobrazení): Funkce $f : X \rightarrow Y$ je relace $f \subseteq X \times Y$ taková, že $(\forall x \in X)(\exists! y \in Y) : xfy$.

- **prosté (injektivní):** Funkce $f : X \rightarrow Y$ je prostá \iff pro všechna Y existuje nejvýše jedno $\forall x \in X$.
- **na (surjektivní):** Funkce $f : X \rightarrow Y$ je prostá \iff pro všechna Y existuje alespoň jedno $\forall x \in X$.
- **vzájemně jednoznačné (bijektivní):** Funkce $f : X \rightarrow Y$ je bijektivní \iff je *prostá* i *na*. ($\exists! x$)

1.2.4 Vlastnosti relací

- **Reflexivita:** Relce R na X je *reflexivní* $\iff \forall x \in X : xRx$. (Lze zapsat jako: $R \subseteq \Delta_X$)
- **Symetrie:** Relce R na X je *symetrická* $\iff \forall x, y \in X : xRy \iff yRx$. (Také: $R = R^{-1}$)
- **Antisymetrie:** Relce R na X je *antisymetrická* $\iff \forall x, y \in X : xRy \wedge yRx \implies x = y$. ($R \cap R^{-1} \subseteq \Delta_X$)
- **Transitivita:** Relce R na X je *tranzitivní* $\iff \forall x, y, z \in X : xRy \wedge yRz \implies xRz$. (Také: $R \circ R \subseteq R$)

1.2.5 Ekvivalence, ekvivalenční třída, rozklad množiny

- **Ekvivalence:** Relace R na X je ekvivalentní \iff je *reflexivní, symetrická a tranzitivní*.
- **Ekvivalenční třída:** $R[x] = \{y \in X \mid xRy\}$... Pro relaci R ekvivalentní na X je $R[x]$ množina $\forall x, y \in X$ vzájemně ekvivalentních mezi sebou.
- **Rozklad množiny:** $\varphi = X \setminus R = \{R[x] \mid x \in X\}$... Nechť máme relaci R na X a rozklad množiny $\varphi = X \setminus R$. Potom existuje právě jedna ekvivalence na R .

1.3 Uspořádání

1.3.1 Uspořádání

Uspořádání Relace R na X je *uspořádání* \iff je *reflexivní, antisymetrická a tranzitivní*.

- **Částečné:** Prvky nemusí být porovnatelné.
- **Lineární:** Uspořádání je *lineární* $\iff \forall x, y \in X : xRy \vee yRx$. Prvky jsou porovnatelné (=trichomické).
- **Ostré:** Uspořádání je *ostré* \iff je *ireflexivní* - žádný prvek není v relaci sám se sebou.
- **Uspořádaná množina:** Taková dvojice (X, R) , kde X je množina a R je uspořádání na ní.

1.3.2 Hasseův diagram a bezprostředního předchůdce

- **Hasseův diagram:** Graf znázorňující uspořádání. V zakreslování se nepoužívá, z důvodu přehlednosti, reflexivita a tranzitivita. Zakresluje se od spoda vzhůru vždy jen bezprostřední předchůdce.
- **Bezprostředního předchůdce:** Nechť X je ČUM, potom prvek $x \in X$ je *bezprostředním předchůdcem* prvku $y \in X$ právě tehdy, když $x \prec y \wedge \nexists t \in X$ splňující $x \prec t \prec y$.

1.3.3 Prvky

Nechť (X, \preceq) je ČUM:

- **Největší:** potom $a \in X$ je *největší prvek*, pokud $\forall x \in X$ platí $a \succeq x$.
- **Nejmenší:** potom $a \in X$ je *nejmenší prvek*, pokud $\forall x \in X$ platí $a \preceq x$.
- **Maximální:** potom $a \in X$ je *maximální prvek*, pokud $\nexists x \in X$, pro které $x \succ a$.
- **Minimální:** potom $a \in X$ je *minimální prvek*, pokud $\nexists x \in X$, pro které $x \prec a$.

1.3.4 Řetězce

Nechť (X, \preceq) je ČUM a $A \subseteq X$, potom pro

- **Řetězec** platí, že $\forall a, b \in A$ jsou porovnatelné.
- **Antiřetězec** platí, že $\nexists a, b \in A$, které jsou různé a porovnatelné.

1.3.5 Parametry alpha a omega

- **Parametr ω :** Výšku uspořádání v P : $\omega(P) = \max\{\text{délka řetězců}\}$. (maximum z délek řetězců)
- **Parametr α :** Šířku uspořádání v P : $\alpha(P) = \max\{|A|; A \text{ nezávislá v } P\}$. (maximum z délek antiřetězců)

1.4 Kominatorické počítání

1.4.1 Klesající mocnina

Nechť N je n -prvková a X je x -prvková množina. *Klesající množina* x^n je rovna počtu všech prostých $f : N \rightarrow X$:

$$x^n = x \cdot (x-1) \cdot \dots \cdot (x-n+1)$$

1.4.2 Charakteristická funkce podmnožiny

Nechť $A \subseteq X$, potom *charakteristická funkce podmnožiny* je zobrazení $C_A : X \rightarrow \{1, 0\}$.

$$(\forall x \in X) : C_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{pokud } x \in A \\ 0 & \text{pokud } x \notin A \end{cases}$$

1.4.3 Notace pro množinu všech k -prvkových podmnožin

Nechť N je množina. potom $\binom{N}{k}$ je *množina všech k -prvkových podmnožin* množiny N .

$$\binom{N}{k} = \{A \subseteq N : |A| = k\}$$

Zároveň platí:

$$\left| \binom{N}{k} \right| = \binom{|N|}{k} = \binom{n}{k}$$

1.4.4 Kombinační číslo a Pascalův trojúhelník

- **Kombinační číslo (binomický koeficient):** Pro čísla $n, k > 0$ platí:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!} = \frac{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$$

- **Pascalův trojúhelník:** Tabulka kombinačních čísel:

$n = 0:$					1
$n = 1:$				1	1
$n = 2:$			1	2	1
$n = 3:$		1	3	3	1
$n = 4:$	1	4	6	4	1

1.5 Grafy

1.5.1 Graf, vrchol, hrana

Graf je uspořádaná dvojice (V, E) , kde V je vrchol a E je hrana. V je konečná neprázdná množina a E konečná neprázdná množina všech dvouprvkových podmnožin V , tedy $E \subseteq \binom{V}{2}$.

1.5.2 Standardní grafy

- **Úplný graf** na n vrcholech značíme K_n , kde $V = [n]$ a $E = \binom{V}{2}$.
- **Prázdný graf** na n vrcholech značíme E_n , kde $V = [n]$ a $E = \emptyset$, t.j. nemá žádnou hranu.
- **Cestu** na n vrcholech značíme P_n , kde $V = [n]$ a $E = \{\{i-1, i\}; 1 \leq i \leq n\}$.
- **Kružnici** na n vrcholech značíme C_n , kde $V = [n]$ a $E = \{\{i, i+1\}, 1 \leq i \leq n-1\} \cup \{\{1, n\}\}$.

1.5.3 Bipartitní a Úplně bipartitní graf

- **Bipartitní graf**, pokud $V = V_1 \cup V_2$, t.ž. $V_1 \cap V_2 = \emptyset$. Hrany jsou mezi V_1 a V_2 , neboli $\forall e \in E : |e \cap V_1| = 1$. Graf G je bipartitní, pokud lze V rozdělit na dvě disjunktní množiny V_1 a V_2 takové, že každá hrana z E obsahuje jeden bod z V_1 a druhý z V_2 .
- **Úplně bipartitní graf** na $n+m$ vrcholech značíme $K_{n,m}$, kde $V = \{u_1, \dots, u_n\} \cup \{v_1, \dots, v_m\}$ (*=dvě party*) a $E = \{\{u_i, v_j\}, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$.

1.5.4 Isomorfismus grafů

Grafy G a H jsou *isomorfní*, pokud existuje *bijekce* mezi vrcholy:

$$\exists f : V(G) \rightarrow V(H), \text{ t.ž. } \{u, v\} \in E(G) \iff \{f(u), f(v)\} \in E(H)$$

1.5.5 Stupeň vrcholu, Regulární graf a Skóre grafu

- **Stupeň vrcholu** v v grafu G je $\deg_G(v) := |\{u \in V(G) : \{u, v\} \in E(G)\}|$.
Neboli počet hran grafu G , které obsahují hranu v .
- **k -regulární**, pokud pro $k \in \mathbb{N}$ platí $\forall u \in V(G) : \deg_G(u) = k$.
- **Skóre grafu** G je posloupnost stupňů všech vrcholů (*krom uspořádání*).

1.5.6 Podgraf, indukovaný podgraf

- **Podgraf**: Graf H je *podgrafem* grafu G , pokud $V(H) \subseteq V(G)$ a $E(H) \subseteq E(G) \cap \binom{V(H)}{2}$.
- **Indukovaný podgraf**: Podgraf H je *indukovaný*, pokud $E(H) = E(G) \cap \binom{V(H)}{2}$.

1.5.7 Cesta, kružnice, sled a tah v grafu

- **Cesta v grafu** G je podgraf isomorfní s nějakou cestou.
- **Kružnice v grafu** G je podgraf isomorfní s nějakou kružnicí, kde se vrcholy ani hrany neopakují.
- **Sled** z v_0 do v_n v grafu G je posloupnost $(v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_n, v_n)$, pokud platí $\forall i : e_i = \{v_{i-1}, v_i\}$, kde v jsou vrcholy a e hrany. *Mohou se opakovat vrcholy i hrany.*
- **Tah** z v_0 do v_n v grafu G je posloupnost $(v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_n, v_n)$, pokud platí $\forall i : e_i = \{v_{i-1}, v_i\}$, kde v jsou vrcholy a e navzájem různé hrany. *Mohou se opakovat pouze vrcholy, ne hrany.*

1.5.8 Souvislý graf, relace dosažitelnosti, komponenty souvislosti

- **Souvislý**, pokud $(\forall u, v \in V)$ existuje cesta z u do v . *Graf drží pohoromadě.*
- **Relace dosažitelnosti (ekvivalence)** v grafu G je binární relace \sim na $V(G)$, t.ž. $u \sim v$, pokud existuje cesta z u do v .
- **Komponenty souvislosti** jsou podgrafy indukované třídami ekvivalence.

1.5.9 Matice sousednosti

Matice sousednosti $A(G)$ grafu G je čtvercová matice $n \times n$, pro kterou platí:

$$A_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{pokud } \{v_i, v_j\} \in E \\ 0 & \text{pokud } \{v_i, v_j\} \notin E \end{cases}$$

1.5.10 Vzdálenost v grafu (grafová metrika)

Vzdálenost v souvislém grafu G je definována jako $d_G : V^2 \rightarrow \mathbb{R} : \forall u, v : d_G(u, v)$ je minimum z délek mezi u a v .

Pro metriku musí platit $\forall u, v, w \in V$:

- $d_G(u, v) \geq 0$... je minimum z délek cest, cesty jsou také nezáporné
- $d_G(u, v) = 0 \iff u = v$... nikde jinde (krom $d_G(u, u)$) vzdálenost nulová není
- $d_G(u, v) \leq d_G(u, w) \leq d_G(w, v)$... vzdálenost mezi u a v je shora omezená mezi vzdáleností u, w a w, v
- $d_G(v, u) = d_G(u, v)$

1.5.11 Grafové operace: přidání/odebrání vrcholu/hrany, dělení hrany, kontrakce hrany

Grafové operace: přidání/odebrání vrcholu/hrany, dělení hrany, kontrakce hrany

- **Přidání vrcholu/hrany** značíme $G + v / G + e$.
- **Odebrání vrcholu/hrany** značíme $G - v / G - e$. V případě $G - v$ vytváříme indukovaný podgraf (*mažeme i hrany z tohoto vrcholu*). $G - v = G[V \setminus \{v\}]$
- **Dělení hrany** značíme $G \% e$. Vytvoření vrcholu uprostřed: $\{u, x\}$ a $\{x, v\}$.
 $V' = V \cup \{v\}; E' = (E \setminus \{e\}) \cup \{\{v, x\}, \{x, y\}\}$.
- **Kontrakce hrany** značíme $G.e$. Spojení (slepení) hran. $V' = (V \cup \{x, y\}) \cup \{z\}$
 $E' = \{f \in E \mid f \cap e = \emptyset\} \cup \{f \setminus \{x, y\} \cup \{z\} \mid f \in E \wedge |f \cap e| = 1\}$

1.5.12 Otevřený a uzavřený eulerovský tah

Otevřený eulerovský tah z v_0 do v_n je takový tah, který obsahuje všechny vrcholy a hrany grafu právě jednou. *Uzavřený* eulerovský tah je takový tah, kde $v_0 = v_n$.

1.5.13 Orientovaný graf, podkladový graf, vstupní a výstupní stupeň, vyváženost vrcholu

- **Orientovaný graf** uspořádaná dvojice (V, E) , kde $E \subseteq V^2 \setminus \{(x, x) \mid x \in V\}$.
Neboli relace na množině vrcholů bez diagonálních prvků.
- **Podkladový graf** $G = (V, E) \rightarrow G_0 = (V, E_0)$, pro $E_0 = \left\{ \{u, v\} \in \binom{V}{2} \mid (u, v) \in E \vee (v, u) \in E \right\}$.
Neboli množina všech neuspořádaných dvojic vrcholů, kde v jednom nebo druhém pořadí je hrana.
- **Vstupní a výstupní stupeň:** Pokud existuje Eulerovský tah pro každý vrchol v , potom:

$$\underbrace{\# \text{hran z } V}_{\text{výstupní stupeň } \deg^-(V)} = \underbrace{\# \text{hran do } V}_{\text{vstupní stupeň } \deg^+(V)}$$

- **Vyváženost vrcholu:** Graf je *vyvážený*, pokud platí $\deg^-(V) = \deg^+(V)$.

1.5.14 Silná a slabá souvislost orientovaných grafů

- **Silná souvislost**, pokud pro $\forall u, v \in V$ existuje orientovaná cesta z u do v .
- **Slabá souvislost**, pokud podkladový graf (=symetrie grafu) je souvislý.

1.6 Stromy

1.6.1 Stromy, les, list

- **Strom** je souvislý graf bez kružnic. (*acyklický graf*)
- **Les** je acyklický graf. Jeho komponenty souvislosti jsou stromy.
- **List** je vrchol stupně 1.

1.6.2 Kostra grafu

Kostra grafu G je podgraf T , tedy $T \subseteq G$ t.ž.: $V(T) = V(G) \wedge T$ je strom.

1.7 Rovinné kreslení grafů

1.7.1 Rovinné nakreslení grafu a jeho stěny (neformálně)

Pokud existuje nakreslení do roviny bez křížení hran, tak je graf G rovinný.

1.7.2 Rovinný graf a topologický graf

- **Rovinný graf** je takový graf, pro nějž existuje nějaké nakreslení v rovině.
- **Topologický graf:** uspořádaná dvojice (graf, nakreslení).

1.7.3 Stereografická projekce

Překreslení grafu z roviny na sféru a naopak.

1.8 Barvení grafů

1.8.1 Obarvení grafu k barvami a barevnost

- **Obarvení grafu k barvami** je $c : V(G) \rightarrow [k]$ tak, že kdykoli $\{x, y\} \in E(G)$, pak $c(x) \neq c(y)$.
- **Barevnost** $\chi(G)$ je nejmenší k takové, že existuje k -obarvení G .

1.9 Pravděpodobnost

Ω je množina elementárních jevů; $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$ je podmnožina elementárních jevů;

Pravděpodobnost P je funkce $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1] = \begin{cases} P(A) = 1 & \text{jev jistý} \\ P(A) = 0 & \text{jev možný} \end{cases}$

1.9.1 Pravděpodobnostní prostor diskrétní, konečný, klasický

- **Diskrétní:** trojice (Ω, \mathcal{F}, P) , kde Ω je konečná nebo spočetná, $\mathcal{F} = 2^\Omega$; $P(\Omega) = 1$; $P(A) = \sum_{w \in A} P(\{w\})$.
- **Konečný:** Diskrétní pravděpodobnostní prostor, kde Ω je konečný.
- **Klasický:** Konečný pravděpodobnostní prostor, kde $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$.

1.9.2 Jev elementární, jev složený, pravděpodobnost jevu

- **Elementární jev:** Všechny výsledky nějakého pravděpodobnostního experimentu. Značíme jako Ω .
- **Složený jev:** Takový jev, který není elementární. Složený jev nastane \iff nastane některý z elementárních jevů v něm obsažený.
- **Pravděpodobnost jevu** udává, jakou máme šanci, že daný jev nastane.

1.9.3 Podmíněná pravděpodobnost

Podmíněná pravděpodobnost je pravděpodobnost, že nastal jev A za podmínky, že nastal jev B .

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

1.9.4 Jevy nezávislé a po k nezávislé

- **Nezávislé:** Jevy A a B jsou nezávislé $\iff P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.
- **Po k nezávislé:** Jevy A_1, A_2, \dots, A_n jsou po dvou nezávislé $\iff \forall i, j : i \neq j \implies A_i, A_j$ jsou nezávislé.
Neboli jsou nezávislé, pokud pro $\forall I \subseteq [n]$ platí: $P\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \prod_{i \in I} P(A_i)$.

1.9.5 Náhodná veličina

Náhodná veličina (proměnná) je funkce $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

1.9.6 Střední hodnota

Střední hodnota náhodné veličiny X je $\mathbb{E}(X) = \sum_{w \in \Omega} P(\{w\}) \cdot X(w)$.

1.9.7 Indikátor náhodného jevu

Indikátor náhodného jevu A je náhodná veličina $I_A : \Omega \rightarrow \{0, 1\}$.

$$I_A(w) = \begin{cases} 1 & \text{pokud } w \in A \text{ (pokud jev nastal)} \\ 0 & \text{pokud } w \notin A \text{ (pokud jev nenastal)} \end{cases}$$

1.9.8 Markovova nerovnost

Nechť X je nezáporná náhodná veličina a $\forall t \geq 1$, potom platí: $P[X \geq t \cdot \mathbb{E}(X)] \leq \frac{1}{t}$

2 Věty a důkazy

2.1 Úvod

2.2 Relace


2.2.1 Vztah mezi ekvivalencemi a rozklady

Věta: Pro každou ekvivalenci R na X platí:

- (i) $\forall x \in X : R[x] \neq \emptyset$
- (ii) $\forall x, y \in X : R[x] = R[y]$ nebo (XOR) $R[x] \cap R[y] = \emptyset$
- (iii) Třídy ekvivalence jednoznačně určují (popisují) relaci R .

Proof.

- (i) Množina $R[x]$ vždy obsahuje prvek x , protože R je *reflexivní*. $xRx \implies x \in R[x] \implies R[x] \neq \emptyset$
- (ii) Chceme ukázat, že $R[x] \cap R[y] \neq \emptyset \implies R[x] \subseteq R[y]$.
Víme, že $\exists t \in R[x] \cap R[y]$ a chceme, aby $\forall a : a \in R[x] \wedge a \in R[y]$.
Víme tedy, že t je průnikem, proto platí $xRt; tRx$ i $yRt; tRy$ a zároveň víme, že $aRx; xRa$.
Nyní za pomoci tranzitivity zjistíme, že aRt a opět tranzitivitou $aRy \implies a \in R[y]$.



- (iii) Triviálně: $xRy \iff \{x, y\} \subseteq R[x]$. Neboli, když chci zjistit, jestli je xRy , tak stačí najít $R[x]$ obsahující y a podívat se, jestli je tam i x .

□

2.3 Uspořádání

2.3.1 Konečná neprázdna uspořádaná množina má minimální a maximální prvek

Věta: Každá konečná neprázdna ČUM má minimální a maximální prvek.

Proof. Zvolíme libovolné $x_1 \in X$:

- x_1 je minimální - **hotovo**
- $\exists x_2 < x_1$, s ním pokračuji dál: $x_1 > x_2 > \dots > x_t$

Pokud $t > |X|$, pak $\exists i, j, i \neq j$ t.ž. $x_i = x_j$. Platí tedy $x_1 > x_{i+1} > x_{j+1} > \dots > x_j = x_i$. Za pomoci tranzitivity určím $x_i > x_j = x_i$, získal jsem tím pádem $x_i > x_i$, což je **spor**.

Neboli: Tvořím posloupnost. Začnu lib. prvkem, v každém kroku vezmu poslední přidaný prvek do posloupnosti a podívám se, jestli má minimum. Pokud ne, přidám ho do posloupnosti. Posloupnost musí být konečná, protože jinak jsem přidal z množiny do posl. nějaký stejný prvek. Pokud se vyskytne stejný prvek, tak tranzitivita a následně spor. □

2.3.2 O Dlouhém a Širokém

Věta: Necht (X, \preceq) je konečná ČUM, potom $\alpha(X, \preceq) \cdot \omega(X, \preceq) \geq |X|$

Proof. Konstruuje vestvy x_1, x_2, \dots, x_i , kde $x_1 = \min X$. **Krok:** Máme-li x_1, \dots, x_i , nejdříve se podíváme, co zbylo:

$$Z_i = X \setminus \left(\bigcup_{j < i} X_j \right) \implies \begin{cases} Z_i = \emptyset & \text{hotovo} \\ Z_i \neq \emptyset & X_{i+1} = \min \text{ prvky } Z_i \end{cases}$$

Z toho nám plynou 3 důsledky:

1. $\forall i : X_i \text{ je antiřetězec} \implies |X_i| \leq \alpha$ (= velikost každé vrstvy je nejvýš α)
2. $\exists \text{ řetězec } \{q_1, \dots, q_n\} \text{ t.ž. } \forall i : q_i \in X_i \implies k \leq \omega$ (= počet vrstev je nejvýš ω)
podívám se, kvůli kterému prvku je náš prvek ve své vrstvě a ne nějaké nižší, neboli $q_k \in X_k$ libovolně.
Máme q_k, q_{k-1}, \dots, q_i , kde $q_i \notin X_{i-1} \implies \exists q_{i-1} \in X_{i-1} : q_{i-1} < q_i$.
3. X_1, \dots, X_k jsou rozklad $X \implies |X| = \sum_i |X_i| \leq \alpha \cdot \omega$

□

2.3.3 Erdősovo-Szekeresovo lemma o monotónních podposloupnostech

Věta: Necht x_1, \dots, x_{n^2+1} je posloupnost navzájem různých čísel, potom \exists vybraná podposloupnost délky $n+1$, která je ostře monotónní (=klesající nebo rostoucí).

Proof. Nadefinujeme si relaci \leq na množině $\{1, \dots, n^2+1\}$ pro $i \leq j \equiv i \leq j \wedge x_i \leq x_j$ a vypořádujeme, že se jedná o částečné uspořádání. Potom řetězec odpovídá rostoucí podposloupnosti a antiřetězec klesající podposloupnosti. Můžeme tedy použít Dlouhého a širokého:

$$\alpha \cdot \omega \geq n^2 + 1 \implies \text{nemůže nastat } \alpha \leq n \wedge \omega \leq n \implies \alpha \geq n + 1 \vee \omega \geq n + 1.$$

□

2.4 Kombinatorické počítání

2.4.1 Počet funkcí mezi množinami

Věta: Necht A je n -prvková a B je m -prvková množina, potom počet funkcí mezi A a B je m^n .

Proof. Určujeme $\#f : A \rightarrow B$.

Máme množinu A o velikosti $|A| = n$ a množinu B o velikosti $|B| = m$. Množina A obsahuje prvky a_1, a_2, \dots, a_n , množina B prvky b_1, b_2, \dots, b_m . Zobrazujeme jednotlivě prvky a na prvky z množiny B .

$f(a_1)$ můžeme zobrazit m možnostmi, $f(a_2)$ také m možnostmi, ..., $f(a_n)$ také m možnostmi. Z čehož nám vyplývá:

$$\#f : [n] \rightarrow [m] = \underbrace{m \cdot m \cdot \dots \cdot m}_{n\text{-krát}} = m^n$$

□

2.4.2 Počet prostých funkcí mezi množinami

Věta: Necht A je n -prvková a B je m -prvková množina, potom počet prostých funkcí mezi A a B je m^n .

Proof. Určujeme $\#f : [n] \rightarrow [m]$ prostých.

$f(1)$ zobrazíme m možnostmi, $f(2)$ už $m-1$ možnostmi, ..., $f(n)$ jen $m-n+1$ možnostmi. Z čehož nám vyplývá:

$$\#f : [n] \rightarrow [m] \text{ prostých} = m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdot \dots \cdot (m-n+1) = m^n \dots \text{klesající mocnina}$$

□

2.4.3 Počet všech podmnožin

Věta: Počet všech n -prvkových podmnožin je roven 2^n , tedy $|2^X| = 2^{|X|}$.

Proof. Snažíme se ukázat $|2^{[n]}| = 2^n$.

Podmnožině $A \subseteq X$ přiřadíme funkci $C_A : X \rightarrow \{0, 1\}$. 0 pokud $x \notin A$, 1 pokud $x \in A$.

Spárovali jsme podmnožiny s charakteristickými funkcemi, neboli našli jsme bijekci mezi množinou všech podmnožin X a množinou všech funkcí $C_A : X \rightarrow \{0, 1\}$.

Máme-li bijekci mezi dvěma množinami, pak mají obě množiny stejný počet prvků $\implies |2^{[n]}| = 2^n$.

□

2.4.4 Počet podmnožin sudé a liché velikosti

Věta: Počet podmnožin sudé a liché velikosti je stejný.

Proof. Nechť máme množinu $[n]$, kde $n > 0$.

Definujme si dvě množiny: $S = \{A \subseteq [n] : |A| \text{ je sudá}\}$ a $L = \{A \subseteq [n] : |A| \text{ je lichá}\}$. Jejich sjednocením získáme množinu všech prvků, neboli $S \cup L = 2^{[n]} \iff |S| + |L| = 2^n$.

Snažíme se ukázat $|S| = |L| = 2^{n-1}$. Určuji tedy bijekci mezi S a L :

Zvolím libovolné $a \in [n]$ a definuji zobrazení $f : 2^{[n]} \rightarrow 2^{[n]}$. Následně přidám a do A pokud v ní není, nebo ho naopak odeberu, pokud v ní je.

$$f(A) = \begin{cases} A \cup \{a\} & \text{pokud } a \notin A \\ A \setminus \{a\} & \text{pokud } a \in A \end{cases}$$

□

2.4.5 Počet permutací na množině

Věta: Pokud A je konečná množina, tak permutace množiny A je bijekce z A do A

Proof.

- (a) Jedná se o zobrazení množiny na stejnou množinu, jedná se o bijekci.
Protože se jedná o bijekci, stačí nám spočítat, $\#f : [n] \rightarrow [n]$.

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 1 = n! \text{ ...faktoriál}$$

- (b) Kolik existuje způsobů, jak očíslovat prvky nějaké množiny $[n]$ čísly od 1 do n ?
Počítáme bijekci mezi 1 až n do 1 až n , takže počítáme počet prostých funkcí $\implies n!$

□

2.4.6 Počet uspořádaných k -tic bez opakování a k -prvkových podmnožin

Věta: Počet uspořádaných k -tic bez opakování a k -prvkových podmnožin je roven $\binom{n}{k}$.

Proof. Nechť X je množina, potom $|X^k| \iff f : [k] \rightarrow X$.

- (a) **Bez opakování:** $f[k] \rightarrow X$, neopakujeme, takže je prostá:

$$\#f : [k] \rightarrow X \text{ prosté} \implies |X|^k$$

- (b) **Podmnožiny (= neuspořádané k -tice).** Určíme k -tice bez opakování za pomoci počítání 2 způsoby:

- (1) $U(k, n)$ je uspořádaná k -tice z bodu (a).
- (2) $N(k, n)$ je odvození neuspořádaných k -tic.

$$N(k, n)k! = U(k, n) = n^k$$

$$N(k, n) = \frac{n^k}{k!} = \frac{n^k}{k!} = \frac{n(n-1)(n-2) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k(k-1) \cdot \dots \cdot 1} = \binom{n}{k} \text{ ...binomické číslo}$$

□

2.4.7 Základní vlastnosti kombinačních čísel

$$\binom{n}{0} = 1 = \binom{n}{n}$$

$$\binom{n}{1} = n = \binom{n}{n-1}$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

2.4.8 Binomická věta

Věta: $(\forall x, y \in \mathbb{R})(\forall n \in \mathbb{N}) : (x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$

Proof. Představme si $\underbrace{(x + y) \cdot (x + y) \cdot \dots \cdot (x + y)}_{n\text{-krát}}$. Když z toho vybereme jednotlivá x a y , např.:

$x \cdot x \cdot y \cdot x \cdot y \dots = x^{n-k} y^k \dots$ y -nů mám celkem y^k , takže x -ů musím mít celkem zbylých x^{n-k} .

Dále se můžeme ptát, kolik existuje členů pro konkrétní k . A protože z právě k závorek jsme si vybrali y , tak si z právě n závorek musíme vybrat k takových, ve kterých použijeme x . \implies máme $\binom{n}{k}$ možností, jak je vybrat. \square

2.4.9 Princip inkluze a exkluze

Věta 1: Pro konečné A_1 až A_n platí:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{I \in \binom{[n]}{k}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

Proof. #1. Nechť $A := \bigcup_i A_i$

Levá i pravá strana jsou součty velikostí nějakých množin, takže se můžeme ptát, *kolikrát levé a pravé straně přispěje každý prvek $a \in A$* . Víme, že k levé přispěje jednou, chceme dokázat, že k pravé také jednou. Zadefinujeme

si *kolikrát se započítá $\#i : a \in A_i = t$* : Pro $k > t \dots$ 0-krát; Pro $k \leq t \dots (-1)^{k+1} \binom{t}{k}$ -krát

$$\underbrace{\sum_{k=1}^t (-1)^{k+1} \binom{t}{k}} = 1$$

I na pravé straně tedy přispěje právě jednou. \square

Věta 2: Pro konečné A_1 až A_n platí:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

Proof. #2.

Nechť $A := \bigcup_i A_i$ a nechť pro $X \subseteq A$ platí $C_X : A \rightarrow \{0, 1\} \dots$ charakt. funkce. Nechť platí vztah:

$$\prod_{i=1}^n (1 - x_i) = \sum_{I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} \prod_{i \in I} x_i$$

Operace char. fce: $C_X \cdot C_Y = C_{X \cap Y}$; $C_{\bar{X}} = 1 - C_X$; $1 - C_{X \cup Y} = (1 - C_X)(1 - C_Y)$; $\sum_{a \in A} C_X(a) = |X|$

Nyní dosadíme do původní rovnice $x_i = C_{A_i}$:

$$\begin{aligned} \underbrace{\prod_{i=1}^n (1 - C_{A_i})}_{1 - C_{\bigcup_i A_i}} &= \sum_{I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} \underbrace{\prod_{i \in I} C_{A_i}}_{C_{\bigcap_{i \in I} A_i}} \\ 1 - C_{\bigcup_i A_i} &= \left(\sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|} C_{\bigcap_{i \in I} A_i} \right) + 1 \\ C_{\bigcup_i A_i} &= \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} C_{\bigcap_{i \in I} A_i} \\ \underbrace{\sum_{a \in A} C_{\bigcup_i A_i}}_{\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right|} &= \sum_{\emptyset \neq I \subseteq [n]} (-1)^{|I|+1} \underbrace{\sum_{a \in A} C_{\bigcap_{i \in I} A_i}}_{\left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|} \end{aligned}$$

\square

2.4.10 Odhad faktoriálu

Věta: $n^{n/2} \leq n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$

Nejprve uděláme několik menších úprav, umocníme $(n^{n/2} \leq n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n)^2$ a vyjádříme:

$$(n!)^2 = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n \cdot n = (1 \cdot n) \cdot (2 \cdot (n-1)) \cdot (3 \cdot (n-2)) \cdot \dots \cdot (n \cdot 1)$$

$$n! = \underbrace{\sqrt{1 \cdot n} \cdot \sqrt{2 \cdot (n-1)} \cdot \sqrt{3 \cdot (n-2)} \cdot \dots \cdot \sqrt{n \cdot 1}}_{\sqrt{i(n-i+1)}}$$

Nyní budeme dokazovat dvě nerovnosti, ve kterých $n! = \sqrt{i(n-i+1)}$:

- Proof.* $\sqrt{i(n-i+1)} \geq \sqrt{n} = n^{1/2}$, umocníme na 2., takže chceme, aby $i(n-i+1) \geq n$:
 - Pokud se $i = n \vee i = 1$, potom $n \geq n$.
 - Pokud se $i \neq 1, n$, tak počítám součin dvou čísel, jedno je větší (max) a druhé menší (min).
 - $\max \geq n/2 \dots$ nejmenší může být, když se potkají uprostřed
 - $\min \geq 2 \dots$ nemůže být 1 (podmínka)
 Takže součin dvou čísel: $\max \cdot \min \geq n/2 \cdot 2 = n$

□

- Proof.* Za pomoci AG nerovnosti: $\forall x, y \geq 0$:

$$\underbrace{\sqrt{x \cdot y}}_{\text{geometrický průměr}} \leq \underbrace{\frac{x+y}{2}}_{\text{aritmetický průměr}}$$

Tvrdíme, že podle AG nerovnosti platí: $\sqrt{i(n-i+1)} \leq \frac{i+n-i+1}{2} = \frac{n+1}{2}$:

$$0 \leq (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$2ab \leq a^2 + b^2$$

$$ab \leq \frac{a^2 + b^2}{2}$$

Při dosazení $a = \sqrt{x}$ a $b = \sqrt{y}$, získáme $\sqrt{x \cdot y} \leq \frac{x+y}{2} \implies$ platí $n! = \sqrt{i(n-i+1)} \leq \frac{n+1}{2}$.

□

2.4.11 Odhad kombinačního čísla

Věta: $\left(\frac{n}{k}\right)^k \leq C(n, k) \leq n^k$

Nejprve binomické číslo rozdělím na $\binom{n}{k} = \frac{n^k}{k!} = \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k(k-1) \cdot \dots \cdot 1}$ a opět budeme dokazovat dvě nerovnosti:

- Proof.* Můžeme si všimnout, že každé číslo v čitateli je nejvýše n a každé číslo ve jmenovateli je alespoň 1. Proto $\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)}{k(k-1) \cdot \dots \cdot 1} \leq \left(\frac{n}{1}\right)^k = n^k$
- Proof.* Rozdělíme výraz na jednotlivé zlomky: $\frac{n}{k} \cdot \frac{n-1}{k-1} \cdot \dots \cdot \frac{n-k+1}{1}$ a u každého dokážeme, že je $\geq \frac{n}{k}$. Dokazujeme tedy, že z leva do prava zlomky rostou ($\frac{n}{k}$ je nejmenší).

$$\frac{n}{k} \leq \frac{n-1}{k-1}$$

$$n \cdot (k-1) \leq k \cdot (n-1)$$

$$nk - n \leq nk - k$$

$$n \geq k$$

Výraz je skutečně rostoucí.

□

2.4.12 Odhad prostředního kombinačního čísla

Věta: $\frac{4^n}{2n+1} \leq \binom{2n}{n} \leq 4^n$. Čísla rostou, v prostřed je maximum, následně zase klesají (*Pascalův trojúhelník*).

- Proof.* $\binom{2n}{n} \leq 4^n$.
Uvědomme si, že když máme n -tý řádek Pascalova trojúhelníku, tak je jeho součet 2^n . V našem případě je to $2n$ -tý řádek, takže jeho součet je $2^{2n} = 4^n$.
- Proof.* $\frac{4^n}{2n+1} \leq \binom{2n}{n}$.
Když máme posloupnost čísel, tak platí $\max \geq$ aritmetický průměr \geq min. Naše číslo je největší a leží přesně v prostřed, takže musí být \geq AP řádku.
Součet našeho $2n$ -tého řádku je 4^n , součet čísel na řádku je $2n+1$. Celkem tedy platí $\frac{4^n}{2n+1}$

□

2.5 Grafy

2.5.1 Vztah mezi součtem stupňů a počtem hran, princip sudosti

Věta: V grafu $G = (V, E)$ platí:

$$\sum_{v \in V} \deg_G(v) = 2|E|$$

Proof. Sečteme-li stupě, každou hranu započítáme dvakrát (jednou za každý její konec). Konec hran: počítáme dvojice (v, e) , kde $v \in V$ a $e \in E$, t.ž.: $v \in e$. □

Důsledek: počet vrcholů lichého stupně je sudý

2.5.2 Věta o skóre

Věta: Posloupnost $D = (d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n)$ pro $n \geq 2$ je skóre grafu $\iff 0 \leq d_n \leq n-1 \wedge$ posloupnost $D' = d'_1, d'_2, \dots, d'_{n-1}$ je skóre grafu, kde $d'_i = \begin{cases} d_i & \text{pro } i < n - d_n \\ d_i - 1 & \text{pro } i \geq n - d_n \end{cases}$.

Proof. ... □

2.5.3 Dosažitelnost sledem je totéž jako dosažitelnost cestou

Věta: Mezi vrcholy u, v vede sled \iff mezi nimi vede cesta.

1. *Proof.* \Leftarrow :

Triviálně, každá cesta je sledem. □

2. *Proof.* \Rightarrow :

Postupně budu ze sledu vypouštět smyčky. Opakujeme, dokud se nezbavíme všech opakujících se vrcholů.

Formálně: Nechť \exists sled z u do v ... Nyní:

Sled: $v_0, e_1, v_1, \dots, e_i, \underbrace{v_i, e_{i+1}, \dots, e_j, v_j}_{\text{smyčka}}, e_{j+1}, \dots, e_n, v_n$, kde $v_i = v_j$ pro nějaké $i < j$. Odstraníme smyčku:

Sled: $v_0, e_1, v_1, \dots, e_i, v_i, e_{j+1}, \dots, e_n, v_n$, je kratší, je bez smyček, je cestou

Opakujeme, dokud existují duplicitní vrcholy. □

2.5.4 Počet sledů délky k lze získat z k -té mocniny matice sousednosti

Věta: Pro $A = A(G)$ grafu G na vrcholech v_1, \dots, v_n platí:

$$\forall i, j : (A^k)_{i,j} = \# \text{ sledů délky } k \text{ z } v_i \text{ do } v_j.$$

Proof. Matematickou indukcí podle k .

(i) pro $k = 0$ a $k = 1$: Triviálně, sled délky 0 je stejný vrchol; sled délky 1 je jedna hrana.

(ii) pro $k - 1 \rightarrow k$: Zapišeme $A^k = A^{k-1} \cdot A$.

$$\begin{aligned} A^k_{i,j} &= \sum_{t=1}^n \underbrace{A^{k-1}_{i,t}}_{\# \text{ sledů délky } k-1 \text{ z } v_i \text{ do } v_t} \cdot \underbrace{A_{t,j}}_{[\{v_t, v_j\} \in E(G)]} = \\ &= \sum_{\{v_t, v_j\} \in E(G)} \# \text{ sledů délky } k-1 \text{ z } v_i \text{ do } v_t = \\ &= \# \text{ sledů délky } k \text{ z } v_i \text{ do } v_j \end{aligned}$$

□

2.5.5 Trojúhelníková nerovnost pro vzdálenost

Věta: $d_G(u, v) \leq d_G(u, w) + d_G(w, v)$

Proof. Z věty 2.5.3. Sled nemůže být kratší než nejkratší cesta. □

2.5.6 Věta o existenci uzavřeného eulerovského tahu

Věta: Graf je Eulerovský \iff má uzavřený eulerovský tah, je souvislý a má všechny vrcholy sudé ($\forall v \in V(G) : \deg_G(v)$ je sudý)

1. *Proof.* \implies :

Je souvislý: z každého vrcholu do každého se dá dostat za pomoci eulerovského tahu. Tah je případem sledu a když je někde sled, je tam i cesta $\implies \forall u, v$ existuje cesta mezi u a v .

Je sudý: Hrany sousedící s V rozdělíme do disjunktních dvojic $\implies \deg_G(V)$ je sudý. \square

2. *Proof.* \impliedby :

Nechť T je jeden z nejdelších tahů v G .

(a) T je uzavřený: Kdyby nebyl, vezmeme v (krajní vrchol tahu)... v je navšívěn lichým počtem hran tahu $\implies \exists f \in E$ incidentní s v t.ž. $f \notin T \implies f.T$ je ale delší tah. \nmid

(b) $\forall u, v$ vrcholy na T : pokud $\{u, v\} \in E(G)$, pak $\{u, v\} \in T$... Víme, že tah je uzavřený. Kdyby existovala nějaká hrana (mezi u, v), která neleží na tahu, tak ji povedu ke sporu. Víím, že nejdelší tah je uzavřený a že prochází alespoň jednou u . Při jednom průchodu u tah rozpojím a přidám hranu $\{u, v\}$. Tím jsem však vytvořil tah, který je delší než původní nejdelší T . \nmid

(c) Každý vrchol $v \in V(G)$ leží na tahu T ... Nechť vrchol v neleží na tahu T . Vezmu libovolný vrchol u a ze souvislosti plyne, že \exists cesta mezi u a v . Aby ale existoval, musela by existovat hrana, která spojuje v a tah T , ta ale existovat nemůže, protože bychom přidali hranu a zvětšili bychom T . \nmid

\square

2.5.7 Uzavřené eulerovské tahy v orientovaných grafech

Věta: Pro orientovaný graf G je ekvivalentní:
$$\begin{cases} (i) \text{ je vyvážený a slabě souvislý} \\ (ii) \text{ je eulerovský} \\ (iii) \text{ je vyvážený a silně souvislý} \end{cases}.$$

Proof. Postupně dokazujeme $(i) \implies (ii) \implies (iii) \implies (i)$:

$(i) \implies (ii)$: Z důkazu o existenci uzavřeného eulerovského tahu

$(ii) \implies (iii)$: Máme-li uzavřený eulerovský tah, tak je ve dvojicích vždy stejně hran dovnitř a hran ven. Je eulerovský, takže z něj mohu vybrat podtah z u do v i z v do u . (věta 2.5.3)

$(iii) \implies (i)$: Silná souvislost implikuje slabou

\square

2.6 Stromy

2.6.1 Lemma o koncovém vrcholu

Věta: Každý strom s alespoň dvěma vrcholy má alespoň jeden list.

Proof. Nechť C je nejdelší cesta a vrcholy a a z jsou listy.

Pro spor předpokládejme, že

1. $\exists x \notin C$, ale když ho propojíme s a , vznikne nám delší cesta. \nmid

2. Hrana vede do vrcholu x' , který už na cestě leží. V takovém případě by nastala kružnice. \nmid

\square

2.6.2 Je-li l list grafu G, pak G je strom, právě když G-l je strom.

Věta: Pro graf G s listem l : G je strom $\iff G - l$ je strom.

1. *Proof.* \implies je-li G souvislý acyklický, pak je i $G - l$ souvislý acyklický.

Je souvislý: $\forall u, v \in V(G - l) \exists$ cesta C v G mezi u, v , takže $C \subseteq G - l$


Je acyklický: Kdyby \exists kružnice $C \subseteq G - l \subseteq G \implies C \subseteq G$

\square

2. *Proof.* \Leftarrow je-li $G - l$ souvislý acyklický, pak je i G souvislý acyklický.

Je souvislý: Dokazujeme, že mezi každými vrcholy G existuje cesta. Pokud to jsou vrcholy $\neq l$, pak jsou to vrcholy, které už byly v $G - l$, tím pádem mezi nimi byla cesta, která zůstala až do G . Přidáním listu nerozbijí cestu. Dokazujeme, že \exists cesty mezi l a ostatními vrcholy v $G - l$. Například chceme z l do t : využijeme $G - l$ souvislosti a bodu s , který propojíme s bodem $t \Rightarrow \exists$ cesta.

Je acyklický: Kdybychom měli kružnici v G , kde není l , tak taková byla i v $G - l$. Tam být ale nemůže, protože l má stupeň 1 a v kružnici musí mít každý vrchol stupeň ≥ 2 . \square



2.6.3 Pět ekvivalentních charakteristik stromu

Věta: Pro graf G jsou následující tvrzení ekvivalentní:

- (i) G je souvislý a acyklický (=strom)
- (ii) $\forall u, v \in V(G) \exists!$ cesta v G mezi u a v (=jednoznačná souvislost)
- (iii) G je souvislý a $\forall e \in E(G) : G - e$ není souvislý (=minimální souvislost)
- (iv) G je acyklický a $\forall e \in \binom{V(G)}{2} \setminus E : G + e$ má cyklus (=maximálně acyklický)
- (v) G je souvislý a $|E(G)| = |V(G)| - 1$ (=Eulerova formule)

Proof. Matematickou indukcí podle k .

(i) \Rightarrow (ii): indukcí odtrháváním listů

(i) \Rightarrow (iii): Máme-li uzavřený eulerovský tah, tak je ve dvojicích vždy stejně hran dovnitř a hran ven. Graf je vyvážený a silně souvislý, na tahu leží každé dva vrcholy u, v . Je eulerovský, takže z něj mohu vybrat podtah z u do v i z v do u .

(i) \Rightarrow (iv): Z důkazu o existenci uzavřeného eulerovského tahu

(i) \Rightarrow (v): Z důkazu o existenci uzavřeného eulerovského tahu

\square

2.6.4 Graf má kostru, právě když je souvislý.

Věta: Graf G má kostru $\iff G$ je souvislý.

1. *Proof.* \Rightarrow


Má-li graf kostru, je kostra strom, ve stromu jsou každé dva vrcholy spojené cestou. Cesta je podgrafem G , takže G je souvislý. \square

2. *Proof.* \Leftarrow

Pokud je G souvislý, tak je buď acyklický, nebo v něm jsou nějaké cykly. Můžeme si vybrat libovolnou hranu na cyklu a tu smazat (opakujeme konečně krát, dokud jsou v grafu cykly). Dostaneme tedy graf, který je stále souvislý a který neobsahuje cykly, takže je strom. (Odebíráním hrany vždy dostaneme podgraf původního grafu, takže je strom). \square

2.7 Rovinné kreslení grafů

2.7.1 Hranice stěny je nakreslení uzavřeného sledu (bez důkazu).



2.7.2 Graf jde nakreslit do roviny, právě když jde nakreslit na sféru.

Proof. Stereografickou projekcí. Viz 3.7.2. □

2.7.3 Kuratowského věta (bez důkazu)

Věta: Graf G je nerovinný $\iff G$ obsahuje podgraf isomorfní s dělením K_5 nebo $K_{3,3}$.

2.7.4 Eulerova formule pro souvislé rovinné grafy ($v+f=e+2$)

Věta: Nechť G je souvislý graf nakreslený do roviny, $v := |V(G)|$, $e := |E(G)|$, $f := \#$ stěn nakreslení. Potom platí $v + f = e + 2$.

Proof. Zvolíme v pevně a pak indukci podle e .

(i) $e = v - 1$ (G je strom), $f = 1$:

$$v + 1 = v - 1 + 2$$

(ii) $e - 1 \rightarrow e$: mějme graf G s e hranami. Nechť λ je hrana na kružnici v G .

Potom $G' = G - \lambda$, $v' = v$, $e' = e - 1$, $f' = f - 1$. Nyní použijeme indukční předpoklad:

$$v' + f' = e' + 2$$

$$v + f - 1 = e - 1 + 2$$


$$v + f = e + 2$$

□

2.7.5 Maximální rovinný graf je triangulace.

Věta: Je-li G maximální rovinný s alespoň 3 vrcholy, pak jsou ve všech nakresleních všechny stěny trojúhelníky.

Proof.



□

2.7.6 Maximální počet hran rovinného grafu

Věta: V každém rovinném grafu s alespoň 3 vrcholy je $|E| \leq 3|V| - 6$.

Proof. Doplním do G hrany, až získám maximální rovinný graf G' . Takže $v' = v$, $e' \geq e$. Nyní jen dosadíme:

$$e' = 3v' - 6 \implies e \leq 3v - 6$$

□

2.7.7 V rovinném grafu existuje vrchol stupně nejvýše 5.

V rovinném grafu existuje vrchol stupně nejvýše 5. Vychází z věty: Průměrný stupeň vrcholu v rovinném grafu je < 6 . Což dokážeme:

Proof. $\sum_{\lambda} \deg(\lambda) = 2e \leq 6v - 12$. Určím průměr: $\frac{\sum_{\lambda} \deg(\lambda)}{v} = \frac{2e}{v} \leq \frac{6v-12}{v} \implies e < 6v$.

Z toho plyne důkaz pro naši větu: Kdyby všechny vrcholy měly stupeň alespoň 6, tak je průměr také alespoň 6... Což není, je ostře menší.

□

2.7.8 Počet hran a vrchol nízkého stupně v rovinných grafech bez trojúhelníků

Proof. Počítáme dvěma způsoby: $4f \leq 2e \implies f \leq \frac{1}{2}e$:

$$\begin{aligned} v + \frac{1}{2}e &\geq e + 2 \\ v - 2 &\geq \frac{1}{2}e \\ e &\leq 2v - 4 \end{aligned}$$

Průměrný stupeň je tedy $< 4 \implies$ existuje vrchol stupně maximálně 3.

□

2.8 Barvení grafů

2.8.1 Graf má barevnost nejvýše 2, graf je bipartitní, graf neobsahuje lichou kružnici.

Tvrzení: $\chi(G) \leq 2 \iff G$ je bipartitní.



1. *Proof.* \Leftarrow Triviálně, je-li bipartitní, jeho obarvení je nejvýše 2.

□

2. *Proof.* \implies :

Když máme graf obarvitelný 2 barvami, tak ty 2 barvy jsou partity. Když do jedné partity uložíme vrcholy s jednou barvou a druhou, tak zase musí jít hrany napříč partitami.

□

Věta: $\chi(G) \leq 2 \iff G$ nemá lichou kružnici.

1. *Proof.* \implies Triviálně.

□

2. *Proof.* \Leftarrow :

Kdyby byl nesouvislý, obarvíme po komponentách.

$T :=$ kostra grafu G , $\exists c : V(G) \rightarrow \{1, 2\}$ obarvení T . Kdyby $\exists \{x, y\} \in E(G) \setminus E(T)$ a $c(x) = c(y)$:

$P :=$ cesta mezi x, y v T , P má sudou délku $\implies P + \{x, y\}$ je lichá kružnice v G . \nmid

□

2.8.2 Barevnost je větší nebo rovna než klikovost

Klikovost je rovna velikosti největší kliky (úplného podgrafu) v G .

Tvrzení: Pokud $H \subseteq G$, pak $\chi(H) \leq \chi(G)$.

Proof. Najde-li se v grafu úplný podgraf na k vrcholech, tak ten graf nejde obarvit méně než k barvami, takže χ je alespoň k .

□

2.8.3 Barevnost je menší nebo rovna než maximální stupeň + 1

Věta: Pokud G je k -generovaný, pak $\chi(G) \leq k + 1$.

k -degenerovaný graf: $\equiv \exists \preceq$ lineární uspořádání na $V(G)$ t.ž. $\forall v \in V(G) : |\{u \prec v \mid \{u, v\} \in E(G)\}| \leq k$.
 Neboli: počet všech vrcholů před v , které jsou s v spojené hranou je nejvýš k .

Proof. Barvíme v pořadí podle uspořádání \preceq , zleva doprava. První obarvíme libovolně a pro každý další se podívám, kolik barev je zakázáno jeho obarvenými sousedy. Obarvení sousedů jsou ale jen nalevo, takže jich je nejvýš k . Mám k dispozici $k + 1$ barev, vždy zůstane alespoň 1 volná. \square

2.8.4 Věta o 5 barvách


Věta: Pro graf G rovinný je $\chi(G) \leq 5$.

Proof. Kempeho řetězce - Indukcí podle $|V|$.

(i) $|V| \leq 5$... Triviálně.

(ii) $n - 1 \rightarrow n$: Nechť v je vrchol s min stupněm ($\deg(v) \leq 5$). Vezmeme $G' := G - v \xrightarrow{IP} \exists c'$ 5-ti obarvení G' .
 "Snažíme se odebrat v , obarvit indukci zbytek a přilepit v zpátky."

- Pokud na sousedech v je v c' maximálně 4 barvy, tak dobarvíme v .
- Pokud ne, snažíme se přebarvit něco tak, abychom si alespoň 1 barvu pro v uvolnili.
 Budujeme podgraf z a : podgraf A indukovaný vrcholy, do kterých \exists cesta z a přes a -barvu a c -barvu.
 - Pokud $c \notin A$: stačí prohodit v A barvy, takže je a -barva volná pro v .
 - Pokud $c \in A$: uděláme totéž z b přes b -barvy a d -barvy, vytvoříme tím podgraf B .
 Nyní už $d \notin B$: prohození barev v B , takže se uvolní b -barva pro v .



Buď jsme prohodili barvy v A nebo jsme došli až do c a vytvořila se kružnice. Takže když jsme totéž udělali s B , tak jsme nemohli dojít až do d , protože bychom museli protnout námi vytvořenou kružnici. \square

Důkaz #2 písni: <https://mj.ucw.cz/tmp/5barev>

2.8.5 Věta o 4 barvách (bez důkazu)

Věta: Pro graf G rovinný je $\chi(G) \leq 4$.

2.9 Pravděpodobnost

2.9.1 Věta o úplné pravděpodobnosti

Věta: Nechť A je jev a B_1, \dots, B_k je rozklad Ω na jevy t.ž. $\forall i : P(B_i) \neq 0$. Potom:

$$P(A) = \sum_i P[A|B_i] \cdot P(B_i)$$

Proof.

$$P(A) = \sum_i \underbrace{P[A|B_i] \cdot P(B_i)}_{P(A \cap B_i)}$$

A to platí, protože $P(A) = + \begin{cases} P(A \cap B) = P[A|B] \cdot P(B) \\ P(A \cap \overline{B}) = P[A|\overline{B}] \cdot P(\overline{B}) \end{cases}$

□

2.9.2 Bayesova věta

Věta: Nechť A je jev, kde $P(A) \neq 0$ a B_1, \dots, B_k je rozklad Ω na jevy t.ž. $\forall i : P(B_i) \neq 0$. Potom:

$$P[B_i|A] = \frac{P[A|B_i] \cdot P(B_i)}{\sum_j P[A|B_j] \cdot P(B_j)}$$

2.9.3 Věta o linearitě střední hodnoty

Věta: Nechť X, Y jsou nezávislé veličiny a $\alpha \in \mathbb{R}$, potom $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$ a $\mathbb{E}[\alpha X] = \alpha \mathbb{E}[X]$.

Proof. #1.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X + Y] &= \sum_{\omega \in \Omega} \underbrace{(X + Y)(\omega)}_{X(\omega) + Y(\omega)} \cdot P(\omega) = \\ &= \sum_{\omega \in \Omega} (X(\omega) + Y(\omega)) \cdot P(\omega) = \\ &= \sum_{\omega \in \Omega} (X(\omega) \cdot P(\omega)) + (Y(\omega) \cdot P(\omega)) = \\ &= \underbrace{\left(\sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot P(\omega) \right)}_{\mathbb{E}[X]} + \underbrace{\left(\sum_{\omega \in \Omega} Y(\omega) \cdot P(\omega) \right)}_{\mathbb{E}[Y]} = \\ &= \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y] \end{aligned}$$

□

Proof. #2.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\alpha X] &= \sum_{\omega \in \Omega} (\alpha X)(\omega) \cdot P(\omega) = \\ &= \sum_{\omega \in \Omega} \alpha (X(\omega) \cdot P(\omega)) = \\ &= \alpha \sum_{\omega \in \Omega} \underbrace{(X(\omega) \cdot P(\omega))}_{\mathbb{E}[X]} = \\ &= \alpha \mathbb{E}[X] \end{aligned}$$

□

3 Příklady

3.1 Úvod

3.1.1 Technika důkazu indukcí a sporem

- **Důkaz sporem:** Použitím chybného předpokladu dostaneme spor - předpoklad je nepravdivý, proto platí jeho negace.
- **Důkaz indukcí** Tvzení se rozdělí do několika podtříd, podtřídy uspořádáme do posloupnosti. Dokazujeme pro všechny objekty *první* ($n = 1$) podtřídy a všechny objekty *následující* ($n + 1$) podtřídy.

3.2 Relace

3.2.1 Příklady relací

- **Prázdná:** Prázdná relace $R \subseteq \emptyset$ je podmnožin kartézského součinu prázdné množiny.
- **Univerzální:** Nechť máme relaci $R \subseteq X \times Y$, potom pro *univerzální relace* $S \subseteq X \times Y$ platí $R = S$.
Všechny prvky se propojí.
- **Diagonální:** Relace R na X je *diagonální* $\iff \Delta R = \{(x, x) \mid x \in X\}$. Pokud má v maticovém zápisu jedničky v diagonále.

3.3 Uspořádání

3.3.1 Příklady uspořádání

- **Dělitelnost** (\mathbb{N}, \mid) : reflexivita $\frac{a}{a}$; antisymetrie $\frac{b}{a} \wedge \frac{a}{b} \implies a = b$; tranzitivita $\frac{b}{a} \wedge \frac{c}{b} \implies \frac{c}{a}$; Částečné uspořádání
- **Inkluze podmnožin** $(2^X, \subseteq)$: reflexivita $A \subseteq A$; antisymetrie $A \subseteq B \wedge B \subseteq A \implies A = B$; tranzitivita $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \implies A \subseteq C$; Částečné uspořádání
- **Lexikografické:** Máme abecedu (X, \preceq) .
Pro *lexikografické uspořádání* (X^2, \preceq_{LEX}) platí $(a_1, a_2) \preceq_{LEX} (b_1, b_2) \equiv a_1 < b_1 \vee (a_1 = b_1 \wedge a_2 \preceq b_2)$

3.4 Kominatorické počítání

3.4.1 Problém šatnářky: počet permutací bez pevného bodu

Znění: Do divadla přišlo n pánů s n klobouky, každý pán si odložil klobouk v šatně a po představení si jej zase vyzvedl. Šatnářka však pánům vybrala klobouky náhodně. Jaká je pravděpodobnost, že žádný pán nedostal svůj klobouk?

$S_n := \{\pi \mid \pi \text{ je permutace na } [n]\}$... množina všech pánů - každému pánovi je přiřazen právě 1 klobouk - bijekce $\pi(i) = i$... tzv. *pevný bod* - pán dostal svůj klobouk

$Z_n := |\{\pi \in S_n \mid \forall i : \pi(i) \neq i\}|$... kolik \exists permutací bez pevného bodu

$P_{\pi \in S_n}(\pi \text{ nemá pevný bod}) = \frac{Z_n}{n!}$... výsledná hledaná pravděpodobnost

$A := \{\pi \in S_n \mid \pi \text{ má pevný bod}\}$... $Z_n = n! - |A|$

$A_i := \{\pi \in S_n \mid \pi(i) = i\}$... mají i jako jeden z pevných bodů

$A = \bigcup_i A_i$

$|A_i| = (n - 1)!$

$|A_i \cap A_j| = (n - 2)! \dots$ pro $i \neq j$

$| \text{průniku } k\text{-tice} | = (n - k)!$

Dosadíme do vzorečku pro Inkluzi a exkluzi:

$$\begin{aligned}
\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{\substack{I \in \binom{[n]}{k} \\ (n-k)!}} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right| \\
|A| &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \cdot \underbrace{\binom{n}{k} \cdot (n-k)!}_{\frac{n!(n-k)!}{k!(n-k)!}} \\
|A| &= n! \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{k!} = \frac{n!}{1!} - \frac{n!}{2!} + \frac{n!}{3!} - \dots + \frac{n!}{k!}
\end{aligned}$$

Tím jsme však spočítali počet permutací s alespoň jedním pevným bodem, musíme tedy použít $Z_n = n! - |A|$:

$$\begin{aligned}
Z_n &= n! - \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} - \frac{n!}{3!} + \dots - \frac{n!}{k!} \\
Z_n &= n! \cdot \underbrace{\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}}_{e^{-1}}
\end{aligned}$$

Pravděpodobnost, že žádný pán nedostal svůj klobouk je $\frac{n!}{e}$.


3.5 Grafy

3.6 Stromy

3.7 Rovinné kreslení grafů

3.7.1 K_5 a $K_{3,3}$ nejsou rovinné.


K_5 a $K_{3,3}$ nejsou rovinné podle Jordanovy věty, která říká: *Každá uzavřená křivka dělí rovinu na dvě části.*



Pokud je 5 uvnitř, nelze ji propojit s 3. Naopak, pokud je 5 venku, nelze ji propojit s 4.

3.7.2 Vnější stěnu lze zvolit.

Princip: Když mám nekreslený graf v rovině, promítnu ho stereograficky na sféru. Tím zase dostanu nakreslení na sféře a vnější stěna se promítne taky na stěnu - pozná se podle toho, že obsahuje S pól.



Při otočení: Vytvoří se rovinné zakreslení téhož grafu, stěny vypadají stejně \implies mohu si zvolit, která bude vnější.

3.7.3 Klasifikace platónských těles pomocí rovinných grafů

Platónské těleso konvexní mnohostěn, má shodné mnohoúhelníky, v každém vrcholu má stejný počet hran

Z bodu uvnitř mnohostěnu promítáme vrcholy na sféru, máme tedy nakreslený graf na sféře. Víme ale, že graf na sféře můžeme překreslit do roviny.

Hledáme tedy rovinný graf, kde každá stěna má právě k -hran a je d -regulární pro nějaké d .

Nakreslíme-li do každé stěny vrchol a spojíme hranami, vznikne nový rovinný graf, který má prohozené k a d .

Takže $3 \leq k, d \leq 5$.

Zároveň víme, že $k \cdot f = 2e$, protože každá stěna má k -hran $\implies f = \frac{2e}{k}$.

Zároveň víme, že $d \cdot v = 2e$, protože součet stupňů v je $2e \implies v = \frac{2e}{d}$.

Dosadíme do eulerovy formule:

$$\begin{aligned} v + f &= e + 2 \\ \frac{2e}{d} + \frac{2e}{k} &= e + 2 / (: 2e) \\ \frac{1}{d} + \frac{1}{k} &= \frac{1}{2} + \frac{1}{e} \end{aligned}$$


Pravá část výsledného výrazu nám říká, že $\frac{1}{2} + \frac{1}{e} \in (\frac{1}{2}; 1] \implies \min(d, k) = 3$.

Vytvoříme tabulku a dopočítáme zbytek:

d	k	e	v	f
3	3	6	4	4
3	4	12	8	6
3	5	30	20	12
4	3	12	6	8
5	3	30	12	20

3.8 Barvení grafů

3.8.1 Převod barvení mapy na barvení grafu pomocí duality



3.8.2 Barevnost úplných grafů, cest a kružnic

- Úplný graf: $\chi(K_n) = n$
- Cesta: $\chi(P_n) = 2$
- Kružnice: $\chi(C_n) = \begin{cases} 2 & \text{sudé} \\ 3 & \text{liché} \end{cases}$


3.8.3 Princip barvení indukcí: stromy jsou 2-obarvitelné, rovinné grafy 6-obarvitelné

Tvrzení: Každý strom je 2-obarvitelný.

Proof. Indukcí podle $|V|$.

(i) $|V| = 1 \dots$ Triviálně.

(ii) $n - 1 \rightarrow n$: Nechť l je list a s jeho soused. Uvažme $G' := G - l \xrightarrow{IP} \exists c'$ obarvení G' .
Nyní stačí rozšířit c' na nějaké c , které listu l dává opačnou barvu, než má s . Takže: $c(l) = 3 - c'(s)$ a $c(V) = c'(V)$, pro $\forall V \neq l$.



□

3.9 Pravděpodobnost

3.9.1 Jev se také dá popsat logickou formulí.

$\{x \in X \mid \varphi(x)\}$, kde $\varphi(x)$ je *formulka*, která nám řekne, jestli je výsledek pokusu elementární jev

3.9.2 Bertrandův paradox s kartičkami

Máme 3 kartičky, s barvami stran: CC , MM , CM .

Vybereme náhodnou kartičku náhodnou stranou položíme nahoru.

Pozorovali jsme, že horní strana je červená. Jaká je předěpodobnost, že je i spodní červená?

$\Omega = \{\underline{CC}, \underline{CC}, \underline{MM}, \underline{MM}, \underline{CM}, \underline{CM}\}$, kde $\underline{}$ je kartička otočená nahoru. Víme, že horní strana byla červená \implies

$\Omega = \{\underline{CC}, \underline{CC}, \underline{MM}, \underline{MM}, \underline{CM}, \underline{CM}\}$, hledáme ale dolní stranu C , takže nám zbývá pouze:

$\Omega = \{\underline{CC}, \underline{CC}, \underline{MM}, \underline{MM}, \underline{CM}, \underline{CM}\}$, všechny jevy mají stejnou pravděpodobnost $\frac{1}{3}$, takže celková $P[C] = \frac{2}{3}$.

Když řešíme přes podmíněnou pravděpodobnost: $A = C$, $B = \underline{C}$. $P[A|B] = \frac{2/6}{1/2} = \frac{2}{3}$

3.9.3 Jevy, které jsou po 2 nezávislé, ale po 3 už ne

Hod mincí: $\Omega = \{00, 01, 10, 11\}$, $A = \{10, 11\}$...první 1, $B = \{01, 11\}$...druhá 1, $C = \{00, 11\}$...sudý #1. Takže
 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{2}$
 $P(A \cap B) = P(A \cap C) = P(B \cap C) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$
 $P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$

3.9.4 Součin pravděpodobnostních prostorů, projekce

Součin pravděpodobnostních prostorů $(\Omega_1, 2^{\Omega_1}, P_1)$ a $(\Omega_2, 2^{\Omega_2}, P_2)$ je trojice $(\Omega_1 \times \Omega_2, 2^{\Omega_1} \times 2^{\Omega_2}, P)$,
kde $P(A) = \sum_{(a_1, a_2) \in A} P_1(a_1) \cdot P_2(a_2)$

3.9.5 Logické formule s náhodnými veličinami dávají jevy.

n -krát hodím mincí a defuji si náhodnou veličinu $X := \#1$. Potom mi $P[X < 3]$ dává jev.

3.9.6 Použití indikátorů k výpočtu střední hodnoty

n -krát hodím mincí a ptám se, kolik mi padlo jedniček - zajímá mě střední hodnota $\mathbb{E}[X]$ jedniček.

$X = \#1$, $X_i = \#1$ na i -té pozici, takže $X = \sum_i X_i$.

$$\mathbb{E}[X] = \sum_i \mathbb{E}[X_i] = \begin{cases} 0 & \text{s pravděpodobností } \frac{1}{2} \\ 1 & \text{s pravděpodobností } \frac{1}{2} \end{cases} \implies \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

Sčítáme n -krát $\frac{1}{2}$, takže máme $\frac{n}{2}$.

3.9.7 Velikost řezu v grafu: střední hodnota, existuje velký řez, pravděpodobnostní algoritmus