

TỜ ĐIỀU TRỊ
(Số 01)

Họ tên người bệnh: Nguyễn Thị Deng Tuổi: 67 tuổi Giới tính: Nữ
Khoa: Khoa HSCC - Chẩn đoán Buồng: Bệnh nhân TNT ngoại trú Giường: H001
Chẩn đoán: Suy thận mạn, giai đoạn 5
Bệnh kèm theo: Bệnh lý tăng huyết áp/ Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản

Ngày giờ	Diễn biến bệnh	Y lệnh điều trị
24/07 13:30	Bệnh nhân nữ 67 tuổi vào viện với lý do mệt mỏi, tăng cân, đau bụng thượng vị Tiền sử: Suy thận mạn, tăng huyết áp. Bệnh sử: Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn đang chạy thận theo chu kỳ 3.5.7 nay mệt mỏi nhiều, ăn uống kém, đau bụng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, phù 2 chi dưới vào viện khám và điều trị Bệnh nhân tỉnh Mệt mỏi nhiều Không nôn, không buồn nôn Ăn, ngủ kém Không đau ngực, không khó thở Mạch: 77 lần/ phút Huyết áp: 120/80 mmHg Nhịp thở: 17 lần/ phút Nhiệt độ: 36,6 độ C Cân khô: 46 kg Cân trước lọc: 48 kg Da niêm mạc nhợt Phù nhẹ 2 chân Đau bụng thượng vị, ợ hơi ợ chua nhiều Tim nhịp đều Phổi không rales Bụng mềm, không chướng Ấn thượng vị đau tức, PUTB (-) Các cơ quan khác hiện chưa phát hiện dấu hiệu bệnh lý Chẩn đoán : Suy thận mạn giai đoạn 5/ Tăng huyết áp  Ký bởi : BSCKI. Trần Hoài Quang Trần Hoài Quang	1.TNT chu kỳ tháng 7/2023 Máy thận: Nipro surdial 5S plus Quả lọc: Eliso 17 M Chất liệu màng: Cellulose Triacetate Diện tích màng: 1,7 m2 Hệ số siêu lọc: 2.580 ml/hr/100mmHg Dịch lọc: Renalvn A+B Đường vào MM: AVF Tốc độ dịch: 500 ml/p Tốc độ máu: 230 ml/p UF: 2300ml Thời gian lọc máu: 4h Chống đông: Heparin x 4000UI (Tán công 2000UI, Duy trì 2000UI/4h) Nacl 0,9% 500 mml x 3 chai xả quả lọc Recombinant Human Erythropoietin for Injection (Erythropoietin 2000 IU) x 01 Lọ Pha tiêm TMC 01 lọ sau lọc máu Nước cất tiêm (Nước cất pha tiêm (Nước để pha thuốc tiêm 10ml) 10ml) x 01 Ống Pha recombina Jiracek (Esomeprazol 40mg) x 10 Viên Uống 1 viên/ lần * 1 lần / ngày lúc 20 giờ Alusi (Magnesi trisilicat + nhôm hydroxyd 500mg+ 250mg) x 20 Viên Nhai 1 viên/ lần * 2 lần/ ngày sáng - chiều trước ăn 30 phút Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trừ) Thận nhân tạo thường qui (13:30 - 17:30) Ăn nhạt, giảm đạm, hạn chế nước Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ trước trong và sau lọc máu  Ký bởi : BSCKI. Trần Hoài Quang

Ngày giờ	Diễn biến bệnh	Y lệnh điều trị
		Trần Hoài Quang
24/07 14:00		Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 5ml/cc (Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar (5ml)) x 01 Cái TN- Dịch lọc RENALVN-A(Acid) x 0,5 Can TN- Dịch lọc RENALVN-B(Bicarbonat) x 0,5 Can TN- Sodium (Natriclorid) 1000ml (Natri clorid 1000 ml) x 01 Chai TN- Sodium chloride 500ml (Natri clorid 500ml) x 01 Chai TN- Paringold (Heparin (natri) 25000IU + 15mg + 45mg) x 0,2 Lọ TN- Găng tay mỏng size M x 02 Đôi TN- Kim chạy thận nhân tạo x 04 Cái TN- Gạc thận 3.5x4.5x 80 lớp x 02 Cái TN- Bơm tiêm SD 1 lần 10ml Vinahankook x 01 Cái TN- Quả lọc thận nhân tạo ELISSIO-17M x 01 Quả TN- Dây lọc máu thận nhân tạo x 01 Cái TN- Kim tiêm sử dụng 1 lần 18G x 01 Cái  Ký bởi : BSCKI. Trần Hoài Quang Trần Hoài Quang
26/07 13:30	Bệnh nhân tỉnh Mệt mỏi nhiều Không nôn, không buồn nôn Ăn, ngủ kém Không đau ngực, không khó thở Mạch: 79 lần/ phút Huyết áp: 130/80 mmHg Nhịp thở: 18 lần/ phút Nhiệt độ: 36,8 độ C Cân khô: 46 kg Cân trước lọc: 48,2 kg Da niêm mạc nhợt Phù nhẹ 2 chân Đau bụng thượng vị, ợ hơi ợ chua nhiều Tim nhịp đều Phổi không rales Bụng mềm, không chướng Ấn thượng vị đau tức, PUTB (-) Các cơ quan khác hiện chưa phát hiện dấu hiệu bệnh lý	2.TNT chu kỳ tháng 7/2023 Máy thận: Nipro surdial 5S plus Quả lọc: Eliso 17 M Chất liệu màng: Cellulose Triacetate Diện tích màng: 1,7 m2 Hệ số siêu lọc: 2.580 ml/hr/100mmHg Dịch lọc: Renalvn A+B Đường vào MM: AVF Tốc độ dịch: 500 ml/p Tốc độ máu: 230 ml/p UF: 2500ml Thời gian lọc máu: 4h Chống đông: Heparin x 4000UI (Tấn công 2000UI, Duy trì 2000UI/4h) Nacl 0,9% 500 mml x 3 chai xả quả lọc Recombinant Human Erythropoietin for Injection (Erythropoietin 2000 IU) x 01 Lọ Pha tiêm TMC 01 lọ sau lọc máu Nước cất tiêm (Nước cất pha tiêm (Nước để pha thuốc tiêm

TỜ ĐIỀU TRỊ
(Số 02)

Họ tên người bệnh: Nguyễn Thị Deng Tuổi: 67 tuổi Giới tính: Nữ
Khoa: Khoa HSCC - Chống độc Buồng: Bệnh nhân TNT ngoại trú Giường: H001
Chẩn bệnh: Suy thận mạn, giai đoạn 5
Bệnh kèm theo: Bệnh lý tăng huyết áp/ Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản

Ngày giờ	Diễn biến bệnh	Y lệnh điều trị
	 Ký bởi : BSCKI. Trần Hoài Quang Trần Hoài Quang	10ml) 10ml) x 01 Ống Pha recombinat Thận nhân tạo thường qui (13:30 - 17:30) Ăn nhạt, giảm đạm, hạn chế nước Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ trước trong và sau lọc máu  Ký bởi : BSCKI. Trần Hoài Quang Trần Hoài Quang
26/07 14:00		Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 5ml/cc (Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar (5ml)) x 01 Cái TN- Dịch lọc RENALVN-A(Acid) x 0,5 Can TN- Dịch lọc RENALVN-B(Bicarbonat) x 0,5 Can TN- Sodium (Natriclorid) 1000ml (Natri clorid 1000 ml) x 01 Chai TN- Sodium chloride 500ml (Natri clorid 500ml) x 01 Chai TN- Paringold (Heparin (natri) 25000IU + 15mg + 45mg) x 0,2 Lọ TN- Găng tay mỏng size M x 02 Đôi TN- Kim chạy thận nhân tạo x 04 Cái TN- Gạc thận 3.5x4.5x 80 lớp x 02 Cái TN- Kim tiêm sử dụng 1 lần 18G x 01 Cái  Ký bởi : BSCKI. Trần Hoài Quang Trần Hoài Quang
28/07 13:30	Bệnh nhân tỉnh Mệt mỏi nhiều Không nôn, không buồn nôn Ăn, ngủ kém Không đau ngực, không khó thở Mạch: 80 lần/ phút	3.TNT chu kỳ tháng 7/2023 Máy thận: Nipro surdial 5S plus Quả lọc: Eliso 17 M Chất liệu màng: Cellulose Triacetate Diện tích màng: 1,7 m2 Hệ số siêu lọc: 2.580 ml/hr/100mmHg

Ngày giờ	Diễn biến bệnh	Y lệnh điều trị
	Huyết áp: 140/80 mmHg Nhịp thở: 20 lần/ phút Nhiệt độ: 36,5 độ C Cân khô: 46 kg Cân trước lọc: 48 kg Da niêm mạc nhợt Phù nhẹ 2 chân Đau bụng thượng vị, ợ hơi ợ chua nhiều Tim nhịp đều Phổi không rales Bụng mềm, không chướng Án thượng vị đau tức, PUTB (-) Các cơ quan khác hiện chưa phát hiện dấu hiệu bệnh lý  Ký bởi : BSCKI. Trần Hoài Quang Trần Hoài Quang	Dịch lọc: Renalvn A+B Đường vào MM: AVF Tốc độ dịch: 500 ml/p Tốc độ máu: 230 ml/p UF: 2300ml Thời gian lọc máu: 4h Chống đông: Heparin x 4000UI (Tán công 2000UI, Duy trì 2000UI/4h) Nacl 0,9% 500 mml x 3 chai xả quả lọc Recombinant Human Erythropoietin for Injection (Erythropoietin 2000 IU) x 01 Lọ Pha tiêm TMC 01 lọ sau lọc máu Nước cất tiêm (Nước cất pha tiêm (Nước để pha thuốc tiêm 10ml) 10ml) x 01 Ống Pha recombinaat Thận nhân tạo thường qui (13:30 - 17:30) Ăn nhạt, giảm đạm, hạn chế nước Theo dõi mạch, huyết áp, nhiệt độ trước trong và sau lọc máu  Ký bởi : BSCKI. Trần Hoài Quang Trần Hoài Quang
28/07 14:00		Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 5ml/cc (Bơm tiêm sử dụng một lần Tanaphar (5ml)) x 01 Cái TN- Bơm tiêm SD 1 lần 10ml Vinahankook x 01 Cái TN- Dịch lọc RENALVN-A(Acid) x 0,5 Can TN- Dịch lọc RENALVN-B(Bicarbonat) x 0,5 Can TN- Sodium (Natriclorid) 1000ml (Natri clorid 1000 ml) x 01 Chai TN- Sodium chloride 500ml (Natri clorid 500ml) x 01 Chai TN- Paringold (Heparin (natri) 25000IU + 15mg + 45mg) x 0,2 Lọ TN- Găng tay mỏng size M x 02 Đôi TN- Kim chạy thận nhân tạo x 02 Cái TN- Gạc thận 3.5x4.5x 80 lớp x 02 Cái TN- Kim tiêm sử dụng 1 lần 18G x 01 Cái  Ký bởi : BSCKI. Trần Hoài Quang