

Guia detalhado de alongamentos

Lista extraída da base interna do app, com função, modo de execução, tempo, indicações, cuidados e variações de cada alongamento.

85

ALONGAMENTOS CATALOGADOS

17

REGIÕES CORPORAIS

6

TIPOS EXPLICADOS

Como usar este guia

Use a lista para consulta rápida, roteiros de vídeo, revisão de conteúdo e criação de fichas no app. Em todos os casos, priorize tensão confortável e retorno calmo da postura.

Princípio de segurança

O alongamento adequado deve gerar tensão confortável, nunca dor aguda. Queimacao intensa, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura ou sensação de choque são sinais de alerta.

Tipos de alongamento

Estático

Mantem uma posição por tempo determinado. Pós-treino, relaxamento e flexibilidade.

Dinâmico

Usa movimentos controlados dentro da amplitude. Aquecimento e preparação para atividades.

Ativo

A própria musculatura sustenta a posição. Mobilidade e controle motor.

Passivo

Usa apoio externo. Relaxamento, sem forçar.

Balístico

Usa impulso ou rebote. Evitar para iniciantes.

PNF

Contração, relaxamento e alongamento. Mais avançado, idealmente com orientação profissional.

Índice por região

Mãos, dedos e punhos - 5 itens

Ombros e deltoides - 5 itens

Pescoço e cervical - 5 itens

Abdomen e tronco anterior - 5 itens

Posterior de coxa - 5 itens

Tornozelos - 5 itens

Antebraços e cotovelos - 5 itens

Peitoral - 5 itens

Coluna torácica - 5 itens

Quadril - 5 itens

Anterior de coxa - 5 itens

Pés e dedos - 5 itens

Bíceps, triceps e braços - 5 itens

Costas superiores e escápulas - 5 itens

Lombar - 5 itens

Glúteos - 5 itens

Panturrilhas - 5 itens

Mãos, dedos e punhos

5 alongamentos - sinais atendidos: mãos e punhos cansados, foco no trabalho, muito tempo sentado

Extensão dos flexores do punho

PassivoIniciante

Função: Reduzir tensão da face anterior do antebraço.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Mãos, dedos e punhos	20 a 30 segundos	2 por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, palmar longo	punho, dedos, cotovelo	teclado, mouse, celular, musculacao

Como executar

1. Estenda o braco a frente com a palma para cima.

2. Com a outra mão, puxe suavemente os dedos para baixo e para tras.

3. Mantenha o cotovelo estendido sem travar.

4. Respire e sustente tensão confortável.

Respiração

Lenta, sem prender o ar.

Sensação correta

Puxar na palma e na face anterior do antebraço.

Versão fácil

Cotovelo semiflexionado.

Evite se houver

formigamento, dor no túnel do carpo, cirurgia recente

Erros comuns

dobrar o cotovelo, puxar com força, elevar o ombro

Progressao

Dedos mais estendidos, sem aumentar dor.

Melhor momento: Pausas de trabalho ou pós-treino.

Nota anatômica: Alonga tendoes flexores que passam pela região anterior do punho.

Sinais de alerta: dormencia, choque, dor irradiada

Flexão dos extensores do punho

EstáticoIntermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em mãos, dedos e punhos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Mãos, dedos e punhos	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
extensor radial longo do carpo, extensor ra- dial curto do carpo, extensor ulnar do carpo	punho, dedos, cotovelo	mãos e punhos cansados, foco no trabalho, muito tempo sentado

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.

2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.

3. Sustente a posição sem quicar.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de punhos e dedos, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura,
condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar
articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar con-
fortável.

Pausa AI - guia interno de alongamentos

Página 2 de 49

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de punho, dedos, cotovelo e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.
Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Abertura dos dedos

Ativo

Iniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em mãos, dedos e punhos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Mãos, dedos e punhos	6 a 10 repetições lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
interosseos, lumbricais, adutor do polegar	dedos, metacarpofalângicas	mãos e punhos cansados, foco no trabalho, muito tempo sentado

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Movimento dentro da amplitude disponível de forma lenta.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de punhos e dedos, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de dedos, metacarpofalângicas e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.
Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Alongamento do polegar

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em mãos, dedos e punhos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Mãos, dedos e punhos	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
adutor do polegar, flexor curto do polegar	polegar, punho	mãos e punhos cansados, foco no trabalho, muito tempo sentado

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Sustente a posição sem quicar.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de punhos e dedos, sem dor aguda.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

- quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de polegar, punho e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Círculos de punho

Mobilidade

Iniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em mãos, dedos e punhos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Mãos, dedos e punhos	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
flexores do punho, extensores do punho	punho	mãos e punhos cansados, foco no trabalho, muito tempo sentado

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Movimento dentro da amplitude disponível de forma lenta.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de punhos e dedos, sem dor aguda.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura,
condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de punho e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Antebraços e cotovelos

5 alongamentos - sinais atendidos: mãos e punhos cansados, foco no trabalho

Pronação e supinação do antebraço

Mobilidade

Iniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em antebraços e cotovelos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Antebraços e cotovelos	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
pronador redondo, supinador	cotovelo, radio-ulnar	mãos e punhos cansados, foco no trabalho

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.

2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.

3. Movimento dentro da amplitude disponível de forma lenta.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de antebraço, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de cotovelo, radio-ulnar e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Alongamento do braquiorradial

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em antebraços e cotovelos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Antebraços e cotovelos	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
braquiorradial	cotovelo, punho	mãos e punhos cansados, foco no trabalho

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.

2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.

3. Sustente a posição sem quicar.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de antebraço, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de cotovelo, punho e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Alongamento dos pronadores

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em antebraços e cotovelos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Antebraços e cotovelos	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
pronador redondo, pronador quadrado	cotovelo, punho	mãos e punhos cansados, foco no trabalho

Pausa AI - guia interno de alongamentos

Página 5 de 49

Como executar

- 1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- 2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- 3. Sustente a posição sem quicar.
- 4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de antebraço, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de cotovelo, punho e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.
Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Alongamento dos supinadores

Estático Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em antebraços e cotovelos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Antebraços e cotovelos	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
supinador, bíceps braquial	cotovelo, radio-ulnar	mãos e punhos cansados, foco no trabalho

Como executar

- 1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- 2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- 3. Sustente a posição sem quicar.
- 4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de antebraço, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de cotovelo, radio-ulnar e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.
Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Mobilidade leve de cotovelo

Mobilidade Iniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em antebraços e cotovelos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Antebraços e cotovelos	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado

MÚSCULOS PRINCIPAIS
bíceps braquial, triceps braquial

ARTICULAÇÕES
cotovelo

INDICADO PARA
mãos e punhos cansados, foco no trabalho

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Movimento dentro da amplitude disponível de forma lenta.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de antebraço, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de cotovelo e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Bíceps, triceps e braços

5 alongamentos - sinais atendidos: depois do treino, mobilidade geral

Alongamento de bíceps na parede

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em bíceps, triceps e braços.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Bíceps, triceps e braços	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado

MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
bíceps braquial, braquial	ombro, cotovelo	depois do treino, mobilidade geral

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de braços, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de ombro, cotovelo e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Tríceps acima da cabeça

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em bíceps, triceps e braços.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Bíceps, triceps e braços	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado

MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
tríceps braquial	ombro, cotovelo	depois do treino, mobilidade geral

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de braços, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de ombro, cotovelo e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Braco cruzado suave

EstáticoIntermediário

Função:

Reduzir rigidez e melhorar conforto em bíceps, triceps e bracos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Bíceps, triceps e bracos	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
deltoide posterior, triceps braquial	ombro	depois do treino, mobilidade geral

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.

2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.

3. Sustente a posição sem quicar.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de bracos, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento:

Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica:

Trabalha tecidos ao redor de ombro e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta:

dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Extensão dos bracos atrás

EstáticoIntermediário

Função:

Reduzir rigidez e melhorar conforto em bíceps, triceps e bracos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Bíceps, triceps e bracos	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
bíceps braquial, peitoral maior	ombro, cotovelo	depois do treino, mobilidade geral

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.

2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.

3. Sustente a posição sem quicar.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de bracos, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

- Melhor momento:** Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
- Nota anatômica:** Trabalha tecidos ao redor de ombro, cotovelo e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.
- Sinais de alerta:** dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Mobilidade de braco e cotovelo

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em bíceps, triceps e bracos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Bíceps, triceps e bracos	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
bíceps braquial, triceps braquial	ombro, cotovelo	depois do treino, mobilidade geral

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponivel de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de bracos, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de ombro, cotovelo e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Ombros e deltoides

5 alongamentos - sinais atendidos: tensão nos ombros, foco no trabalho, muito tempo sentado

Deltoide posterior cruzado

EstáticoIntermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em ombros e deltoides.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Ombros e deltoides	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
deltoide posterior	ombro, escápula	tensão nos ombros, foco no trabalho, muito tempo sentado

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Pausa AI - guia interno de alongamentos

Página 10 de 49

Tensão confortável na região de ombros, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de ombro, escápula e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Círculos lentos de ombros

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em ombros e deltoides.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Ombros e deltoides	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
trapezio superior, deltoides	ombro, escápula	tensão nos ombros, foco no trabalho, muito tempo sentado

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponivel de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de ombros, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de ombro, escápula e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Rotação externa na parede

AtivoIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em ombros e deltoides.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Ombros e deltoides	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
infraespinal, redondo menor	ombro	tensão nos ombros, foco no trabalho, muito tempo sentado

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponivel de forma lenta.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de ombros, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de ombro e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Alongamento posterior do ombro

EstáticoIntermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em ombros e deltoides.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Ombros e deltoides	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
capsula posterior do ombro, deltoide posterior	ombro	tensão nos ombros, foco no trabalho, muito tempo sentado

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de ombros, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de ombro e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Pendulo de ombro

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em ombros e deltoides.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Ombros e deltoides	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
deltoides, manguito rotador	ombro	tensão nos ombros, foco no trabalho, muito tempo sentado

Pausa AI - guia interno de alongamentos

Página 12 de 49

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Movimento dentro da amplitude disponível de forma lenta.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de ombros, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de ombro e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Peitoral

5 alongamentos - sinais atendidos: muito tempo sentado, foco no trabalho, tensão nos ombros

Abertura de peito na porta

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em peitoral.

REGIÃO

Peitoral

TEMPO

20 a 30 segundos

SÉRIES

1 a 2 séries por lado

MÚSCULOS PRINCIPAIS

peitoral maior, peitoral menor

ARTICULAÇÕES

ombro, escápula

INDICADO PARA

muito tempo sentado, foco no trabalho, tensão nos ombros

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Sustente a posição sem quicar.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de peitoral, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de ombro, escápula e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Estático

Peitoral na parede com um braco

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em peitoral.

REGIÃO Peitoral	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS peitoral maior	ARTICULAÇÕES ombro	INDICADO PARA muito tempo sentado, foco no trabalho, tensão nos ombros

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de peitoral, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de ombro e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Mãos atrás das costas

EstáticoIntermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em peitoral.

REGIÃO Peitoral	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS peitoral maior, deltoide anterior	ARTICULAÇÕES ombro	INDICADO PARA muito tempo sentado, foco no trabalho, tensão nos ombros

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de peitoral, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de ombro e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Peitoral no canto da parede

EstáticoIntermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em peitoral.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Peitoral	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
peitoral maior, peitoral menor	ombro, torácica	muito tempo sentado, foco no trabalho, tensão nos ombros

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.

2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.

3. Sustente a posição sem quicar.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de peitoral, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de ombro, torácica e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Extensão torácica com abertura de peito

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em peitoral.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Peitoral	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
peitoral maior, reto abdominal	coluna torácica, ombro	muito tempo sentado, foco no trabalho, tensão nos ombros

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.

2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.

3. Movimente dentro da amplitude disponivel de forma lenta.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de peitoral, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Pausa AI - guia interno de alongamentos

Página 15 de 49

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de coluna torácica, ombro e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Costas superiores e escápulas

5 alongamentos - sinais atendidos: tensão nos ombros, muito tempo sentado, relaxamento

Abraco das escápulas

EstáticoIntermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em costas superiores e escápulas.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Costas superiores e escápulas	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
romboides, trapezio medio	escápula, ombro	tensão nos ombros, muito tempo sentado, relaxamento

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de costas superiores, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de escápula, ombro e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Dorsal com apoio na cadeira

EstáticoIntermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em costas superiores e escápulas.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Costas superiores e escápulas	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
latissímo do dorso, redondo maior	ombro, torácica	tensão nos ombros, muito tempo sentado, relaxamento

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de costas superiores, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de ombro, torácica e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Retração e protração escapular

Mobilidade

Iniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em costas superiores e escápulas.

REGIÃO

Costas superiores e escápulas

TEMPO

6 a 10 repetições lentas

SÉRIES

1 a 2 séries por lado

MÚSCULOS PRINCIPAIS

serrato anterior, romboides

ARTICULAÇÕES

escápula

INDICADO PARA

tensão nos ombros, muito tempo sentado, relaxamento

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Movimento dentro da amplitude disponível de forma lenta.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de costas superiores, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de escápula e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Postura da criança lateral

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em costas superiores e escápulas.

REGIÃO

Costas superiores e escápulas

TEMPO

20 a 30 segundos

SÉRIES

1 a 2 séries por lado

MÚSCULOS PRINCIPAIS

latíssimo do dorso, quadrado lombar

ARTICULAÇÕES

ombro, coluna

INDICADO PARA

tensão nos ombros, muito tempo sentado, relaxamento

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Sustente a posição sem quicar.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de costas superiores, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de ombro, coluna e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Gato-vaca escapular

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em costas superiores e escápulas.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Costas superiores e escápulas	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
serrato anterior, trapezio	escápula, torácica	tensão nos ombros, muito tempo sentado, relaxamento

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Movimento dentro da amplitude disponivel de forma lenta.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de costas superiores, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de escápula, torácica e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Pescoço e cervical

5 alongamentos - sinais atendidos: dor ou tensão no pescoço, tensão nos ombros, foco no trabalho

Estático

Inclinação lateral do pescoço

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em pescoço e cervical.

REGIÃO Pescoço e cervical	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS esternocleidomastoideo, escalenos	ARTICULAÇÕES cervical	INDICADO PARA dor ou tensão no pescoço, tensão nos ombros, foco no trabalho

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de cervical, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de cervical e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Flexão cervical suave

EstáticoIntermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em pescoço e cervical.

REGIÃO Pescoço e cervical	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS extensores cervicais	ARTICULAÇÕES cervical	INDICADO PARA dor ou tensão no pescoço, tensão nos ombros, foco no trabalho

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de cervical, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de cervical e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Rotação cervical controlada

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em pescoço e cervical.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Pescoço e cervical	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
rotadores cervicais	cervical	dor ou tensão no pescoço, tensão nos ombros, foco no trabalho

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponível de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de cervical, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de cervical e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Alongamento do elevador da escápula

EstáticoIntermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em pescoço e cervical.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Pescoço e cervical	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
elevador da escápula	cervical, escápula	dor ou tensão no pescoço, tensão nos ombros, foco no trabalho

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de cervical, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

- Melhor momento:** Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
- Nota anatômica:** Trabalha tecidos ao redor de cervical, escápula e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.
- Sinais de alerta:** dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Queixo para tras

AtivoIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em pescoço e cervical.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Pescoço e cervical	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
flexores profundos do pescoço	cervical	dor ou tensão no pescoço, tensão nos ombros, foco no trabalho

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponível de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de cervical, sem dor aguda.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

- Melhor momento:** Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
- Nota anatômica:** Trabalha tecidos ao redor de cervical e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.
- Sinais de alerta:** dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Coluna torácica

5 alongamentos - sinais atendidos: muito tempo sentado, mobilidade geral, antes do treino

Rotação torácica sentada

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em coluna torácica.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Coluna torácica	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
multifidos torácicos, oblíquos	coluna torácica	muito tempo sentado, mobilidade geral, antes do treino

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponível de forma lenta.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de torácica, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de coluna torácica e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Extensão torácica na cadeira

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em coluna torácica.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Coluna torácica	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
eretores da coluna torácica	coluna torácica	muito tempo sentado, mobilidade geral, antes do treino

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponivel de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de torácica, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de coluna torácica e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Gato-vaca torácico

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em coluna torácica.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Coluna torácica	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
eretores da coluna, reto abdominal	torácica, lombar	muito tempo sentado, mobilidade geral, antes do treino

Como executar

- 1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- 2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- 3. Movimento dentro da amplitude disponível de forma lenta.
- 4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de torácica, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de torácica, lombar e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.
Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Livro aberto

Mobilidade

Iniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em coluna torácica.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Coluna torácica	6 a 10 repetições lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
peitoral maior, oblíquos	torácica, ombro	muito tempo sentado, mobilidade geral, antes do treino

Como executar

- 1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- 2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- 3. Movimento dentro da amplitude disponível de forma lenta.
- 4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de torácica, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de torácica, ombro e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.
Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Alcance lateral torácico

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em coluna torácica.

REGIÃO Coluna torácica	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS intercostais, latíssimo do dorso	ARTICULAÇÕES torácica, ombro	INDICADO PARA muito tempo sentado, mobilidade geral, antes do treino

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de torácica, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de torácica, ombro e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Lombar

5 alongamentos - sinais atendidos: lombar rígida, muito tempo sentado, antes de dormir

Joelhos ao peito

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em lombar.

Estático

Intermediário

REGIÃO Lombar	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS erectores lombares, glúteos	ARTICULAÇÕES lombar, quadril	INDICADO PARA lombar rígida, muito tempo sentado, antes de dormir

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de lombar, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de lombar, quadril e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Torção lombar leve

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em lombar.

REGIÃO Lombar	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS erectores da coluna, obliquos	ARTICULAÇÕES lombar, quadril	INDICADO PARA lombar rígida, muito tempo sentado, antes de dormir

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de lombar, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de lombar, quadril e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Postura da criança

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em lombar.

REGIÃO Lombar	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS erectores da coluna, latíssimo do dorso	ARTICULAÇÕES lombar, quadril	INDICADO PARA lombar rígida, muito tempo sentado, antes de dormir

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de lombar, sem dor aguda.

Evite se houver
dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de lombar, quadril e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Bascula pélvica

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em lombar.

REGIÃO Lombar	TEMPO 6 a 10 repeticoes lentas	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS reto abdominal, eretores lombares	ARTICULAÇÕES lombar, pelve	INDICADO PARA lombar rigida, muito tempo sentado, antes de dormir

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponivel de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de lombar, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de lombar, pelve e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Flexão lombar sentada

EstáticoIntermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em lombar.

REGIÃO Lombar	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS eretores lombares	ARTICULAÇÕES lombar, quadril	INDICADO PARA lombar rigida, muito tempo sentado, antes de dormir

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiracao suave.

Evite se houver
dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Pausa AI - guia interno de alongamentos

Página 26 de 49

Sensação correta

Tensão confortável na região de lombar, sem dor aguda.

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de lombar, quadril e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Abdomen e tronco anterior

5 alongamentos - sinais atendidos: mobilidade geral, antes do treino

Cobra suave

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em abdomen e tronco anterior.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Abdomen e tronco anterior	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
reto abdominal, oblíquos	coluna, quadril	mobilidade geral, antes do treino

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Sustente a posição sem quicar.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de tronco anterior, sem dor aguda.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de coluna, quadril e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Extensão abdominal em pé

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em abdomen e tronco anterior.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Abdomen e tronco anterior	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
reto abdominal	coluna, quadril	mobilidade geral, antes do treino

Como executar

reto abdominal, flexores do quadril

quadril, coluna

mobilidade geral, antes do treino

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponível de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de tronco anterior, sem dor aguda.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril, coluna e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Respiração nas costelas

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em abdômen e tronco anterior.

REGIÃO

Abdômen e tronco anterior

TEMPO

6 a 10 repetições lentas

SÉRIES

1 a 2 séries por lado

MÚSCULOS PRINCIPAIS

intercostais, diafragma

ARTICULAÇÕES

costelas, torácica

INDICADO PARA

mobilidade geral, antes do treino

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponível de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de tronco anterior, sem dor aguda.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de costelas, torácica e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Quadril

5 alongamentos - sinais atendidos: muito tempo sentado, antes do treino, rigidez matinal

Flexor do quadril ajoelhado

Estático Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em quadril.

REGIÃO Quadril	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
-------------------	---------------------------	---------------------------------

MÚSCULOS PRINCIPAIS iliopsoas, reto femoral	ARTICULAÇÕES quadril, joelho	INDICADO PARA muito tempo sentado, antes do treino, rigidez matinal
--	---------------------------------	--

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Sustente a posição sem quicar.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de quadril, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril, joelho e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.
Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Borboleta

Estático Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em quadril.

REGIÃO Quadril	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
-------------------	---------------------------	---------------------------------

MÚSCULOS PRINCIPAIS adutores do quadril	ARTICULAÇÕES quadril	INDICADO PARA muito tempo sentado, antes do treino, rigidez matinal
--	-------------------------	--

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Sustente a posição sem quicar.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de quadril, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

90/90 de quadril

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em quadril.

REGIÃO Quadril	TEMPO 6 a 10 repeticoes lentas	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS rotadores externos do quadril, glúteos	ARTICULAÇÕES quadril	INDICADO PARA muito tempo sentado, antes do treino, rigidez matinal

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponivel de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de quadril, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Círculos de quadril

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em quadril.

REGIÃO Quadril	TEMPO 6 a 10 repeticoes lentas	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS glúteos, flexores do quadril	ARTICULAÇÕES quadril	INDICADO PARA muito tempo sentado, antes do treino, rigidez matinal

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponivel de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de quadril, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.
Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Abertura de quadril sentado

Estático Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em quadril.

REGIÃO Quadril	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS adutores, glúteos	ARTICULAÇÕES quadril	INDICADO PARA muito tempo sentado, antes do treino, rigidez matinal

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Sustente a posição sem quicar.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de quadril, sem dor aguda.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.
Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Glúteos

5 alongamentos - sinais atendidos: muito tempo sentado, lombar rígida, depois do treino

Figura quatro sentado

Estático Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em glúteos.

REGIÃO Glúteos	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS glúteo máximo, piriforme	ARTICULAÇÕES quadril	INDICADO PARA muito tempo sentado, lombar rígida, depois do treino

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Sustente a posição sem quicar.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de glúteos, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Piriforme deitado

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em glúteos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Glúteos	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
piriforme, glúteo medio	quadril, lombar	muito tempo sentado, lombar rígida, depois do treino

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de glúteos, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril, lombar e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Pombo adaptado

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em glúteos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Glúteos	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
glúteos, rotadores externos do quadril	quadril	muito tempo sentado, lombar rígida, depois do treino

Pausa AI - guia interno de alongamentos

Página 33 de 49

Como executar

- 1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- 2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- 3. Sustente a posição sem quicar.
- 4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de glúteos, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Joelho ao peito cruzado

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em glúteos.

REGIÃO

Glúteos

TEMPO

20 a 30 segundos

SÉRIES

1 a 2 séries por lado

MÚSCULOS PRINCIPAIS

glúteo maximo, piriforme

ARTICULAÇÕES

quadril, lombar

INDICADO PARA

muito tempo sentado, lombar rigida, depois do treino

Como executar

- 1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- 2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- 3. Sustente a posição sem quicar.
- 4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de glúteos, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril, lombar e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Glúteo na parede

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em glúteos.

REGIÃO

Glúteos

TEMPO

20 a 30 segundos

SÉRIES

1 a 2 séries por lado

MÚSCULOS PRINCIPAIS

glúteos, isquiotibiais

ARTICULAÇÕES

quadril

INDICADO PARA

muito tempo sentado, lombar rígida, depois do treino

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.

2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.

3. Sustente a posição sem quicar.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de glúteos, sem dor aguda.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento:

Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica:

Trabalha tecidos ao redor de quadril e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta:

dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Posterior de coxa

5 alongamentos - sinais atendidos: caminhada ou corrida, depois do treino, lombar rígida

Posterior sentado

Estático

Intermediário

Função:

Reduzir rigidez e melhorar conforto em posterior de coxa.

REGIÃO

Posterior de coxa

TEMPO

20 a 30 segundos

SÉRIES

1 a 2 séries por lado

MÚSCULOS PRINCIPAIS

isquiotibiais

ARTICULAÇÕES

quadril, joelho

INDICADO PARA

caminhada ou corrida, depois do treino, lombar rígida

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.

2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.

3. Sustente a posição sem quicar.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de posterior de coxa, sem dor aguda.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril, joelho e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.
Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Posterior em pé com apoio

Estático Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em posterior de coxa.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Posterior de coxa	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
isquiotibiais	quadril, joelho	caminhada ou corrida, depois do treino, lombar rígida

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Sustente a posição sem quicar.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de posterior de coxa, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.
Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril, joelho e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.
Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Posterior com toalha deitado

Estático Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em posterior de coxa.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Posterior de coxa	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
isquiotibiais, gastrocnêmio	quadril, joelho, tornozelo	caminhada ou corrida, depois do treino, lombar rígida

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Sustente a posição sem quicar.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de posterior de coxa, sem dor aguda.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril, joelho, tornozelo e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Bom dia de mobilidade

Dinâmico

Iniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em posterior de coxa.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Posterior de coxa	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado

MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
isquiotibiais, eretores da coluna	quadril	caminhada ou corrida, depois do treino, lombar rigida

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponivel de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de posterior de coxa, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Inclinação unilateral na cadeira

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em posterior de coxa.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Posterior de coxa	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado

MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
isquiotibiais	quadril, joelho	caminhada ou corrida, depois do treino, lombar rigida

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiracao suave.

Evite se houver
dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Pausa AI - guia interno de alongamentos

Página 37 de 49

Sensação correta
Tensão confortável na região de posterior de coxa, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de quadril, joelho e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Anterior de coxa

5 alongamentos - sinais atendidos: depois do treino, caminhada ou corrida

Quadríceps em pé com apoio

EstáticoIntermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em anterior de coxa.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Anterior de coxa	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
quadríceps, reto femoral	joelho, quadril	depois do treino, caminhada ou corrida

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de anterior de coxa, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de joelho, quadril e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Quadríceps deitado de lado

EstáticoIntermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em anterior de coxa.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Anterior de coxa	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
quadríceps	joelho, quadril	depois do treino, caminhada ou corrida

Como executar

Pausa AI - guia interno de alongamentos

Página 38 de 49

quadríceps, reto femoral

joelho, quadril

depois do treino, caminhada ou corrida

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de anterior de coxa, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de joelho, quadril e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Anterior de coxa na cadeira

EstáticoIntermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em anterior de coxa.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Anterior de coxa	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
quadríceps	joelho	depois do treino, caminhada ou corrida

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de anterior de coxa, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de joelho e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Panturrilhas

5 alongamentos - sinais atendidos: caminhada ou corrida, depois do treino, rigidez matinal

Panturrilha na parede

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em panturrilhas.

REGIÃO Panturrilhas	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS gastrocnemio	ARTICULAÇÕES tornozelo, joelho	INDICADO PARA caminhada ou corrida, depois do treino, rigidez matinal

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de panturrilhas, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de tornozelo, joelho e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Soleo com joelho flexionado

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em panturrilhas.

REGIÃO Panturrilhas	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS soleo	ARTICULAÇÕES tornozelo, joelho	INDICADO PARA caminhada ou corrida, depois do treino, rigidez matinal

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de panturrilhas, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forcar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de tornozelo, joelho e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Panturrilha no degrau

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em panturrilhas.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Panturrilhas	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
gastrocnemio, soleo	tornozelo	caminhada ou corrida, depois do treino, rigidez matinal

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de panturrilhas, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de tornozelo e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Panturrilha com toalha

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em panturrilhas.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Panturrilhas	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
gastrocnemio, soleo	tornozelo, joelho	caminhada ou corrida, depois do treino, rigidez matinal

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de panturrilhas, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de tornozelo, joelho e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Mobilidade tornozelo-panturrilha

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em panturrilhas.

REGIÃO Panturrilhas	TEMPO 6 a 10 repeticoes lentas	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS soleo, gastrocnemio	ARTICULAÇÕES tornozelo	INDICADO PARA caminhada ou corrida, depois do treino, rigidez matinal

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponível de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração
Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta
Tensão confortável na região de panturrilhas, sem dor aguda.

Versão fácil
Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver
dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns
quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão
Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de tornozelo e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Tornozelos

5 alongamentos - sinais atendidos: caminhada ou corrida, antes do treino, mobilidade geral

Dorsiflexão na parede

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em tornozelos.

REGIÃO Tornozelos	TEMPO 6 a 10 repeticoes lentas	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS soleo, tibial anterior	ARTICULAÇÕES tornozelo	INDICADO PARA caminhada ou corrida, antes do treino, mobilidade geral

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponível de forma lenta.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de tornozelos, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de tornozelo e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Círculos de tornozelo

MobilidadeIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em tornozelos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Tornozelos	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
tibial anterior, fibulares	tornozelo	caminhada ou corrida, antes do treino, mobilidade geral

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponivel de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de tornozelos, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de tornozelo e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Inversão e eversao controlada

AtivoIniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em tornozelos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Tornozelos	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
tibial posterior, fibulares	tornozelo	caminhada ou corrida, antes do treino, mobilidade geral

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Movimento dentro da amplitude disponível de forma lenta.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de tornozelos, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de tornozelo e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Alongamento da frente do tornozelo

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em tornozelos.

REGIÃO Tornozelos	TEMPO 20 a 30 segundos	SÉRIES 1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS tibial anterior, extensores dos dedos	ARTICULAÇÕES tornozelo, dedos	INDICADO PARA caminhada ou corrida, antes do treino, mobilidade geral

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
3. Sustente a posição sem quicar.
4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de tornozelos, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de tornozelo, dedos e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Alfabeto com tornozelo

Mobilidade

Iniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em tornozelos.

Pausa AI - guia interno de alongamentos

Página 45 de 49

REGIÃO

Tornozelos

TEMPO

6 a 10 repeticoes lentas

SÉRIES

1 a 2 séries por lado

MÚSCULOS PRINCIPAIS

tibial anterior, fibulares, gastrocnemio

ARTICULAÇÕES

tornozelo

INDICADO PARA

caminhada ou corrida, antes do treino, mobilidade geral

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.

2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.

3. Movimento dentro da amplitude disponível de forma lenta.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de tornozelos, sem dor aguda.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento:

Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica:

Trabalha tecidos ao redor de tornozelo e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta:

dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Pés e dedos

5 alongamentos - sinais atendidos: caminhada ou corrida, relaxamento, rigidez matinal

Extensão dos dedos do pé

Estático

Intermediário

Função:

Reduzir rigidez e melhorar conforto em pés e dedos.

REGIÃO

Pés e dedos

TEMPO

20 a 30 segundos

SÉRIES

1 a 2 séries por lado

MÚSCULOS PRINCIPAIS

flexores dos dedos do pé

ARTICULAÇÕES

dedos, metatarsofalangicas

INDICADO PARA

caminhada ou corrida, relaxamento, rigidez matinal

Como executar

1. Entre na posição devagar e com apoio se precisar.

2. Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.

3. Sustente a posição sem quicar.

4. Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de pés, sem dor aguda.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de dedos, metatarsofalângicas e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Flexão dos dedos do pé

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em pés e dedos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Pés e dedos	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
extensores dos dedos do pé	dedos	caminhada ou corrida, relaxamento, rigidez matinal

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de pés, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de dedos e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Arco plantar com bola

Mobilidade

Iniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em pés e dedos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Pés e dedos	6 a 10 repetições lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
fascia plantar, músculos intrínsecos do pé	pé, dedos	caminhada ou corrida, relaxamento, rigidez matinal

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponível de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de pés, sem dor aguda.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de pé, dedos e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Fascia plantar com toalha

Estático

Intermediário

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em pés e dedos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Pés e dedos	20 a 30 segundos	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
fascia plantar, flexores dos dedos	pé, tornozelo	caminhada ou corrida, relaxamento, rigidez matinal

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Sustente a posição sem quicar.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Respiração

Respiração lenta, com expiracao suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de pés, sem dor aguda.

Evite se houver

dor aguda, lesao recente sem liberacao, formigamento, tontura, condição medica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Progressao

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de pé, tornozelo e ajuda a organizar a percepcao corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque

Abertura dos dedos do pé

Ativo

Iniciante

Função: Reduzir rigidez e melhorar conforto em pés e dedos.

REGIÃO	TEMPO	SÉRIES
Pés e dedos	6 a 10 repeticoes lentas	1 a 2 séries por lado
MÚSCULOS PRINCIPAIS	ARTICULAÇÕES	INDICADO PARA
interosseos plantares, lumbricais	dedos	caminhada ou corrida, relaxamento, rigidez matinal

Como executar

- Entre na posição devagar e com apoio se precisar.
- Ajuste até sentir tensão confortável, sem dor aguda.
- Movimente dentro da amplitude disponivel de forma lenta.
- Respire sem prender o ar e retorne com calma.

Pausa AI - guia interno de alongamentos

Página 48 de 49

Respiração

Respiração lenta, com expiração suave.

Sensação correta

Tensão confortável na região de pés, sem dor aguda.

Versão fácil

Reduza amplitude, use apoio e diminua o tempo.

Evite se houver

dor aguda, lesão recente sem liberação, formigamento, tontura, condição médica sem orientação

Erros comuns

quicar em alongamento estático, prender a respiração, forçar articulações, ignorar sinais de alerta

Progressão

Aumente tempo ou controle ativo somente se continuar confortável.

Melhor momento: Pausas de trabalho, pós-treino leve, antes de dormir ou quando o check-in indicar tensão.

Nota anatômica: Trabalha tecidos ao redor de dedos e ajuda a organizar a percepção corporal dessa região.

Sinais de alerta: dor aguda, formigamento, perda de força, dor irradiada, tontura, sensação de choque