# 降水量预测

预测15-20天内的海上降水量

### 第七次讨论会


#### ▶总结

- 1、完善方法,使方法与结果都准确无误。
- 2、预处理好数据,提取出来6-9月份的数据。
- 3、得出详细的结果,做出图标。

#### ▶本周工作

- 1、预处理数据,将数据整理出6-9月份的。
- 2、校准优化程序。
- 3、画出数据原始的分布图。
- 4、运行出所有点的结果,并画出分布图。


#### ▶原始降水量分布





区域降水量总和分布图

是否降水,统计天数分布

#### ▶各点的皮尔森系数分布情况








#### >实验结果及分析:


- 1、模型不能对降水量进行很精确的预测,皮尔森系数普遍不高
- 2、模型对数据有很强的依赖性, 即皮尔森系数高的值总是聚集在 一起。说明,模型只适合部分数 据的预测。
- 3、分析预测值会发现,模型可以预测出降水量大体的趋势,但有时计算出的皮尔森系数不是很高。




0.13384086399242973


• 总结 输入数据中加入历史降水量数据

#### ▶各点的皮尔森系数分布情况





#### 原数据绘制图像结果



• 实验分析:

实验最后的效果不是很好,预测的超过0.6的,上升了2个,但是预测的超过0.5的,减少了5个,总体来说,有提升,但是提升效果特别微小。


- 进一步实验思路
- 1、随机生成20个数据,更改不同的hidden\_size
- 2、计算皮尔森系数时,只计算10天的

• 分别进行三次实验, 随机选择20个点, 以下三个实验都是在这二十个点上进行的。

Type1: hidden size=60&learn time=500

Type2: hidden size=60&learn time=750


Type3: hidden size=90&learn time=500



在前面实验的基础上,做了新的实验。

前面的实验,是对后面预测的所有数据计算皮尔森系数,点太多可能影响计算的结果,于是,

令Type4: hidden size=60&learn time=500, 计算十天的皮尔森系数进行对比。



#### •实验结果分析

- 基于AUC思想,因为时间间隔一样,只计算各皮尔森系数的累加和即可,由此得到
- Type1: 3.9361343399950908
- Type2: 3.082052572559422
- Type3: 3.4592690555272188
- Type4: -0.9713070898523788

根据这个以上结果,和前面的图像,可以看出,增加训练次数,不会增加预测的效果,增加hidden的数量,也不会提高预测的准确性。

使用十天的数据计算皮尔森系数,会在某些点提高数据预测的准确性,但其中有偶然性的因素。

使用十天的数据,计算了所有空间点上的皮尔森系数

得到了如下的结果:

max:0.9858583690991279

min:-0.9594048399046654

>0.7 sum=24 占比: 2.37%

>0.6 sum=49 占比: 4.84%

>0.5 sum=101 占比: 9.98%

>0.4 sum=179 占比: 17.69%

