

平成 30 年度 物理学実験 (二)

プランク定数

実験日: 平成 30 年 5 月 28 日

1217054 佐久間寛伸

目次

1	目的	2
2	原理	2
2.1	プランク定数とエネルギー量子	2
2.2	光電効果	2
3	実験	3
3.1	実験課題	3
3.2	実験装置	3
4	結果	3
5	考察	3

1 目的

プランク定数測定器により，ハロゲン灯の光を分光し，振動数が知られているいくつかの単色光と Sb-Cs 光電管とを用いて光電効果 (photo-electric effect) の実験を行なう．それらの結果から，光が粒子性を示すことを理解し，さらにプランク定数 (Planck constant) h を求める．

2 原理

2.1 プランク定数とエネルギー量子

プランク定数とは「量子力学的な現象を特徴づける普遍定数．ドイツの物理学者プランクが熱放射の研究のなかで 1900 年に発見した．」 [1] ものである．ここでは『発見した』とあるが，「M. プランクは空洞放射の測定値を十分説明できる関係式 (プランクの放射式) を見出したが，この式を導き出すには，振動数 ν の振動子のエネルギーの放出・吸収が連続的ではなく， $h\nu$ を単位とする不連続な量の放出・吸収だけが許される，と仮定せざるをえなかった．ただし， h はプランク定数である．」 [2] のような，定数を『仮定』したという表現が適切と考える．

また，『 $h\nu$ を単位とする不連続な量』をエネルギー量子 (energy quantum) といい，これについては「この意味で， $h\nu$ をエネルギー量子という．エネルギー量子の考えは，エネルギーの連続性を根本的な足場に行っている古典物理学の自然観と正面から対立し，量子論を生み出す第一歩となった．この功績により，1918 年プランクにノーベル物理学賞が授与された．プランクのエネルギー量子という考えは，A. アインシュタインによって光量子という考えに発展した．」 [2] とあるように光電効果，ひいてはそれ以降の量子論に繋がる重要な概念である．

2.2 光電効果

「金属の表面に光を照射すると電子が飛び出す．この現象を光電効果（特に外部光電効果）といい，飛び出した電子を光電子 (photo-electron) と呼ぶ．アインシュタイン (A. Einstein) は，1905 年にプランク (M. Planck) のエネルギー量子の考え方を発展させ，振動数 ν の光が伝播することは $h\nu$ のエネルギーを持つ粒子が空間を飛んでいくことであると考えた．ここで h はプランク定数である．このような光の粒子を光子または光量子 (photon) と名付けた．光電効果は，光子が金属中の電子と衝突してそれが持っているエネルギーを一度に全部電子に与え，その結果電子が金属の表面から外に飛び出す現象と解釈される．したがって，電子が金属表面を越えて外に出るために要する最小のエネルギーを E とすると，飛び出した光電子が持つことのできる最大の運動エネルギー E は

$$E = h\nu - e\varphi \quad (2.1)$$

である．ここに e は電子の電荷の符号を変えたもので，素電荷と呼ばれる．また φ は仕事関数 (work function) とよばれ，金属の種類によって決まる．

式 (2.1) で $E = 0$ ，つまり

$$\nu_0 = \frac{e\varphi}{h} \quad (2.2)$$

を満たす振動数 ν_0 を限界振動数という。限界振動数以下の振動数 $\nu \leq \nu_0$ の光は、それがどんなに強くても、その金属表面から電子を飛び出させることはできない。

光電管 (photon-tube) に振動数が ν の単色光を入射すると、受光面である陰極から電子が飛び出すので、この陰極 (受光面) と陽極を結ぶ外の回路に電流が流れる。この電流を光電流 (photo-current) と呼ぶ。このとき、陽極側が負になるように電圧をかけ、その電圧を増加して行くと、光電流は減少する。この負電圧と光電流の関係を表す曲線を外挿して光電流がゼロに対応する負電圧をもとめる。このとき、光電子がどんな運動エネルギーを持っていたとしても、全て陰極に押し返されている。したがって、この負電圧を $-V_0$ とすると、 $E = eV_0$ であるから、式 (2.1) は、

$$eV_0 = h\nu - e\varphi \quad (2.3)$$

となる。いくつかの振動数、 ν と eV_0 の関係を求めると、それは直線となり、その勾配からプランク定数 h が得られる。知られている h の値は $(6.626176 \pm 0.000036) \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$ である。

また、この直線を外挿して、用いた光電管の受光面を形成している金属の表面物質の仕事関数 φ が得られる。光が $h\nu$ のエネルギーを持つ粒子であることから、単色光を指定する場合に波長や振動数のほか、光子エネルギー (photon energy) も使用される。単位としては、通常、エレクトロン・ボルト (eV) を用いる。1 エレクトロン・ボルト = $e \times 1$ ジュールである。」[3]

3 実験

3.1 実験課題

3.2 実験装置

3.2.1 分光器

本実験で用いたプランク定数測定器は HA-30A(島津理化) であり、製造元によると「島津独自のホログラフィックグレーティングを用いたモノクロメータは、純度の高い単色光を取り出せます。」[5] とある。

4 結果

5 考察

参考文献

- [1] 江沢洋 『日本大百科全書 (ニッポニカ)』 小学館
- [2] 『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』 ブリタニカ・ジャパン
- [3] 東京理科大学 理学部第一部 物理学教室 『物理学実験 (二)』 (2018)
- [4] Palmer, Christopher, *Diffraction Grating Handbook*, 6th edition, Newport Corporation (2005)

[5] 島津理化 HP 製品情報 - ブランク定数測定器 HA-30A