

Лекция 02 — Тригонометрическая и показательная формы комплексного числа

Пререквизиты:

- Поле комплексных чисел
 - Алгебраическая запись комплексного числа
-


Деление комплексных чисел в алгебраической форме

Для нахождения частного двух комплексных чисел мы должны умножить оба из них на комплексно сопряжённое к делителю:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{(a_2 + b_2 i)(a_2 - b_2 i)} = \frac{a_1 a_2 - a_1 b_2 i + a_2 b_1 i + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} = \frac{a_1 a_2 + b_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} + \frac{a_2 b_1 - a_1 b_2}{a_2^2 + b_2^2} i$$

Геометрическая интерпретация комплексных чисел

Представим комплексное число $z = a + bi$ в виде точки с координатами (a, b) в декартовой системе координат:



Двумерное пространство, в котором существует это число, называется *комплексной плоскостью*.

Здесь:

- OX — действительная ось
- OY — мнимая ось
- Oz — радиус-вектор комплексного числа z
- $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ — модуль комплексного числа
- $-\pi \leq \varphi \leq \pi$ — главное значение аргумента комплексного числа.
 $\varphi = \operatorname{arctg} \frac{b}{a}$ для I и IV четвертей; для II четверти $\varphi = \pi + \operatorname{arctg} \frac{b}{a}$, для III четверти $\varphi = -\pi + \operatorname{arctg} \frac{b}{a}$.
- $\varphi + 2\pi k$ — аргумент комплексного числа

Info

Представление *ненулевого* комплексного числа в виде $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ называется его **тригонометрической формой**.

Операции с комплексными числами в тригонометрической форме

- **Умножение:**

$$\begin{aligned} z_1 \times z_2 &= r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) \times r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) = \\ &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + i \cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + i \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) = \\ &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i(\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cos \varphi_2)) = \\ &= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)) \end{aligned}$$

- **Деление:**

$$\begin{aligned} &\frac{r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) r_2(\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2)}{r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) r_2(\cos \varphi_2 - i \sin \varphi_2)} = \\ &= \frac{r_1 r_2 (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - i \cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + i \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2)}{r_2^2 (\cos^2 \varphi_2 - i \cos \varphi_2 \sin \varphi_2 + i \cos \varphi_2 \sin \varphi_2 + \sin^2 \varphi_2)} = \\ &= \frac{r_1 r_2 (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + \sin \varphi_1 \sin \varphi_2 + i(\sin \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_2 \cos \varphi_1))}{r_2^2} = \\ &= \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)) \end{aligned}$$

- **Возведение в степень** (формула Муавра):

$$(r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

Докажем корректность формулы по индукции.

База: $(r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^0 = r^0 (\cos 0 + i \sin 0) = 1$

Переход: пусть $\forall n \leq k : (r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$. Покажем, что это выполняется для $n = k + 1$:

$$\begin{aligned} (r(\cos \varphi + i \sin \varphi))^{k+1} &= r^k (\cos k\varphi + i \sin k\varphi) \times r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = \\ &= r^k r (\cos(k\varphi + \varphi) + i \sin(k\varphi + \varphi)) = r^{k+1} (\cos((k+1)\varphi) + i \sin((k+1)\varphi)), \end{aligned}$$

что и требовалось доказать.

- **Корень n-ной степени:** пусть $r'(\cos \varphi' + i \sin \varphi') = \sqrt[n]{z}$, тогда:

$$(r')^n (\cos n\varphi' + i \sin n\varphi') = r (\cos(\varphi + 2\pi k) + i \sin(\varphi + 2\pi k)), k \in \mathbb{Z}$$

Выразим r' и φ' :

$$(r')^n = r \implies r = \sqrt[n]{r}$$

$$n\varphi' = \varphi + 2\pi k \implies \varphi' = \frac{\varphi + 2\pi k}{n},$$

отсюда

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right)$$

Из этой формулы видно, что:

- корни любой натуральной степени существуют для любого ненулевого комплексного числа
- у корня n -ной степени ровно n различных значений, причём в геометрическом смысле они являются вершинами правильного n -угольника, вписанного в окружность радиусом $\sqrt[n]{r}$.

Показательная форма

Info

Представление *ненулевого* комплексного числа в виде $z = re^{i\varphi}$ называется его **показательной формой**.

Показательная форма получается из тригонометрической путём применения *формулы Эйлера*: $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$.

Операции с комплексными числами в показательной форме:

- **Умножение:**

$$z_1 \times z_2 = r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

- **Деление:**

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

- Возведение в степень:

$$z^n = r^n e^{in\varphi}$$

- Корень n-ной степени:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r} e^{i\frac{\varphi+2\pi k}{n}}, k \in \mathbb{Z}$$
