

แบบบันทึกผลการพยาบาลตามชุดการดูแลเพื่อป้องกันแผลบริเวณปาก และใบหน้ารูปแบบเว็บแอป
 พลิกะชัน

คำชี้แจง:

1. กรุณาใส่เครื่องหมาย

✓ ลงใน ☐ เมื่อพบว่าเกิดแผลบริเวณปาก หรือใบหน้าในช่องเวร เข้า บ่าย หรือ ดึก

- ลงใน ☐ เมื่อพบว่าไม่เกิดแผลบริเวณปาก หรือใบหน้าในช่องเวร เข้า บ่าย หรือ ดึก

2.กรอกรายละเอียดลักษณะของแผลบริเวณปาก หรือใบหน้า

บันทึกผลการพยาบาล	Day 1			Day 2			Day 3			Day 4			ข้อมูลเพิ่มเติม
	ช	บ	ด	ช	บ	ด	ช	บ	ด	ช	บ	ด	
1) แผลบริเวณปาก													
ลักษณะ (Level) _____													
2) แผลบริเวณใบหน้า													
คะแนน (FSIS) _____ *ถ้า < 4 คะแนน แปลว่าไม่เกิดแผล													
เกรดแผล (NPUAP) _____													
ผู้ประเมิน													

บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม

.....

แบบประเมินระดับของการเกิดแผลบริเวณปาก Reaper Oral mucosa pressure injury scale
(ROMPIS)

ระยะ	ลักษณะที่พบ
ระยะที่ 1	พบรอยปื้นแดงบริเวณริมฝีปาก และเยื่อบุผิวบริเวณปาก ยังไม่พบร่องรอยของการเกิดแผล ตุ่มน้ำ หรือ รอยปื้นแดงที่กดไม่จางหายบริเวณมุมปาก
ระยะที่ 2	พบการบาดเจ็บของเยื่อบุผิวช่องปาก อาจพบตุ่มน้ำ รอยลึมหื้นตื้นที่แข็งตัว หรือ พบแผลในเยื่อบุผิวช่องปากชั้นตื้น แต่ยังไม่พบการบาดเจ็บของชั้นกล้ามเนื้อ
ระยะที่ 3	พบแผลของเยื่อบุผิวช่องปากชั้น Mucosa และ Submucosa มีการบาดเจ็บลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อของมุมปากและปาก มองเห็นชั้นกล้ามเนื้อของปากได้ชัดเจน

คำอธิบาย

ผู้ป่วยเกิดแผลบริเวณปาก ตั้งแต่ ระยะที่ 1 ถือว่าผู้ป่วยเกิดแผลบริเวณปาก จากการใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก

แบบประเมินแผลบริเวณใบหน้า Facial skin integrity score tool (FSIS)

ลักษณะของผิวหนัง / คะแนน	1	2	3
ลักษณะความแห้ง	ปกติ และไม่มี ผิวแห้ง	ผิวแห้ง และสามารถมองเห็น ผิวเป็นเกล็ด	ผิวแห้งมาก มีรอยแตก หรือ รอยแยกเป็นทาง
ลักษณะของผื่นแดง (erythema)	ไม่มีผื่นแดง	มองเห็นผื่นแดง < 50% ของ พื้นผิวใบหน้าทั้งหมด	มองเห็นผื่นแดง > 50% ของใบหน้าทั้งหมด
ลักษณะการแตกของผิว	ไม่มีหลักฐานของการแตก	แตกเป็นพื้นที่เล็ก ๆ ≤ 1 ตารางเซนติเมตร	แตกเป็นพื้นที่กว้าง > 1 ตารางเซนติเมตร

คำอธิบาย

เกณฑ์คะแนนการประเมินมีดังนี้ ผลรวมคะแนนอยู่ในระหว่าง 3-9 คะแนน

คะแนนน้อยกว่า 4 หมายถึง ผิวปกติ ไม่มีแผล

คะแนน 4 ถึง 6 หมายถึง มีความผิดปกติของผิวระดับปานกลาง

คะแนน 7 ถึง 9 หมายถึง มีความผิดปกติมาก มีความเสี่ยงต่อการแพ้ หรือเป็นแผลรุนแรง

เมื่อประเมินคะแนนได้มากกว่าหรือเท่ากับ 4 คะแนน แสดงถึงการเกิดแผลบริเวณใบหน้า และแบ่งระดับความรุนแรงของการเกิดแผลเป็น 6 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ของ NPUAP (2016) ดังนี้

ระดับที่ 1 หมายถึง ผิวหนังยังสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดแต่มองเห็นรอยแดง เมื่อใช้มือกดรอยแดงยังคงอยู่ และเกิดความรู้สึกเจ็บปวด

ระดับที่ 2 หมายถึง มีการสูญเสียผิวหนังบางส่วน และลึกถึงชั้นใต้ผิวหนัง ผิวหนังภายนอกอาจยังไม่ฉีกขาดแต่พบเป็นตุ่มน้ำใสหรือตุ่มน้ำปนเลือด อาจแตกหรือยังไม่แตกก็ได้

ระดับที่ 3 หมายถึง มีการสูญเสียผิวหนังทั้งหมด มองเห็นลึกถึงชั้นไขมันแต่ยังไม่เห็น กระดูก และกล้ามเนื้อ อาจมีเนื้อตายลึกสุดของผิวหนัง

ระดับที่ 4 หมายถึง มีการสูญเสียผิวหนังทั้งหมด ซึ่งสามารถมองเห็นกระดูก เอ็นหรือกล้ามเนื้อ พื้นผิวบาดเจ็บอาจมีเนื้อตายหรือสะเก็ดแข็งปกคลุม ซ่องได้ขอบแผลสามารถมองเห็นกระดูก กระดูกอ่อน และเอ็น

ระดับที่ 5 หมายถึง แผลกดทับที่ไม่ทราบความลึก มีการสูญเสียผิวหนังทั้งหมด ซึ่งพื้นผิวแผลทั้งหมดถูกปกคลุมด้วยเนื้อตาย จึงทำให้ไม่สามารถระบุระดับของแผลกดทับได้ถูกต้อง

ระดับที่ 6 หมายถึง มีการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อชั้นลึก ผิวหนังยังไม่ฉีกขาดหรือฉีกขาดแล้ว และสีผิวมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีม่วงเข้มหรือสีแดงเข้มปนน้ำตาล อาจมีลักษณะเป็นตุ่มน้ำปนเลือด