name:
source=/static/img/kardia.jpg
file:
source=/static/img/kardia.jpg
state: unknown
RAPPORT MEDICAL

nom & prénoms date de naissance Adresse

Farida Saboun 18 mai 1942 Alger
motif de consultation médecin correspondant assurance

Syncope - - CASNOS

Antécedents

facteurs de risque CV

DiabèteObésité

- Dyslipidémie – Sédentarité

médicaux

AVC ischémique fev2018

Histoire de la maladie

syncope type Adam Stokes 3 épisodes en 48h

Examen clinique

– eupnéique– Syncope.

Absence d'angor.

Auscultation L'examen clinique retrouve à l'auscultation: souffle systolique RAo 4/6 avec une fréquence cardiaque à = 80 Bpm.

En périphérie les pouls sont bondissants avec une PA = 110/70mmHg.

ECG

Le rythme est en sinusal à fréquence cardiaque de 90 puls/min. Il existe un bloc de branche gauche.

On note aussi une hypertrophie ventriculaire gauche électrique.

Clinique Kardia, Cité Sonelgaz lot n°75/76 Gué de Constantine ,Alger Tél/Fax: 021 83 80 13/021 83 20 36 - Email: contact(at)cliniquekardia.com

name:
source=/static/img/kardia.jpg
file:

source=/static/img/kardia.jpg

state:

unknowsur le plan ischémique: une lésion en latéral, absence d'ischémie électrique, onde T inversée en en latéral.

Le QT corrigé est estimé à 400 msec.

Téléthorax

Le téléthorax retrouve: Cardiomégalie

Echo coeur

Faite le 19 mars 2018: Rac serré gradient trans aortique à 80mmHg

Biologie

voir bilans

Conclusion

Rac serré symptomatique revelé par des syncopes sur BBGc. Hospitalisation et monitorrage à la recherche d'un BAV paroxystique. Indication d'une RVAo par prothèse mécanique.

traitement

amlor 5mg/j

dispositions complémentaires

soins dentaires

Dr Yahyaoui M K – Cardiologue Alger le 20 mars 2018