

蓋蓋樂 (cover)

本題為 **Output Only** 題，測資在題目的 Attachments 的 cover.zip 裡面，對於編號為 a 的測資，請上傳一個名為 output_a.txt 的答案。

題目描述

你有聽過 "西洋棋盤支解問題" 嗎？

這個問題是在說：假設一個標準的 8×8 的西洋棋棋盤，移除左上角及右下角的 2 個方塊，餘下 62 個方塊。可不可以用 31 個 2×1 的骨牌來蓋上餘下方塊呢？

答案是不行的，至於原因就自己去查 wiki。

看完這個問題的你手邊正好有很多個 2×1 的骨牌和一些 $n \times m$ 的棋盤，又很剛好的這些棋盤都可能有一些格子被移除了，你想知道對於每個棋盤，到底要怎樣放才能放越多骨牌？

輸入

測資第一行有兩個數字 n, m ，代表接下來的棋盤為 $n \times m$ ，接著有 n 行，每行有 m 個 -1 或 0 的數， 0 代表這個格子是空的， -1 代表這個格子被移除了。

輸出

第一行輸出一個整數 k ，代表你認為這個棋盤能放 k 個 2×1 的骨牌，接著輸出 n 行，每行有 m 個 -1 到 k 的數， -1 和 0 代表意義如輸入所述，在輸入中為 -1 的格子，在輸出中也必須為 -1 ，而 1 到 k 的數每個數必須出現恰好兩次，且這兩個數字的曼哈頓距離必須恰好為 1 ，代表這兩個格子放了一個骨牌，請參考範例輸出。

評分標準

對於每筆測資的最佳數 T 如下測資所示，而你放了 k 個骨牌，定義分數比重 W 。

$$W = \begin{cases} 1 & \text{if } T \leq k \\ \frac{0.4k}{T} & \text{if } k < T \leq 2k \\ 0 & \text{if } T > 2k \end{cases}$$

本題共有 10 筆測資，測資描述如下所示。你在該筆測資的得分為 W 乘以該測資總分。

測資編號	$n \times m$	最佳數 T	總分
01	10×10	41	5
02	10×10	23	5
03	100×100	5000	3
04	100×100	2646	10
05	100×100	0	2
06	1×10000	4527	5
07	2×5000	4567	10
08	4×2500	4638	15
09	10×1000	3591	20
10	100×100	2109	25

範例

範例輸入 1

```
8 8
-1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 -1
```

範例輸出 1

```
30
-1 4 1 1 2 2 3 3
8 4 9 5 5 6 6 7
8 12 9 10 10 14 11 7
16 12 13 13 18 14 11 15
16 17 17 21 18 19 19 15
20 20 25 21 22 22 27 23
24 28 25 26 26 30 27 23
24 28 29 29 0 30 0 -1
```