




Amöben als Problemlöser





Tobias Weiden
Student Master Informatik
HAW Landshut



Das Sommerdilemma



Das Sommerdilemma




Das Sommerdilemma

Erlaubte Touren: $(n - 1)!/2$

Das Sommerdilemma


Erlaubte Touren: $(n - 1)!/2$



Computed by Wolfram|Alpha

Travelling Salesman Problem


Erlaubte Touren: $(n - 1)!/2$



Computed by Wolfram|Alpha


Travelling Salesman Problem

- Erlaubte Routen: $(n - 1)!/2$
- NP-Schweres Problem
- Suchzeit für optimale Route:



Computed by Wolfram|Alpha


Travelling Salesman Problem



Computed by Wolfram|Alpha

- Erlaubte Routen: $(n - 1)!/2$
- NP-Schweres Problem
- Suchzeit für optimale Route:
 $O(n^2)$

Das Sommerdilemma



Computed by Wolfram|Alpha

- Erlaubte Routen: $(n - 1)!/2$
- NP-Schweres Problem
- ~~Suchzeit für optimale Route:~~
 $\theta(n^2)$
- Gute Route zu annehmbarer Zeit

Inhaltsverzeichnis

1. Kleine Hilfe
2. Experiment
3. Resultate
4. Simulation

Amöben – Kluge Hilfe




Amöben – Kluge Hilfe



Physarum polycephalum

- Gruppe von Einzellern
- Gut erforscht
- Licht-avers


Amöben – Kluge Hilfe



Physarum polycephalum

- Wächst Wellenförmig (Oszillation)



Amöben – Kluge Hilfe



Physarum polycephalum



- Wächst Wellenförmig (Oszillation)

Versuchsaufbau




Versuchsaufbau

(a) $n = 4$




$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6} (X_{Ul}(t)) \right)$$



Status $X_{Vk}(t) \in [0.0, 1.0]$:

Abdeckung Der Linie Vk durch Amöbe

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



Computed by Wolfram|Alpha

$$\sigma_{\gamma, \theta} = 1 / (1 + \exp(-\gamma * (x - \theta)))$$

35

|

0.6


|

→ Sobald die Hälfte der Linie belegt ist steigt der Wert gegen 1

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

$$W_{Vk, Ul} \left\{ \begin{array}{ll} -0.5 & \text{Wenn } V = U \text{ und } k \neq l \\ -0.5 & \text{Wenn } V \neq U \text{ und } k = l \\ -v * dist(V, U) & \text{Wenn } V \neq U \text{ und } |k - l| = 1 \\ 0 & \text{Ansonsten} \end{array} \right.$$

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \underbrace{\sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)}_x$$




Computed by Wolfram|Alpha

$$\sigma_{\gamma, \theta} = 1 / (1 + \exp(-\gamma * (x - \theta)))$$

Nachbar oder Gegenüber belegt

➤ $L = 0.5$

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\underbrace{\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t))}_{x} \right)$$



Computed by Wolfram|Alpha




Nachbar oder
Gegenüber belegt


Nachbar und
Gegenüber frei

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk,Ul} * \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$


(a) $n = 4$




$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$




(a) $n = 4$




$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk,Ul} * \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$




$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$




Wofür entscheidet sich die Amöbe?

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk,Ul} * \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$




$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



Wofür entscheidet sich die Amöbe?

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$




Wofür entscheidet sich die Amöbe?

→ Zufall!

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

(a) $n = 4$




Wofür entscheidet sich der Pilz?

→ Zufall!

Ist das relevant?

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

(a) $n = 4$



$D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D$


Wofür entscheidet sich der Pilz?

→ Zufall!

Ist das relevant?

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

(a) $n = 4$



$D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow D$


Wofür entscheidet sich der Pilz?

→ Zufall!


Ist das relevant?

→ Nein, da Rundkurs!

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk,Ul} * \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



Leuchten A2, A3 & A4?

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$


$$W_{Vk, Ul} \left\{ \begin{array}{ll} -0.5 & \text{Wenn } V = U \text{ und } k \neq l \\ -0.5 & \text{Wenn } V \neq U \text{ und } k = l \\ -v * dist(V, U) & \text{Wenn } V \neq U \text{ und } |k - l| = 1 \\ 0 & \text{Ansonsten} \end{array} \right.$$

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

Für A2, A3 & A4 bei $Ul = A1$

$W_{Vk, Ul}$	{	-0.5	Wenn $V = U$ und $k \neq l$
		-0.5	Wenn $V \neq U$ und $k = l$
		$-v * dist(V, U)$	Wenn $V \neq U$ und $ k - l = 1$
		0	Ansonsten

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



Computed by Wolfram|Alpha

$$\sigma_{\gamma, \theta} = 1 / (1 + \exp(-\gamma * (x - \theta)))$$

35


|

0.6

|

- Sobald die Hälfte der Linie belegt ist steigt der Wert gegen 1

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk,Ul} * \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



Computed by Wolfram|Alpha

$$\sigma_{\gamma,\theta} = 1/(1 + \exp(-\gamma * (x - \theta)))$$

35

|

0.6


|

➤ Sobald die Hälfte der Linie belegt ist steigt der Wert gegen 1

$$X_{A1} \approx 1$$

$$X_{[A-D][1-4]/(A1)} \approx 0$$

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\underbrace{\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t))}_{x} \right)$$




Computed by Wolfram|Alpha



Nachbar oder
Gegenüber belegt


Nachbar und
Gegenüber frei

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\underbrace{\sum_{Ul} W_{Vk, Ul}}_{-0.5} * \underbrace{\sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t))}_{1} \right)$$



Computed by Wolfram|Alpha


$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\underbrace{\sum_{Ul} W_{Vk, Ul}}_{-0.5} * \underbrace{\sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t))}_{1} \right)$$




Computed by Wolfram|Alpha

$$L_{A2, A3, A4} = 0.5$$

$$L_{V_k}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} W_{V_k,Ul} * \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$




Leuchten B1, C1 & D1?

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

Für B1, C1 & D1 bei $Ul = A1$

$W_{Vk, Ul}$	-0.5	Wenn $V = U$ und $k \neq l$
	-0.5	Wenn $V \neq U$ und $k = l$
	$-v * dist(V, U)$	Wenn $V \neq U$ und $ k - l = 1$
	0	Ansonsten

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



Computed by Wolfram|Alpha

$$\sigma_{\gamma, \theta} = 1 / (1 + \exp(-\gamma * (x - \theta)))$$


$\begin{matrix} 35 & 0.6 \\ | & | \end{matrix}$

➤ Sobald die Hälfte der Linie belegt ist steigt der Wert gegen 1

$$X_{A1} \approx 1$$

$$X_{[A-D][1-4]/(A1)} \approx 0$$

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\underbrace{\sum_{Ul} W_{Vk, Ul}}_{-0.5} * \underbrace{\sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t))}_{1} \right)$$




Computed by Wolfram|Alpha




$$L_{B1, C1, D1} = 0.5$$

$$L_{V_k}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} W_{V_k,Ul} * \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



Leuchten B2, C2 & D2?

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

Für B2, C2 & D2 bei $Ul = A1$

$W_{Vk, Ul}$	{	-0.5	Wenn $V = U$ und $k \neq l$
		-0.5	Wenn $V \neq U$ und $k = l$
		$-v * dist(V, U)$	Wenn $V \neq U$ und $ k - l = 1$
		0	Ansonsten

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk,Ul} * \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

Für B2, C2 & D2 bei $Ul = A1$

$W_{Vk,Ul}$	-0.5	Wenn $V = U$ und $k \neq l$
	-0.5	Wenn $V \neq U$ und $k = l$
	$-v * dist(V, U)$	Wenn $V \neq U$ und $ k - l = 1$
	0	Ansonsten


$$n = 4 \rightarrow v = 0.00495$$

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

$$-v * \text{dist}(V, U)$$

$$n = 4 \rightarrow v = 0.00495$$


(a) $n = 4$



$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk,Ul} * \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

$$-v * dist(V, U) \quad n = 4 \rightarrow v = 0.00495$$

(a) $n = 4$




$$W_{A1,B2} = -0.00495 * 5 = -0.02475$$

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

$$-v * \text{dist}(V, U)$$

$$n = 4 \rightarrow v = 0.00495$$

(a) $n = 4$




$$W_{A1, B2} = -0.00495 * 5 = -0.02475$$

$$W_{A1, C2} = -0.00495 * 65 = -0.32175$$

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

$$-v * dist(V, U) \quad n = 4 \rightarrow v = 0.00495$$

(a) $n = 4$



$$W_{B2, A1} = -0.00495 * 5 = -0.02475$$

$$W_{C2, A1} = -0.00495 * 65 = -0.32175$$


$$W_{D2, A1} = -0.00495 * 35 = -0.17325$$

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} \underbrace{W_{Vk,Ul}}_{\substack{W_{B2,A1} = -0.02475 \\ W_{C2,A1} = -0.32175 \\ W_{D2,A1} = -0.17325}} * \underbrace{\sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t))}_1 \right)$$

$$W_{B2,A1} = -0.02475 \quad 1$$

$$W_{C2,A1} = -0.32175$$


$$W_{D2,A1} = -0.17325$$



Computed by Wolfram|Alpha




$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



Leuchten B2, C2 & D2?

→ Nein

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$




Leuchtet der Rest?

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

Für Rest bei $Ul = A1$

$W_{Vk, Ul}$	{	-0.5	Wenn $V = U$ und $k \neq l$
		-0.5	Wenn $V \neq U$ und $k = l$
		$-v * dist(V, U)$	Wenn $V \neq U$ und $ k - l = 1$
		0	Ansonsten

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\underbrace{\sum_{Ul} W_{Vk, Ul}}_0 * \underbrace{\sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t))}_1 \right)$$




Computed by Wolfram|Alpha


Nachbar oder Gegenüber belegt

Nachbar und Gegenüber frei

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk,Ul} * \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$




$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



Welcher Ort wird als nächstes besucht?

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



Welcher Ort wird als nächstes besucht?


B2, C2 oder D2?

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} \underbrace{W_{Vk, Ul}}_{\substack{W_{B2, A1} = -0.02475 \\ W_{C2, A1} = -0.32175 \\ W_{D2, A1} = -0.17325}} * \underbrace{\sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t))}_1 \right)$$

$$W_{B2, A1} = -0.02475 \quad 1$$

$$W_{C2, A1} = -0.32175$$

$$W_{D2, A1} = -0.17325$$



Computed by Wolfram|Alpha




$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} \underbrace{W_{Vk,Ul}}_{\substack{W_{B2,A1} = -0.02475 \\ W_{C2,A1} = -0.32175 \\ W_{D2,A1} = -0.17325}} * \underbrace{\sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t))}_1 \right)$$

$$W_{B2,A1} = -0.02475 \quad 1$$

$$W_{C2,A1} = -0.32175$$

$$W_{D2,A1} = -0.17325$$

$$X_{B2,C2,D2} \rightarrow \mathbf{1}$$



Computed by Wolfram|Alpha



$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

Für B2, C2 & D2 bei $Ul \in \{B2, C2, D2\}$

$W_{Vk, Ul}$	-0.5	Wenn $V = U$ und $k \neq l$
	-0.5	Wenn $V \neq U$ und $k = l$
	$-v * dist(V, U)$	Wenn $V \neq U$ und $ k - l = 1$
	0	Ansonsten


$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} \underbrace{W_{Vk,Ul}}_{\substack{W_{B2,A1} = -0.02475 \\ W_{C2,A1} = -0.32175 \\ W_{D2,A1} = -0.17325}} * \underbrace{\sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t))}_1 \right)$$

$$W_{B2,A1} = -0.02475 \quad 1$$

$$W_{C2,A1} = -0.32175$$

$$W_{D2,A1} = -0.17325$$

$$X_{B2,C2,D2} \rightarrow 1 \text{ mit } W_{B2,C2,D2} = -0.5$$



Computed by Wolfram|Alpha




$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} \underbrace{W_{Vk,Ul}}_{\substack{W_{B2,A1} = -0.02475 \\ W_{C2,A1} = -0.32175 \\ W_{D2,A1} = -0.17325}} * \underbrace{\sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t))}_1 \right)$$

$$W_{B2,A1} = -0.02475 \quad 1$$

$$W_{C2,A1} = -0.32175$$

$$W_{D2,A1} = -0.17325$$

$$X_{B2,C2,D2} \rightarrow 1 \text{ mit } W_{B2,C2,D2} = -0.5$$



Computed by Wolfram|Alpha



$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} \underbrace{W_{Vk,Ul}}_{\substack{W_{B2,A1} = -0.02475 \\ W_{C2,A1} = -0.32175 \\ W_{D2,A1} = -0.17325}} * \underbrace{\sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t))}_1 \right)$$


$$W_{B2,A1} = -0.02475 \quad 1$$

$$W_{C2,A1} = -0.32175$$

$$W_{D2,A1} = -0.17325$$

$$X_{B2,C2,D2} \rightarrow 1 \text{ mit } W_{B2,C2,D2} = -0.5$$

→ C2 leuchtet



Computed by Wolfram|Alpha



$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} \underbrace{W_{Vk,Ul}}_{\substack{W_{B2,A1} = -0.02475 \\ W_{C2,A1} = -0.32175 \\ W_{D2,A1} = -0.17325}} * \underbrace{\sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t))}_1 \right)$$

$$W_{B2,A1} = -0.02475 \quad 1$$


$$W_{C2,A1} = -0.32175$$

$$W_{D2,A1} = -0.17325$$

$$X_{B2,C2,D2} \rightarrow 1 \text{ mit } W_{B2,C2,D2} = -0.5$$

→ C2 leuchtet


→ D2 leuchtet



Computed by Wolfram|Alpha



$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$




Welcher Ort wird als nächstes besucht?

B2, C2 oder D2?

→ C2 & D2 leuchten

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$




Welcher Ort wird als nächstes besucht?

B2, C2 oder D2?

→ C2 & D2 leuchten

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$




Welcher Ort wird als nächstes besucht?

B2, C2 oder D2?

→ C2 & D2 leuchten

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



Welcher Ort wird als nächstes besucht?


C3 oder D3?

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

$$-v * dist(V, U)$$

$$n = 4 \rightarrow v = 0.00495$$

(a) $n = 4$




$$W_{C3, B2}$$

$$W_{D3, B2}$$

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

$$-v * dist(V, U) \quad n = 4 \rightarrow v = 0.00495$$

(a) $n = 4$




$$W_{C3, B2} = -0.00495 * 35 = -0.17325$$

$$W_{D3, B2} = -0.00495 * 65 = -0.32175$$

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

$$-v * dist(V, U) \quad n = 4 \rightarrow v = 0.00495$$

(a) $n = 4$



$$W_{C3, B2} = -0.00495 * 35 = -0.17325$$


$$W_{D3, B2} = -0.00495 * 65 = -0.32175$$

→ D3 wird zuerst leuchten

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

$$-v * dist(V, U) \quad n = 4 \rightarrow v = 0.00495$$

(a) $n = 4$



$$W_{C3, B2} = -0.00495 * 35 = -0.17325$$


$$W_{D3, B2} = -0.00495 * 65 = -0.32175$$

→ D3 wird zuerst leuchten

Merke:

**Um so höher der Abstand,
um so schneller geht Lampe an!**


$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



Welcher Ort wird als nächstes besucht?

C3 oder D3?

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$




Welcher Ort wird als nächstes besucht?

C3 oder D3?

→ D3 leuchtet

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$




Welcher Ort wird als nächstes besucht?

C3 oder D3?

→ D3 leuchtet


$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



D4 noch ohne Licht


→ Besetzt

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk,Ul} * \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



Besetzt:
A1, B2, C3, D4

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000,-0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk,Ul} * \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$




Besetzt:
A1, B2, C3, D4

Rundgang:
A → *B* → *C* → *D* → *A*

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

(a) $n = 4$




Rundgang:

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

(a) $n = 4$




Rundgang:

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$

$$\begin{aligned} & \mathbf{5 + 35 + 25 + 35} \\ & \mathbf{= 100} \end{aligned}$$

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$



Rundgang:


$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$

$5 + 35 + 25 + 35$

$= 100$

→ Idealer Weg gefunden

Resultate




Resultate

n	4	5	6	7	8
mean tour length L_{mean} (known in advance)	153.3	150.0	145.2	146.0	149.1
number of experimental trials T	12	11	12	11	23
best tour length (found in experiment)	100	112	100	121	117
worst tour length (found in experiment)	200	168	174	151	165
Av. tour length L_{exp} (found in experiment)	142.0	129.2	133.3	137.6	133.8
$L_{\text{exp}}/L_{\text{mean}}$	0.926	0.861	0.918	0.942	0.897
top quality (%)	(33.3)	(25)	(33.3)	(37.5)	(20.7)


Resultate

n	4	5	6	7	8
number of successful trials S (succeeded in finding a feasible solution)	10	10	10	10	21
success rate S/T (%)	83.3	90.9	83.3	90.9	91.3
Av. search time (min)	21.6	24.9	34.9	39.6	45.9



Resultate



Resultate



Resultate



AmoebaTSP - Initialisierung

$t = 0$;

FOR $Vk = City_1$ to $City_n$, $Ul = City_1$ to $City_n$

Determine coupling weight $W_{Vk,Ul}$ according to Eq. (3) ;

FOR $Vk = City_1$ to $City_n$

Initialize $X_{Vk}(0) = X_0$ such that $\sigma_{35,0.6}(X_0) = 1/(n^2 - 1)$;

Initialize $S(0) = 0$;

AmoebaTSP - Oszillation

```
WHILE  $t < t_{Max}$  do
  IF a configuration of all  $X_{Vk}(t)$  represents a consistent TSP tour
  THEN RETURN the tour ;
  ELSE
    FOR  $Vk = City_1$  to  $City_n$ 
      Determine  $\epsilon_{Vk}(t)$  as a randomly chosen real number in  $(-0.003, 0.003)$  ;
      Determine  $L_{Vk}(t + 1) = 1 - \sigma_{1000,-0.5}(\sum_{Ul} W_{Vk,Ul} \cdot \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t) + \epsilon_{Vk}(t)))$  ;
      IF lane  $Vk$  is illuminated ( $L_{Vk}(t + 1) > 0.5$ )
        THEN Determine  $O_{Vk}(t + 1) = 2 \cdot \Delta^{out} \cdot \sigma_{20,0.6}(X_{Vk}(t) + \epsilon_{Vk}(t))$  ;
        ELSE Determine  $O_{Vk}(t + 1) = 0$  ;
      CALL StockRedistribution ;
    FOR  $Vk = City_1$  to  $City_n$ 
      IF lane  $Vk$  is not illuminated ( $L_{Vk}(t + 1) \leq 0.5$ )
        THEN Update  $X_{Vk}(t + 1) = X_{Vk}(t) + I_{Vk}(t + 1)$  ;
        ELSE Update  $X_{Vk}(t + 1) = X_{Vk}(t) - O_{Vk}(t + 1)$  ;
  END WHILE
```


AmoebaTSP – Ressourcen-Verteilung

SUBROUTINE: StockRedistribution

Determine $L^{off}(t + 1)$ as the number of non-illuminated ($L_{Vk}(t + 1) \leq 0.5$) lanes ;

IF $L^{off}(t + 1) = 0$

THEN Update $S(t + 1) = S(t) + \sum_{Vk} O_{Vk}(t + 1) + \Delta^{in}$;

Determine $I_{Vk}(t + 1) = 0$;

ELSE Update $S(t + 1) = 0$;

Determine $I_{Vk}(t + 1) = (S(t) + \sum_{Vk} O_{Vk}(t + 1) + \Delta^{in}) / L^{off}(t + 1)$;

END SUBROUTINE

AmoebaTSP - Probleme

AmoebaTSP - Probleme

$$L_{Vk}(t + \Delta t) = 1 - \sigma_{1000, -0.5} \left(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} * \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t)) \right)$$

$W_{Vk, Ul}$	{	-0.5	Wenn $V = U$ und $k \neq l$
		-0.5	Wenn $V \neq U$ und $k = l$
		$-v * dist(V, U)$	Wenn $V \neq U$ und $ k - l = 1$
		0	Ansonsten

AmoebaTSP - Probleme

```
WHILE  $t < t_{Max}$  do
  IF a configuration of all  $X_{Vk}(t)$  represents a consistent TSP tour
  THEN RETURN the tour ;
  ELSE
    FOR  $Vk = City_11$  to  $City_n n$ 
      Determine  $\epsilon_{Vk}(t)$  as a randomly chosen real number in  $(-0.003, 0.003)$  ;
      Determine  $L_{Vk}(t + 1) = 1 - \sigma_{1000, -0.5}(\sum_{Ul} W_{Vk, Ul} \cdot \sigma_{35, 0.6}(X_{Ul}(t) + \epsilon_{Vk}(t)))$  ;
      IF lane  $Vk$  is illuminated ( $L_{Vk}(t + 1) > 0.5$ )
        THEN Determine  $O_{Vk}(t + 1) = 2 \cdot \Delta^{out} \cdot \sigma_{20, 0.6}(X_{Vk}(t) + \epsilon_{Vk}(t))$  ;
        ELSE Determine  $O_{Vk}(t + 1) = 0$  ;
      CALL StockRedistribution ;
    FOR  $Vk = City_11$  to  $City_n n$ 
      IF lane  $Vk$  is not illuminated ( $L_{Vk}(t + 1) \leq 0.5$ )
        THEN Update  $X_{Vk}(t + 1) = X_{Vk}(t) + I_{Vk}(t + 1)$  ;
        ELSE Update  $X_{Vk}(t + 1) = X_{Vk}(t) - O_{Vk}(t + 1)$  ;
  END WHILE
```

AmoebaTSP - Probleme

```
WHILE  $t < t_{Max}$  do
  IF a configuration of all  $X_{Vk}(t)$  represents a consistent TSP tour
  THEN RETURN the tour ;
  ELSE
    FOR  $Vk = City_1$  to  $City_n$ 
      Determine  $\epsilon_{Vk}(t)$  as a randomly chosen real number in  $(-0.003, 0.003)$  ;
      Determine  $L_{Vk}(t + 1) = 1 - \sigma_{1000,-0.5}(\sum_{Ul} W_{Vk,Ul} \cdot \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t) + \epsilon_{Vk}(t)))$  ;
      IF lane  $Vk$  is illuminated ( $L_{Vk}(t + 1) > 0.5$ )
        THEN Determine  $O_{Vk}(t + 1) = 2 \cdot \Delta^{out} \cdot \sigma_{20,0.6}(X_{Vk}(t) + \epsilon_{Vk}(t))$  ;
        ELSE Determine  $O_{Vk}(t + 1) = 0$  ;
      CALL StockRedistribution ;
    FOR  $Vk = City_1$  to  $City_n$ 
      IF lane  $Vk$  is not illuminated ( $L_{Vk}(t + 1) \leq 0.5$ )
        THEN Update  $X_{Vk}(t + 1) = X_{Vk}(t) + I_{Vk}(t + 1)$  ;
        ELSE Update  $X_{Vk}(t + 1) = X_{Vk}(t) - O_{Vk}(t + 1)$  ;
  END WHILE
```

AmoebaTSP - Probleme

WHILE $t < t_{Max}$ do

IF a configuration of all $X_{Vk}(t)$ represents a consistent TSP *tour*

THEN RETURN the *tour* ;

ELSE

FOR $Vk = City_1$ to $City_n$

Determine $\epsilon_{Vk}(t)$ as a randomly chosen real number in $(-0.003, 0.003)$;

Determine $L_{Vk}(t + 1) = 1 - \sigma_{1000,-0.5}(\sum_{Ul} W_{Vk,Ul} \cdot \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t) + \epsilon_{Vk}(t)))$;

IF lane Vk is illuminated ($L_{Vk}(t + 1) > 0.5$)

THEN Determine $O_{Vk}(t + 1) = 2 \cdot \Delta^{out} \cdot \sigma_{20,0.6}(X_{Vk}(t) + \epsilon_{Vk}(t))$;

ELSE Determine $O_{Vk}(t + 1) = 0$;

CALL StockRedistribution ;

FOR $Vk = City_1$ to $City_n$

IF lane Vk is not illuminated ($L_{Vk}(t + 1) \leq 0.5$)



THEN Update $X_{Vk}(t + 1) = X_{Vk}(t) + I_{Vk}(t + 1)$;

ELSE Update $X_{Vk}(t + 1) = X_{Vk}(t) - O_{Vk}(t + 1)$;

END WHILE

$O(n^4)$



AmoebaTSP – Parallel Computing



AmoebaTSP – Dennoch Probleme?

```
WHILE  $t < t_{Max}$  do
  IF a configuration of all  $X_{Vk}(t)$  represents a consistent TSP tour
  THEN RETURN the tour ;
  ELSE
    FOR  $Vk = City_1$  to  $City_n$ 
      Determine  $\epsilon_{Vk}(t)$  as a randomly chosen real number in  $(-0.003, 0.003)$  ;
      Determine  $L_{Vk}(t + 1) = 1 - \sigma_{1000,-0.5}(\sum_{Ul} W_{Vk,Ul} \cdot \sigma_{35,0.6}(X_{Ul}(t) + \epsilon_{Vk}(t)))$  ;
      IF lane  $Vk$  is illuminated ( $L_{Vk}(t + 1) > 0.5$ )
        THEN Determine  $O_{Vk}(t + 1) = 2 \cdot \Delta^{out} \cdot \sigma_{20,0.6}(X_{Vk}(t) + \epsilon_{Vk}(t))$  ;
        ELSE Determine  $O_{Vk}(t + 1) = 0$  ;
      CALL StockRedistribution ;
    FOR  $Vk = City_1$  to  $City_n$ 
      IF lane  $Vk$  is not illuminated ( $L_{Vk}(t + 1) \leq 0.5$ )
        THEN Update  $X_{Vk}(t + 1) = X_{Vk}(t) + I_{Vk}(t + 1)$  ;
        ELSE Update  $X_{Vk}(t + 1) = X_{Vk}(t) - O_{Vk}(t + 1)$  ;
  END WHILE
```


AmoebaTSP – Dennoch Probleme?




Quellen

- <https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rsos.180396>
- <https://de.wikipedia.org/wiki/Amöbe>
- https://de.wikipedia.org/wiki/Physarum_polycephalum
- <https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsif.2016.0030>
- [https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+1%2F\(1%2Bexp\(-35*\(x-0.6\)\)\)\(x+from+0+to+1\)](https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+1%2F(1%2Bexp(-35*(x-0.6)))(x+from+0+to+1))
- [https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+1%2F\(1%2Bexp\(-1000*\(x%2B0.5\)\)\)\(x+from+-1.5+to+0.5\)](https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+1%2F(1%2Bexp(-1000*(x%2B0.5)))(x+from+-1.5+to+0.5))
- [https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+\(1-\(1%2F\(1%2Bexp\(-1000*\(x%2B0.5\)\)\)\)\)\(x+from+-1.5+to+0.5\)](https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+(1-(1%2F(1%2Bexp(-1000*(x%2B0.5)))))(x+from+-1.5+to+0.5))
- [https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+\(x-1\)!%2F2\(x+from+0+to+9\)](https://www.wolframalpha.com/input/?i=plot+(x-1)!%2F2(x+from+0+to+9))

Bild-Quellen

- <https://www.retroplanet.com/PROD/48908.html>
- <https://www.invaluable.com/auction-lot/original-american-rakleigh-bicycle-poster-1950s-b-51-c-7d24d9b8d3>
- <http://www.juedische-gemeinden.de/index.php/gemeinden/k-l/1147-landshut-niederbayern>
- https://de.wikipedia.org/wiki/Physarum_polycephalum#/media/File:Physarum_polycephalum_plasmodium.jpg
- <https://www.pinterest.de/pin/123004633545569987/>



Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Noch Fragen?!